



1995 年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题

一、填空题(本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{2}{\sin x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^0 x \cos t^2 dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设 $(a \times b) \cdot c = 2$, 则 $[(a+b) \times (b+c)] \cdot (c+a) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设三阶方阵 A 、 B 满足关系式: $A^{-1}BA = 6A + BA$, 且 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$, 则 $B =$

$\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 设有直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0, \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\Pi: 4x-2y+z-3=0$, 则直线 L ()

(A) 平行于 Π (B) 在 Π 上 (C) 垂直于 Π (D) 与 Π 斜交

(2) 设在 $[0,1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0)$ 、 $f'(1)$ 、 $f(1)-f(0)$ 或 $f(0)-f(1)$ 的大小顺序是 ()

(A) $f'(1) > f'(0) > f(1)-f(0)$ (B) $f'(1) > f(1)-f(0) > f'(0)$

(C) $f(1)-f(0) > f'(1) > f'(0)$ (D) $f'(1) > f(0)-f(1) > f'(0)$

(3) 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1+|\sin x|)$, 则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 ()

(A) 充分必要条件 (B) 充分条件但非必要条件
(C) 必要条件但非充分条件 (D) 既非充分条件又非必要条件

(4) 设 $u_n = (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$, 则级数 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛 (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散



(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

(5) 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则必有 ()

(A) $AP_1P_2 = B$

(B) $AP_2P_1 = B$

(C) $P_1P_2A = B$

(D) $P_2P_1A = B$

三、(本题共 2 小题, 每小题 5 分, 满分 10 分.)

(1) 设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \sin x$, 其中 f 、 φ 都具有有一阶连续偏导数, 且

$$\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0, \text{ 求 } \frac{du}{dx}.$$

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$.

四、(本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分.)

(1) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分.

(2) 将函数 $f(x) = x - 1 (0 \leq x \leq 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

五、(本题满分 7 分)

设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内, L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交, 交点记为 A . 已知

$$|\overline{MA}| = |\overline{OA}|, \text{ 且 } L \text{ 过点 } \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right), \text{ 求 } L \text{ 的方程.}$$

六、(本题满分 8 分)

设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xy dx + Q(x, y) dy$ 与路径无关, 并且对任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy dx + Q(x, y) dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy dx + Q(x, y) dy,$$

求 $Q(x, y)$.



七、(本题满分 8 分)

假设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶倒数, 并且

$g''(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b)$, 试证:

(1) 在开区间 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$;

(2) 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

八、(本题满分 7 分)

设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 对应于 λ_1 的特征向量为

$\xi_1 = (0, 1, 1)^T$, 求 A .

九、(本题满分 6 分)

设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $AA^T = E$ (E 是 n 阶单位阵, A^T 是 A 的转置矩阵), $|A| < 0$, 求

$|A + E|$.

十、填空题(本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分.)

(1) 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数, 每次射中目标的概率为 0.4, 则 X^2 的数学期望 $E(X^2) =$ _____.

(2) 设 X 和 Y 为两个随机变量, 且

$$P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}, \quad P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = \frac{4}{7},$$

则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} =$ _____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度

$f_Y(y)$.

1995 年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题解析

一、填空题(本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)



(1) 【答案】 e^6

【解析】这是 1^∞ 型未定式求极限，

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{2}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{1}{3x} \cdot \frac{2}{\sin x}},$$

令 $3x=t$ ，则当 $x \rightarrow 0$ 时， $t \rightarrow 0$ ，所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{1}{3x}} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e,$$

故
$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{2}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{6x}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x}{\sin x}} = e^{6 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x}} = e^6.$$

(2) 【答案】 $\int_{x^2}^0 \cos t^2 dt - 2x^2 \cos x^4$

【解析】

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{x^2}^0 x \cos t^2 dt &= \frac{d}{dx} \left(x \int_{x^2}^0 \cos t^2 dt \right) \\ &= \int_{x^2}^0 \cos t^2 dt - x \cos (x^2)^2 \cdot (2x) \\ &= \int_{x^2}^0 \cos t^2 dt - 2x^2 \cos x^4. \end{aligned}$$

【相关知识点】积分上限函数的求导公式：

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt = f(\beta(x)) \beta'(x) - f(\alpha(x)) \alpha'(x).$$

(3) 【答案】 4

【解析】利用向量运算律有

$$\begin{aligned} & [(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) \\ &= [(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{b}] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) + [(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c}] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) \\ &= (\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} + \vec{a}) + (\vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}) \cdot (\vec{c} + \vec{a}) \quad (\text{其中 } \vec{b} \times \vec{b} = \vec{0}) \\ &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} + (\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} \\ &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} \\ &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 4. \end{aligned}$$

(4) 【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】令 $a_n = \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ ，则当 $n \rightarrow \infty$ 时，有



$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{n+1}{2^{n+1} + (-3)^{n+1}} x^{2(n+1)-1} \right|}{\left| \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1} \right|} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} x^2 \cdot \left| \frac{n+1}{n} \cdot \frac{3^n \left[\left(\frac{2}{3} \right)^n + (-1)^n \right]}{3^{n+1} \left[\left(\frac{2}{3} \right)^{n+1} + (-1)^{n+1} \right]} \right| = \frac{1}{3} x^2,\end{aligned}$$

而当 $\frac{1}{3}x^2 < 1$ 时, 幂级数收敛, 即 $|x| < \sqrt{3}$ 时, 此幂级数收敛, 当 $\frac{1}{3}x^2 > 1$ 时, 即 $|x| > \sqrt{3}$ 时, 此幂级数发散, 因此收敛半径为 $R = \sqrt{3}$.

(5) 【答案】 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

【解析】在已知等式 $A^{-1}BA = 6A + BA$ 两边右乘以 A^{-1} , 得 $A^{-1}B = 6E + B$, 即

$$(A^{-1} - E)B = 6E.$$

因为 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$, 所以

$$B = 6(A^{-1} - E)^{-1} = 6 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

二、选择题(本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】(C)

【解析】这是讨论直线 L 的方向向量与平面 Π 的法向量的相互关系问题.

直线 L 的方向向量

$$l = \begin{pmatrix} i & j & k \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -10 \end{pmatrix} = -28i + 14j - 7k = -7(4i - 2j + k),$$

平面 Π 的法向量 $n = 4i - 2j + k$, $l \parallel n$, $L \perp \Pi$. 应选 (C).

(2) 【答案】(B)

【解析】由 $f''(x) > 0$ 可知 $f'(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上为严格单调递增函数, 故



$$f'(1) > f'(x) > f'(0), (0 < x < 1)$$

由微分中值定理, $f(1) - f(0) = f'(\xi), (0 < \xi < 1)$. 所以

$$f'(1) > f(1) - f(0) = f'(\xi) > f'(0), (0 < \xi < 1)$$

故应选择(B).

(3) 【答案】(A)

【解析】由于利用观察法和排除法都很难对本题作出选择, 必须分别验证充分条件和必要条件.

充分性: 因为 $f(0) = 0$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)(1 + |\sin x|)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0),$$

由此可得 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

必要性: 设 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 $f(x) \cdot |\sin x|$ 在 $x = 0$ 处可导, 由可导的充要条件知

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) \cdot |\sin x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) \cdot |\sin x|}{x}. \quad ①$$

根据重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|\sin x|}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|\sin x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad ②$$

结合①, ②, 我们有 $f(0) = -f(0)$, 故 $f(0) = 0$. 应选(A).

(4) 【答案】(C)

【解析】这是讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 敛散性的问题.

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ 是交错级数, 显然 $\ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ 单调下降趋于零, 由莱布尼兹判别法知, 该

级数收敛.

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \ln^2 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ 中, $u_n^2 = \ln^2 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \sim \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right)^2 = \frac{1}{n}$.

根据正项级数的比较判别法以及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散. 因此, 应选(C).

【相关知识点】正项级数的比较判别法:



设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{u_n} = A$, 则

(1) 当 $0 < A < +\infty$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同时收敛或同时发散;

(2) 当 $A = 0$ 时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛; 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

(3) 当 $A = +\infty$ 时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

(5) 【答案】(C)

【解析】 P_1 是交换单位矩阵的第一、二行所得初等矩阵, P_2 是将单位矩阵的第一行加到第三行所得初等矩阵;

而 B 是由 A 先将第一行加到第三行, 然后再交换第一、二行两次初等交换得到的, 因此 $P_1 P_2 A = B$, 故应选 (C).

三、(本题共 2 小题, 每小题 5 分, 满分 10 分.)

(1) 【解析】这实质上已经变成了由方程式确定的隐函数的求导与带抽象函数记号的复合函数求导相结合的问题.

先由方程式 $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, 其中 $y = \sin x$ 确定 $z = z(x)$, 并求 $\frac{dz}{dx}$.

将方程两边对 x 求导得

$$\varphi'_1 \cdot 2x + \varphi'_2 \cdot e^y \cos x + \varphi'_3 \cdot \frac{dz}{dx} = 0,$$

解得
$$\frac{dz}{dx} = -\frac{1}{\varphi'_3} (\varphi'_1 \cdot 2x + \varphi'_2 \cdot e^y \cos x). \quad \textcircled{1}$$

现再将 $u = f(x, y, z)$ 对 x 求导, 其中 $y = \sin x$, $z = z(x)$,

可得
$$\frac{du}{dx} = f'_1 + f'_2 \cdot \cos x + f'_3 \cdot \frac{dz}{dx}.$$

将①式代入得
$$\frac{du}{dx} = f'_1 + f'_2 \cdot \cos x - f'_3 \cdot \frac{1}{\varphi'_3} (\varphi'_1 \cdot 2x + \varphi'_2 \cdot e^y \cos x).$$

【相关知识点】多元复合函数求导法则: 如果函数 $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ 都在点 (x, y) 具有对 x 及对 y 的偏导数, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 具有连续偏导数, 则复合函数

$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ 在点 (x, y) 的两个偏导数存在, 且有



$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = f'_1 \frac{\partial u}{\partial x} + f'_2 \frac{\partial v}{\partial x};$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = f'_1 \frac{\partial u}{\partial y} + f'_2 \frac{\partial v}{\partial y}.$$

(2) 【解析】方法一：用重积分的方法.

将累次积分 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy$ 表成二重积分

$$I = \iint_D f(x)f(y)dxdy,$$

其中 D 如右图所示. 交换积分次序

$$I = \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y)dx.$$

由于定积分与积分变量无关, 改写成

$$I = \int_0^1 dx \int_0^x f(y)f(x)dy.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 2I &= \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy + \int_0^1 dx \int_0^x f(x)f(y)dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 f(x)f(y)dy = \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 f(y)dy = A^2. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{2} A^2.$$

方法二：用分部积分法.

注意 $d\left(\int_x^1 f(y)dy\right) = -f(x)dx$, 将累次积分 I 写成

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(f(x) \int_x^1 f(y)dy \right) dx = - \int_0^1 \int_x^1 f(y)dy d\left(\int_x^1 f(y)dy \right) \\ &= -\frac{1}{2} \left(\int_x^1 f(y)dy \right)^2 \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2} A^2. \end{aligned}$$

四、(本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分.)

(1) 【解析】将曲面积分 I 化为二重积分 $I = \iint_{D_{xy}} f(x, y)dxdy$.



首先确定被积函数 $f(x, y) = z\sqrt{1+z_x^2+z_y^2} = \sqrt{2}\sqrt{x^2+y^2}$,

对锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 而言, $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2} = \sqrt{1+\frac{x^2}{x^2+y^2}+\frac{y^2}{x^2+y^2}} = \sqrt{2}$.

其次确定积分区域即 Σ 在 xOy 平面的投影区域 D_{xy}

(见右图), 按题意:

$$D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 2x, \text{ 即 } (x-1)^2 + y^2 \leq 1.$$





$$I = \iint_{D_{xy}} \sqrt{2} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy.$$

作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$D_{xy} : 0 \leq r \leq 2 \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

因此
$$I = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r \cdot r dr = 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3} r^3 \Big|_0^{2 \cos \theta} d\theta = \frac{32}{9} \sqrt{2}.$$

(2) 【解析】这就是将 $f(x)$ 作偶延拓后再作周期为 4 的周期延拓. 于是得 $f(x)$ 的傅氏系数:

$$b_n = 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad l = 2 \quad \int_0^2 (x-1) \cos \frac{n\pi}{2} x dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^2 (x-1) d \sin \frac{n\pi}{2} x = -\frac{2}{n\pi} \int_0^2 \sin \frac{n\pi}{2} x dx \\ &= \frac{4}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi}{2} x \Big|_0^2 = \frac{4}{n^2 \pi^2} ((-1)^n - 1) \\ &= \begin{cases} \frac{-8}{(2k-1)^2 \pi^2}, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{2}{2} \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 (x-1) dx = \frac{1}{2} (x-1)^2 \Big|_0^2 = 0.$$

由于(延拓后) $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 分段单调、连续且 $f(-1) = 1$. 于是 $f(x)$ 有展开式

$$f(x) = -\frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi}{2} x, x \in [0, 2].$$

五、(本题满分 7 分)

【解析】设点 M 的坐标为 (x, y) , 则 M 处的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$.

令 $X = 0$, 得 $Y = y - xy'$, 切线与 y 轴的交点为 $A(0, y - xy')$. 由 $|\overline{MA}| = |\overline{OA}|$, 有

$$\sqrt{x^2 + (xy')^2} = |y - xy'|.$$

化简后得伯努利方程 $2yy' - \frac{1}{x}y^2 = -x, \quad (y^2)' - \frac{1}{x}y^2 = -x.$

令 $z = y^2$, 方程化为一阶线性方程 $(z)' - \frac{1}{x}z = -x.$



解得 $z = x(c - x)$, 即 $y^2 = cx - x^2$, 亦即 $y = \sqrt{cx - x^2}$.

又由 $y\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}$, 得 $c = 3$, L 的方程为 $y = \sqrt{3x - x^2} (0 < x < 3)$.

六、(本题满分 8 分)

【解析】在平面上 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关 (其中 P, Q 有连续偏导数),

$$\Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \text{ 即 } \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x.$$

对 x 积分得 $Q(x, y) = x^2 + \varphi(y)$, 其中 $\varphi(y)$ 待定. 代入另一等式得对 $\forall t$,

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + (x^2 + \varphi(y))dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + (x^2 + \varphi(y))dy. \quad \textcircled{1}$$

下面由此等式求 $\varphi(y)$.

方法一：易求得原函数

$$\begin{aligned} 2xydx + (x^2 + \varphi(y))dy &= ydx^2 + x^2dy + \varphi(y)dy \\ &= d(x^2y) + d\left(\int_0^y \varphi(s)ds\right) = d\left(x^2y + \int_0^y \varphi(s)ds\right). \end{aligned}$$



于是由①式得 $\left(x^2y + \int_0^y \varphi(s)ds\right)\Big|_{(0,0)}^{(t,1)} = \left(x^2y + \int_0^y \varphi(s)ds\right)\Big|_{(0,0)}^{(1,t)}.$

$$\text{即 } t^2 + \int_0^1 \varphi(s)ds = t + \int_0^t \varphi(s)ds, \text{ 亦即 } t^2 = t + \int_1^t \varphi(s)ds.$$

$$\text{求导得 } 2t = 1 + \varphi(t), \text{ 即 } \varphi(t) = 2t - 1.$$

$$\text{因此 } Q(x, y) = x^2 + 2y - 1.$$

方法二：取特殊的积分路径：对①式左端与右端积分分别取积分路径如下图所示.



$$\text{于是得 } \int_0^1 (t^2 + \varphi(y))dy = \int_0^t (1 + \varphi(y))dy.$$

$$\text{即 } t^2 + \int_0^1 \varphi(y)dy = t + \int_0^t \varphi(y)dy, \text{ 亦即 } t^2 = t + \int_1^t \varphi(y)dy.$$

其余与方法一相同.



七、(本题满分 8 分)

【解析】(1) 反证法. 假设 $\exists c \in (a, b)$, 使 $g(c) = 0$. 则由罗尔定理, $\exists \xi_1 \in (a, c)$ 与 $\xi_2 \in (c, b)$,

使 $g'(\xi_1) = g'(\xi_2) = 0$; 从而由罗尔定理, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, $g''(\xi) = 0$. 这与

$g''(x) \neq 0$ 矛盾.

(2) 证明本题的关键问题是: “对谁使用罗尔定理?” 换言之, “谁的导数等于零?”

这应该从所要证明的结果来考察. 由证明的结果可以看出本题即证 $f(x)g''(x) - f''(x)g(x)$ 在 (a, b) 存在零点.

方法一: 注意到 $f(x)g''(x) - f''(x)g(x) = (f(x)g'(x) - f'(x)g(x))'$,

考察 $f(x)g''(x) - f''(x)g(x)$ 的原函数, 令

$$\varphi(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x),$$

$\Rightarrow \varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$. 由罗尔定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $\varphi'(\xi) = 0$. 即有

$$f(\xi)g''(\xi) - f''(\xi)g(\xi) = 0, \text{ 亦即 } \frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

方法二: 若不能像前面那样观察到 $f(x)g''(x) - f''(x)g(x)$ 的原函数, 我们也可以用积分来讨论这个问题:

$$f(x)g''(x) - f''(x)g(x) = (?)' \Leftrightarrow \int [f(x)g''(x) - f''(x)g(x)] dx = ?.$$

$$\begin{aligned} \int [f(x)g''(x) - f''(x)g(x)] dx &= \int f(x)dg'(x) - \int g(x)df'(x) \\ &= \left[f(x)g'(x) - \int g'(x)f'(x)dx \right] - \left[f'(x)g(x) - \int f'(x)g'(x)dx \right] \\ &= f(x)g'(x) - f'(x)g(x) \quad (\text{取 } C = 0). \end{aligned}$$

令 $\varphi(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$, 其余与方法一相同.

八、(本题满分 7 分)

【解析】设对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的特征向量为 $\xi = (x_1, x_2, x_3)^T$, 因为 A 为实对称矩阵, 且实对称矩阵的不同特征值所对应的特征向量相互正交, 故 $\xi^T \xi_1 = 0$, 即 $x_2 + x_3 = 0$.

解之得 $\xi_2 = (1, 0, 0)^T, \xi_3 = (0, 1, -1)^T$.

于是有 $A(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (\lambda_1 \xi_1, \lambda_2 \xi_2, \lambda_3 \xi_3)$,



所以 $A = (\lambda_1 \xi_1, \lambda_2 \xi_2, \lambda_3 \xi_3)(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^{-1}$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

九、(本题满分 6 分)

【解析】方法一：根据 $AA^T = E$ 有

$$|A + E| = |A + AA^T| = |A(E + A^T)| = |A| |E + A| = |A| |A + E|,$$

移项得 $(1 - |A|) |A + E| = 0$.

因为 $|A| < 0$, 故 $1 - |A| > 0$. 所以 $|A + E| = 0$.

方法二：因为 $|(A + E)A^T| = |AA^T + A^T| = |E + A^T| = |E + A|$,

所以 $|A + E| |A| = |E + A|$,

即 $(1 - |A|) |A + E| = 0$.

因为 $|A| < 0$, 故 $1 - |A| > 0$. 所以 $|A + E| = 0$.

十、填空题(本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分.)

(1) 【解析】由题设, 因为是独立重复实验, 所以 X 服从 $n = 10, p = 0.4$ 的二项分布.

由二项分布的数学期望和方差计算公式, 有

$$E(X) = np = 4, D(X) = np(1 - p) = 2.4,$$

根据方差性质有 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 18.4$.

(2) 【解析】令 $A = \{X < 0\}, B = \{Y < 0\}$, 则

$$P\{\max(X, Y) \geq 0\} = 1 - P\{\max(X, Y) < 0\} = 1 - P\{X < 0, Y < 0\}.$$

由概率的广义加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$, 有

$$\begin{aligned} P\{\max(X, Y) \geq 0\} &= 1 - [1 - P(\overline{AB})] = P(\overline{A} + \overline{B}) = P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - P(\overline{AB}) \\ &= \frac{4}{7} + \frac{4}{7} - \frac{3}{7} = \frac{5}{7}. \end{aligned}$$



十一、(本题满分 6 分)

【解析】方法 1：用分布函数法先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 。

$$\text{当 } y \leq 1 \text{ 时, } F_Y(y) = 0;$$

$$\text{当 } y > 1 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P(e^X \leq y) = P\{X \leq \ln y\}$$

$$= \int_0^{\ln y} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^{\ln y} = 1 - \frac{1}{y},$$

所以由连续型随机变量的概率密度是分布函数的微分, 得

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases}$$

或者直接将 $\int_0^{\ln y} e^{-x} dx$ 对 y 求导数得 $\frac{d}{dy} \int_0^{\ln y} e^{-x} dx = \frac{1}{y} e^{-\ln y} = \frac{1}{y^2}$ 。

方法 2：用单调函数公式直接求 Y 的概率密度。

由于 $y = e^x$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调, 其反函数 $x = h(y) = \ln y$ 在 $(1, +\infty)$ 内可导且其导数为

$$x'_y = \frac{1}{y} \neq 0, \text{ 则所求概率密度函数为}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} |h'(y)| \cdot f_X(h(y)), & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{y} \cdot e^{-\ln y}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases}$$

【相关知识点】对积分上限的函数的求导公式：

若 $F(t) = \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x) dx$, $\alpha(t)$, $\beta(t)$ 均一阶可导, 则

$$F'(t) = \beta'(t) \cdot f[\beta(t)] - \alpha'(t) \cdot f[\alpha(t)].$$