

BRAÇO A FORA DO ENSAIO · MASSA FINAL EM CÂMARA A 18 °C, RECEITA QT

Cronograma revisado, dois braços

Ancorado nas suas duas misturas de quarta 5/8, às 14h30 e às 22h15, e no forno de quinta 6/8 às 22h00. Hidratação final de 75% nos dois braços. As fases frias encurtaram para caber, e tudo que mudou está declarado abaixo.

LINHA MESTRA · MARQUE CADA ETAPA CUMPRIDA

ETAPA	ALVO	B · MORBIDA 55%	C · UMIDA 65%	ANOTAÇÃO
Mistura da biga	v1, curta	Qua 14h30 ☐	Qua 22h15 ☐	_____
Arranque	20 °C	1h00, até 15h30 ☐	0h45, até 23h00 ☐	_____
Entra na câmara	4 °C	Qua 15h30 ☐	Qua 23h00 ☐	altura cx _____
Checação 1	pH	Qua 23h00 · 7h30	Qui 07h00 · 8h00	pH _____
Checação 2	pH	Qui 08h00 · 16h30	Qui 12h00 · 13h00	pH _____
Sai da câmara	pH 5,0–5,2	Qui 11h00 · 19h30 ☐	Qui 14h00 · 15h00 ☐	pH _____
Risveglio	21 °C	3h00 ☐	2h00 ☐	T ao fim _____
Rinfresco	TA 24–26 °C	Qui 14h00 ☐	Qui 16h00 ☐	TA _____
Puntata	22–24 °C	2h55, até 17h15	0h55, até 17h15	_____
Staglio · 6 × 290 g	—	Qui 17h15 ☐	Qui 17h15 ☐	_____
Appretto	18 °C	4h45 ☐	4h45 ☐	T câmara _____
Forno estabilizado	—	Qui 21h45, pizza sacrificial ☐		T piso _____
Informata	marinara	Qui 22h00	Qui 22h04	_____

O QUE MUDOU EM RELAÇÃO AO DESENHO ORIGINAL

	ORIGINAL	REVISÃO 2
Câmara B	26h00	19h30
Câmara C	19h20	15h00
Risveglio B	2h00	3h00
Risveglio C	1h00	2h00
Massa final	20 °C	18 °C, câmara
Appretto	6h15 / 6h00	4h45 nos dois
Fermento e hidratação	0,9% / 0,55% · 75%	inalterados

O risveglio mais longo recupera o pH, não o platô. Uma hora a 21 °C vale muitas horas a 4 °C para a levedura, então as duas chegam ao ponto. O que não volta é a maturação enzimática e a acidificação que só o tempo frio dá. As duas perdem profundidade aromática em proporção parecida, e é por isso que a comparação entre B e C continua de pé.

REGRAS DE DERIVA

- Chegou cedo ao ponto.** Baixe para 2 °C e desça a caixa para a prateleira mais fria. Segurar biga madura no frio é a manobra mais barata que existe.
- Chegou muito cedo.** Encurte o risveglio e mantenha o rinfresco na hora marcada. Nesta revisão o risveglio é o amortecedor, porque os horários de rinfresco estão travados.
- Está atrasada.** Suba o risveglio de 21 °C para 24 a 26 °C. Cada 3 °C a mais corta perto de um terço do tempo.
- Passou do ponto, ou uma chegou e a outra não.** Passada, não tente salvar, registre a hora exata. Descompassadas, segure a pronta a 2 °C e espere: comparar em pontos diferentes é pior que atrasar o forno.

AS DUAS DECISÕES DESTA REVISÃO

- Appretto igual, puntata diferente.** Seus horários dão 8h para B e 6h para C depois do rinfresco. O appretto é onde a bola estrutura e onde o alvéolo se define, então appretto diferente entre os braços seria confundidor. As duas fazem staglio às 17h15 e 4h45 de appretto, e as duas horas de diferença ficam na puntata, que perdoa muito mais.
- Puntata a 22 a 24 °C, appretto a 18 °C.** 4h45 a 18 °C é curto para 75% de hidratação. Aquecer a puntata põe a massa em movimento antes de ela entrar na câmara e recupera o tempo sem mexer no appretto.

Se as bolas não estiverem prontas às 22h, atrase o forno. Não encurte o appretto para bater o horário, senão a única variável que você mediu deixa de ser a hidratação.

Sem o braço A você perde uma ponta da curva. Anote os dados da biga a 50% que você já faz na folha de consolidação, na coluna A, como referência. Sem esse terceiro ponto você compara 55 contra 65 sem âncora.

CHECAGENS

	B · 55%	C · 65%
CHECAGEM 1		
Hora real	_____	_____
pH em suspensão	_____	_____
T núcleo	_____	_____
CHECAGEM 2		
Hora real	_____	_____
pH em suspensão	_____	_____
Aroma	_____	_____
SAÍDA DA CÂMARA		
Hora real	_____	_____
pH em suspensão	_____	_____
Tempo total de frio	_____	_____

pH sempre em suspensão de 10 g em 100 mL de água destilada a 20 °C, nunca espeto na massa.