

Chemistry - Question 121

Original paper page 59; original question and option regions

If the radius of electron in the excited state of He^+ is 0.4232 nm, the energy of electron in that excited state in J is :

(The radius and energy of electron in the first orbit of hydrogen atom are 52.9 pm and -2.18×10^{-18} J respectively)

He^+ యొక్క ఉత్తేజ స్థితిలోని ఎలక్ట్రాన్ వ్యాసార్థం 0.4232 nm అయినట్లైతే, అదే ఉత్తేజ స్థాయిలోని ఎలక్ట్రాన్ శక్తి J లలో

(హైడ్రోజన్ పరమాణువు మొదటి కక్ష్య వ్యాసార్థం, శక్తి వరుసగా 52.9 pm, -2.18×10^{-18} J)

Options :

1. -5.45×10^{-17}
2. -5.45×10^{-19}
3. 5.45×10^{18}
4. 5.45×10^{-18}

Chemistry - Question 122

Original paper page 59; original question and option regions

The wavelength (in m) of a particle of mass 1.67×10^{-27} kg moving with velocity of 3.97×10^6 m s⁻¹ is :

3.97×10^6 m s⁻¹ వేగంతో కదులుతున్న 1.67×10^{-27} kg ద్రవ్యరాశి గల కణం యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యం (m లలో)

Options :

1. 1×10^{-13}
2. 1×10^{-11}
3. 2×10^{-13}
4. 2×10^{-11}

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-26 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 123

Original paper page 59; original question and option regions

Which of the following statements is **not** correct ?

క్రింది వివరణలలో సరియైనది **కానిది** ఏది?

Chemistry - Question 124

Original paper page 60; original question and option regions

Match the following :

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List - I

జాబితా - I

- a) sp^3d^2
- b) sp^3
- c) sp^3d
- d) dsp^2

List - II

జాబితా - II

- i) PF_5
- ii) $[Ni(CN)_4]^{2-}$
- iii) BrF_5
- iv) C_2H_6
- v) C_2H_2

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Chemistry - Question 125

Original paper page 61; original question and option regions

Identify the correct statement(s) from the following

- a) Dipole moment of NH_3 is more than NF_3
- b) SF_4 is square planar
- c) SnCl_4 is more covalent than SnCl_2
- d) In H_2SO_4 sulphur atom has expanded octet

క్రింది వానిలో సరైన వివరణలను గుర్తించుము

- a) NH_3 ద్విధృవ భ్రామకము NF_3 కంటే ఎక్కువ
- b) SF_4 చతురస్ర సమతల నిర్మాణమును కలిగి ఉండును
- c) SnCl_2 కంటే SnCl_4 కు అధిక సంయోజనీయ స్వభావం కలదు
- d) H_2SO_4 నందు సల్ఫర్ పరమాణువునకు విస్తరించిన అష్టకం కలదు

Options :

- 1. a, b
- 2. b, c, d
- 3. a, c, d
- 4. a, b, c

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-26 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 126

Original paper page 61; original question and option regions

Which one of the following statements is **not** correct ?

క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

Chemistry - Question 127

Original paper page 62; original question and option regions

One litre of 0.15 M Na_2SO_3 aqueous solution is mixed with 500 mL of 0.2M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ aqueous solution in acid medium. What is the concentration (in mol L^{-1}) of unreacted $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ in the resultant solution ?

ఒక లీటరు 0.15 M Na_2SO_3 జలద్రావణాన్ని, అవ్లు యానకంలో నున్న 500 mL 0.2M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ జలద్రావణానికి కలిపారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణంలో చర్యనొందని $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ గాఢత (mol L^{-1} లలో) ఎంత?

Options :

1. $\frac{1}{3}$
2. $\frac{1}{20}$
3. $\frac{1}{300}$
4. $\frac{1}{30}$

Chemistry - Question 128

Original paper page 62; original question and option regions

Which one of the following involves decrease in entropy ?

ఈ క్రింది వానిలో దేనిలో ఎంట్రోపీ తగ్గుతుంది?

Chemistry - Question 129

Original paper page 63; original question and option regions

If K_C for the equilibrium reaction $2ABC(g) \rightleftharpoons 2AB(g) + C_2(g)$ is X at $T(K)$, its K_P at the same temperature is :

$T(K)$ వద్ద, $2ABC(వా) \rightleftharpoons 2AB(వా) + C_2(వా)$ సమతాస్థితి చర్యకు, $K_C = X$ అయినట్లైతే, అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద దాని K_P

Options :

1. $X.T$

2. $X(RT)$

3. $\left(\frac{X}{T}\right)R$

4. $\frac{XT}{R}$

Chemistry - Question 130

Original paper page 64; original question and option regions

Assertion (A) : For every chemical reaction at equilibrium, standard Gibbs energy change of the reaction is zero

Reason (R) : At constant temperature and pressure chemical reactions are spontaneous in the direction of decreasing Gibbs energy.

నిశ్చితం (A) : సమతాస్థితి వద్ద ప్రతి రసాయన చర్యకు, ప్రమాణ గిబ్స్ శక్తి మార్పు సున్ను.

కారణము (R) : స్థిర ఉష్ణోగ్రత, పీడనం వద్ద, రసాయన చర్యలు గిబ్స్ శక్తి తగ్గే దిశలో అయత్నీకృతం.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి, మరియు (R), (A) కు సరియైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి, కానీ (R), (A) కు సరియైన వివరణ కాదు

(A) is correct and (R) is not correct

3. (A) సరియైనది కానీ (R) సరియైనది కాదు

(A) is not correct but (R) is correct

4. (A) సరియైనది కాదు కానీ (R) సరియైనది

Chemistry - Question 131

Original paper page 64; original question and option regions

The reaction in which dihydrogen is acting as an oxidising agent is

క్రింది ఏ చర్యలో డైహైడ్రోజన్ ఆక్సీకరణిగా పనిచేస్తుంది.

Chemistry - Question 132

Original paper page 65; original question and option regions

Which one of the following ions participates in the production of ATP from the oxidation of glucose?

గ్లూకోజ్ ఆక్సీకరణం చెంది ATP తయారీలో పాల్గొనే అయాను, క్రింది వాటిలో ఏది?

Options :

1. Na^+
2. Co^{2+}
3. Fe^{3+}
4. K^+

Chemistry - Question 133

Original paper page 65; original question and option regions

Which of the following is **not** correct regarding Orthoboric acid ?

ఆర్థోబోరిక్ ఆమ్లానికి సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

Orthoboric acid can be prepared by the reaction of HCl with $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$

1. $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ తో HCl ను చర్యగావించి ఆర్థోబోరిక్ ఆమ్లాన్ని తయారు చేయవచ్చు

Orthoboric acid contains planar BO_3 units.

2. ఆర్థోబోరిక్ ఆమ్లంలో సమతల BO_3 యూనిట్లు ఉంటాయి

Orthoboric acid releases three H^+ ions in water.

3. నీటిలో ఆర్థోబోరిక్ ఆమ్లం మూడు H^+ అయాన్లను విడుదల చేయును

Orthoboric acid when heated above 370 K, forms HBO_2 which on further heating forms B_2O_3 .

4. ఆర్థోబోరిక్ ఆమ్లాన్ని 370 K కు పైన వేడి చేసినపుడు HBO_2 ఏర్పడుతుంది. HBO_2 ను ఇంకా వేడి చేసినపుడు B_2O_3 ఏర్పడుతుంది.

Chemistry - Question 134

Original paper page 66; original question and option regions

Which one of the following statements is **not** correct?

క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

Hydrolysis of $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$ gives product which undergoes condensation polymerisation to form long chain silicones.

$(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$ ను జలవిశ్లేషణ చెందించగ ఏర్పడిన ఉత్పన్నము సంఘనన అణుపుంజనీకరణం

1. చెంది పొడవైన గొలుసుల సిలికోన్లనిస్తాయి

SiO_2 is soluble in HF.

2. HF లో SiO_2 కరుగుతుంది

Hydrated zeolites are used as ion exchangers to reduce the hardness of hard water.

3. ఆర్థ్ర జియోలైట్లను కఠినజలం కఠనత్వాన్ని తగ్గించటానికి అయాన్ వినిమయాలుగ ఉపయోగిస్తారు

Water gas contains about 40% of CO_2 .

4. వాటార్ గ్యాస్‌లో సుమారు 40% CO_2 ఉంటుంది

Chemistry - Question 135

Original paper page 66; original question and option regions

The COD of water sample is determined using

నీటి శ్యాంపిల్ యొక్క COD ని దీనిని ఉపయోగించి నిర్ణయిస్తారు.

Options :

1. 50% H_2SO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
2. 50% NaOH , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
3. 50% CH_3COOH , KMnO_4
4. 50% H_2SO_4 , FeSO_4

Which of the following statements are **not** correct ?

- The energy of resonance hybrid structure is higher than that of the possible canonical structures of the molecule
- When inductive effect and electromeric effect operate in opposite directions, electromeric effect predominates
- When the π electrons of the multiple bond are transferred to that atom to which the attacking reagent does not get attached, it is known as +E effect
- The resonance structures with separation of opposite charges are more stable.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలు **కానివి** ఏవి?

- రెజోనెన్స్ సంకర నిర్మాణం శక్తి, అణువుకు వీలయ్యే కానోనికల్ నిర్మాణాల కంటే ఎక్కువ
- ప్రేరేపక ప్రభావం మరియు ఎలక్ట్రోమెరిక్ ప్రభావం వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నప్పుడు, ఎలక్ట్రోమెరిక్ ప్రభావం అధిగమిస్తుంది
- π ఎలక్ట్రాన్ జంట బదలాయింపు కారకం బంధం ఏర్పరచే పరమాణువు వైపుకాక రెండో పరమాణువు వైపు జరిగితే దానిని +E ప్రభావం అంటారు
- విద్యుదావేశాలు వేరైన రెజోనెన్స్ నిర్మాణాల స్థిరత్వం ఎక్కువ

Options :

- a, c, d
- c, d
- b, c, d
- a, b, c





Chemistry - Question 137

Original paper page 67; original question and option regions

Which one among the following undergoes dehydrohalogenation most readily?

క్రింది వాటిలో అతి త్వరగా డీహైడ్రోహాలోజినేషన్ చెందేది ఏది?

Options :




Chemistry - Question 138


Original paper page 68; original question and option regions

The trend in acidic behaviour of the following hydrocarbons is


క్రింది హైడ్రోకార్బన్ల ఆమ్ల స్వభావ క్రమం




a



b



c



d

Options :

1. $c > d > a > b$
2. $d > a > b > c$
3. $a > d > b > c$
4. $b > a > d > c$

Chemistry - Question 139

Original paper page 68; original question and option regions

An element with molar mass $2.7 \times 10^{-2} \text{ kg mol}^{-1}$ forms a cubic unit cell with edge length of 405 pm. If its density is $2.7 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$, the nature of cubic unit cell is :

$$(N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1})$$

$2.7 \times 10^{-2} \text{ kg mol}^{-1}$ మోలార్ ద్రవ్యరాశి గల మూలకం, 405 pm అంచు పొడవు గల ఘన యూనిట్ సెల్ ను ఏర్పరుస్తుంది. దాని సాంద్రత $2.7 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ అయినట్లైతే ఘన యూనిట్ సెల్ స్వభావం ఏది?

$$(N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1})$$

Options :

face centered cubic

1. ఫలక కేంద్రిత ఘనం

simple cubic

2. ప్రాథమిక ఘనం

body centered cubic

3. అంతఃకేంద్రిత ఘనం

end centered

4. అంత్యకేంద్రిత ఘనం

Chemistry - Question 140

Original paper page 69; original question and option regions

At $T(K)$, the vapour pressures of two liquids, heptane and octane are 106 kPa and 47 kPa respectively. If 25g of heptane and 57g of octane form an ideal solution, at $T(K)$ the vapour pressure of solution in kPa is :

$T(K)$ వద్ద, హెప్టేన్, ఆక్టేన్ ద్రవాల బాష్ప పీడనాలు వరుసగా 106 kPa, 47 kPa. 25g హెప్టేన్, 57g ఆక్టేన్లు అదర్శ ద్రావణమును ఏర్పరిచితే, $T(K)$ వద్ద ద్రావణపు బాష్పపీడనం kPa లలో

Options :

1. 66.66
2. 76.5
3. 50.0
4. 60.0

Chemistry - Question 141

Original paper page 69; original question and option regions

At 27 °C, the osmotic pressure of a solution containing 4g of a non-electrolyte solute in 1.0 L of solution is 0.4 bar. The molar mass of the solute in g mol^{-1} is :

($R = 0.083 \text{ L bar K}^{-1}\text{mol}^{-1}$)

27 °C వద్ద 4g ల అవిద్యుత్ విశ్లేష్యక ద్రావితం గల 1.0 L ద్రావణపు ద్రవాభిసరణ పీడనము 0.4 bar. ద్రావితపు మోలార్ ద్రవ్యరాశి g mol^{-1} లో ($R = 0.083 \text{ L bar K}^{-1}\text{mol}^{-1}$)


Options :

1. 24.6
2. 49.2
3. 249
4. 180

Chemistry - Question 142

Original paper page 69; original question and option regions

Standard Gibbs energy change in kJ mol^{-1} for a galvanic cell



0.5V ల ప్రమాణ emf గల $A_{(ఘ)} + B_{(జల)}^{3+} \longrightarrow A_{(జల)}^{3+} + B_{(ఘ)}$ గాల్వనిక్ ఘటం ప్రమాణ గిబ్స్ శక్తిలో మార్పు kJ mol^{-1} లలో ఎంత? ($F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$)

Chemistry - Question 143

Original paper page 70; original question and option regions

The rate equation for the decomposition of a compound 'A' in terms of partial pressure is given as, $\text{rate} = k(P_A)^{\frac{3}{2}}$. If the pressure is measured in bar and time in minutes, then the units of rate constant is :

ఒక సమ్మేళనం 'A' వియోగం చెందే రేటు సమీకరణం పాక్షి పీడనాలలో, రేటు $= k(P_A)^{\frac{3}{2}}$ గా ఇవ్వబడినది. పీడనాన్ని bar లలో కాలాన్ని నిమిషాలలో కొలచినట్లయితే రేటు స్థిరాంకం ప్రమాణాలు ఏమిటి?

Options :

1. min^{-1}
2. $\text{bar}^{\frac{3}{2}} \text{min}^{-1}$
3. $\text{bar}^{-\frac{1}{2}} \text{min}^{-1}$
4. $\text{bar}^{\frac{1}{2}} \text{min}$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-26 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 144

Original paper page 70; original question and option regions

Which one of the following is correct?

ఈ క్రింది వానిలో ఏది సరి అయినది?

Chemistry - Question 145

Original paper page 71; original question and option regions

In vapour phase refining, metal A is purified by Van Arkel method and metal B is purified by Mond's process. A and B are respectively.

బాష్ప ప్రావస్త శోధనంలో, లోహం A ను వాన్ ఆర్కెల్ పద్ధతిలోను, లోహం B ను మాండ్ పద్ధతిలోను శుద్ధి చేస్తారు. A మరియు B లు వరుసగా

Options :

1. Zr, Ti
2. Ti, Zn
3. Ti, Ni
4. Zr, Fe

Chemistry - Question 146

Original paper page 71; original question and option regions

Which one of the following phosphorous halide has tetrahedral and octahedral shaped ions?

క్రింది ఏ ఫాస్ఫరస్ హాలైడ్ లో టెట్రాహెడ్రల్ మరియు ఆక్టాహెడ్రల్ ఆకృతులు గల అయాన్లు ఉంటాయి?

Options :

liquid PCl_3

1. ద్రవ PCl_3

liquid PCl_5

2. ద్రవ PCl_5

gaseous PCl_5

3. వాయు PCl_5

solid PCl_5

4. ఘన PCl_5



Chemistry - Question 147

Original paper page 72; original question and option regions

Potassium permanganate on heating gives potassium manganate, oxygen and X. For which of the following reactions, X is used as a catalyst.

పొటాషియం పర్మాంగనేట్‌ను వేడి చేసినప్పుడు పొటాషియం మాంగనేట్, ఆక్సిజన్ మరియు X లు ఏర్పడుతాయి. క్రింది ఏ చర్యలో X ఉత్ప్రేరకంగా వాడతారు

Options :



Chemistry - Question 148

Original paper page 72; original question and option regions

The hydrolysis products of BrF_5 molecule are

BrF_5 అణువు జలవిశ్లేషణ ఉత్పన్నాలు

Options :

1. HBr , HOF
2. HF , HBrO_3
3. HF , HBrO_4
4. HF , HBrO_2

Chemistry - Question 149

Original paper page 72; original question and option regions

The magnetic moment of $[\text{CoF}_6]^{3-}$ as per spin only formula (in BM) is

భ్రమణ అధారిత భ్రామకం ఫార్ములాను బట్టి $[\text{CoF}_6]^{3-}$ యొక్క అయస్కాంత భ్రామకం విలువ (BM లలో)

Options :

1. 3.87
2. 5.92
3. 2.84
4. 4.90

Chemistry - Question 150

Original paper page 73; original question and option regions

The electronic configuration of a metal ion in its complex is $[\text{Ar}]3d^4$. For this metal complex, $\Delta_0 < P$ (P = energy required for electron pairing in a single orbital). The distribution of electrons in the complex.

ఒక లోహ సమ్మేళనంలో లోహ అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము $[\text{Ar}]3d^4$. ఈ సమ్మేళనానికి $\Delta_0 < P$ (P = ఒక ఆర్బిటాల్‌లో ఎలక్ట్రాన్ జతకూడుటకు అవసరమగు శక్తి) ఈ సంక్లిష్టంలో ఎలక్ట్రాన్ల వితరణ

Options :

1. $(t_{2g})^3 (e_g)^1$

2. $(t_{2g})^2 (e_g)^2$

3. $(t_{2g})^4 (e_g)^0$

4. $(t_{2g})^1 (e_g)^3$

Chemistry - Question 151

Original paper page 73; original question and option regions

Which of the following statements are correct ?

- a. Natural rubber becomes hard at high temperature
- b. Neoprene is a polymer of 2-chloro -1, 3-butadiene
- c. Nylon 6, 6 is a polyamide fibre
- d. Buna-S is an example of a homopolymer

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలు ఏవి?

- a. సహజ రబ్బర్ అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద గట్టిపడుతుంది
- b. నియోప్రీన్, 2-క్లోరో-1, 3-బ్యూటడియన్ యొక్క పాలిమర్
- c. నైలాన్ 6, 6 ఒక పాలిఎమైడ్ పోగు
- d. బ్యూన-S సజాతీయ పాలిమర్ కు ఉదాహరణ

Options :

- 1. b, c
- 2. a, c, d
- 3. b, d
- 4. a, c

Chemistry - Question 152

Original paper page 74; original question and option regions

Which of the following statements are correct ?

- a. Deficiency of vitamin K results in increased blood clotting time.
- b. The sources of vitamin B₂ are milk and liver
- c. Hexapeptide has six peptide bonds
- d. Improper functioning of adrenal cortex results in hypoglycemia.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలు ఏవి?

- a. విటమిన్ K లోపం వల్ల రక్తం గడ్డ కట్టడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది
- b. పాలు మరియు లివర్ విటమిన్ B₂ మూల స్థానాలు
- c. హెక్సాపెప్టైడ్‌లో ఆరు పెప్టైడ్ బంధాలుంటాయి
- d. ఎడ్రినాల్ కార్టెక్స్ సరిగా పనిచేయనట్లయితే హైపోగ్లైసీమియా వస్తుంది

Options :

- 1. b, c
- 2. a, c
- 3. b, d
- 4. a, b, d

Chemistry - Question 153

Original paper page 74; original question and option regions

Identify an artificial sweetener (A) and tranquilizer (B) from the following.

క్రింది వాటిలో కృత్రిమ తీపి కారకం (A) మరియు ట్రాంక్విలైజర్ (B) ను గుర్తించండి

Chemistry - Question 154

Original paper page 75; original question and option regions


Which of the following statements are correct ?

- a. Aspartame is more sweeter than saccharin
- b. Shaving soaps contain glycerol to prevent drying
- c. Salt of sorbic acid is used as a food preservative
- d. Norethindrone is an example of an antifertility drug

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలు ఏవి?

- a. అస్పార్టేమ్ సాకరీన్ కంటే ఎక్కువ తీపి కలది
- b. తొందరగా తడి హరించిపోకుండా ఉండటానికిగాను షేవింగ్ సబ్బులు గ్లిసరీన్‌ను కలిగి ఉంటాయి
- c. సార్బిక్ ఆమ్ల లవణాన్ని ఆహార పదార్థాల సంరక్షకంగా వాడతారు
- d. నారెథిన్‌డ్రోన్ గర్భనిరోధక మందుకు ఉదాహరణ


Consider the following reaction



Which of the following statements are correct ?

- I is the major product of the reaction
- II is the major product of the reaction
- Formation of I is in accordance with Saytzeff's rule
- II is more stable because it is more substituted

క్రింది చర్యను పరిశీలించుము



క్రింది వాటిలో ఏవి సరియైన వివరణలు?

- చర్యలో I ప్రధాన ఉత్పన్నం
- చర్యలో II ప్రధాన ఉత్పన్నం
- I సేట్జెఫ్ నియమం ననుసరించి ఏర్పడును
- II అధిక స్థిరమైనది. కారణం అది అధికంగా ప్రతిక్షేపితమైనది

Chemistry - Question 156

Original paper page 77; original question and option regions

The compound which exhibits both geometrical and optical isomerism is

క్షేత్ర సాదృశ్యాన్ని మరియు దృక్ సాదృశ్యాన్ని ప్రదర్శించే సమ్మేళనము

Options :


- 4 – Bromopent – 2 – ene
1. 4 – బ్రోమోపెంట్ – 2 – ఈన్
- 3 – Bromo – 2 – methylbut – 1 – ene
2. 3 – బ్రోమో – 2 – మిథైల్ బ్యూట్ – 1 – ఈన్
- 1 – Bromobut – 2 – ene
3. 1 – బ్రోమో బ్యూట్ – 2 – ఈన్
- 3 – Bromo – 2 – methylpropene
4. 3 – బ్రోమో – 2 – మిథైల్ ప్రొపిన్

Chemistry - Question 157

Original paper page 77; original question and option regions

What are A and B in the following reactions.

క్రింది చర్యలలో A, B లు ఏవి?




Chemistry - Question 158

Original paper page 78; original question and option regions

Identify A, B and C in the following reactions :

క్రింది చర్యలలో A, B, C లను గుర్తింపుము




Chemistry - Question 159

Original paper page 79; original question and option regions

What are A, B and C in the following reactions ?

క్రింది చర్యలలో A, B మరియు C లను గుర్తింపుము



Chemistry - Question 160

Original paper page 80; original question and option regions

The number of resonance structures, aniline and anilinium ion can have are respectively

ఎనిలీన్ మరియు ఎనిలీనియమ్ అయాన్ యొక్క రెజోనెన్స్ నిర్మాణాల సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. 2, 5

2. 4, 5

3. 3, 4

4. 5, 2