

Chemistry - Question 121

Original paper page 70; original question and option regions

If the kinetic energy of an electron of mass 9.0×10^{-31} kg is 8.0×10^{-25} J, the wavelength of this electron in nm is

9.0×10^{-31} kg ద్రవ్యరాశి గల ఎలక్ట్రాన్ గతిజశక్తి 8.0×10^{-25} J అయిన దాని తరంగదైర్ఘ్యం nm లలో

Options :

1. 1104.1

2. 276.2

3. 552.2

4. 828.4

Chemistry - Question 122

Original paper page 71; original question and option regions

The radius ratio of Bohr's first orbit of hydrogen like species He^+ , Li^{2+} and Be^{3+} is

హైడ్రోజన్ వంటి జాతులయిన He^+ , Li^{2+} మరియు Be^{3+} ల బోర్ మొదటి కక్ష్య వ్యాసార్థముల నిష్పత్తి

Options :

1. 3 : 4 : 6

2. 2 : 3 : 4

3. 6 : 4 : 3

4. 4 : 3 : 2

Chemistry - Question 123

Original paper page 71; original question and option regions

The element Uuq contains 12.8% more neutrons compared to protons. What is the approximate mass number of it?

మూలకము Uuq లో ప్రోటాన్లతో పోల్చితే 12.8% ఎక్కువ న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయి. దాని ద్రవ్యరాశి సంఖ్య సుమారుగ ఎంత?

Options :

1. 263

2. 253

3. 233

4. 243

Chemistry - Question 124

Original paper page 72; original question and option regions

Observe the following statements

- i. The dipole moment of NH_3 is higher than the dipole moment of NF_3 .
- ii. The dipole moment of chloroform is zero.
- iii. Covalent bond character in NaCl is more compared to CuCl .

క్రింది వివరణలను పరిశీలించుము

- i. NH_3 యొక్క ద్విధ్రువ భ్రామకం, NF_3 యొక్క ద్విధ్రువ భ్రామకం కంటే ఎక్కువ
- ii. క్లోరోఫారమ్ యొక్క ద్విధ్రువ భ్రామకం సున్న
- iii. NaCl లో సమయోజనీయ బంధ లక్షణం, CuCl తో పోల్చితే ఎక్కువ

The statements which are **not** correct are

సరియైన వివరణలు కానివి ఏవి?

Options :

1. i, iii
2. ii, iii
3. i, ii, iii
4. i, ii

Chemistry - Question 125

Original paper page 72; original question and option regions

The correct order of energy of σ_{2p} , π_{2p} , π_{2p}^* and σ_{2p}^* orbitals in F_2 is

F_2 లో σ_{2p} , π_{2p} , π_{2p}^* మరియు σ_{2p}^* ఆర్బిటాళ్ళ సరియైన శక్తి క్రమము

Chemistry - Question 126

Original paper page 73; original question and option regions

If the most probable speed of methane at a certain temperature is 400 ms^{-1} , the kinetic energy of one mole of methane at the same temperature in J is

ఒక నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత వద్ద మీథేన్ గరిష్ఠ సంభావ్యత వేగం 400 ms^{-1} అయిన అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక మోల్ మీథేన్ గతిజశక్తి J లలో

Options :

1. 1024

2. 2048

3. 3072

4. 1920





Chemistry - Question 127

Original paper page 73; original question and option regions

Which of the following are disproportionation reactions?

క్రింది వాటిలో అననుపాత చర్యలు ఏవి?

(g = వా, l = ద్ర, aq = జల, s = ఘ)



Chemistry - Question 128

Original paper page 74; original question and option regions

If the work done during the isothermal reversible expansion of an ideal gas at a pressure of 10 atm from 4L to a final volume is -184.24 L atm , the final volume of the gas in L is

10 atm పీడనం వద్ద 4L ల ఒక ఆదర్శ వాయువును సమోష్ణ ఉత్క్రమణీయ వ్యాకోచంలో తుది ఘనపరిమాణంను పొందటంలో అది జరిపిన పని -184.24 L atm అయిన, ఆ వాయువు తుది ఘనపరిమాణం L లలో

Options :

1. 40
2. 400
3. 8
4. 80

Chemistry - Question 129

Original paper page 74; original question and option regions

The equilibrium concentrations of N_2 , H_2 and NH_3 in the formation of NH_3 at 500 K are 1.25×10^{-2} M, 4.0×10^{-2} M and 1.6×10^{-2} M respectively. The equilibrium constant K_p at the same temperature is

500 K వద్ద NH_3 తయారీలో N_2 , H_2 మరియు NH_3 ల సమతాస్థితి గాఢతలు వరుసగా 1.25×10^{-2} M, 4.0×10^{-2} M మరియు 1.6×10^{-2} M. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద సమతాస్థితి స్థిరాంకం K_p

Options :

1. $3.2 (RT)^{-2}$

2. $32 (RT)^2$

3. $320 (RT)^2$

4. $320 (RT)^{-2}$

Chemistry - Question 130

Original paper page 75; original question and option regions

If the pH of 0.10 M monoacidic base at 298 K is 9.0, the value of K_b and pK_b at the same temperature are respectively

298 K వద్ద 0.10 M ఏకఆమ్లక క్షారము pH 9.0 అయిన అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద K_b మరియు pK_b విలువలు వరుసగా

Options :

1. 1.0×10^{-9} , 9.0
2. 1.0×10^{-5} , 5.0
3. 1.0×10^{-10} , 10.0
4. 1.0×10^{-4} , 4.0

Chemistry - Question 131

Original paper page 75; original question and option regions

The correct statements from the following are :

- i. Ca(OH)_2 is used in Clark's method of removal of temporary hardness of water
- ii. 100 mL of 10 vol H_2O_2 , on complete decomposition liberates 1L of oxygen at STP.
- iii. Urea can be added to the solution of H_2O_2 as stabilizer.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలు

- i. క్లార్క్ పద్ధతిలో, తాత్కాలిక జలకఠినతను తొలగించుటకు Ca(OH)_2 ను ఉపయోగిస్తారు
- ii. 100 mL ల 10 vol H_2O_2 ను పూర్తిగా వియోగంగావిస్తే 1L ఆక్సిజన్ STP వద్ద విడుదలగును
- iii. H_2O_2 ద్రావణానికి యూరియాను స్థిరీకరిణీగ కలుపవచ్చు

Options :

1. i, ii
2. ii, iii
3. i, iii
4. i, ii, iii

Chemistry - Question 132

Original paper page 76; original question and option regions

Identify the answer in which, the trends corresponding to hydroxides of group 2 elements (from $\text{Mg}(\text{OH})_2$ to $\text{Ba}(\text{OH})_2$) are correctly shown

గ్రూపు 2 మూలకాల హైడ్రాక్సైడ్లు ($\text{Mg}(\text{OH})_2$ నుంచి $\text{Ba}(\text{OH})_2$ వరకు) ధర్మాలకు సంబంధించిన క్రింది సూచించిన మార్పులలో, సరియైన వాటిని సూచించే సమాధానంను గుర్తించుము

basic character

క్షార ధర్మం

chemical stability

రసాయన స్థిరత్వం

solubility

ద్రావణీయత

Options :

- | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | increases
పెరుగును | increases
పెరుగును | decreases
తగ్గును |
| 2. | decreases
తగ్గును | decreases
తగ్గును | decreases
తగ్గును |
| 3. | decreases
తగ్గును | increases
పెరుగును | increases
పెరుగును |
| 4. | increases
పెరుగును | increases
పెరుగును | increases
పెరుగును |

Chemistry - Question 133

Original paper page 76; original question and option regions

In which of the following reactions, H_2 is liberated ?

- i. $Al(s) + HCl(aq) \rightarrow$
- ii. $Al(s) + NaOH(aq) \rightarrow$
- iii. $B_2H_6(g) + H_2O(l) \rightarrow$
- iv. $F_2(g) + H_2O(l) \rightarrow$

ఈ క్రింది ఏ చర్యలలో H_2 విడుదలగును?

- i. $Al(ఘ) + HCl(జల) \rightarrow$
- ii. $Al(ఘ) + NaOH(జల) \rightarrow$
- iii. $B_2H_6(వ) + H_2O(ద్ర) \rightarrow$
- iv. $F_2(వ) + H_2O(ద్ర) \rightarrow$

Chemistry - Question 134

Original paper page 77; original question and option regions

Identify the element whose monoxide and dioxide are acidic in nature.

ఏ మూలకం యొక్క మోనాక్సైడ్, డై ఆక్సైడ్లు ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయో ఆ మూలకాన్ని గుర్తించుము.

Options :

1. Sn

2. C

3. Ge

4. Pb

Chemistry - Question 135

Original paper page 77; original question and option regions

Methemoglobinemia is caused by the presence of X in drinking water. X is


తాగే నీటిలో X ఉండటం వలన నీలిబిడ్డ సిండ్రోమ్ వచ్చును. X ఏది?

Chemistry - Question 136

Original paper page 78; original question and option regions

The three dimensional structure of CH_4 is given below. The bonds are labelled as W, X, Y and Z. What are the bonds lying in the plane (A), projecting out of the plane away from the observer (B) and projecting out of the plane towards the observer (C) ?

CH_4 త్రిజామితీయ నిర్మాణం కింద ఇవ్వబడినది. దాని బంధాలు W, X, Y మరియు Z లుగా సూచింపబడ్డాయి. దీనిలో తలంలోని బంధాలు (A), తలం నుండి బయటకుపోయే బంధాలలో పరిశీలకునికి దూరంగా ఉన్న బంధాలు (B) మరియు తలం నుండి బయటకుపోయే బంధాలలో పరిశీలకునికి సమీపంగా ఉండే బంధాలు (C) ఏవి?



Options :

- | | A | B | C |
|----|------|------|------|
| 1. | X, Y | Z | W |
| 2. | A | B | C |
| | Z | W | X, Y |
| 3. | A | B | C |
| | X, Y | W | Z |
| 4. | A | B | C |
| | W | X, Y | Z |

Chemistry - Question 137

Original paper page 79; original question and option regions

Assertion (A) : Reaction of 1-butene with HBr gives 1-bromobutane as major product.

Reason (R) : Addition of HBr to unsymmetrical alkenes proceeds according to Markovnikov's rule

నిశ్చితం (A): 1-బ్యూటీన్‌ను HBr తో చర్య జరిపినప్పుడు ఏర్పడే ప్రధాన ఉత్పన్నం 1-బ్రోమోబ్యూటేన్

కారణం (R) : HBr తో అసౌష్ఠవ అల్క్యీన్‌ల యొక్క సంకలన చర్య మార్కోవ్నికాఫ్ నియమం ప్రకారం జరుగుతుంది

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

(A) and (R) are correct, (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

(A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి అయితే (R) అనేది (A) కి సరియైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is not correct

3. (A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

(A) is not correct but (R) is correct

4. (A) సరియైనది కాదు కాని (R) సరియైనది

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-24 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 138

Original paper page 79; original question and option regions

Which one of the following is **not** aromatic ?

క్రింది వాటిలో ఆరోమాటిక్ కానిది ఏది?

Chemistry - Question 139

Original paper page 80; original question and option regions

If a metal crystallises in a face centred cubic structure with metallic radius of 25 pm, the number of unit cells in 1.0 cm^3 of lattice is

25 pm లోహ వ్యాసార్థం గల ఒక లోహము సన్నిహిత ఘన కూర్పులో స్ఫటికీకరణ జరిగిన, 1.0 cm^3 జాలకంలో ఉన్న యూనిట్ సెల్ల సంఖ్య

Options :

1. 2.828×10^{28}

2. 1.414×10^{28}

3. 1.414×10^{24}

4. 2.828×10^{24}

Chemistry - Question 140

Original paper page 81; original question and option regions

Match the following.

List - I

- A) Azeotrope
 B) Henry's law
 C) Cryoscopic constant
 D) Van't Hoff factor

List - II

- I) $\Delta T_b = i K_b m$
 II) $p = K_H x$
 III) $\Delta T_f / m$
 IV) Deviation from Raoult's law
 V) $\pi = CRT$

క్రింది వాటిని జతపరుచుము.

జాబితా - I

- A) ఎజియోట్రోప్
 B) హెన్రీ నియమము
 C) క్రయోస్కోపిక్ స్థిరాంకం
 D) వాంట్‌హాఫ్ గుణకం

జాబితా - II

- I) $\Delta T_b = i K_b m$
 II) $p = K_H x$
 III) $\Delta T_f / m$
 IV) రాల్ట్ నియమం నుంచి విచలనం
 V) $\pi = CRT$

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

- (A) (B) (C) (D)
 1. II III V IV

- (A) (B) (C) (D)
 2. IV II III I

- (A) (B) (C) (D)
 3. IV II I III

- (A) (B) (C) (D)
 4. I III II IV

Chemistry - Question 141

Original paper page 82; original question and option regions

The mass of ascorbic acid ($C_6H_8O_6$) to be dissolved in 100 g of acetic acid to lower its freezing point by $1.5^\circ C$ in g is :

(K_f for acetic acid is $4.0 K kg mol^{-1}$)

100 గ్రా ఎసిటిక్ ఆమ్లపు ఘనీభవన స్థానం $1.5^\circ C$ తగ్గించటానికి దానిలో కరిగించవలసిన అస్కార్బిక్ ఆమ్లం ($C_6H_8O_6$) ద్రవ్యరాశి గ్రా లలో

(ఎసిటిక్ ఆమ్లం $K_f = 4.0 K kg mol^{-1}$)

Options :

1. 17.6

2. 8.8

3. 6.6

4. 13.2

Chemistry - Question 142

Original paper page 82; original question and option regions

At T(K), the molar conductivity of 0.04 M acetic acid is $7.8 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$. If the limiting molar conductivities of H^+ and CH_3COO^- at T(K) are 349 and $41 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ respectively, the dissociation constant of acetic acid is

T(K) వద్ద 0.04 M ఎసిటిక్ ఆమ్లం మోలార్ వాహకత $7.8 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$. T(K) వద్ద H^+ , CH_3COO^- ల అవధిక మోలార్ వాహకతలు వరుసగా 349, $41 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ అయిన ఎసిటిక్ ఆమ్లం విఘటన స్థిరాంకం

Options :

1. 1.63×10^{-5}

2. 8.33×10^{-5}

3. 1.63×10^{-4}

4. 8.33×10^{-4}

Chemistry - Question 143

Original paper page 83; original question and option regions

At T(K), if the rate constant of a first order reaction is $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$, the time to reduce the initial concentration of the reactant to 1/10 in seconds is :

T(K) వద్ద ప్రథమ క్రమాంకచర్య రేటు స్థిరాంకం $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ అయిన క్రియాజనకం ప్రారంభ గాఢతను 1/10 కు తగ్గించడానికి పట్టే కాలం సెకన్లలో

Options :

1. 500
2. 1000
3. 100
4. 50

Chemistry - Question 144

Original paper page 83; original question and option regions

Which one of the following statements is correct ?

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణ ఏది?

Options :

The difference in the initial and final concentrations of the adsorbate gives the value of ' x ' in Freundlich equation (x = mass of adsorbate)

అధిశోషితం తొలి, తుదిగాఢతల మధ్యతేడా ప్రాయొండ్లిష్ సమీకరణంలో ' x ' విలువనిస్తుంది
(x = అధిశోషితం యొక్క ద్రవ్యరాశి)

1.

The mass of adsorbent gives the value of ' n ' in Freundlich equation

అధిశోషకం ద్రవ్యరాశి ప్రాయొండ్లిష్ సమీకరణంలో ' n ' విలువనిస్తుంది

2.

Chemisorption decreases with increase of surface area of the adsorbent

అధిశోషకం ఉపరితల వైశాల్యం పెరిగే కొలది రసాయన అధిశోషణం తగ్గుతుంది

3.

Enthalpy of adsorption is 20 kJ mol^{-1} in chemisorption

రసాయన అధిశోషణంలో అధిశోషణం ఎంథాల్పీ 20 kJ mol^{-1}

4.

Chemistry - Question 145

Original paper page 84; original question and option regions

Blister copper is extracted from copper pyrites. After removal of slag FeSiO_3 , blister copper is obtained by

బ్లిస్టర్ కాపర్‌ను కాపర్ పైరైటస్ నుండి నిష్కర్షణ చేస్తారు. లోహమలం, FeSiO_3 ను తొలగించిన తరువాత బ్లిస్టర్ కాపర్‌ను ఈవిధంగా పొందుతారు.

Options :

self reduction

1. స్వయం క్షయకరణం వలన

reduction with CO

2. CO తో క్షయకరణం చేసి

reduction with coke

3. కోక్‌తో క్షయకరణం చేసి

self oxidation

4. స్వయం ఆక్సీకరణం వలన

Chemistry - Question 146

Original paper page 84; original question and option regions

Which one of the following is used to remove moisture from ammonia gas ?


అమ్మోనియా వాయువు నుండి తేమను తొలగించుటకు క్రింది వాటిలో దేనిని ఉపయోగిస్తారు?

Chemistry - Question 147

Original paper page 85; original question and option regions

In the reaction $2\text{I}^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_3(\text{g}) \rightarrow 2\text{OH}^-(\text{aq}) + \text{I}_2(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$, ozone acts as

క్రింది చర్యలో



ఓజోన్ దేనిగా పనిచేయును?

Options :

an oxidizing agent

1. ఒక ఆక్సీకరణ కారకంగా

a reducing agent

2. ఒక క్షయకరణ కారకంగా

a dehydrating agent

3. ఒక నిర్జలీకరణ కారకంగా

a hydrating reagent

4. ఒక జలీకరణ కారకంగా

Chemistry - Question 148

Original paper page 85; original question and option regions

X_2 reacts with water to form $HX(aq)$ and $HOX(aq)$. Y_2 reacts with water to form $O_2(g)$, $Y^-(aq)$ and $H^+(aq)$. Z_2 does not react with water. X_2 , Y_2 , Z_2 are respectively

X_2 నీటితో చర్యనొంది HX (జల) మరియు HOX (జల) లను ఏర్పరుచును. Y_2 నీటితో చర్య నొంది O_2 (వా), Y^- (జల) మరియు H^+ (జల)లను ఏర్పరుచును. Z_2 నీటితో చర్యనొందదు. X_2 , Y_2 , Z_2 లు వరుసగా

Chemistry - Question 149

Original paper page 86; original question and option regions

Identify the statements which are **not** correct.

- i. CrO_3 and Mn_2O_7 are basic oxides
- ii. V_2O_3 and V_2O_4 are acidic oxides
- iii. Cr(VI) is more stable than W(VI)

సరియైన వివరణలు కాని వాటిని గుర్తించుము

- i. CrO_3 మరియు Mn_2O_7 లు క్షార ఆక్సైడ్లు
- ii. V_2O_3 మరియు V_2O_4 లు ఆమ్ల ఆక్సైడ్లు
- iii. W(VI) కంటే Cr(VI) ఎక్కువ స్థిరమైనది

Options :

- 1. i, ii
- 2. ii, iii
- 3. i, iii
- 4. i, ii, iii

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-24 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 150

Original paper page 86; original question and option regions

Identify the complex which exhibits optical isomerism.

దృక్ సాదృశ్యాన్ని ప్రదర్శించు సంశ్లిష్టాన్ని గుర్తించుము

Chemistry - Question 151

Original paper page 87; original question and option regions

Examples of thermoplastic polymer (X) and thermosetting polymer (Y) are

ధర్మోప్లాస్టిక్ పాలిమర్ (X), ఉష్ణదృఢ పాలిమర్ (Y) లకు ఉదాహరణలు

X

Y

Options :

teflon

neoprene

1. టెఫ్లాన్

నియోప్రీన్

neoprene

glyptal

2. నియోప్రీన్

గ్లిప్టాల్

polystyrene

bakelite

3. పాలిస్టైరీన్

బేకలైట్

bakelite

polythene

4. బేకలైట్

పాలిథీన్

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-24 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 152

Original paper page 87; original question and option regions

Fischer projection formula of D - (–) - fructose is

D - (–) - ఫ్రక్టోజ్ ఫిషర్ ప్రక్షేపక ఫార్ములా

Chemistry - Question 153

Original paper page 89; original question and option regions

The drug used for relieving tension is

మనోవేదనను తగ్గించడానికి వాడే మందు

Options :

Terfenadine (Seldane)

1. టెర్ఫెనాదీన్ (సెల్డేన్)

Alitame

2. అలిటేమ్

Meprobamate

3. మెప్రోబామేట్

Aspartame

4. అస్పార్టేమ్

Chemistry - Question 154

Original paper page 89; original question and option regions

Chloroethane with silver acetate forms X and with LiAlH_4 forms Y. What are X and Y?

క్లోరోఈథేన్ సిల్వర్ ఎసిటేట్తో X ను మరియు LiAlH_4 తో Y ను ఏర్పరుస్తుంది. X మరియు Y లు ఏవి?

X

Y




Chemistry - Question 155

Original paper page 90; original question and option regions

Pent-1-ene reacts with diborane to form X. X on oxidation using H_2O_2 in the presence of aqueous NaOH gives Y. Compound Y is

పెంట్ -1- ఈన్ డైబోరేన్ తో చర్యనొంది X ను ఏర్పరుస్తుంది. H_2O_2 తో NaOH జలద్రావణం సమక్షంలో X ఆక్సీకరణం చెంది Y నిస్తుంది. సమ్మేళనము Y

Options :




Chemistry - Question 156

Original paper page 91; original question and option regions

Identify X and Y in the following reactions

క్రింది చర్యలలో X, Y లను గుర్తించండి



X

Y

Chemistry - Question 157

Original paper page 92; original question and option regions

Identify m-cresol (A), catechol (B) and resorcinol (C) from the following













క్రింది వాటిలో m-క్రిసాల్ (A), కేటకోల్ (B), రిసార్సిన్ (C) లను గుర్తించండి

A

B

C

Options :




Chemistry - Question 158

Original paper page 93; original question and option regions

What are X and Y in the following reactions ?









క్రింది చర్యలలో X, Y లు ఏవి?



X

Y

Options :



Chemistry - Question 159

Original paper page 93; original question and option regions

Reaction of RCOOH with $\text{R}'\text{OH}$ takes place in the presence of H_2SO_4 to form an ester.
The intermediate in the reaction is

RCOOH , $\text{R}'\text{OH}$ తో H_2SO_4 సమక్షంలో చర్యనొంది ఎస్టర్ను ఏర్పరుస్తుంది. చర్యలో ఏర్పడే మధ్యస్థం

Chemistry - Question 160

Original paper page 94; original question and option regions

The reagent used for the distinction of 1° , 2° and 3° amines is

1° , 2° మరియు 3° ఎమీన్లను గుర్తించడానికి వాడే కారకం

Options :

