

Sea $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ una función dos veces diferenciable tal que

$$2f'(x) + xf''(x) \geq 1$$

Demostrar que

$$\int_{-1}^1 xf(x) \, dx \geq \frac{1}{3}$$

Solución:

Sea $g(x) = xf(x) - \frac{x^2}{2}$. Se cumple que

$$g''(x) = \left(xf(x) - \frac{x^2}{2} \right)'' = (f(x) + xf'(x) - x)' = 2f'(x) + xf''(x) - 1 \geq 0$$

Entonces, la función g es convexa. Ahora, se ve que

$$\int_{-1}^1 xf(x) \, dx = \int_{-1}^1 \left(g(x) + \frac{x^2}{2} \right) \, dx = \frac{1}{3} + \int_{-1}^1 g(x) \, dx$$

Si se aproxima la función g por la recta tangente en $x = 0$, se tiene que $g(x) \approx g(0) + g'(0) \cdot x = ax$, siendo $a = g'(0)$, de hecho, se cumplirá que $g(x) \geq ax$, porque g es convexa. Entonces

$$\int_{-1}^1 g(x) \, dx \geq \int_{-1}^1 ax \, dx = 0$$

Y, por tanto, se demuestra que

$$\int_{-1}^1 xf(x) \, dx \geq \frac{1}{3}$$