

Sea n un número natural. Determina el mínimo rango posible de una matrix $n \times n$ que tiene ceros en todas las posiciones la diagonal principal y números positivos en las demás posiciones.

Solución:

Para $n = 1$ la única matriz posible es $A_1 = (0)$, cuyo rango es $\text{rank}(A_1) = 0$. Para $n = 2$, se tienen matrices de estilo de

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & m \\ n & 0 \end{pmatrix}, m, n > 0 \implies |A_2| = -mn \neq 0 \implies \text{rank}(A_2) = 2$$

Para $n \geq 3$ se puede ver que la matriz

$$\begin{aligned} A_n &= \begin{pmatrix} 0^2 & 1^2 & \dots & (n-1)^2 \\ (-1)^2 & 0^2 & \dots & (n-2)^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (1-n)^2 & (2-n)^2 & \dots & 0^2 \end{pmatrix} = ((i-j)^2)_{i,j=1}^n = (i^2 - 2ij + j^2)_{i,j=1}^n = \\ &= \begin{pmatrix} 1^2 & 1^2 & \dots & 1^2 \\ 2^2 & 2^2 & \dots & 2^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n^2 & n^2 & \dots & n^2 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 & 1 \cdot 2 & \dots & 1 \cdot n \\ 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 & \dots & 2 \cdot n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n \cdot 1 & n \cdot 2 & \dots & n \cdot n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1^2 & 2^2 & \dots & n^2 \\ 1^2 & 2^2 & \dots & n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1^2 & 2^2 & \dots & n^2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1^2 & 1^2 & \dots & 1^2 \\ 4 & 4 & \dots & 4 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n^2 & n^2 & \dots & n^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 & \dots & 2n \\ 4 & 8 & \dots & 4n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2n & 4n & \dots & 2n^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 4 & \dots & n^2 \\ 1 & 4 & \dots & n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 4 & \dots & n^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Y entonces el rango mínimo posible de A_n es

$$\begin{aligned}
 \text{rank}(A_n) &= \text{rank} \left(\begin{pmatrix} 1^2 & 1^2 & \dots & 1^2 \\ 4 & 4 & \dots & 4 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n^2 & n^2 & \dots & n^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 & \dots & 2n \\ 4 & 8 & \dots & 4n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2n & 4n & \dots & 2n^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 4 & \dots & n^2 \\ 1 & 4 & \dots & n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 4 & \dots & n^2 \end{pmatrix} \right) \leq \\
 &\leq \text{rank} \begin{pmatrix} 1^2 & 1^2 & \dots & 1^2 \\ 4 & 4 & \dots & 4 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n^2 & n^2 & \dots & n^2 \end{pmatrix} + \text{rank} \begin{pmatrix} -2 & -4 & \dots & -2n \\ -4 & -8 & \dots & -4n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -2n & -4n & \dots & -2n^2 \end{pmatrix} + \\
 &+ \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & 4 & \dots & n^2 \\ 1 & 4 & \dots & n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 4 & \dots & n^2 \end{pmatrix} = \\
 &= 1 + 1 + 1 = 3
 \end{aligned}$$

Por tanto, el rango mínimo de A_n con $n \geq 3$ es 3.