

ZERYVA

ПРИРОДА, ЩО ПРАЦЮЄ НА ВРОЖАЙ





The background of the page is a photograph of an industrial facility, likely a factory or processing plant. It shows a large, blue, cylindrical machine with a motor on top, situated in a room with a high ceiling and metal beams. The lighting is bright, and the overall tone is industrial and professional.

З 2013 року українська компанія **«Зерива»** займається розробкою, масштабним виробництвом та впровадженням високоефективних добрив нового покоління й унікальних біопрепаратів для рослинництва. Наш підхід базується на глибоких наукових дослідженнях та прагненні дати аграріям надійний інструмент для розкриття повного генетичного потенціалу сільськогосподарських культур.

Ми будуємо чесні партнерські відносини з фермерами, надаючи не просто високо-ефективні продукти, а комплексні технологічні рішення та повну підтримку на кожному етапі вирощування — від передпосівної обробки насіння до збирання якісного врожаю. Наша головна мета — забезпечити стійкий, прогнозований та економічно вигідний розвиток агробізнесу завдяки розумному живленню рослин та збереженню природного потенціалу українських ґрунтів.



ДОСЛІДЖЕННЯ

Науково-виробничий потенціал: Від ідеї до каністри

Унікальність продукції «Зерива» полягає в тому, що ми контролюємо весь життєвий цикл препарату. Ми не копіюємо чужі формули, а створюємо власні.

Власна R&D лабораторія: Наші спеціалісти — провідні агрономи, агрохіміки та біотехнологи — постійно працюють над виділенням та дослідженням нових штамів корисних мікроорганізмів, вивченням синергії хімічних та біологічних компонентів.

Сучасне технологічне виробництво: Завод компанії оснащений передовим обладнанням, що дозволяє випускати продукцію стабільно високої якості, з точним дозуванням діючих речовин та тривалим терміном зберігання.

Багаторівневий контроль якості: Кожна партія сировини та готова продукція в каністрах проходять суворий лабораторний аналіз. Ми гарантуємо, що заявлений склад на 100% відповідає вмісту в кожній упаковці.

Польові випробування: Перед виходом на ринок кожен новий продукт проходить мінімум дворічні тести на власних та партнерських дослідних ділянках у різних регіонах України, щоб довести свою ефективність у реальних погодних умовах.

Комплексний асортимент: Всебічна турбота про врожай



Асортимент ТМ «Зерива» — це збалансована екосистема продуктів, яка дозволяє закрити всі базові та специфічні потреби рослини протягом усього сезону. Ми пропонуємо інноваційні рішення, що легко інтегруються як у класичні інтенсивні, так і в екологічні технології землеробства:

- **Високоєфективні інокулянти:** Спеціалізовані мікробіологічні препарати нового покоління для передпосівної обробки насіння. Вони стимулюють розвиток міцної кореневої системи та гарантують стабільне азотне, фосфорне і калійне живлення рослин із перших днів вегетації.
- **Унікальні бактеріальні комплекси:** Продукти на основі живих культур корисних бактерій та грибів, що активізують корисну мікрофлору ґрунту, покращують його структуру та переводять заблоковані хімічні елементи у легкозасвоювану для рослин форму.
- **Біологічний захист від патогенів:** Передові засоби для м'якого та безпечного фітосанітарного контролю посівів. Вони забезпечують надійне блокування розвитку та поширення хвороб рослин без накопичення токсичних речовин у кінцевій продукції.
- **Антистресанти, біостимулятори та регулятори росту:** Продукти швидкого реагування, які допомагають посівам миттєво відновитися після температурних шоків (весняні приморозки, спека), посухи чи гербіцидного стресу за рахунок високої концентрації гумінових, фульвових та амінокислот.
- **Деструктори рослинних решток:** Спеціалізовані комплекси на основі активних штамів мікроорганізмів. Вони забезпечують прискорене розкладання соломи та стерні, повертають у ґрунт цінну органіку, покращують його родючість та ефективно пригнічують патогени, які зимують у полі.
- **Мікро-, моно- та мультидобрива нового покоління:** Повна лінійка рідких добрив із макро-, мікро- та мезоелементами у максимально доступній (хелатній) формі для точного позакореневого підживлення окремих груп культур (зернових, зернобобових, технічних) та ліквідації дефіциту живлення.
- **Спеціалізовані ад'юванти (ПАР):** Високотехнологічні прилипачі, які оптимізують якість обприскування, гарантують ідеальне покриття листової поверхні робочим розчином, покращують утримання препаратів на рослині та посилюють дію всієї бакової суміші.

Агрономічний супровід: Ми завжди поруч у полі



Слоган «Зерива — наука, яка працює в полі» відображає наш підхід до сервісу. Ми розуміємо, що навіть найкращий препарат не спрацює, якщо його застосувати невчасно або в неправильному дозуванні.

Тому кожен наш клієнт отримує індивідуальну підтримку:

1

Експертні консультації щодо підбору схем живлення під конкретну культуру, планову врожайність та бюджет.

2

Адаптація технологічних карт під специфічні ґрунтово-кліматичні умови вашого регіону.

3

Оперативна допомога та виїзд спеціалістів у поле для аналізу стану посівів у критичних чи стресових ситуаціях.

“ЗЕРИВА - НАУКА, ЯКА ПРАЦЮЄ В ПОЛІ,,

Чому професійні аграрії обирають «Зерива»?

1

Реальна економічна вигода

Наша продукція оптимізує витрати на вирощування. Ви отримуєте більшу фінансову віддачу з кожного вкладеного гривні за рахунок приросту врожаю та підвищення його класності.

2

Збереження родючості землі

Системне використання наших біопрепаратів та добрив покращує структуру ґрунту, відновлює його природний біоценоз та запобігає деградації земель від надмірного хімічного навантаження.

3

Ідеальна сумісність

Препарати ТМ «Зерива» мають чудову фізико-хімічну стабільність, легко змішуються у бакових сумішах з більшістю засобів захисту рослин (ЗЗР), що дозволяє економити на кількості проходів техніки по полю.

«ZERYVA» — це природа, що працює на врожай.
Результат нашої наукової праці та вашої відданої роботи ви бачите безпосередньо в полі: у налитому колосі, кожному сформованому стручку та в кожній тоні якісного, здорового врожаю.

ЗМІСТ

Інокулянти:

Ризофос	10
Ризостарт рідкий	12
Ризостарт сухий	14

Фітопротектори:

Арія	18
Фунгіблок	20

Бактеріальні комплекси:

Глеон	24
Деструмаг	26

Стимулятори, антистресанти:

Віолон	30
Ксерула	32
Ризогумат рідкий	34
Ризогумат сухий	36

Мікро, моно добрива:


Бобові	40
Бор 150	42
Бор+Молібден	44
Віасил	46
Залізо	48
Зернові	50
Кальцій	52
Марганець	54
Мідь	56
Молібден+Кобальт	58
Мультимікс	60
Технічні	62
Цинк	64

Прилипачі (ПАР):

Ліпротенс	68
-----------------	----







ІНОКУЛЯНТИ





РИЗОФОС

БІОПЕРПАРАТ ДЛЯ ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ



Ризофос — комплексний фосфор-каліймобілізуєчий та азотфіксуєчий біопрепарат призначений для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур. Сприяє активному розвитку та галуженню кореневої системи, переводить важкодоступний фосфор і калій у доступну форму, фіксує атмосферний азот. Забезпечує бактеріальний захист від ґрунтових патогенів, підвищує стійкість до стресів та нейтралізує післядію пестицидів.

СКЛАД: Комплекс азотфіксуєчих, фосфор- та каліймобілізуєчих мікро-організмів, корисних бактерій і грибів, що покращують живлення, стимулюють розвиток кореневої системи та підвищують стійкість рослин до стресів. Загальний титр — не менше $4,0 \times 10^9$ КУО/мл.

МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ:

стимулювання швидкого росту та галуження кореневої системи, покращення засвоєння вологи, живлення та фіксації атмосферного азоту, бактеріального захисту насіння від патогенів.

ФОРМА: однорідна сипка порошкоподібна суміш сірого або темно-сірого кольору, без сторонніх домішок, зі слабко вираженим специфічним запахом.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +5 до +25°

ОБРОБКА НАСІННЯ: Насіння змішують з препаратом вручну, в мішках з насінням або в сівалці ретельно перемішуючи, дозволяється застосовувати на попередньо протруєному насінні. Обробіток насіння можна проводити в день висіву або за 90 днів до висіву.

СУМІСНІСТЬ: сумісний з усіма фунгіцидними та інсектицидними протравниками

УПАКОВКА: ящик 15кг (15 пакетів по 1кг)

НОРМА ВИТРАТИ

Культури	Норма витрати грамм/га
Кукурудза/Соняшник	50грамм/га (1 мірна ложка)
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	50грамм/га (1 мірна ложка)
Зернові (Пшениця, Ячмінь, Жито)	100грамм/га (2 мірні ложки)
Ріпак	50грамм/га (1 мірна ложка)
Буряки (цукрові, кормові, столові)	25грамм/га (половина мірної ложки)

ПЕРЕВАГИ

Максимальна доступність фосфору та калію для рослини.

Дружні сходи та потужний розвиток кореневої системи.

Пригнічення ґрунтової патогенної мікрофлори.

Підвищення врожайності та якості продукції



ФГ Кравчука Ю.В. Хмельницька обл

«Цього сезону випробували «Ризофос» на кукурудзі й залишилися дуже задоволені. Коренева система стала потужнішою та розгалуженішою, а посіви набагато легше витримали спеку й нестачу вологи. Кукурудза стартувала швидше та рівніше, а качани сформувалися повністю - із виповненим зерном. Отримали гарну прибавку до врожаю, тому обов'язково будемо використовувати препарат і в наступних сезонах», зазначив керівник Юрій Віталійович.



РИЗОСТАРТ

ВИСОКОЯКІСНИЙ АЗОТФІКСУЮЧИЙ
РІДКИЙ ІНОКУЛЯНТ



Препарат ініціює масове утворення продуктивних азотфіксуючих бульбочок вже на початкових етапах розвитку рослин. Бактерії інокулянту потрапляють в корінь бобових рослин через кореневі волоски, а потім починають інтенсивно розмножуватися і стимулювати навколо своїх вогнищ швидке ділення клітин з подальшим утворенням бульб, фіксуючих атмосферний азот та перетворювати його у форму, доступну для засвоєння рослинами.



СКЛАД: Азотфіксуючі бактерії *Bradyrhizobium elkanii* штами U 1301 та U 1302 титр не менше 4×10^9 КУО/г, ексклюзивні стимулятори росту кореневої системи 2%, вітаміни, фітогормони, гетероауксини, прилипачі.



НОРМА ВИТРАТИ: 2л інокулянту РисзоСтарт на 1 тону насіння або пакет 5л на 2,5тонни насіння.



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: Фіксація атмосферного азоту рослинами сої/гороху



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: Соя, Горох



ФОРМА: рідина



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 36 місяців (3 роки) за температури зберігання від +5 до +25°C.



ОБРОБКА НАСІННЯ: Інокуляція можлива за 45 днів до висіву насіння.



СУМІСНІСТЬ: сумісний з усіма фунгіцидами та інсектицидними протравниками



УПАКОВКА: 5л пакет на 2,5тонни насіння

ПЕРЕВАГИ

Новий титр «*Bradyrhizobium elkanii*» штами U1301 та U1302» завдяки яким Фермер із США Алекс Харрелл побив рекорд урожайності сої з результатом 14,67 т/га.;

Данний **титр «*Bradyrhizobium elkanii*»** має життєдіяльність до 3-років, тому інокулянти Ризостарт мають більш тривалий товарний термін зберігання і позитивну азотну післядію у ґрунті на наступну культуру у сівозміні;

Сумісний з усіма фунгіцидними та інсектицидними протравниками;

Містить у собі ексклюзивний прилипач котрий дозволяє обробляти насіння за 45 днів до висіву;

До складу інокулянту входять - стимулятори росту котрі додатково стимулюють ріст і розвиток кореневої системи;

Низька вартість на 1га у порівнянні із брендовими інокулянтами;

Відмінна робота у «екстримальних умовах» – «бідні ґрунти», не достатня кількість опадів, ранні/пізні терміни посіву, заглиблений або поверхневий висів насіння;

Підвищує врожайність бобових до 50%, збільшує вміст протеїну, підвищує стійкість рослини до дії стресових факторів;



ФГ ДД Агро, Волинська обл, Гришук Ю.В.

«Наше господарство використовує інокулянт Ризостарт уже впродовж п'яти сезонів. За цей час ми помітили значний приріст в урожаї сої та збільшення показників протеїну. Особливо важливо те, що навіть на піщаних ґрунтах бактерія Ризостарт забезпечує суттєву надбавку до врожайності та протеїну. Тож ми вже давно для себе зробили чіткий висновок щодо ефективності цього інокулянту!»



РИЗОСТАРТ

Високоякісний Азотфіксуючий сухий інокулянт



Препарат ініціює масове утворення продуктивних азотфіксуючих бульбочок вже на початкових етапах розвитку рослин. Бактерії інокулянту потрапляють в корінь бобових рослин через кореневі волоски, а потім починають інтенсивно розмножуватися і стимулювати навколо своїх вогнищ швидке ділення клітин з подальшим утворенням бульб, фіксуючих атмосферний азот та перетворювати його у форму, доступну для засвоєння рослинами.



СКЛАД: азотфіксуючі бактерії *Bradyrhizobium elkanii* штами U 1301 та U 1302 титр не менше 4×10^9 КУО/г, ексклюзивні стимулятори росту кореневої системи 2%, вітаміни, фітогормони, гетероауксини.



НОРМА ВИТРАТИ: 2 кг сухого інокулянту РизоСтарт на 1 тону насіння, пакет 1 кг на 500 кг насіння.



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: ФІКСАЦІЯ АТМОСФЕРНОГО АЗОТУ РОСЛИНАМИ СОЇ/ГОРОХУ



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: Соя, Горох



ФОРМА: сухий стерильний препарат на основі торфу



УПАКОВКА: ящик 10 кг (10 пакетів по 1 кг), розрахований на 5 тонн насіння



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 36 місяців (3 роки) за температури зберігання від +5 до +25°C.



ОБРОБКА НАСІННЯ: Насіння змішують з препаратом вручну або в сівалці ретельно перемішуючи, дозволяється застосовувати на попередньо протруєному насінні. Обробіток насіння можна проводити в день висіву або за 45 днів до висіву.



СУМІСНІСТЬ: сумісний з усіма фунгіцидними та інсектицидними протравниками

ПЕРЕВАГИ

Новий титр «Bradyrhizobium elkanii» штами U1301 та U1302» завдяки яким Фермер із США Алекс Харрелл побив рекорд урожайності сої з результатом 14,67 т/га.;

Даний титр «Bradyrhizobium elkanii» має життєдіяльність до 3-років, тому інокулянти Ризостарт мають більш тривалий товарний термін зберігання і позитивну азотну післядію у ґрунті на наступну культуру у сівозміні;

Сумісний з усіма фунгіцидними та інсектицидними протравниками;

До складу інокулянту входять - стимулятори росту котрі додатково стимулюють ріст і розвиток кореневої системи;


Низька вартість на 1га у порівнянні із брендовими інокулянтами;

Відмінна робота у «екстримальних умовах» – «бідні ґрунти», не достатня кількість опадів, ранні/пізні терміни посіву, заглиблений або поверхневий висів насіння;

Підвищує врожайність бобових до 50%, збільшує вміст протеїну, підвищує стійкість рослини до дії стресових факторів;



ФІТОПРОТЕКТОРИ





АРІЯ

ЗАХИСТ • ІМУНІТЕТ • СТІЙКІСТЬ.



Арія — фітопротектор санітарно-профілактичної та системної контактної дії для обробки рослин, покращення фітосанітарного стану та зниження патогенного навантаження. Препарат підвищує витривалість рослин до стресових факторів і підтримує їх фізіологічну активність протягом вегетації. Завдяки системному розподілу створює несприятливе середовище для розвитку патогенної мікрофлори та підтримує стабільний фітосанітарний фон. Швидке поглинання й рівномірне поширення забезпечують тривалий захисно-профілактичний ефект. Арія підтримує природні захисні механізми, здоровий листковий апарат і стабільний розвиток рослин.

Фітопротектор Арія складається з трьох активних речовин:

- **Полігексаметиленгуанідин гідрохлорид** — сприяє швидкому зниженню мікро біологічного навантаження та підтриманню належного фітосанітарного стану рослин;
- **Фосфориста кислота** — підтримує природні захисні механізми рослин протягом тривалого періоду;
- **Фітонциди** — біологічно активні речовини, що стимулюють природні захисні реакції та підвищують витривалість рослин;



СКЛАД: Полігексаметиленгуанідин гідрохлорид 40 г/л; Фосфориста кислота 70 г/л; Фітонциди 2г/л



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: профілактична обробка, зниження патогенного навантаження та підтримка природних захисних механізмів рослин.



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами, добривами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.



УПАКОВКА: 1л. 5л.



ФОРМА: концентрат суспензії

НОРМА ВИТРАТИ

Культура	Норма л/га для промисло- вого сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток	Шкідливий об'єкт
Зернові (Пшениця, Ячмінь, Жито, Кукурудза)	0.5	50 мл	Покращення фітосанітарного стану рослин, зниження патогенного навантаження, підтримка природних захисних механізмів та підвищення стійкості до стресових факторів.
Технічні (Соняшник, Ріпак, Цукровий буряк)	0.5	50 мл	
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	0.5	50 мл	
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля ріпчаста, Огірки, Часник, Морква)	1	100 мл	
Плодові та ягідні культури (абрикос, вишня, черешня, персик, яблуна, груша, слива, суниця, малина)	1	100 мл	
Плодові насадження та виноградники	1	100 мл	

ПЕРЕВАГИ

Сприяє зниженню патогенного навантаження;

Покращує фітосанітарний стан рослин;

Підтримує природні захисні механізми;

Підвищує витривалість до стресових факторів;

Сприяє активному росту та розвитку рослин;

Найкращий ефект забезпечує при профілактичному застосуванні.



СФГ Калина, Миколаївська обл, Червінко А.В.

«Через перенасичену сівозміну соняшником постала гостра проблема з переноспорозом та склеротиніозом, проти яких класичні фунгіциди були безсилі. Для підсилення імунітету рослин та знезараження листової пластини рослин ми обрали фітопротектор «Арія» і отримали суттєво добрий результат.

Препарат чудово спрацював у складних умовах, захистивши посів там, де звичайна хімія не давала ефекту», зазначив Андрій Вікторович.



ФУНГІБЛОК

ЗАХИСТ • ІМУНІТЕТ • СТІЙКІСТЬ.



Фунгіблок – фітопротектор санітарно-профілактичної та комплексно-системної та контактної дії для підтримання стабільного фітосанітарного стану рослин і зниження патогенного навантаження. Препарат створює профілактичне середовище на поверхні та в тканинах рослин, ускладнюючи розвиток небажаної мікрофлори. Комплекс активних компонентів підтримує природні захисні механізми, підвищує адаптивність рослин до біотичних стресів і забезпечує тривалий профілактично-захисний ефект. Рекомендований для профілактичного догляду за посівами протягом вегетації.

Фітопротектор Фунгіблок складається з трьох активних речовин:

- **Молочна кислота** – сприяє підтриманню належного мікробіологічного та фітосанітарного стану поверхні рослин;
- **Пероксид водню** – компонент контактної санітарно-профілактичної дії, що сприяє очищенню поверхні рослин від небажаної мікрофлори;
- **Фітоалексини** – природні захисні сполуки, що підтримують захисні механізми рослин і підвищують їх адаптивність до біотичних стресів.



СКЛАД: Молочна кислота 30г/л; Пероксид Водню 80 г/л; Фітоалексини 2г/л



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: профілактична обробка, зниження патогенного навантаження та підтримка природних захисних механізмів рослин.



ФОРМА: концентрат суспензії
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами, добривами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.



УПАКОВКА: 1л. 5л.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура	Норма л/га для промисло- вого сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток	Шкідливий об'єкт
Зернові (Пшениця, Ячмінь, Жито, Кукурудза)	0.5	50 мл	Покращення фітосанітарного стану рослин, зниження патогенного навантаження, підтримка природних захисних механізмів та підвищення стійкості до стресових факторів.
Технічні (Соняшник, Ріпак, Цукровий буряк)	0.5	50 мл	
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	0.5	50 мл	
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля ріпчаста, Огірки, Часник, Морква)	1	100 мл	
Плодові та ягідні культури (абрикос, вишня, черешня, персик, яблуна, груша, слива, суниця, малина)	1	100 мл	
Плодові насадження та виноградники	1	100 мл	

ПЕРЕВАГИ

Інноваційний механізм дії для підтримання стабільного фітосанітарного стану рослин;

Комплексна системна та контактна дія з рівномірним розподілом компонентів у рослині;

Тривалий профілактично-захисний ефект;

Низький вплив на навколишнє середовище за умови дотримання регламентів застосування;

Підтримує природні захисні механізми та адаптивність рослин;

Застосовується у системах профілактичного та санітарного догляду за посівами;

Найкращий ефект досягається при профілактичному застосуванні



БАКТЕРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ





ГЛЕОН

БІОАКТИВАТОР ЖИВЛЕННЯ ТА ҐРУНТУ



Глеон — комплексний мікробіологічний препарат для підвищення біологічної активності ґрунту, покращення доступності елементів живлення та ефективнішого використання мінеральних добрив.

Глеон містить комплекс корисних ґрунтових мікроорганізмів, здатних фіксувати атмосферний азот, мобілізувати важкодоступні сполуки фосфору й калію та переводити їх у форми, доступні для засвоєння рослинами. Завдяки діяльності бактерій у ризосфері підвищується доступність елементів живлення, покращується використання внесених мінеральних добрив і створюються сприятливі умови для розвитку кореневої системи.

Мікроорганізми препарату продукують органічні кислоти, ферменти, вітаміни, амінокислоти, фітогормони та інші фізіологічно активні речовини, які підтримують коренеутворення, живлення та розвиток рослин.

Дія мікроорганізмів:

- **Clostridium sp.** — сприяє фіксації атмосферного азоту в анаеробних мікрозонах ґрунту;
- **Azotobacter chroococcum** — фіксує атмосферний азот і продукує біологічно активні речовини;
- **Paenibacillus polymyxa** — бере участь в азотфіксації, мобілізації фосфору та стимуляції розвитку кореневої системи;
- **Bacillus megaterium var. phosphaticum** — переводить важкодоступні сполуки фосфору в доступніші для рослин форми;
- **Bacillus licheniformis** — сприяє мобілізації калію та підвищенню доступності елементів живлення;
- **Bacillus subtilis** — активно колонізує ризосферу, підтримує корисну мікрофлору та розвиток кореневої системи.

СКЛАД: Clostridium sp., Azotobacter chroococcum, Paenibacillus polymyxa, Bacillus megaterium var. Phosphaticum, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis
Вітаміни, фітогормони, амінокислоти та інші фізіологічно-активні речовини.
Загальне число життєздатних клітин не менше ніж 2×10^8 КУО/мл

МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: підвищення родючості ґрунту, мобілізація елементів живлення, стимуляція розвитку рослин

ФОРМА: концентрат суспензії

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 36 місяців (3 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C

СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами, добривами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.

УПАКОВКА: 5л., 10л., 20л.

Культура	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Обприскування ґрунту перед культивацією або дискуванням	2-3	200-300 мл
Внесення разом із КАС/РКД	1,5-2	150-200 мл
Одночасно із посівом, локально в рядок	1,5-2	150-200 мл
Фертигація	3-4	300-400 мл

ПЕРЕВАГИ

Сприяє фіксації атмосферного азоту;

Підвищує доступність фосфору та калію у ґрунті;

Покращує засвоєння внесених мінеральних добрив;

Підвищує коефіцієнт використання елементів живлення рослинами;

Сприяє зменшенню непродуктивних втрат елементів живлення;

Активізує корисну ризосферну мікрофлору;

Підтримує біологічну активність і родючість ґрунту;

Стимулює розвиток кореневої системи;

Покращує доступність макро- та мікроелементів;

Сприяє рівномірному росту й розвитку рослин;

Підвищує ефективність системи живлення культур.



У ПП «Хлібороб» Полтавська обл. Янчук І.І. 700 га.

«**Препарат Глеон** ми спробували вперше у цьому сезоні на площі сояшнику 65 га. Вносили його у нормі 3 л/га разом із ґрунтовим гербіцидом. Ми помітили, що на площі, де застосовували Глеон, сояшник сформував значно потужнішу кореневу систему, краще переніс стресові умови та демонструє рівномірніші й активніші сходи проти контрольних ділянок.

Тому цим препаратом ми задоволені і будемо використовувати його на усі свої поля!» — зазначає керівник господарства Янчук Ігор



ДЕСТРУМАГ

БІОПЕРПАРАТ ДЕСТРУКТОР ДЛЯ ПРИСКОРЕНОГО РОЗКЛАДАННЯ РОСЛИННИХ РЕШТОК, ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД ХВОРОБ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ҐРУНТУ



ДеструМаг — це біодеструктор, який прискорює розкладання стерні, соломи, листя та інших залишків культур після збирання врожаю. Він містить у своєму складі речовини антибіотичної групи, які пригнічують розвиток багатьох видів збудників хвороб сільськогосподарських культур та інших рослин, що вражають кореневу систему.

Біодеструктор складається з таких штамів бактерій:

- **Trichoderma viride-lignorum**, пригнічує розви-

ток патогенних мікроорганізмів, грибків у ґрунті в тому числі (*Fusarium*, *Pythium*, *Rhizoctonia*, *Sclerotinia*, *Verticillium* spp, *Helminthosporium* spp, *Blumeria* spp., *Septoria* spp, *Gibberella* spp, *Pyrenophora* spp., *Alternaria* spp., *Dreschlera* spp., *Ascochyta* spp., *Phytophthora* spp., *Erysiphe* spp. та ін.);

- **Bacillus subtilis-licheniformis** — сприяє швидкій деструкції рослинних решток, покращує структуру ґрунту та його родючість, руйнує складні молекули пестицидів, перетворюючи їх на прості та безпечні речовини, що дозволяє швидше нейтралізувати їхню післядію;

- **Azotobacter, Enterococcus** — здатні фіксувати атмосферний азот (N_2) і переводити його у форми, доступні для рослин (NH_4 , NO_3), покращують засвоєння фосфору і калію;

- **Enterobacter, Paenibacillus polymyxa** — захищають від корневих і прикореневих гнилей, контролюють патогени й вивільняють фосфор.



СКЛАД: 8 штамів роду: *Trichoderma viride-lignorum*, *Bacillus subtilis-licheniformis*, *Azotobacter*, *Enterococcus*, *Enterobacter*, *Paenibacillus polymyxa*, Титр від $4,0 \cdot 10^9$ до $2,0 \cdot 10^{11}$ КУО/мл. КУО/мл.



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: пришвидшення розкладання поживних решток, пригнічення розвитку фітопатогенів у ґрунті;

ФОРМА: концентрат суспензії



СУМІСНІСТЬ: Попередньо потрібно провести тест на сумісність



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 36 місяців (3 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



УПАКОВКА: 5л., 10л., 20л.

Культура	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток	Робочий розчин л/га
Зернові (Пшениця, Ячмінь, Жито, Кукурудза)	1-2	100-200 мл	50-300
Технічні (Соняшник, Ріпак)	1-2	100-200 мл	
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	1-1,5	100-150 мл	
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля ріпчаста, Огірки, Часник)	1-2	100-200 мл	
Опале листя плодових дерев безпосередньо на території саду у період листопаду	1-2	100-200 мл	500-800

ПЕРЕВАГИ Швидко та ефективно розкладає поживні рештки, збільшуючи доступність поживних елементів;

Захищає рослини від широкого спектру грибних та бактеріальних хвороб (*Fusarium*, *Pythium*, *Rhizoctonia*, *Sclerotinia*, *Verticillium* spp, *Helminthosporium* spp, *Blumeria* spp., *Septoria* spp, *Gibberella* spp, *Pyrenophora* spp., *Alternaria* spp., *Dreschlera* spp., *Ascochyta* spp., *Phytophthora* spp., *Erysiphe* spp. та ін.);

Пригнічує розвиток фітопатогенів у ґрунті;

Добре працює у стресових умовах;

Активізує розвиток природної ґрунтової мікрофлори;

Збільшує продуктивність рослин і підвищує врожайність наступних культур;

Економія до 80% на внесенні азотних добрив, необхідних для розкладання решток;

Менше накопичення залишків ЗЗР у продукції, зниження післядії та фітотоксичності для наступних культур пестицидів;

Рекомендовано в бакову суміш вносити азотовмісні водорозчинні добрива у нормі 5-15 кг д.р. на 1га;

Після внесення препарату можна проводити дискування або оранку за потреби, можна використовувати при технологіях по-till, mini-till, strip-till рекомендовано прикатати оброблену ділянку котком;

Можна застосовувати як самостійно, так і сумісно з іншими дозволеними препаратами живлення та захисту рослин. Попередньо потрібно провести тест на сумісність;

для підвищення ефективності дії біопрепарату ДеструМаг до робочого розчину додають ПАР ЛіпроТенс (0,2-0,3 л/га) з метою рівномірного розподілення препарату у ґрунтовому профілі, зменшення промивання після тривалих опадів;

Біодеструктор застосовують за температури повітря від +5 °С до +25 °С, можна працювати у сонячну погоду.



**СТИМУЛЯТОРИ
АНТИСТРЕСАНТИ**





ВІОЛОН

АДАПТОГЕН • СТИМУЛЯТОР РОСТУ
УКОРІНЮВАЧ • АНТИОКСИДАНТ • АНТИСТРЕСАНТ



Віолон — препарат широкого спектра дії, що сприяє подоланню стресів, збільшує стійкість до несприятливих кліматичних умов, механічних пошкоджень, хімічних опіків-стресів, посилює імунітет та покращує ріст і розвиток рослин. Стимулює утворення вторинного коріння, сприяє засвоєнню поживних речовин, прискорює адаптацію та значно посилює власний імунітет рослин. Препарат зменшує фунгіцидне навантаження на рослини та дозволяє отримувати кращі результати, а також економію на системах захисту.

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.

СКЛАД:

Органічні речовини — 100 г/л, у тому числі:

- органічний вуглець рослинного походження — 48 г/л;
полісахариди — 40 г/л; протеїнові поліпептиди — 10 г/л;
- стероїдні глікозиди — 2 г/л.
- Макроелементи: Азот (N) — 10 г/л; Фосфор (P) — 20 г/л;
Калій (K) — 20 г/л.
- Амінокислоти — 120 г/л, у тому числі: незамінні — 60 г/л;
замінні — 60 г/л.
- Фітогормони та антистресанти: ауксини — 0,1 г/л;
цитокініни — 0,42 г/л; бетаїни — 0,3 г/л.
- Комплекс вітамінів, β -каротин та ПАР — 10 г/л.

СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами, добривами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.

МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: збільшення урожайності і якості с/г культур

ФОРМА: концентрат суспензії

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.

УПАКОВКА: 1л. 5л.

НОРМА ВИТРАТИ

Культури	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Зернові, Технічні, Бобові	0,5 л/га	50мл
Овочеві	1 л/га	100мл
Плодово-Ягідні	1 л/га	100мл

Обробка насіння:

Зернові, бобові, технічні, овочеві культури — Норма препарату — 1 л/т насіння

ПЕРЕВАГИ

Підвищує стійкість рослин до стресів і хвороб;

Сприяє стимуляції ростових процесів;

Стимулює відновлення рослин, сприяє активному наростанню вегетативної та кореневої маси;

Сприяє закладанню бутонів, активізує процеси цвітіння та запліднення, запобігає опаданню квіток та плодів;

Підвищує врожайність культур та покращує їх якість та товарність;

Зміцнює імунну систему рослин;

Стимулює обмінні процеси в рослині, впливає на клітинний і тканинний метаболізм;

Забезпечує надходження кисню до клітин;

Підвищує ефективність застосованих добрив;

Розкриває генетичний потенціал культур;



ПСП «Промінь» Вінницька область 3900га, Директор Тимчак І.А.
«Цього року погода випробовувала нас на міцність. Приморозки змінювалися посухою, але завдяки препарату Віолон ми не просто зберегли посіви озимого ріпаку та інших культур (Соя, Соняшник, Кукурудза, Ячмінь, Пшениця), а й забезпечили їх повноцінний розвиток. Препарат спрацював як надійний щит: рослини швидко відновлювалися, мали насичений колір і потужну кореневу систему. Результатом задоволені на всі 100%.»



КСЕРУЛА

ВОЛОГА • СТІЙКІСТЬ • ПОТЕНЦІАЛ



Ксерула — спеціалізований антистресовий комплекс нового покоління на основі Ксерофітину® та Ferula-N BioMatrix, призначений для підтримки рослин у періоди посухи, спеки, дефіциту вологи, суховіїв та інших абіотичних стресів.

Комплекс сприяє підтриманню водного балансу і тургору листків, збереженню фотосинтетичної активності та нормальному перебігу ростових процесів. Допомогає рослинам ефективніше використовувати доступну вологу, швидше відновлювати фізіологічну активність після стресу та довше зберігати функціональний листковий апарат.

XEROPHYTIN® підтримує водоутримувальну здатність тканин рослини, Ferula-N BioMatrix активує природні механізми адаптації до стресу, а комплекс макро- та мікроелементів підтримує фотосинтез, живлення й відновлення рослин.



СКЛАД: Ксерофітин — 90г/л; Витяжка ферули / Ferula-N BioMatrix — 0,7г/л; Азот (N) — 20г/л; Фосфор (P) — 10г/л; Калій (K) — 20г/л; Кремній (SiO₂) — 10г/л; Кальцій (Ca) — 1г/л; Сірка (S) — 1г/л; Магній (Mg) — 1г/л; Цинк (Zn) — 1г/л; Залізо (Fe) — 0,5г/л; Мідь (Cu) — 0,7г/л; Марганець (Mn) — 0,7г/л; Бор (B) — 0,9г/л; Молібден (Mo) — 0,03г/л; Кобальт (Co) — 0,001г/л;



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ:

підвищення стійкості рослин до посухи, спеки, водного дефіциту та інших абіотичних стресів, підтримання водного балансу, фотосинтезу і відновлення ростових процесів.



ФОРМА: концентрат суспензії

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами, добривами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.



УПАКОВКА: 5л., 10л., 20л.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура	Норма л/га для промисло- вого сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток	Шкідливий об'єкт
Зернові (Пшениця, Ячмінь, Жито, Кукурудза)	1,5-3	150-300 мл	1–3 рази протягом вегетації залежно від стану культури, рівня стресу та погодних умов. За необхідності повторну обробку проводити через 10–14 днів.
Технічні (Соняшник, Ріпак, Цукровий буряк)	1,5-3	150-300 мл	
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	1,5-3	150-300 мл	
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля ріпчаста, Огірки, Часник, Морква)	3-4	300-400 мл	
Плодові та ягідні культури (абрикос, вишня, черешня, персик, яблуна, груша, слива, суниця, малина)	3-4	300-400 мл	

ПЕРЕВАГИ

Підвищує фізіологічну стійкість рослин до посухи та високих температур;

Підтримує водний баланс і тургор листків;

Сприяє зниженню непродуктивних втрат вологи;

Допомагає рослинам ефективніше використовувати доступну вологу;

Підтримує фотосинтетичну активність у стресових умовах;

Сприяє збереженню функціонального листового апарату;

Прискорює відновлення фізіологічної активності після стресу;

Підтримує живлення та ростові процеси;

Сприяє збереженню потенціалу врожайності.



Львівська обл, ТОВ Агростатус, Курило І.В

«Цей сезон став справжнім випробуванням на витривалість: з середини травня до серпня ми не отримали жодного міліметра опадів. У період закладки качанів температура стабільно трималася вище +35°C — постало питання не про врожай, а про банальне виживання кукурудзи. Для підтримання водного балансу вирішили взяти препарат «Ксерула» на площу 40 га. Різниця в порівнянні з контролем стала помітною неозброєним оком, препарат дійсно допоміг кукурудзі вистояти в екстремальну спеку!».



РИЗОГУМАТ

СТИМУЛЯТОР РОСТУ • АНТИСТРЕСАНТ



Ризогумат – універсальний стимулятор росту з вираженою антистресовою дією для обробки насіння та позакореневого підживлення сільськогосподарських культур. Комплекс гумінових і фульвових сполук, амінокислот, калію та мікроелементів підтримує розвиток кореневої системи, активізує обмінні процеси, покращує засвоєння елементів живлення та сприяє швидкому відновленню рослин після стресових умов. Препарат особливо ефективний після герби-

цидного навантаження, впливу посухи, спеки, холоду, заморозків, дефіциту вологи та інших несприятливих чинників. Застосовується в критичні фази росту, після перенесеного стресу або профілактично перед очікуваними стресовими умовами. Рекомендований для польових, овочевих, плодово-ягідних та інших сільськогосподарських культур.

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.



СКЛАД: Солі гумінових кислот – 140г/л; Солі фульвових кислот - 40г/л; Амінокислоти – 15г/л; Калій K₂O – 30г/л; Комплекс мікроелементів – 10 г/л.



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: підвищення врожайності та покращення якісних показників сільськогосподарських культур.

ФОРМА: концентрат суспензії
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з інсектицидами, гербицидами, біопрепаратами, добривами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.

УПАКОВКА: 5л., 10л.



НОРМА ВИТРАТИ

Культури	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Зернові, Технічні, Бобові	0,3 - 0,5л/га	30 – 50 мл
Овочеві	0,7 - 1л/га	70 – 100 мл
Плодово-Ягідні	0,7 - 1л/га	70 – 100 мл

Обробка насіння:

Зернові, бобові, технічні, овочеві культури - рекомендується використовувати «РизоГумат» при протруєнні насіння в нормі 1л на 10л води - на одну тону насіння

ПЕРЕВАГИ

Сприяє швидкому відновленню рослин після стресових умов;

Знижує негативний вплив посухи, спеки, холоду та пестицидного навантаження;

Стимулює розвиток потужної кореневої системи;

Активізує ріст і обмінні процеси в рослині;

Покращує засвоєння макро- та мікроелементів;

Підвищує ефективність мінерального живлення;

Підтримує природні захисні механізми рослин;

Сприяє рівномірному розвитку посівів;

Підтримує азотний обмін;



Фермерське господарство «**Ковагростарт**» (Хмельницька обл.)

Препарат РизоГумат ми почали впроваджувати у свої технології ще у 2024 році. Одразу помітили, як гарно та чутливо рослини реагують на його внесення. Але найбільше він здивував нас у критичній ситуації: коли посівах сої випав град і збитки здавалися неминучими, ми за допомогою РизоГумату буквально витягнули посіви на 3,7 тонни з 1 га! Роботою препарату ми задоволені на всі 100% і продовжуємо активно застосовувати його в наших технологіях.



РИЗОГУМАТ

ВИСОКОЯКІСНИЙ АНТИСТРЕСАНТ ТА
СТИМУЛЯТОР РОСТУ ІЗ 100% РОЗЧИННІСТЮ



Ризогумат в.г. - це інноваційний препарат, котрий містить гумінові та фульвові кислоти. Він підвищує родючість ґрунту, покращує ріст рослин та збільшує врожайність. Розчинний на 100% і може використовуватися з застосуванням будь-яких типів обприскувачів, крапельних систем.

СКЛАД:

Солі гумінових і фульвових кислот – 75%; - Амінокислоти – 10%; - Калій K₂O – 10%; - Мікроелементи – 2-3%;

МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: збільшення урожайності і якості с/г культур

ФОРМА: водорозчинні гранули

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: від - 30 °C до +30 °C. Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці.

УПАКОВКА: 1 кг - пакет Zip-Lock

СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами, добривами та хімічними фунгіцидами.

Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність. Для швидкого та рівномірного розчинення необхідно гранули повільно додавати у воду. При цьому розчин потрібно постійно перемішувати.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Зернові (Пшениця, Ячмінь, Жито, Кукурудза)	0.1-0.2 кг/га	10-20 грамм
Технічні (Соняшник, Ріпак,)	0.1-0.2 кг/га	10-20 грамм
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	0.1-0.2 кг/га	10-20 грамм
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля ріпчаста, Огірки, Часник)	0.2-0.4 кг/га	20-40 грамм
Флодово-Ягідні (Абрикос, Вишня, Черешня, Персик, Яблуко, Груша, Слива, Суниця, Малина) Виноградники	0.2-0.4 кг/га	20-40 грамм
Закритий, відкритий ґрунт (овочі, квіти)	0.2-0.4 кг/га	0.2-0.4 кг/га

Обробка насіння: Зернові, бобові, технічні культури - рекомендується використовувати «Ризогумат» при протруєнні насіння в нормі 200грамм на 10л води - на одну тонну насіння

ПЕРЕВАГИ

Збільшує врожайність до 30%;

Підвищує якість продукції;

Посилює імунітет рослин;

Стимулює розвиток потужної кореневої системи;


Зменшує дію стресів різної природи

Сприяє засвоєнню рослинами мінеральних добрив;



Покращує азотне живлення рослин;






**МІКРО-МОНО
ДОБРИВА**



МАКРОЕЛЕМЕНТИ



МИКРОЕЛЕМЕНТИ



Cu/ Mo/ Co



БОБОВІ

КОМПЛЕКСНЕ ДОБРИВО



Zeryva Бобові — комплексно-збалансоване добриво, розроблене з урахуванням потреби в елементах живлення. Має підвищені прилипаючі властивості для передпосівної обробки насіння гороху, сої, люпину тощо, а також для позакореневої обробки зерно-бобових культур. Збільшує врожайність і покращує якість продукції.

Містить набір макро- та мікроелементів, необхідних для живлення бобових культур у

критичні для них періоди розвитку, забезпечує культурам збалансоване та повноцінне живлення, стимулює ріст і розвиток.

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.

СКЛАД: Азот (N) - 80г/л; Фосфор (P)-30 г/л; Калій (K)-10г/л; Магній (Mg) - 25г/л; Сірка (S) - 18г/л; Бор (B) - 70г/л; Мідь (Cu) - 10 г/л; Залізо (Fe) - 3г/л; Марганець (Mn) - 29г/л; Молібден (Mo) - 6г/л; Цинк (Zn) - 27г/л; Кобальт (Co) - 0,2г/л; Вітамінний комплекс B1, B6, D, H, PP – 0,04 %; Вільні L Амінокислоти 4г/л; Фульвові кислоти, 10 г/л; Гумінові кислоти 10 г/л;



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: забезпечення рослини необхідними мікро-макро елементами



ФОРМА: концентрат суспензії



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: добриво сумісне з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.



УПАКОВКА: 5л., 10л., 20л.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	1 - 2	100 - 200 мл.

Обробка насіння.

Норма застосування 2 - 3 л/т насіння зернобобових культур.

ПЕРЕВАГИ

Регулює роботу бульбочкових бактерій, посилює азотфіксацію;

Покращує метаболізми фосфатів та заліза;

Швидко відновлює обмін речовин та стимулює побудову білків;

Швидко відновлює рослину після пестицидного обробітку;

Збільшує кількість квіток і покращує запилення;

Збільшує вміст білка в зерні;

Підвищує якість посівного матеріалу (польова схожість, енергія проростання);



БОР 150

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСЛИН БОРОМ



Zeryva Бор 150 – концентроване борне мікродобриво для профілактики та усунення дефіциту бору в рослин. Високий вміст бору сприяє активному цвітінню, повноцінному запиленню, формуванню зав'язі, транспортуванню цукрів і розвитку генеративних органів. Азот підтримує ростові процеси та засвоєння бору, амінокислоти й вітамінний комплекс сприяють відновленню рослин та підвищенню їхньої фізіологічної активності.

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.



СКЛАД: В – 150 г/л; N – 30 г/л;
Вітамінний комплекс В1, В6, D, Н, РР – 0,04 %; Амінокислоти



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: забезпечення рослини необхідними мікро-макро елементами, стимуляція росту



ФОРМА: концентрат суспензії



УПАКОВКА: 5л., 10л., 20л.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами, добривами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Зернові культури та кукурудза	1-2	100-200 мл
Технічні (Соняшник, ріпак, цукровий буряк)	1-2	100-200 мл
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	1-2	100-200 мл
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля ріпчаста, Огірки, Часник, Морква)	2-4	200-400 мл
Плодові та Ягідні (Абрикос, Вишня, Черешня, Персик, Яблуко, Груша, Слива, Суниця, Малина)	2-4	200-400 мл
Сади, Виноградники	2-4	200-400 мл

ПЕРЕВАГИ

Запобігає та сприяє усуненню проявів дефіциту бору;

Підтримує процеси цвітіння, запилення та запліднення;

Сприяє формуванню зав'язі та генеративних органів;

Підтримує транспорт цукрів і вуглеводний обмін;

Сприяє розвитку молодих тканин і точок росту;

Підтримує фізіологічну активність рослин у стресових умовах;

Сприяє реалізації потенціалу врожайності та якості продукції.



БОР+МОЛІБДЕН

МІКРОДОБРИВО СТИМУЛЯТОР РОСТУ



Zeryva Бор-Молібден – концентроване рідке мікродобриво для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур, особливо чутливих до дефіциту бору та молібдену.

Бор бере участь у формуванні генеративних органів, процесах цвітіння, запилення та зав'язування плодів, а також у транспорті вуглеводів. Молібден підтримує азотний обмін і сприяє ефективному використанню азоту рослиною.

Амінокислоти та стимулятори росту підтримують обмінні процеси, розвиток кореневої системи й відновлення рослин після стресових умов.

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.



СКЛАД: Азот (N)-50 г/л; Бор(B)-139 г/л; Молібден(Mo)- 10 г/л; амінокислоти, стимулятори росту та розвитку



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: усунення дефіциту бору та молібдену, підтримка цвітіння, запилення, зв'язування плодів і азотного обміну



ФОРМА: концентрат суспензії



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами, добривами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.



УПАКОВКА: 5л., 10л., 20л.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Зернові (Пшениця, Ячмінь, Жито, Кукурудза)	1-2	100-200 мл.
Технічні (Соняшник, Ріпак, Цукровий буряк)	1-2	100-200 мл.
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	1-2	100-200 мл.
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля ріпчаста, Огірки, Часник, Морква)	1-2	100-200 мл.
Ягідні (Абрикос, Вишня, Черешня, Персик, Яблуко, Груша, Слива, Суниця, Малина)	1-2	100-200 мл.
Сади, Виноградники	1-2	100-200 мл.

ПЕРЕВАГИ

Усуває та запобігає проявам дефіциту бору й молібдену;

Підтримує процеси цвітіння, запилення та зав'язування;

Сприяє розвитку кореневої системи;

Покращує азотний обмін у рослині;

Підтримує транспорт і накопичення вуглеводів;

Зменшує негативний вплив стресових умов;

Підвищує ефективність системи живлення;

Покращує якісні показники врожаю.



ВІАСИЛ

КОНЦЕНТРОВАНИЙ АЗОТ ІЗ ПРОЛОНГОВАНОЮ
АНТИСТРЕСОВОЮ ДІЄЮ



Віасил — концентроване листкове азотне добриво подвійної дії для оперативного та пролонгованого забезпечення рослин азотом. Частина азоту швидко включається в обмінні процеси після внесення, а частина вивільняється поступово, підтримуючи азотне живлення протягом тривалого періоду. Сірка підтримує азотний обмін і синтез білків, магній бере участь у формуванні хлорофілу та фотосинтезі, а цинк — у ферментативних і ростових процесах.

Ксерофітин® доповнює азотну формулу антистресовою дією, підтримує водний баланс, тургор і фотосинтетичну активність рослин в умовах спеки, посухи та інших абіотичних стресів. Комплекс сприяє ефективному використанню азоту та відновленню активних ростових процесів.

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.



СКЛАД: N — 310 г/л де амідний азот — 93 г/л і повільнодоступний азот із поліметиленсечовини — 217 г/л.; S - 21 г/л; Mg - 11 г/л; Zn - 2г/л; Ксерофітин — 10г/л;

МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ:

Оперативне усунення дефіциту азоту, пролонговане азотне живлення, підтримка фотосинтезу, синтезу білка.



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами, добривами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.



ФОРМА: концентрат суспензії
УПАКОВКА: 5л., 10л., 20л.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Зернові та кукурудза (Пшениця, Ячмінь, Жито)	2-3	200-300 мл
Технічні (Соняшник, Ріпак, Цукровий буряк)	2-3	200-300 мл
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	2-3	200-300 мл
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля, Огірки, Часник, Морква)	3-4	300-400 мл
Плодові та ягідні культури: (Абрикос, Вишня, Черешня, Персик, Яблуко, Груша, Слива, Суниця, Малина)	3-4	300-400 мл

ПЕРЕВАГИ

Висока концентрація азоту — 310 г/л;

Поєднує оперативне та пролонговане азотне живлення;

Сприяє швидкій корекції дефіциту азоту;

Підтримує рівномірне азотне живлення протягом тривалого періоду;

Сірка підвищує ефективність азотного обміну та синтезу білків;

Магній підтримує утворення хлорофілу та фотосинтез;

Цинк бере участь у ферментативних і ростових процесах;

Ксерофітин® підтримує водний баланс і фізіологічну стійкість рослин до стресу;

Дозволяє зменшити кількість повторних підживлень залежно від потреби культури.

Знижує ризик листових опіків порівняно з розчинами карбаміду, КАС і сульфату магнію



ЗАЛІЗО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСЛИН ЗАЛІЗОМ



Zeryva Залізо – концентроване мікродобриво для профілактики та усунення дефіциту заліза в рослин. Препарат підтримує утворення хлорофілу, активність фотосинтезу, дихання та ферментативні процеси, сприяє відновленню природного зеленого забарвлення листків і нормальному перебігу ростових процесів. Застосування Zeryva Залізо допомагає зменшити прояви міжжилкового хлорозу, покращує засвоєння елементів живлення, підтримує життєздатність листового апарату та сприяє формуванню продуктивних рослин.

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.



СКЛАД: Fe - 100г/л; S – 20г/л; B – 2г/л; Mg – 8г/л; Mn – 30г/л; Zn – 1г/л; Вітамінний комплекс; Амінокислоти; Вітамінний комплекс;



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ:
забезпечення рослини
Залізом



ФОРМА: концентрат
суспензії



УПАКОВКА: 5л., 10л., 20л.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48
місяців (4 роки) за
температури зберігання від
+2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: Препарат
сумісний з інсектицидами,
гербіцидами, біопрепаратами,
добривами та хімічними
фунгіцидами. Перед
змішуванням компонентів
доцільно провести попереднє
тестування на сумісність.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Зернові та кукурудза (Пшениця, Ячмінь, Жито)	1-2	100-200 мл
Технічні (Соняшник, Ріпак, Цукровий буряк)	1-2	100-200 мл
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	1-2	100-200 мл
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля, Огірки, Часник, Морква)	2-3	200-300 мл
Плодові та ягідні культури: (Абрикос, Вишня, Черешня, Персик, Яблуко, Груша, Слива, Суниця, Малина)	2-3	200-300 мл

ПЕРЕВАГИ

Швидко усуває дефіцит заліза;

Зменшує прояви міжжилкового хлорозу;

Підтримує утворення хлорофілу;

Активізує фотосинтез і дихання рослин;

Відновлює природне зелене забарвлення листків;

Підтримує ріст і розвиток культури;

Сприяє збереженню врожайного потенціалу.



ЗЕРНОВІ

КОМПЛЕКСНЕ ДОБРИВО



Zeryva Зернові — це комплексно добриво для позакореневого підживлення, що містить 100% хелатовані EDTA мікро- та макроелементи з підвищеними прилипаючими властивостями. Воно призначене для перед-посівної обробки насіння зернових (одночасно з протруєнням) і для позакореневого підживлення зернових культур (пшениця, ячмінь, овес, жито, кукурудза), що сприяє підвищенню врожайності та поліпшенню якісних показників зерна. Завдяки своєму

складу підвищує інтенсивність фотосинтезу, збільшує площу асиміляційної поверхні листків та оперативно вирішує проблеми дефіциту елементів живлення та дисбаланс фітогормонів.

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.

СКЛАД: Азот (N) - 39г/л; (P)-20 г/л; Калій (K)-10г/л; Магній (Mg) - 20 г/л; Сірка (S) - 50г/л; Бор (B) - 10г/л; Мідь (Cu) - 60г/л; Залізо (Fe) - 10г/л; Марганець (Mn) - 19г/л; Молібден (Mo) - 1г/л; Цинк (Zn) - 7г/л; Вітамінний комплекс B1, B6, D, H, PP – 0,04 %; Вільні L Амінокислоти 3г/л; Фульвові кислоти, 10 г/л; Гумінові кислоти 30 г/л;



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: забезпечення рослини необхідними мікро-макро елементами



ФОРМА: концентрат суспензії



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: добриво сумісне з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.



УПАКОВКА: 5л., 10л., 20л.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Зернові (Пшениця, Ячмінь, Жито, Тритикале, Овес, Рис)	1 - 2	100 - 200 мл.
Газонні трави	1	200 мл.

Обробка насіння.

Норма застосування 2 - 3 л/т насіння зернових культур.

ПЕРЕВАГИ

Використовується на всіх стадіях розвитку рослин, особливо під час кушіння та формування колосу;

Поліпшує якісні показники врожаю (білок, клейковина);

Підвищує якість посівного матеріалу (польова схожість, енергія проростання);

Підвищує стійкість озимої пшениці до вилягання;

Забезпечує швидке відновлення життєдіяльності озимих культур після зимівлі;

Стимулює процеси кушіння та утворення генеративних органів;

Підвищує фотосинтез, збільшуючи площу асиміляційної поверхні листків;

Підвищує імунітет рослин і стійкість до захворювань та несприятливих умов;



КАЛЬЦІЙ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСЛИН КАЛЬЦІЄМ



Zeryva Кальцій — кальцієве добриво з високим вмістом біологічно активного кальцію, збагачене магнієм та іншими компонентами для кращої ефективності. Містить комплекс вітамінів і амінокислот.

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.

СКЛАД:

Кальцій (CaO) – 200 г/л; Магній (MgO) – 60 г/л; Вітамінний комплекс B1, B6, D, H, PP – 0,04 %; Вільні L Амінокислоти 5г/л;

МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: забезпечення рослини Кальцієм

ФОРМА: концентрат суспензії

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.

СУМІСНІСТЬ: препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.

УПАКОВКА: 1л. 5л. 20л.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Зернові (Пшениця, Ячмінь, Жито, Кукурудза)	0.5 - 1	50 - 100 мл.
Технічні (Соняшник, Ріпак, Цукровий буряк)	0.5 - 1	50 - 100 мл.
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	0.5 - 1	50 - 100 мл.
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля ріпчаста, Огірки, Часник, Морква)	2 - 4	200 - 400 мл.
Ягідні (Абрикос, Вишня, Черешня, Персик, Яблуко, Груша, Слива, Суниця, Малина)	2 - 4	200 - 400 мл.
Саді, Виноградники	2 - 4	200 - 400 мл.

ПЕРЕВАГИ

Зміцнює структуру клітинних стінок та мембран, покращує водоутримуючу здатність протоплазми;

Підвищує лежкість та транспортабельність продукції;

Симулює ферментативні й гормональні процеси, активує транспорт ауксинів з точок росту в корені, що покращує розвиток кореневої системи;

Покращує транспорт цукрів та асимілятів;

Стимулює запилення, запліднення та збереження плодів;

Підвищує стійкість до біотичних факторів (шкідників та інфекцій);

Магній сприяє активації фотосинтезу, утворенню вуглеводів та накопиченню аскорбінової кислоти;

Покращує якість і лежкість плодів (до і після збору врожаю);



МАРГАНЕЦЬ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСЛИН МАРГАНЦЕМ



Zeryva Марганець – концентроване мікродобриво, яке містить спеціальну формуляцію марганцю з біологічно активними речовинами, що забезпечують їх високу доступність. Застосовується для підживлення культур, чутливих до нестачі марганцю. Позитивно впливає на кількісні та якісні показники врожаю (вміст білку, клейковини, цукрів)

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.

СКЛАД:

Марганець (Mn) - 180г/л; Азот (N) 40 г/л; Вітамінний комплекс B1, B6, D, H, PP – 0,04 %; Вільні L Амінокислоти 10г/л;

МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: забезпечення рослини Марганцем

ФОРМА: концентрат суспензії

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.

СУМІСНІСТЬ: препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.

УПАКОВКА: 1л. 5л. 20л.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Зернові (Пшениця, Ячмінь, Жито, Кукурудза)	1	100 мл.
Технічні (Соняшник, Ріпак, Цукровий буряк)	1	100 мл.
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	1	100 мл.
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля ріпчаста, Огірки, Часник, Морква)	0.5	50 мл.
Ягідні (Абрикос, Вишня, Черешня, Персик, Яблуко, Груша, Слива, Суниця, Малина)	0.5	50 мл.

ПЕРЕВАГИ

Сприяє швидкому засвоєнню марганцю;

Нормалізує газообмін (дихання) у рослин;

Покращує утворення хлорофілу;

Посилює стійкість рослин до хвороб;

Активізує ферментативну систему;

Підвищує вміст цукру та аскорбінової кислоти.



МІДЬ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСЛИН МІДДЮ



Zeryva Мідь – комплексне мікродобриво з високим вмістом міді, сірки, магнію, марганцю, бору та амінокислот, призначене для профілактики й усунення дефіциту міді. Препарат підтримує фотосинтез, ферментативні процеси, синтез білків і вуглеводів, сприяє формуванню міцних тканин та повноцінному розвитку рослин. Підвищує стійкість культур до температурних перепадів, посухи та інших стресових умов, покращує засвоєння елементів живлення, підтримує

здоровий листковий апарат і допомагає зберегти врожайний потенціал.

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.



СКЛАД: Cu – 110г/л; S – 70г/л; B – 10г/л; Mg – 20г/л; Mn – 30г/л; Zn – 2г/л; Вітамінний комплекс; Амінокислоти;



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: забезпечення рослини Міддю



ФОРМА: концентрат суспензії



УПАКОВКА: 5л., 10л., 20л.



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами, добривами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Зернові та кукурудза (Пшениця, Ячмінь, Жито)	1-2	100-200 мл
Технічні (Соняшник, Ріпак, Цукровий буряк)	1-2	100-200 мл
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	1-2	100-200 мл
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля, Огірки, Часник, Морква)	2-3	200-300 мл
Плодові та ягідні культури: (Абрикос, Вишня, Черешня, Персик, Яблуко, Груша, Слива, Суниця, Малина)	2-3	200-300 мл

ПЕРЕВАГИ

Швидко усуває дефіцит міді;

Підтримує активний фотосинтез;

Покращує синтез білків і вуглеводів;

Зміцнює тканини рослин;

Підвищує стійкість до стресів;

Покращує засвоєння елементів живлення;

Сприяє збереженню врожайного потенціалу.



МОЛІБДЕН+КОБАЛЬТ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСЛИН
МОЛІБДЕН-КОБАЛЬТОМ



Zeryva Молібден+Кобальт - добриво для обробки насіння та позакореневого підживлення бобових та інших культур з високою потребою у молібдені. Спеціально розроблене для покращення азотфіксуючої здатності бульбочкових бактерій.

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.

СКЛАД:



Азот(N) – 20 г/л; Фосфор(P) – 15 г/л; Молібден(Mo) – 70 г/л; Кобальт(Co) – 7 г/л; Вітамінний комплекс B1, B6, D, H, PP – 0,04 %; Вільні L Амінокислоти 10г/л;



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: забезпечення рослини мікроелементами



ФОРМА: концентрат суспензії



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.



УПАКОВКА: 1л. 5л. 20л.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Зернові (Пшениця, Ячмінь, Жито, Кукурудза)	0.3 - 0.5	30 - 50 мл.
Технічні (Соняшник, Ріпак, Цукровий буряк)	0.3 - 0.5	30 - 50 мл.
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	0.3 - 0.5	30 - 50 мл.
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля ріпчаста, Огірки, Часник, Морква)	0.3 - 0.5	30 - 50 мл.
Ягідні (Абрикос, Вишня, Черешня, Персик, Яблуко, Груша, Слива, Суниця, Малина)	0.3 - 0.5	30 - 50 мл.

Обробка насіння: Норма застосування 0,5 - 1,0 л/т насіння зернових, зернобобових, технічних та овочевих культур.

ПЕРЕВАГИ

Максимальна концентрація мікроелементів та низька норма внесення; сумісний з більшістю протруйників насіння та інокулянтів;

Призначене для корекції дефіциту молібдену та кобальту. Особливо Ефективним є застосування добрива на кислих ґрунтах ($\text{pH} < 5,5$) та для обробки бобових культур (соя, горох, люцерна та інші). Покращує життєдіяльність бульбочкових бактерій і процеси азотфіксації;

Молібден (Mo) сприяє метаболізму азоту, перетворенню нітратів в амінокислоти та білки. Впливає на розвиток бульбочок у бобових культур і здатність фіксації атмосферного азоту бульбочковими бактеріями;

Кобальт (Co) необхідний для функціонування азотфіксуючих бактерій та синтезу вітаміну B12, який потрібен для утворення леггемоглобіну та ефективної азотфіксації.



МУЛЬТИМІКС

КОМПЛЕКСНЕ ДОБРИВО



Zeryva Мультимікс — це комплексне добриво для позакореневого підживлення зі 100% хелатованих EDTA мікро- та макроелементів. Це добриво працює як «вітамінний коктейль» для культури, даючи їй усі необхідні мікро- та макроелементи для росту, розвитку і стійкості. Хелатоутворювачі створюють навколо мікроелементів оболонку, яка дозволяє їм проникати крізь поверхню листка всередину рослини та вступати в обмінні процеси. Призначене для позакореневого підживлення рослин протягом усього вегетаційного періоду.

Містить високу концентрацію макро- та мікроелементів, а також комплекс вітамінів та амінокислот.

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.

СКЛАД: Азот(N) - 60 г/л; Фосфор(P) -50 г/л; Калій (K)-70г/л;
Кальцій (Ca) – 20 г/л; Сірка (S) 80 г/л, Магній (Mg) - 14г/л; Цинк (Zn)- 14г/л;
Залізо (Fe) - 4г/л; Мідь (Cu) - 14г/л, Марганець (Mn) - 12г/л; Бор (B)5г/л;
Молібден (Mo) - 0,5г/л; Кобальт (Co) - 0,05г/л; Нікель(Ni) - 0,002г/л;
Вітамінний комплекс B1, B6, D, H, PP – 0,04 %; Вільні L Амінокислоти 5г/л;



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: забезпечення рослини необхідними мікро-макро елементами



ФОРМА: концентрат суспензії



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: Добриво сумісне з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.



УПАКОВКА: 5л., 10л., 20л.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Зернові (Пшениця, Ячмінь, Жито, Кукурудза)	1-2	100-200 мл.
Технічні (Соняшник, Ріпак, Цукровий буряк)	1-2	100-200 мл.
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	1-2	100-200 мл. мл.
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля ріпчаста, Огірки, Часник, Морква)	1-3	100-300 мл.
Ягідні (Абрикос, Вишня, Черешня, Персик, Яблуко, Груша, Слива, Суниця, Малина)	1-3	100-300 мл.
Сади, Виноградники	1-3	

Обробка насіння: Зернові, бобові, технічні культури - рекомендується використовувати «Zeryva Мультимікс» при протруєнні насіння в нормі 2-3 л на 10л води - на одну тонну насіння

ПЕРЕВАГИ

Усуває та запобігає проявам дефіциту макро- і мікроелементів;

Підтримує фотосинтетичну активність та енергію росту;

Стимулює розвиток кореневої системи та генеративних органів;

Сприяє відновленню рослин після стресових умов;

Підвищує ефективність використання елементів живлення;

Покращує кількісні та якісні показники врожаю;

Підвищує фізіологічну стійкість рослин до посухи й температурних коливань.



ТЕХНІЧНІ

КОМПЛЕКСНЕ ДОБРИВО



Zeryva Технічні — комплексне мікродобриво для повноцінного живлення соняшнику, ріпаку, цукрового буряку та інших технічних культур. Збалансоване поєднання макро- і мікроелементів сприяє активному фотосинтезу, розвитку кореневої системи, формуванню міцного листкового апарату та продуктивних органів рослини. Підвищений вміст бору, сірки, марганцю, магнію та цинку підтримує процеси цвітіння, запилення, зав'язування насіння, синтез білків і накопичення олій та цукрів. Амінокислоти, вітаміни, гумінові й фульвові кислоти покращують засвоєння елементів живлення, підвищують стійкість рослин до стресових умов і сприяють реалізації врожайного потенціалу культури.

тів живлення, підвищують стійкість рослин до стресових умов і сприяють реалізації врожайного потенціалу культури.

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.

СКЛАД: N — 22 г/л; P — 14 г/л; K — 11 г/л; Mg — 12 г/л; S — 24 г/л;

B — 25 г/л; Cu — 4 г/л; Fe — 3 г/л; Mn — 18 г/л; Mo — 0,2 г/л;

Zn — 11 г/л; Co — 0,2 г/л.;

Вітамінний комплекс B1, B6, D, H, PP — 0,04 % ;

Амінокислоти; Фульвові кислоти, 4 г/л; Гумінові кислоти 5 г/л



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: забезпечення рослини необхідними мікро-макро елементами



ФОРМА: концентрат суспензії



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами, добривами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.



УПАКОВКА: 5л., 10л., 20л.

НОРМА ВИТРАТИ

Культури	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Соняшник, Ріпак (озимий, ярий), Гірчиця, Льон	1-2	100-200мл
Цукровий буряк	1-2	100-200мл
Інші технічні культури	1-2	100-200мл

ПЕРЕВАГИ

Забезпечує комплексне живлення технічних культур;

Підтримує активний фотосинтез;

Сприяє розвитку кореневої системи;

Покращує цвітіння та запилення;

Підвищує зав'язування насіння і плодів;

Посилює стійкість рослин до стресів;



ЦИНК

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСЛИН ЦИНКОМ



Zeryva Цинк – концентроване добриво для позакореневого підживлення та профілактики дефіциту цинку в сільськогосподарських культурах. Цинк бере участь у роботі ферментативних систем, синтезі ауксинів, білків і хлорофілу, підтримує ріст кореневої системи та формування продуктивних органів рослини.

Азот, фосфор, калій, амінокислоти та вітаміни підтримують обмінні процеси й сприяють швидшому відновленню рослин після

стресових умов. Позакореневе внесення дозволяє оперативно поповнити потребу рослин у цинку в критичні фази росту та розвитку.

XEROPHYTIN® TECHNOLOGY допомагає підтримувати водний баланс, тургор і природну стійкість рослин до посухи, спеки та інших абіотичних стресів.



СКЛАД: Цинк (Zn) – 190 г/л., Азот (N) - 10 г/л., Фосфор (P) - 10 г/л., Калій (K) – 10 г/л. Вітамінний комплекс B1, B6, D, H, PP – 0,04 %; Вільні L Амінокислоти 5г/л;



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: забезпечення рослини Цинком



ФОРМА: концентрат суспензії



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до +25°C.



СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.



УПАКОВКА: 1л. 5л. 20л.

НОРМА ВИТРАТИ

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма л/га для промислового сектору	Норма внесення для приватного сектору на 10 соток
Зернові (Пшениця, Ячмінь, Жито, Кукурудза)	0.5 - 1	50 - 100 мл.
Технічні (Соняшник, Ріпак, Цукровий буряк)	0.5 - 1	50 - 100 мл.
Бобові (Соя, Горох, Люпин)	0.5 - 1	50 - 100 мл.
Овочеві (Картопля, Томати, Капуста, Цибуля ріпчаста, Огірки, Часник, Морква)	0.5 - 1	50 - 100 мл.
Ягідні (Абрикос, Вишня, Черешня, Персик, Яблуко, Груша, Слива, Суниця, Малина)	0.5 - 1	50 - 100 мл.
Сади, Виноградники	0.5 - 1	50 - 100 мл.

ПЕРЕВАГИ

Швидко усуває та запобігає проявам дефіциту цинку;

Бере участь у роботі ферментативних систем рослини;

Підтримує синтез хлорофілу, білків та ауксинів;

Сприяє розвитку кореневої системи;

Підтримує формування генеративних органів;

Активізує ріст і обмінні процеси;

Підвищує фізіологічну стійкість рослин до стресових умов;

Сприяє реалізації потенціалу врожайності та якості продукції.



ПРИЛИПАЧІ (ПАР)





ЛІПРОТЕНС

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА РЕЧОВИНА (ПАР)



ЛіпроТенс — прилипач (ПАР), який забезпечує зменшення водовідштовхувальних властивостей поверхні бур'янів, покривів комах-фітофагів та грибів-патогенів, що підвищує контакт засобів захисту рослин зі шкідливими об'єктами. Покращує змочування надземних частин рослин (особливо тих, які мають потужний восковий наліт чи надмірне опушення), посилює утримання робочого розчину пестицидів, сприяє швидшому і повнішому проникненню діючих речовин. Забезпечує стійкість до змивання опадами, сильною росою та зменшення втрат внаслідок випаровування і розкладу через фотодеградацію. Застосовується з ґрунтовими препаратами з метою фіксації їх у верхньому шарі ґрунту, що припиняє подальше їхнє вимивання в нижні шари.

Склад:

Суміш етоксилатів 170г/л, Нонилфенол-пропіловий ефір, 40 г/л, полісахариди 40 г/л

МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ: підвищення ефективності ЗЗР, Добрив, Деструкторів і інших препаратів

ФОРМА: концентрат суспензії

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 48 місяців (4 роки) за температури зберігання від +2 до

СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з інсектицидами, гербіцидами, біопрепаратами, добривами та хімічними фунгіцидами. Перед змішуванням компонентів доцільно провести попереднє тестування на сумісність.

УПАКОВКА: 1л. 5л.

НОРМА ВИТРАТИ

	Промисловий Сектор л/га	Приватний сектор на 10 соток
Норма л/га при позакореновому фоліар- ному застосуванні	0,1л на 100л води але не менше 0,2л/га	10 мл на 10л води але не менше 20 мл
Норма л/га при застосуванні з ґрунтовими препаратами	0,3 - 0,6л/га	30-60 мл

ПЕРЕВАГИ

Зменшує показник жорсткості (ЕС води - вміст розчинених у воді солей);

Покращує розчинність в холодній воді;

Зменшує стікання робочого розчину з поверхні листків утримуючи робочий розчин;

Сприяє кращому прилипанню засобів захисту рослин та добрив;

Підвищує ефективність пестицидної дії;

Прискорює та посилює ефект препаратів, з якими застосовується;

Збільшена проникаюча здатність;

Фіксація препаратів у верхніх шарах ґрунту;



Кіровоградська обл, ПАП Козацький Шлях, Муляр В.С.

«Ми давно шукали якісний ПАР для наших полів. Коли спробували Ліпротенс то помітили одразу що при ґрунтовому внесенні препарат ідеально зафіксував екран без вимивання. При листовому внесенні крапля миттєво розтікається і має сильну проникаючу здатність, що суттєво покращує роботу пестицидів, забезпечуючи їхнє швидке потрапляння всередину рослини без втрат».

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ

Команда **Zeryva** — це поєднання досвіду агрономів, науковців та практиків, які щодня працюють над створенням **ефективних технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур**. Ми враховуємо не лише загальні агротехнічні вимоги, а й особливості кожного поля, кліматичні умови та специфіку ґрунтів.

Наш підхід базується на:

- **Комплексному аналізі** ґрунту та підборі добрив для оптимального живлення.
- **Використанні біопрепаратів** і сучасних рішень для стимуляції росту та підвищення стійкості рослин до стресів.
- **Індивідуальному підході** до кожного господарства з урахуванням його цілей і ресурсів.
- **Поєднанні класичних технологій і новітніх біологічних засобів**, що дозволяє отримувати максимальний урожай без шкоди для довкілля.

Кожна технологічна карта — це результат **роботи нашої команди**, яка включає аналіз, тестування, польові дослідження та практичний досвід. Саме тому вони є не просто схемою, **а надійною інструкцією для отримання стабільного врожаю**.

З нами аграрії отримують:

- Впевненість у правильності агротехнічних рішень.
- Зниження виробничих ризиків.
- Зростання прибутковості господарства.

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ДЛЯ БОБОВИХ КУЛЬТУР

Ризостарт 2 кг. л/тонну

+

Ризофос 50грамм/га;

Ризогумат 1л/тонну

+

Zeryva MoCo 0.5л/тонну;

Віолон 1л/тонну


- ІНОКУЛЯНТИ
ПРОТРУЙНИКИ
- ФИТОПРОТЕКТОРИ
- СТИМУЛЯТОРИ,
АНТИСТРЕСАНТИ
- МІКРО, МОНО
ДОБРИВА
- ПРИЛИПАЧІ (ПАР)

ЛіпроТенс 0.2л/га

Zeryva MoCo - 0.3л/га Бобові 1л/га Zeryva B+Mo 1л/га

Ризогумат 0.5л/га Віолон 0.5/га Ксерула 2л/га Віасил 2л/га

Фунгіблок 0.5л/га Арія 0.5л/га



Посів

Сходи

1 трійчастий
листок

2-3 трійчастий
листок

Початок
цвітіння

Формування
бобів

Повний
стручок

Початок дозрівання
(побуріння стручків)

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ДЛЯ РІПАКУ

- ІНОКУЛЯНТИ
ПРОТРУЙНИКИ
- ФІТОПРОТЕКТОРИ
- СТИМУЛЯТОРИ,
АНТИСТРЕСАНТИ
- МІКРО, МОНО
ДОБРИВА
- ПРИЛИПАЧІ (ПАР)

ЛіпроТенс 0.2л/га

Мультимікс 1л/га Zeryva B+Mo 1л/га Zeryva Mn - 0.5л/га

Ризогумат 0.5л/га Біолон 0.5/га Ксерула 2л/га Віасил 2л/га

Фунгіблок 0.5л/га Арія 0.5л/га

Ризофос 50грамм/га;

Біолон 1л/тонну;

Ризогумат 1л/тонну;

0 0 0



Посів

Сходи

Утворення листя

Стеблування

Бутонізація

Цвітіння

Побуріння
стручків

Дозрівання

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ДЛЯ КУКУРУДЗИ

- ІНОКУЛЯНТИ
ПРОТРУЙНИКИ
- ФІТОПРОТЕКТОРИ
- СТИМУЛЯТОРИ,
АНТИСТРЕСАНТИ
- МІКРО, МОНО
ДОБРИВА
- ПРИЛИПАЧІ (ПАР)

Ризофос 50грамм/га;

Віолон 1л/тонну;

Ризогумат 1л/тонну;

ЛіпроТенс 0.2л/га

Мультимікс 1л/га Zeryva Цинк 1л/га

Ризогумат 0.5л/га Віолон 0.5/га Ксерула 2л/га Віасил 2л/га

Фунгіблок 0.5л/га Арія 0.5л/га



Посів

1-2
листки

3-5
листіків

6-8
листіків

до 10-ти
листіків

Поява
молоті

Молочна
стиглість

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ДЛЯ СОНЯШНИКА

- ІНОКУЛЯНТИ
ПРОТРУЙНИКИ
- ФІТОПРОТЕКТОРИ
- СТИМУЛЯТОРИ,
АНТИСТРЕСАНТИ
- МІКРО, МОНО
ДОБРИВА
- ПРИЛИПАЧІ (ПАР)

ЛіпроТенс 0.2л/га

Zeryva Мультимікс 1л/га Zeryva В+Мо 1л/га

Ризогумат 0.5л/га Біолон 0.5л/га Ксерула 2л/га Віасил 2л/га

Фунгіблок 0.5л/га Арія 0.5л/га

Ризофос 50грамм/га;
Ризогумат 1л/тонну;
Біолон 1л/тонну;



Посів

2-3 пари листків

Формування кошика

Цвітіння

Налив насіння

Дозрівання

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ДЛЯ ЗЕРНОВИХ

- ІНОКУЛЯНТИ
ПРОТРУЙНИКИ
- ФІТОПРОТЕКТОРИ
- СТИМУЛЯТОРИ,
АНТИСТРЕСАНТИ
- МІКРО, МОНО
ДОБРИВА
- ПРИЛИПАЧІ (ПАР)

ЛіпроТенс 0.2л/га

Zeryva Цинк 1л/га Zeryva Зернові 1л/га

Ризогумат 0.5л/га Віолон 0.5л/га Ксерула 2л/га Віасил 2л/га

Фунгіблок 0.5л/га Арія 0.5л/га

Ризофос 100грамм/га;

Віолон 1л/тонну;

Ризогумат 1л/тонну;



Проростання

Кушення

Вихід в трубку

Колосіння

Дозрівання



ТОВ ЗЕРИВА
Рівненський р-н,
с. Велика Омеляна,
вул. Шевченка, 35
т. +380991885637