

Исчисление предикатов

Категорические силлогизмы

- ▶ Силлогизм — «подытоживание, подсчёт, умозаключение»
- ▶ Категорический — потому, что речь идёт о категориях (в философском смысле).
- ▶ Определяем некоторые стандартные мыслительные блоки, с которыми у образованной аудитории есть навык работы. Цель — сделать неформальный человеческий язык чуть более формальным. Где важно: научный трактат, диспут, для исключения ошибок в рассуждениях.
- ▶ Язык рассуждений понимается единым, без разделения на язык исследователя и предметный.
- ▶ Пример категорического силлогизма:

Каждый человек смертен	Сократ есть человек
<hr/>	
Сократ смертен	

- ▶ Восходят к Аристотелю и Теофрасту, активно развивались в средневековье.

Категорический силлогизм: вспомогательные определения

Категорический силлогизм соединяет три термина:

предикат (больший термин, P)

субъект (меньший термин, S)

средний термин (M).

На основании соотношений P и M, а также M и S строим соотношение P и S.

Возможные соотношения:

A Affirmato (общеутвердительное)

I affirmato (частноутвердительное)

E nEgo (общеотрицательное)

O negO (частноотрицательное)

Матан есть раздел математики (SaP)

Некоторые разделы математики сложны (SiP)

Никакой человек не знает всю математику

Некоторые разделы математики — не матан

Фигуры и модусы

Фигура 1 Фигура 2 Фигура 3 Фигура 4



Большая посылка:	M—P	P—M	M—P	P—M
Меньшая посылка:	S—M	S—M	M—S	M—S
Заключение:	S—P	S—P	S—P	S—P

Расстановка соотношений вместо «—» в фигуре — модус. Например, тут — фигура 1, ааа.

Каждый человек смертен	Сократ есть человек
<hr/>	
Сократ смертен	

Как этим пользоваться: по умозаключению на (русском) языке определяем, где в нём P, M, S и каковы между ними соотношения, находим соответствующую фигуру и модус, а дальше определяем силлогизм и его свойства в соответствии со следующими правилами.

Правильные модусы

Не все модусы осмысленны, большинство некорректно. Например фигура 1, аае:

Каждый человек смертен	Сократ есть человек
<hr/>	
Сократ не есть смертен	

Список всех правильных модусов (из них выделяют *слабые*, выводящие частное соотношение при возможности общего — указаны курсивом):

Фигура 1	Фигура 2	Фигура 3	Фигура 4
Barbara	Cesare	Darapti	Bramantip
Celarent	Camestres	Disamis	Camenes
Darii	Festino	Datisi	Dimaris
Ferio	Baroco	Felapton	Fesapo
<i>Barbari</i>	<i>Cesaro</i>	Bocardo	Fresison
<i>Celaront</i>	<i>Camestros</i>	Ferison	<i>Camenos</i>

Некоторые модусы требуют непустоты М: это все слабые модусы и четыре сильных (указаны серым), например Darapti:

Все единороги имеют рог	Все единороги суть лошади
<hr/>	
Некоторые лошади имеют рог	

Ограничения языка исчисления высказываний

Каждый человек смертен	Сократ есть человек
<hr/>	
Сократ смертен	

Ограничения языка исчисления высказываний

<u>Каждый человек смертен</u>	<u>Сократ есть человек</u>
Сократ смертен	

Цель: увеличить формализованную часть метаязыка.

Ограничения языка исчисления высказываний

Каждый человек смертен	Сократ есть человек
<hr/>	
Сократ смертен	

Цель: увеличить формализованную часть метаязыка.

Мы неформально знакомы с **предикатами** ($P : D \rightarrow V$) и **кванторами** ($\forall x. H(x) \rightarrow S(x)$).

$\forall x. H(x) \rightarrow S(x)$	$H(\text{Сократ})$
<hr/>	
$S(\text{Сократ})$	

Начнём с примера

$$\forall x. \sin x = 0 \vee (\sin x)^2 + 1 > 1$$

Начнём с примера

$$\forall x. \sin x = 0 \vee (\sin x)^2 + 1 > 1$$

1. Предметные (здесь: числовые) выражения

1.1 Предметные переменные (x).

Начнём с примера

$$\forall x. \sin x = 0 \vee (\sin x)^2 + 1 > 1$$

1. Предметные (здесь: числовые) выражения
 - 1.1 Предметные переменные (x).
 - 1.2 Одно- и двухместные функциональные символы «синус», «возведение в квадрат» и «сложение».

Начнём с примера

$$\forall x. \sin x = 0 \vee (\sin x)^2 + 1 > 1$$

1. Предметные (здесь: числовые) выражения
 - 1.1 Предметные переменные (x).
 - 1.2 Одно- и двухместные функциональные символы «синус», «возведение в квадрат» и «сложение».
 - 1.3 Нульместные функциональные символы «ноль» (0) и «один» (1).

Начнём с примера

$$\forall x. \sin x = 0 \vee (\sin x)^2 + 1 > 1$$

1. Предметные (здесь: числовые) выражения

1.1 Предметные переменные (x).

1.2 Одно- и двухместные функциональные символы «синус», «возведение в квадрат» и «сложение».

1.3 Нульместные функциональные символы «ноль» (0) и «один» (1).

2. Логические выражения

2.1 Предикатные символы «равно» и «больше»

Язык исчисления предикатов

1. Два типа: предметные и логические выражения.

Язык исчисления предикатов

1. Два типа: предметные и логические выражения.
2. Предметные выражения: метAPEReменная θ .

Язык исчисления предикатов

1. Два типа: предметные и логические выражения.
2. Предметные выражения: метапеременная θ .
 - ▶ Предметные переменные: a, b, c, \dots , метапеременные x, y .

Язык исчисления предикатов

1. Два типа: предметные и логические выражения.
2. Предметные выражения: метAPEReменная θ .
 - ▶ Предметные переменные: a, b, c, \dots , метAPEReменные x, y .
 - ▶ Функциональные выражения: $f(\theta_1, \dots, \theta_n)$, метAPEReменные f, g, \dots

Язык исчисления предикатов

1. Два типа: предметные и логические выражения.
2. Предметные выражения: метAPEReменная θ .
 - ▶ Предметные переменные: a, b, c, \dots , метAPEReменные x, y .
 - ▶ Функциональные выражения: $f(\theta_1, \dots, \theta_n)$, метAPEReменные f, g, \dots
 - ▶ Примеры: $r, q(p(x, s), r)$.

Язык исчисления предикатов

1. Два типа: предметные и логические выражения.
2. Предметные выражения: метAPEReменная θ .
 - ▶ Предметные переменные: a, b, c, \dots , метAPEReменные x, y .
 - ▶ Функциональные выражения: $f(\theta_1, \dots, \theta_n)$, метAPEReменные f, g, \dots
 - ▶ Примеры: $r, q(p(x, s), r)$.
3. Логические выражения: метAPEReменные $\alpha, \beta, \gamma, \dots$
 - ▶ Предикатные выражения: $P(\theta_1, \dots, \theta_n)$, метAPEReменная P .

Язык исчисления предикатов

1. Два типа: предметные и логические выражения.
2. Предметные выражения: метAPERменная θ .
 - ▶ Предметные переменные: a, b, c, \dots , метAPERменные x, y .
 - ▶ Функциональные выражения: $f(\theta_1, \dots, \theta_n)$, метAPERменные f, g, \dots
 - ▶ Примеры: $r, q(p(x, s), r)$.
3. Логические выражения: метAPERменные $\alpha, \beta, \gamma, \dots$
 - ▶ Предикатные выражения: $P(\theta_1, \dots, \theta_n)$, метAPERменная P .
Имена: A, B, C, \dots

Язык исчисления предикатов

1. Два типа: предметные и логические выражения.
2. Предметные выражения: метAPEReменная θ .
 - ▶ Предметные переменные: a, b, c, \dots , метAPEReменные x, y .
 - ▶ Функциональные выражения: $f(\theta_1, \dots, \theta_n)$, метAPEReменные f, g, \dots
 - ▶ Примеры: $r, q(p(x, s), r)$.
3. Логические выражения: метAPEReменные $\alpha, \beta, \gamma, \dots$.
 - ▶ Предикатные выражения: $P(\theta_1, \dots, \theta_n)$, метAPEReменная P .
Имена: A, B, C, \dots
 - ▶ Связки: $(\varphi \vee \psi), (\varphi \& \psi), (\varphi \rightarrow \psi), (\neg \varphi)$.

Язык исчисления предикатов

1. Два типа: предметные и логические выражения.
2. Предметные выражения: метAPERменная θ .
 - ▶ Предметные переменные: a, b, c, \dots , метAPERменные x, y .
 - ▶ Функциональные выражения: $f(\theta_1, \dots, \theta_n)$, метAPERменные f, g, \dots
 - ▶ Примеры: $r, q(p(x, s), r)$.
3. Логические выражения: метAPERменные $\alpha, \beta, \gamma, \dots$.
 - ▶ Предикатные выражения: $P(\theta_1, \dots, \theta_n)$, метAPERменная P .
Имена: A, B, C, \dots
 - ▶ Связки: $(\varphi \vee \psi), (\varphi \& \psi), (\varphi \rightarrow \psi), (\neg \varphi)$.
 - ▶ Кванторы: $(\forall x. \varphi)$ и $(\exists x. \varphi)$.

Сокращения записи, метаязык

1. Метаварьиные:

- ▶ ψ, ϕ, π, \dots — формулы
- ▶ P, Q, \dots — предикатные символы
- ▶ θ, \dots — термы
- ▶ f, g, \dots — функциональные символы
- ▶ x, y, \dots — предметные переменные

Сокращения записи, метаязык

1. Метаварьиные:

- ▶ ψ, ϕ, π, \dots — формулы
- ▶ P, Q, \dots — предикатные символы
- ▶ θ, \dots — термы
- ▶ f, g, \dots — функциональные символы
- ▶ x, y, \dots — предметные переменные

2. Скобки — как в И.В.; квантор — жадный:

$$\underbrace{(\forall a. A \vee B \vee C \rightarrow \underbrace{\exists b. D \& \neg E}_{\exists b \dots}) \& F}_{\forall a \dots}$$

Сокращения записи, метаязык

1. Метаварьиные:

- ▶ ψ, ϕ, π, \dots — формулы
- ▶ P, Q, \dots — предикатные символы
- ▶ θ, \dots — термы
- ▶ f, g, \dots — функциональные символы
- ▶ x, y, \dots — предметные переменные

2. Скобки — как в И.В.; квантор — жадный:

$$\underbrace{(\forall a. A \vee B \vee C \rightarrow \underbrace{\exists b. D \& \neg E}_{\exists b \dots}) \& F}_{\forall a \dots}$$

3. Дополнительные обозначения при необходимости:

- ▶ $(\theta_1 = \theta_2)$ вместо $E(\theta_1, \theta_2)$
- ▶ $(\theta_1 + \theta_2)$ вместо $p(\theta_1, \theta_2)$
- ▶ 0 вместо z
- ▶ \dots

Теория моделей: два типа значений

Напомним формулу:

$$\forall x. \sin x = 0 \vee (\sin x)^2 + 1 > 1$$

Без синтаксического сахара:

$$\forall x. E(s(x), z) \vee G(p(q(s(x))), o), o)$$

Теория моделей: два типа значений

Напомним формулу:

$$\forall x. \sin x = 0 \vee (\sin x)^2 + 1 > 1$$

Без синтаксического сахара:

$$\forall x. E(s(x), z) \vee G(p(q(s(x)), o), o)$$

1. Истинностные (логические) значения:

- 1.1 предикаты (в том числе пропозициональные переменные = нульместные предикаты);

Теория моделей: два типа значений

Напомним формулу:

$$\forall x. \sin x = 0 \vee (\sin x)^2 + 1 > 1$$

Без синтаксического сахара:

$$\forall x. E(s(x), z) \vee G(p(q(s(x)), o), o)$$

1. Истинностные (логические) значения:

- 1.1 предикаты (в том числе пропозициональные переменные = нульместные предикаты);
- 1.2 логические связки и кванторы.

Теория моделей: два типа значений

Напомним формулу:

$$\forall x. \sin x = 0 \vee (\sin x)^2 + 1 > 1$$

Без синтаксического сахара:

$$\forall x. E(s(x), z) \vee G(p(q(s(x)), o), o)$$

1. Истинностные (логические) значения:

- 1.1 предикаты (в том числе пропозициональные переменные = нульместные предикаты);
- 1.2 логические связки и кванторы.

2. Предметные значения:

- 2.1 предметные переменные;

Теория моделей: два типа значений

Напомним формулу:

$$\forall x. \sin x = 0 \vee (\sin x)^2 + 1 > 1$$

Без синтаксического сахара:

$$\forall x. E(s(x), z) \vee G(p(q(s(x)), o), o)$$

1. Истинностные (логические) значения:

- 1.1 предикаты (в том числе пропозициональные переменные = нульместные предикаты);
- 1.2 логические связки и кванторы.

2. Предметные значения:

- 2.1 предметные переменные;
- 2.2 функциональные символы (в том числе константы = нульместные функциональные символы)

Оценка исчисления предикатов

Определение

Оценка — упорядоченная четвёрка $\langle D, F, P, E \rangle$, где:

Оценка исчисления предикатов

Определение

Оценка — упорядоченная четвёрка $\langle D, F, P, E \rangle$, где:

1. $D \neq \emptyset$ — предметное множество;

Оценка исчисления предикатов

Определение

Оценка — упорядоченная четвёрка $\langle D, F, P, E \rangle$, где:

1. $D \neq \emptyset$ — предметное множество;
2. F — оценка для функциональных символов; пусть f_n — n -местный функциональный символ:

$$F_{f_n} : D^n \rightarrow D$$

Оценка исчисления предикатов

Определение

Оценка — упорядоченная четвёрка $\langle D, F, P, E \rangle$, где:

1. $D \neq \emptyset$ — предметное множество;
2. F — оценка для функциональных символов; пусть f_n — n -местный функциональный символ:

$$F_{f_n} : D^n \rightarrow D$$

3. P — оценка для предикатных символов; пусть T_n — n -местный предикатный символ:

$$P_{T_n} : D^n \rightarrow V$$

Оценка исчисления предикатов

Определение

Оценка — упорядоченная четвёрка $\langle D, F, P, E \rangle$, где:

1. $D \neq \emptyset$ — предметное множество;
2. F — оценка для функциональных символов; пусть f_n — n -местный функциональный символ:

$$F_{f_n} : D^n \rightarrow D$$

3. P — оценка для предикатных символов; пусть T_n — n -местный предикатный символ:

$$P_{T_n} : D^n \rightarrow V \quad V = \{И, Л\}$$

Оценка исчисления предикатов

Определение

Оценка — упорядоченная четвёрка $\langle D, F, P, E \rangle$, где:

1. $D \neq \emptyset$ — предметное множество;
2. F — оценка для функциональных символов; пусть f_n — n -местный функциональный символ:

$$F_{f_n} : D^n \rightarrow D$$

3. P — оценка для предикатных символов; пусть T_n — n -местный предикатный символ:

$$P_{T_n} : D^n \rightarrow V \quad V = \{И, Л\}$$

4. E — оценка для предметных переменных.

$$E(x) \in D$$

Оценка формулы

Запись и сокращения записи подобны исчислению высказываний:

$$\llbracket \phi \rrbracket \in V, \quad \llbracket Q(x, f(x)) \vee R \rrbracket^{x:=1, f(t):=t^2, R:=\mathbb{I}} = \mathbb{I}$$

Оценка формулы

Запись и сокращения записи подобны исчислению высказываний:

$$\llbracket \phi \rrbracket \in V, \quad \llbracket Q(x, f(x)) \vee R \rrbracket^{x:=1, f(t):=t^2, R:=I} = I$$

1. Правила для связок \vee , $\&$, \neg , \rightarrow остаются прежние;

Оценка формулы

Запись и сокращения записи подобны исчислению высказываний:

$$\llbracket \phi \rrbracket \in V, \quad \llbracket Q(x, f(x)) \vee R \rrbracket^{x:=1, f(t):=t^2, R:=I} = I$$

1. Правила для связок \vee , $\&$, \neg , \rightarrow остаются прежние;
2. $\llbracket f_n(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) \rrbracket = F_{f_n}(\llbracket \theta_1 \rrbracket, \llbracket \theta_2 \rrbracket, \dots, \llbracket \theta_n \rrbracket)$

Оценка формулы

Запись и сокращения записи подобны исчислению высказываний:

$$\llbracket \phi \rrbracket \in V, \quad \llbracket Q(x, f(x)) \vee R \rrbracket^{x:=1, f(t):=t^2, R:=I} = I$$

1. Правила для связок \vee , $\&$, \neg , \rightarrow остаются прежние;
2. $\llbracket f_n(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) \rrbracket = F_{f_n}(\llbracket \theta_1 \rrbracket, \llbracket \theta_2 \rrbracket, \dots, \llbracket \theta_n \rrbracket)$
3. $\llbracket P_n(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) \rrbracket = P_{T_n}(\llbracket \theta_1 \rrbracket, \llbracket \theta_2 \rrbracket, \dots, \llbracket \theta_n \rrbracket)$

Оценка формулы

Запись и сокращения записи подобны исчислению высказываний:

$$\llbracket \phi \rrbracket \in V, \quad \llbracket Q(x, f(x)) \vee R \rrbracket^{x:=1, f(t):=t^2, R:=I} = I$$

1. Правила для связок \vee , $\&$, \neg , \rightarrow остаются прежние;
2. $\llbracket f_n(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) \rrbracket = F_{f_n}(\llbracket \theta_1 \rrbracket, \llbracket \theta_2 \rrbracket, \dots, \llbracket \theta_n \rrbracket)$
3. $\llbracket P_n(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) \rrbracket = P_{T_n}(\llbracket \theta_1 \rrbracket, \llbracket \theta_2 \rrbracket, \dots, \llbracket \theta_n \rrbracket)$
- 4.

$$\llbracket \forall x. \phi \rrbracket = \begin{cases} I, & \text{если } \llbracket \phi \rrbracket^{x:=t} = I \text{ при всех } t \in D \\ L, & \text{если найдётся } t \in D, \text{ что } \llbracket \phi \rrbracket^{x:=t} = L \end{cases}$$

Оценка формулы

Запись и сокращения записи подобны исчислению высказываний:

$$\llbracket \phi \rrbracket \in V, \quad \llbracket Q(x, f(x)) \vee R \rrbracket^{x:=1, f(t):=t^2, R:=I} = I$$

1. Правила для связок \vee , $\&$, \neg , \rightarrow остаются прежние;

2. $\llbracket f_n(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) \rrbracket = F_{f_n}(\llbracket \theta_1 \rrbracket, \llbracket \theta_2 \rrbracket, \dots, \llbracket \theta_n \rrbracket)$

3. $\llbracket P_n(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) \rrbracket = P_{T_n}(\llbracket \theta_1 \rrbracket, \llbracket \theta_2 \rrbracket, \dots, \llbracket \theta_n \rrbracket)$

4.

$$\llbracket \forall x. \phi \rrbracket = \begin{cases} I, & \text{если } \llbracket \phi \rrbracket^{x:=t} = I \text{ при всех } t \in D \\ L, & \text{если найдётся } t \in D, \text{ что } \llbracket \phi \rrbracket^{x:=t} = L \end{cases}$$

5.

$$\llbracket \exists x. \phi \rrbracket = \begin{cases} I, & \text{если найдётся } t \in D, \text{ что } \llbracket \phi \rrbracket^{x:=t} = I \\ L, & \text{если } \llbracket \phi \rrbracket^{x:=t} = L \text{ при всех } t \in D \end{cases}$$

Пример (очевидная интерпретация)

Оценим:

$$\llbracket \forall a. \exists b. \neg a + 1 = b \rrbracket$$

Пример (очевидная интерпретация)

Оценим:

$$\llbracket \forall a. \exists b. \neg a + 1 = b \rrbracket$$

Зададим оценку:

- ▶ $D := \mathbb{N}$;
- ▶ $F_1 := 1$, $F_{(+)}$ — сложение в \mathbb{N} ;
- ▶ $P_{(=)}$ — равенство в \mathbb{N} .

Пример (очевидная интерпретация)

Оценим:

$$\llbracket \forall a. \exists b. \neg a + 1 = b \rrbracket$$

Зададим оценку:

- ▶ $D := \mathbb{N}$;
- ▶ $F_1 := 1$, $F_{(+)}$ — сложение в \mathbb{N} ;
- ▶ $P_{(=)}$ — равенство в \mathbb{N} .

Фиксируем $a \in \mathbb{N}$. Тогда:

$$\llbracket a + 1 = b \rrbracket^{b:=a} = \perp$$

Пример (очевидная интерпретация)

Оценим:

$$\llbracket \forall a. \exists b. \neg a + 1 = b \rrbracket$$

Зададим оценку:

- ▶ $D := \mathbb{N}$;
- ▶ $F_1 := 1$, $F_{(+)}$ — сложение в \mathbb{N} ;
- ▶ $P_{(=)}$ — равенство в \mathbb{N} .

Фиксируем $a \in \mathbb{N}$. Тогда:

$$\llbracket a + 1 = b \rrbracket^{b:=a} = \perp$$

поэтому при любом $a \in \mathbb{N}$:

$$\llbracket \exists b. \neg a + 1 = b \rrbracket = \top$$

Пример (очевидная интерпретация)

Оценим:

$$\llbracket \forall a. \exists b. \neg a + 1 = b \rrbracket$$

Зададим оценку:

- ▶ $D := \mathbb{N}$;
- ▶ $F_1 := 1$, $F_{(+)}$ — сложение в \mathbb{N} ;
- ▶ $P_{(=)}$ — равенство в \mathbb{N} .

Фиксируем $a \in \mathbb{N}$. Тогда:

$$\llbracket a + 1 = b \rrbracket^{b:=a} = \perp$$

поэтому при любом $a \in \mathbb{N}$:

$$\llbracket \exists b. \neg a + 1 = b \rrbracket = \top$$

Итого:

$$\llbracket \forall a. \exists b. \neg a + 1 = b \rrbracket = \top$$

Пример (странная интерпретация)

$$\llbracket \forall a. \exists b. \neg a + 1 = b \rrbracket$$

Пример (странная интерпретация)

$$\llbracket \forall a. \exists b. \neg a + 1 = b \rrbracket$$

Зададим интерпретацию:

- ▶ $D := \{\square\}$;
- ▶ $F_{(1)} := \square$, $F_{(+)}(a, b) := \square$;
- ▶ $P_{(=)}(a, b) := \text{И}$.

Пример (странная интерпретация)

$$\llbracket \forall a. \exists b. \neg a + 1 = b \rrbracket$$

Зададим интерпретацию:

- ▶ $D := \{\square\};$
- ▶ $F_{(1)} := \square, F_{(+)}(a, b) := \square;$
- ▶ $P_{(=)}(a, b) := \text{И}.$

Тогда:

$$\llbracket a + 1 = b \rrbracket^{a:=\square, b:=\square} = \text{И}$$

Пример (странная интерпретация)

$$\llbracket \forall a. \exists b. \neg a + 1 = b \rrbracket$$

Зададим интерпретацию:

- ▶ $D := \{\square\}$;
- ▶ $F_{(1)} := \square$, $F_{(+)}(a, b) := \square$;
- ▶ $P_{(=)}(a, b) := \perp$.

Тогда:

$$\llbracket a + 1 = b \rrbracket^{a \in D, b \in D} = \perp$$

Пример (странная интерпретация)

$$\llbracket \forall a. \exists b. \neg a + 1 = b \rrbracket$$

Зададим интерпретацию:

- ▶ $D := \{\square\};$
- ▶ $F_{(1)} := \square, F_{(+)}(a, b) := \square;$
- ▶ $P_{(=)}(a, b) := \text{И}.$

Тогда:

$$\llbracket a + 1 = b \rrbracket^{a \in D, b \in D} = \text{И}$$

Итого:

$$\llbracket \forall a. \exists b. \neg a + 1 = b \rrbracket = \text{Л}$$

Общезначимость

Определение

Формула исчисления предикатов общезначима, если истинна при любой оценке:

$$\models \phi$$

Общезначимость

Определение

Формула исчисления предикатов общезначима, если истинна при любой оценке:

$$\models \phi$$

То есть истинна при любых D , F , P и E .

Пример: общезначимая формула

Теорема

$$\llbracket \forall x. Q(f(x)) \vee \neg Q(f(x)) \rrbracket = \text{И}$$

Доказательство.

Фиксируем D, F, P, E .

Пример: общезначимая формула

Теорема

$$\llbracket \forall x. Q(f(x)) \vee \neg Q(f(x)) \rrbracket = \text{И}$$

Доказательство.

Фиксируем D, F, P, E . Пусть $x \in D$.

Пример: общезначимая формула

Теорема

$$\llbracket \forall x. Q(f(x)) \vee \neg Q(f(x)) \rrbracket = \text{И}$$

Доказательство.

Фиксируем D, F, P, E . Пусть $x \in D$. Обозначим $P_Q(F_f(E_x))$ за t .

Пример: общезначимая формула

Теорема

$$\llbracket \forall x. Q(f(x)) \vee \neg Q(f(x)) \rrbracket = \text{И}$$

Доказательство.

Фиксируем D, F, P, E . Пусть $x \in D$. Обозначим $P_Q(F_f(E_x))$ за t . Ясно, что $t \in V$. Разберём случаи.

- ▶ Если $t = \text{И}$, то $\llbracket Q(f(x)) \rrbracket^{Q(f(x)):=t} = \text{И}$, потому
 $\llbracket Q(f(x)) \vee \neg Q(f(x)) \rrbracket^{Q(f(x)):=t} = \text{И}$
- ▶ Если $t = \text{Л}$, то $\llbracket \neg Q(f(x)) \rrbracket^{Q(f(x)):=t} = \text{И}$, потому всё равно
 $\llbracket Q(f(x)) \vee \neg Q(f(x)) \rrbracket^{Q(f(x)):=t} = \text{И}$



Свободные вхождения

Определение

Вхождение подформулы в формулу — это позиция первого символа этой подформулы в формуле.

Вхождения x в формулу: $(\forall x.A(x) \vee \exists x.B(x)) \vee C(x)$

Определение

Рассмотрим формулу $\forall x.\psi$ (или $\exists x.\psi$). Здесь переменная x связана в ψ . Все вхождения переменной x в ψ — связанные.

Определение

Вхождение x в ψ свободное, если не находится в области действия никакого квантора по x . Переменная входит свободно в ψ , если имеет хотя бы одно свободное вхождение. $FV(\psi), FV(\Gamma)$ — множества свободных переменных в ψ , в Γ

Пример

$\exists y.(\forall x.P(x)) \vee P(x) \vee Q(y)$

Подстановка, свобода для подстановки

$$\psi[x := \theta] := \begin{cases} \psi, & \psi \equiv y, y \not\equiv x \\ \psi, & \psi \equiv \forall x.\pi \text{ или } \psi \equiv \exists x.\pi \\ \pi[x := \theta] \star \rho[x := \theta], & \psi \equiv \pi \star \rho \\ \theta, & \psi \equiv x \\ \forall y.\pi[x := \theta], & \psi \equiv \forall y.\pi \text{ и } y \not\equiv x \\ \exists y.\pi[x := \theta], & \psi \equiv \exists y.\pi \text{ и } y \not\equiv x \end{cases}$$

Определение

Терм θ свободен для подстановки вместо x в ψ ($\psi[x := \theta]$), если ни одно свободное вхождение переменных в θ не станет связанным после подстановки.

Свобода есть	Свободы нет
$(\forall x.P(y))[y := z]$	$(\forall x.P(y))[y := x]$
$(\forall y.\forall x.P(x))[x := y]$	$(\forall y.\forall x.P(t))[t := y]$

Теория доказательств

Рассмотрим язык исчисления предикатов. Возьмём все схемы аксиом классического исчисления высказываний и добавим ещё две схемы аксиом (здесь везде θ свободен для подстановки вместо x в φ):

$$11. \quad (\forall x.\varphi) \rightarrow \varphi[x := \theta]$$

$$12. \quad \varphi[x := \theta] \rightarrow \exists x.\varphi$$

Добавим ещё два правила вывода (здесь везде x не входит свободно в φ):

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \forall x.\psi} \quad \text{Правило для } \forall$$

$$\frac{\psi \rightarrow \varphi}{(\exists x.\psi) \rightarrow \varphi} \quad \text{Правило для } \exists$$

Определение

Доказуемость, выводимость, полнота, корректность — аналогично исчислению высказываний.

Важность ограничений на схемы аксиом и правила вывода

- ▶ Рассмотрим формулу $(\forall x. \exists y. \neg x = y) \rightarrow ((\exists y. \neg x = y)[x := y])$

Важность ограничений на схемы аксиом и правила вывода

- ▶ Рассмотрим формулу $(\forall x. \exists y. \neg x = y) \rightarrow ((\exists y. \neg x = y)[x := y])$
- ▶ Соответствует 11 схеме

$$(\forall x. \varphi) \rightarrow \varphi[x := \theta] \quad \varphi \equiv \exists y. \neg x = y \quad \theta \equiv y$$

Важность ограничений на схемы аксиом и правила вывода

- ▶ Рассмотрим формулу $(\forall x. \exists y. \neg x = y) \rightarrow ((\exists y. \neg x = y)[x := y])$
- ▶ Соответствует 11 схеме

$$(\forall x. \varphi) \rightarrow \varphi[x := \theta] \quad \varphi \equiv \exists y. \neg x = y \quad \theta \equiv y$$

- ▶ Но нарушается свобода для подстановки

$$(\exists y. \neg x = y)[x := y] \equiv (\exists y. \neg y = y)$$

Важность ограничений на схемы аксиом и правила вывода

- ▶ Рассмотрим формулу $(\forall x. \exists y. \neg x = y) \rightarrow ((\exists y. \neg x = y)[x := y])$
- ▶ Соответствует 11 схеме

$$(\forall x. \varphi) \rightarrow \varphi[x := \theta] \quad \varphi \equiv \exists y. \neg x = y \quad \theta \equiv y$$

- ▶ Но нарушается свобода для подстановки

$$(\exists y. \neg x = y)[x := y] \equiv (\exists y. \neg y = y)$$

- ▶ Пусть $D = \mathbb{N}$ и $(=)$ есть равенство на \mathbb{N} . Тогда

$$\llbracket \exists y. \neg x = y \rrbracket = \text{И} \quad \llbracket (\exists y. \neg x = y)[x := y] \rrbracket = \text{Л}$$

Важность ограничений на схемы аксиом и правила вывода

- ▶ Рассмотрим формулу $(\forall x. \exists y. \neg x = y) \rightarrow ((\exists y. \neg x = y)[x := y])$
- ▶ Соответствует 11 схеме

$$(\forall x. \varphi) \rightarrow \varphi[x := \theta] \quad \varphi \equiv \exists y. \neg x = y \quad \theta \equiv y$$

- ▶ Но нарушается свобода для подстановки

$$(\exists y. \neg x = y)[x := y] \equiv (\exists y. \neg y = y)$$

- ▶ Пусть $D = \mathbb{N}$ и $(=)$ есть равенство на \mathbb{N} . Тогда

$$\llbracket \exists y. \neg x = y \rrbracket = \text{И} \quad \llbracket (\exists y. \neg x = y)[x := y] \rrbracket = \text{Л}$$

- ▶ $\not\models (\forall x. \exists y. \neg x = y) \rightarrow ((\exists y. \neg x = y)[x := y])$

Теорема о дедукции для исчисления предикатов

Теорема

Если $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, то $\Gamma, \alpha \vdash \beta$. Если $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ и в доказательстве не применяются правила для кванторов по свободным переменным из α , то $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

Доказательство.

(\Rightarrow) — как в КИВ

Теорема о дедукции для исчисления предикатов

Теорема

Если $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, то $\Gamma, \alpha \vdash \beta$. Если $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ и в доказательстве не применяются правила для кванторов по свободным переменным из α , то $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

Доказательство.

(\Rightarrow) — как в КИВ (\Leftarrow) — та же схема, два новых случая.

Теорема о дедукции для исчисления предикатов

Теорема

Если $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, то $\Gamma, \alpha \vdash \beta$. Если $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ и в доказательстве не применяются правила для кванторов по свободным переменным из α , то $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

Доказательство.

(\Rightarrow) — как в КИВ (\Leftarrow) — та же схема, два новых случая.

Перестроим: $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n \equiv \beta$ в $\alpha \rightarrow \delta_1, \alpha \rightarrow \delta_2, \dots, \alpha \rightarrow \delta_n$.

Дополним: обоснуем $\alpha \rightarrow \delta_n$, если предыдущие уже обоснованы.

Теорема о дедукции для исчисления предикатов

Теорема

Если $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, то $\Gamma, \alpha \vdash \beta$. Если $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ и в доказательстве не применяются правила для кванторов по свободным переменным из α , то $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

Доказательство.

(\Rightarrow) — как в КИВ (\Leftarrow) — та же схема, два новых случая.

Перестроим: $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n \equiv \beta$ в $\alpha \rightarrow \delta_1, \alpha \rightarrow \delta_2, \dots, \alpha \rightarrow \delta_n$.

Дополним: обоснуем $\alpha \rightarrow \delta_n$, если предыдущие уже обоснованы.

Два новых похожих случая: правила для \forall и \exists . Рассмотрим \forall .

Доказываем $(n) \alpha \rightarrow \psi \rightarrow \forall x.\varphi$ (правило для \forall), значит, доказано $(k) \alpha \rightarrow \psi \rightarrow \varphi$.

Теорема о дедукции для исчисления предикатов

Теорема

Если $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, то $\Gamma, \alpha \vdash \beta$. Если $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ и в доказательстве не применяются правила для кванторов по свободным переменным из α , то $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

Доказательство.

(\Rightarrow) — как в КИВ (\Leftarrow) — та же схема, два новых случая.

Перестроим: $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n \equiv \beta$ в $\alpha \rightarrow \delta_1, \alpha \rightarrow \delta_2, \dots, \alpha \rightarrow \delta_n$.

Дополним: обоснуем $\alpha \rightarrow \delta_n$, если предыдущие уже обоснованы.

Два новых похожих случая: правила для \forall и \exists . Рассмотрим \forall .

Доказываем $(n) \alpha \rightarrow \psi \rightarrow \forall x. \varphi$ (правило для \forall), значит, доказано $(k) \alpha \rightarrow \psi \rightarrow \varphi$.

$(n - 0.9) \dots (n - 0.8)$	$(\alpha \rightarrow \psi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\alpha \& \psi) \rightarrow \varphi$	Т. о полноте КИВ
$(n - 0.6)$	$(\alpha \& \psi) \rightarrow \varphi$	М.Р. $k, n - 0.8$

Теорема о дедукции для исчисления предикатов

Теорема

Если $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, то $\Gamma, \alpha \vdash \beta$. Если $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ и в доказательстве не применяются правила для кванторов по свободным переменным из α , то $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

Доказательство.

(\Rightarrow) — как в КИВ (\Leftarrow) — та же схема, два новых случая.

Перестроим: $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n \equiv \beta$ в $\alpha \rightarrow \delta_1, \alpha \rightarrow \delta_2, \dots, \alpha \rightarrow \delta_n$.

Дополним: обоснуем $\alpha \rightarrow \delta_n$, если предыдущие уже обоснованы.

Два новых похожих случая: правила для \forall и \exists . Рассмотрим \forall .

Доказываем $(n) \alpha \rightarrow \psi \rightarrow \forall x.\varphi$ (правило для \forall), значит, доказано $(k) \alpha \rightarrow \psi \rightarrow \varphi$.

$(n - 0.9) \dots (n - 0.8)$	$(\alpha \rightarrow \psi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\alpha \& \psi) \rightarrow \varphi$	Т. о полноте КИВ
-----------------------------	--	------------------

$(n - 0.6)$	$(\alpha \& \psi) \rightarrow \varphi$	М.Р. $k, n - 0.8$
-------------	--	-------------------

$(n - 0.4)$	$(\alpha \& \psi) \rightarrow \forall x.\varphi$	Правило для \forall , $n - 0.6$
-------------	--	-----------------------------------

Теорема о дедукции для исчисления предикатов

Теорема

Если $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, то $\Gamma, \alpha \vdash \beta$. Если $\Gamma, \alpha \vdash \beta$ и в доказательстве не применяются правила для кванторов по свободным переменным из α , то $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

Доказательство.

(\Rightarrow) — как в КИВ (\Leftarrow) — та же схема, два новых случая.

Перестроим: $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n \equiv \beta$ в $\alpha \rightarrow \delta_1, \alpha \rightarrow \delta_2, \dots, \alpha \rightarrow \delta_n$.

Дополним: обоснуем $\alpha \rightarrow \delta_n$, если предыдущие уже обоснованы.

Два новых похожих случая: правила для \forall и \exists . Рассмотрим \forall .

Доказываем $(n) \alpha \rightarrow \psi \rightarrow \forall x.\varphi$ (правило для \forall), значит, доказано $(k) \alpha \rightarrow \psi \rightarrow \varphi$.

$(n - 0.9) \dots (n - 0.8)$	$(\alpha \rightarrow \psi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\alpha \& \psi) \rightarrow \varphi$	Т. о полноте КИВ
$(n - 0.6)$	$(\alpha \& \psi) \rightarrow \varphi$	М.Р. $k, n - 0.8$
$(n - 0.4)$	$(\alpha \& \psi) \rightarrow \forall x.\varphi$	Правило для \forall , $n - 0.6$
$(n - 0.3) \dots (n - 0.2)$	$((\alpha \& \psi) \rightarrow \forall x.\varphi) \rightarrow (\alpha \rightarrow \psi \rightarrow \forall x.\varphi)$	Т. о полноте КИВ
(n)	$\alpha \rightarrow \psi \rightarrow \forall x.\varphi$	М.Р. $n - 0.4, n - 0.2$



Следование

Определение

$\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n \models \alpha$, если α выполнено всегда, когда выполнено $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$.

Теорема

Если $\Gamma \vdash \alpha$ и в доказательстве не используются кванторы по свободным переменным из Γ , то $\Gamma \models \alpha$

Важность дополнительного условия в теореме о корректности

Пример

Покажем, что $\Gamma \models \alpha$ ведёт себя неестественно, если в α используются кванторы по переменным, входящим свободно в Γ .

Важность дополнительного условия в теореме о корректности

Пример

Покажем, что $\Gamma \models \alpha$ ведёт себя неестественно, если в α используются кванторы по переменным, входящим свободно в Γ .

Легко показать, что $P(x) \vdash \forall x.P(x)$.

Важность дополнительного условия в теореме о корректности

Пример

Покажем, что $\Gamma \models \alpha$ ведёт себя неестественно, если в α используются кванторы по переменным, входящим свободно в Γ .

Легко показать, что $P(x) \vdash \forall x.P(x)$.

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| (1) | $P(x)$ | Гипотеза |
| (2) | $P(x) \rightarrow (A \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow P(x)$ | Сх. акс. 1 |
| (3) | $(A \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow P(x)$ | М.Р. 1, 2 |
| (4) | $(A \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow \forall x.P(x)$ | Правило для \forall , 3 |
| (5) | $(A \rightarrow A \rightarrow A)$ | Сх. акс. 1 |
| (6) | $\forall x.P(x)$ | М.Р. 5, 4 |

Важность дополнительного условия в теореме о корректности

Пример

Покажем, что $\Gamma \models \alpha$ ведёт себя неестественно, если в α используются кванторы по переменным, входящим свободно в Γ .

Легко показать, что $P(x) \vdash \forall x.P(x)$.

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| (1) | $P(x)$ | Гипотеза |
| (2) | $P(x) \rightarrow (A \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow P(x)$ | Сх. акс. 1 |
| (3) | $(A \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow P(x)$ | М.Р. 1, 2 |
| (4) | $(A \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow \forall x.P(x)$ | Правило для \forall , 3 |
| (5) | $(A \rightarrow A \rightarrow A)$ | Сх. акс. 1 |
| (6) | $\forall x.P(x)$ | М.Р. 5, 4 |

Пусть $D = \mathbb{Z}$ и $P(x) = x > 0$. Тогда не будет выполнено $P(x) \models \forall x.P(x)$.

Корректность

Теорема

Если θ свободен для подстановки вместо x в φ , то $\llbracket \varphi \rrbracket^{x:=\llbracket \theta \rrbracket} = \llbracket \varphi[x := \theta] \rrbracket$

Доказательство (индукция по структуре φ).

- ▶ База: φ не имеет кванторов. Очевидно.
- ▶ Переход: пусть справедливо для ψ . Покажем для $\varphi = \forall u. \psi$.
 - ▶ $x = u$ либо $x \notin FV(\psi)$. Тогда: $\llbracket \forall u. \psi \rrbracket^{x:=\llbracket \theta \rrbracket} = \llbracket \forall u. \psi \rrbracket = \llbracket (\forall u. \psi)[x := \theta] \rrbracket$
 - ▶ $x \neq u$. Тогда: $\llbracket \forall u. \psi \rrbracket^{x:=\llbracket \theta \rrbracket} = \llbracket \psi \rrbracket^{y \in D; x:=\llbracket \theta \rrbracket} = \dots$

Свобода для подстановки: $u \notin \theta$.

$$\dots = \llbracket \psi \rrbracket^{x:=\llbracket \theta \rrbracket; y \in D} = \dots$$

Индукционное предположение.

$$\dots = \llbracket \psi[x := \theta] \rrbracket^{y \in D} = \llbracket \forall u. (\psi[x := \theta]) \rrbracket = \dots$$

Но $\forall u. (\psi[x := \theta]) \equiv (\forall u. \psi)[x := \theta]$ (как текст). Отсюда:

$$\dots = \llbracket (\forall u. \psi)[x := \theta] \rrbracket$$



Корректность

Теорема

Если $\Gamma \vdash \alpha$ и в доказательстве не используются кванторы по свободным переменным из $FV(\Gamma)$, то $\Gamma \models \alpha$

Доказательство.

Фиксируем D, F, P . Индукция по длине доказательства α : при любом E выполнено $\Gamma \models \alpha$ при длине доказательства n , покажем для $n + 1$.

- ▶ Схемы аксиом (1)..(10), правило М.Р.: аналогично И.В.
- ▶ Схемы (11) и (12), например, схема $(\forall x.\varphi) \rightarrow \varphi[x := \theta]$:

$$\llbracket (\forall x.\varphi) \rightarrow \varphi[x := \theta] \rrbracket = \llbracket ((\forall x.\varphi) \rightarrow \varphi)[x := \theta] \rrbracket = \llbracket ((\forall x.\varphi) \rightarrow \varphi) \rrbracket^{x:=\llbracket \theta \rrbracket} = \text{И}$$

- ▶ Правила для кванторов: например, введение \forall :
Пусть $\llbracket \psi \rightarrow \varphi \rrbracket = \text{И}$. Причём $x \notin FV(\Gamma)$ и $x \notin FV(\psi)$. То есть, при любом x выполнено $\llbracket \psi \rightarrow \varphi \rrbracket^{x:=x} = \text{И}$. Тогда $\llbracket \psi \rightarrow (\forall x.\varphi) \rrbracket = \text{И}$.

