

Mathematische Modelle und Methoden – Lösungen

Aufgabe 1

- a) Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine der vier befragten Personen ein Nokia gekauft hat?
Gegenereignis: Kein Nokia unter den vier Handys.

$$P(K \geq 1) = 1 - P(K = 0) = 1 - \binom{4}{0} * 0.192^0 * 0.808^4 = 1 - 0.808^4 = 0.5738 = 57,4\%$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine von vier Personen ein Nokia gekauft hat, beträgt also 57,4%.

- b) Wahrscheinlichkeit, dass genau drei von sechs Handys einem chinesischen Hersteller zuzuordnen sind?

Marktanteil chinesischer Handys: 3,9% + 2,8% + 2,2% = 8.9%

$$\begin{aligned} P(K = 3) &= \binom{6}{3} * 0.089^3 * 0.911^3 \\ &= \frac{6!}{3! (6-3)!} * 0.089^3 * 0.911^3 \\ &= 20 * 0.089^3 * 0.911^3 = 0.0107 = 1.1\% \end{aligned}$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass genau drei von sechs Personen ein chinesisches Handy gekauft haben, beträgt 1,1%.

- c) Wahrscheinlichkeit, dass höchstens zwei Personen von fünf Personen ein taiwanesisches Handy gekauft haben?

$$P(K \leq 2) = P(K = 0) + P(K = 1) + P(K = 2)$$

$$P(K = 0) = \binom{5}{0} * 0.02^0 * 0.98^5 = 0.9039 = 90.4\%$$

$$P(K = 1) = \binom{5}{1} * 0.02^1 * 0.98^4 = 0.0922 = 9.2\%$$

$$P(K = 2) = \binom{5}{2} * 0.02^2 * 0.98^3 = 10 * 0.02^2 * 0.98^3 = 0.0038 = 0.4\%$$

Damit ist $P(K \leq 2) = 90.4\% + 9.2\% + 0.4\% = 100\%$

Die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens zwei von fünf Personen ein taiwanesisches Handy gekauft haben, beträgt 100%.

- d) Wahrscheinlichkeit, dass alle vier Personen von vier Personen ein südkoreanisches Handy gekauft haben?

Marktanteil südkoreanischer Handys: 22,9% + 3,3% = 26.2%

$$P(K = 4) = \binom{4}{4} * 0.262^4 * 0.738^0 = 0.00471 = 0.471\%$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass alle vier Personen ein südkoreanisches Handy besitzen, beträgt 0.471%.

Aufgabe 2

- a) Die Länge des direkten Weges lässt sich mittels Pythagoras berechnen:

$$d = \sqrt{750^2 + 250^2} = \sqrt{625000} = 790,57$$

Im Feld beträgt die Geschwindigkeit 3 km/h, damit benötigt er

$$t = \frac{790,57 * 3600}{3000} \text{ sek} = 948,68 \text{ sek} = 15,81 \text{ min}$$

- b) Für die Straße gilt:
- $t_1 = \frac{x}{6 \text{ km/h}} = \frac{3,6 * x}{6 \text{ m/sek}} = 0,6 \frac{\text{sek}}{\text{m}} * x \text{ [m]}$

Für den Weg durch das Feld gilt:

$$t_2 = \frac{\sqrt{(750-x)^2 + 250^2}}{3 \frac{\text{km}}{\text{h}}} = \frac{\sqrt{(750-x)^2 + 62500}}{3 \frac{\text{m}}{\text{s}}} * 3,6$$

$$= 1,2 * \sqrt{(750-x)^2 + 62500} \text{ sek/m}$$

Die Gesamtzeit ergibt sich aus beiden Zeiten:

$$t(x) = t_1 + t_2 = 0,6 * x + 1,2 * \sqrt{(750-x)^2 + 62500}$$

- c) Extremwerte bestimmen, da schnellster Weg = Minimum

$$t'(x) = 0,6 + 1,2 * \frac{1}{2} * \frac{2 * (750-x) * (-1)}{\sqrt{(750-x)^2 + 62500}} = 0,6 - \frac{1,2 * (750-x)}{\sqrt{(750-x)^2 + 62500}}$$

$$t'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1,2 * (750-x)}{\sqrt{(750-x)^2 + 62500}} = 0,6$$

$$\Leftrightarrow 1,2 * (750-x) = 0,6 * (\sqrt{(750-x)^2 + 62500})$$

$$\Leftrightarrow (750-x) = 0,5 * (\sqrt{(750-x)^2 + 62500})$$

$$\Leftrightarrow (750-x)^2 = 0,25 * ((750-x)^2 + 62500)$$

$$\Leftrightarrow 0,75 * (750-x)^2 = 0,25 * 62500$$

$$\Leftrightarrow 0,75 * (750-x)^2 = 15625$$

$$\Leftrightarrow (750-x)^2 = 20833,33$$

$$\Leftrightarrow 750-x = 144,34 \text{ oder } 750-x = -144,34$$

$$\Leftrightarrow x = 605,66 \text{ oder } x = 894,34$$

Da der Weg mit $x = 894,34$ offensichtlich deutlich länger ist, wird die kürzeste Zeit mit $x = 605,66$ erreicht.

Dabei gilt $t_{\min} = t(605,66) = 0,6 * 605,66 + 1,2 * \sqrt{20834 + 62500} = 709,81 \text{ sek} = 11,83 \text{ min}$

Aufgabe 3

- a) Höhe = h, Breite = b

$$\text{Tragfähigkeit } T(b, h) = b \cdot h^2 \cdot c$$

- b) Durchmesser = d

$$\text{Nach Pythagoras gilt hier: } h^2 + b^2 = d^2 \Leftrightarrow h^2 = d^2 - b^2$$

$$\text{Einsetzen in T: } T(b) = c \cdot b \cdot (d^2 - b^2)$$

- c) Ableiten der Tragfähigkeit und gleich Null setzen ergibt

$$T'(b) = c \cdot d^2 - 3 \cdot c \cdot b^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow d^2 = 3 \cdot b^2 \Leftrightarrow b = d/\sqrt{3}$$

$$T''(b) = -6 \cdot c \cdot b < 0 \rightarrow \text{Damit liegt tatsächlich ein Maximum vor.}$$

$$\text{Für die Höhe ergibt sich damit } h = \sqrt{d^2 - b^2} = \sqrt{d^2 - \frac{d^2}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot d$$

$$\text{Für den konkreten Durchmesser } d = 40\text{cm} \text{ erhält man damit eine Breite von } 40\text{cm}/\sqrt{3} =$$

$$23.09\text{cm} \text{ und eine Höhe von } \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot 40\text{cm} = 32.66\text{cm}$$

- d) Auch hier hilft Pythagoras weiter: Im Endeffekt sind die Strecken |AC| und |AD| gesucht. Es gilt

$$|AE|^2 + |EC|^2 = |AC|^2 \text{ und } |EM|^2 + |EC|^2 = |CM|^2, \text{ also } |EC|^2 = |CM|^2 - |EM|^2$$

$$\text{Es gilt ebenfalls } |AE| = d/3, |EM| = d/6, |MC| = d/2$$

$$\text{und damit } |AC|^2 = (d/3)^2 + (d/2)^2 - (d/6)^2 = d^2/9 + d^2/4 + d^2/36 = d^2/3$$

$$\text{So erhält man also auch Breite } = |AC| = d/\sqrt{3}$$

Aufgabe 4

- a) Die Ebene kann dargestellt werden durch

$$E: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 60 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -80 \\ 0 \\ 60 \end{pmatrix} \text{ mit } 0 \leq \alpha, \beta \leq 1$$

Der Punkt B liegt in der Ebene wegen

$$\begin{pmatrix} -80 \\ 60 \\ 60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 60 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -80 \\ 0 \\ 60 \end{pmatrix}$$

- b) Der Flächeninhalt ergibt sich aus dem Betrag des Kreuzproduktes aus A und C, also

$$F = \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 60 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -80 \\ 0 \\ 60 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} 3600 \\ 0 \\ 4800 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{3600 * 3600 + 4800 * 4800} = 6000$$

- c) Die bebaubare Fläche eines Hanggrundstücks ist die Projektionsfläche in die x-y-Ebene mit den Eckpunkten

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 60 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -80 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -80 \\ 60 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Die Fläche wie in b) berechnet ist gleich 4800.

- d) Der Richtungsvektor liegt parallel zur Ebene, da

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{5}{60} \begin{pmatrix} 0 \\ 60 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{20} \begin{pmatrix} -80 \\ 0 \\ 60 \end{pmatrix}$$

Ein Vektor senkrecht zur Ebene mit Länge 1 (Normaleneinheitsvektor) ist $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$

Aus der Hesse'schen Normalform ergibt sich der konstante Abstand zwischen der Geraden und der Ebene zu

$$d = \left| \left\langle \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -20 \\ 40 \\ 40 \end{pmatrix} \right\rangle \right| = 20$$

Der minimale Abstand zwischen Gerade und Mittelpunkt M(-40/30/30) und der Geraden ist ebenfalls gleich 20, denn

$$\left| \left\langle \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -20 \\ 40 \\ 40 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -40 \\ 30 \\ 30 \end{pmatrix} \right\rangle \right| = \left| \left\langle \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \\ 10 \end{pmatrix} \right\rangle \right| = 20$$

Aufgabe 5

a)

$$S_4 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = 0.58333333$$

$$S_5 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = 0.78333333$$

b) Durch die alternierende Reihe wechseln das Vorzeichen und der absolute Wert fällt. Damit liegt der wahre Wert jeweils zwischen zwei Näherungen, also $0.58333333 < \ln(2) < 0.78333333$

c) Eines der Rechengesetze des \ln besagt, das $\ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b)$ gilt, also gilt hier $\ln(1/2) = \ln(1) - \ln(2) = 0 - \ln(2)$ und damit $\ln(2) = -\ln(1/2)$

d) Setze $x = -1/2$ in die Taylorreihe ein und berechne neu:

$$S_4 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{8} - \frac{1}{24} - \frac{1}{64} = -0.68229166$$

$$S_5 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{8} - \frac{1}{24} - \frac{1}{64} - \frac{1}{160} = -0.68854167$$

$$\ln(2) = -\ln(1/2) = 0.6822917$$

e) Da die Glieder nur noch negativ sind, muss damit $\ln(1/2) < -0.68\dots$ und somit $\ln(2) > 0.68854167$ gelten.

f)

$$a_0 = 0$$

$$a_1 = \frac{2}{3} = 0.66666667$$

$$a_2 = \frac{2}{3} + \frac{2}{81} = 0.69135802$$

$$a_3 = \frac{2}{3} + \frac{2}{81} + \frac{2}{1215} = 0.69300411$$

g) Der dritte Näherungswert aus f) ist auf drei Dezimalstellen genau, da $\ln(2) - a_3 = 0.000143$

Aufgabe 6

a)

$$W(X = 30) = \binom{420}{30} * 0.05^{30} * 0.95^{420-30}$$

b) X ist die Zufallsvariable für die Anzahl der defekten Notebooks in der Stichprobe vom Umfang 420. Es liegt eine Binomialverteilung vor mit den Parametern $n = 420$ und $p = 0.05$

c) Erwartungswert $\mu = 420 * 0.05 = 21$

d) Faustformel: Varianz = $n * p * q > 9$

Hier gilt ja $p = 0.05$, $q = 0.95$, $n = 420$, sodass $420 * 0.05 * 0.95 = 19.95 > 9$ ist. Damit darf man die Approximation nutzen.

e) Für die Standardabweichung gilt $\sigma = \sqrt{420 * 0.05 * 0.95} \approx 4.4665$

Die Wahrscheinlichkeit, 30 defekte Notebooks zu haben ist $W(X = 30)$. Dies wird lokal durch den Wert der Dichte der Normalverteilung mit Erwartungswert 21 und Standardabweichung 4.4665 angenähert, also

$$\frac{1}{4.4665 * \sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2 * \sigma^2}} = \frac{1}{\sigma * \sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{(30-21)^2}{2 * 4.4665^2}} = 0.01173$$

Damit beträgt die Wahrscheinlichkeit dafür, unter 420 geprüften Notebooks 30 defekte Notebooks zu finden, 1.17%.