

1 基础知识

1.1 二进制十进制转换

例如 $(53.7)_{10} = (110101.10\overline{110})$ ，小数点左边倒序，小数点右边正序。

$53 \div 2 = 26 \cdots 1$	$6 \div 2 = 3 \cdots 0$	$0.7 \times 2 = 0.4 + 1$	$0.6 \times 2 = 0.2 + 1$
$26 \div 2 = 13 \cdots 0$	$3 \div 2 = 1 \cdots 1$	$0.4 \times 2 = 0.8 + 0$	$0.2 \times 2 = 0.4 + 0$
$13 \div 2 = 6 \cdots 1$	$1 \div 2 = 0 \cdots 1$	$0.8 \times 2 = 0.6 + 1$	$0.4 \times 2 = 0.8 + 0$

1.2 浮点数计算

标准化 IEEE 浮点数 $\pm 1.bbb \cdots b \times 2^p$ ，IEEE 最近舍入法则：对 53 位，如果为 0，则舍去，如果为 1，则进位。

精度	符号	指数	尾数
单精度	1	8	23
双精度	1	11	52
长双精度	1	15	64

加减法时需要用 0 补齐到指数最大的数对应的位置。

$(8.3)_{10} = (1000.0100\overline{1})_2 = 1.0000100\overline{1} \times 2^3 = 1. \cdots 110011010 \times 2^3$
 $(7.3)_{10} = (111.0100\overline{1})_2 = 1.1101\overline{001} \times 2^2 = 1. \cdots 100110011 \times 2^2$
(向 52 位之后的位置补齐) $(8.3)_{10} - (7.3)_{10} = 1.00001001 \cdots 10011010\mathbf{0} \times 2^3$
(对齐，保留 52 位之后的数字) $= 0.11101001 \cdots 10011001\mathbf{1} \times 2^3$
(52 位之后的数字也要进行计算) $= 0.00100000 \cdots 00000000\mathbf{1} \times 2^3$
(移动到 0 位为 1，舍入到 52 位) $= 1.00000000 \cdots 00000100 \times 2^0$

2 解方程

2.1 二分法、误差

初始区间 $[a, b]$ 使 $f(a)f(b) < 0$ ，取中点 $c = (a+b)/2$ 若 $f(a)f(c) < 0$ ，下一迭代区间为 $[a, c]$ ，若 $f(c)f(b) < 0$ ，下一迭代区间为 $[c, b]$ ，输出近似解为 $x_a = (a+b)/2$ (线性收敛)。近似解 x_a 的前向误差为 $|r - x_a|$ ，后向误差为 $|f(x_a)|$ 。

2.2 不动点迭代

不动点迭代将方程 $f(x) = 0$ 变换为 $g(x) = x$ ，满足条件可以达到线性收敛。

$$x_{i+1} = g(x_i) \qquad \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{e_{i+1}}{e_i} = S = |g'(r)| < 1 \qquad \color{red}{x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_{i+1})}}$$

牛顿方法，可以达到二次收敛，出现 $m > 2$ 重根时变为线性收敛。

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{e_{i+1}}{e_i^2} = \left| \frac{f''(r)}{2f'(r)} \right| \qquad \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{e_{i+1}}{e_i} = \frac{m-1}{m} \qquad \color{blue}{x_{i+1} = x_i - \frac{mf(x_i)}{f'(x_{i+1})}}$$

如果 $0 = f(r) = f'(r) = \cdots = f^{(m-1)}(r)$ ，但是 $f^{(m)}(r) \neq 0$ ，则 r 为 m 重根，可用**改进的牛顿方法**，恢复二次收敛速度。

3 解方程组

3.1 高斯消元法、LU 分解

高斯消元的操作次数 $\frac{2}{3}n^3$ ，LU 分解的操作次数 $\frac{2}{3}n^3$ ，每次回代的操作次数： n^2 。

3.2 PA=LU 分解

部分主元：每一行根据第一列元素从大到小排序，避免湮灭问题。

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix}$$
$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \textcircled{1} \leftrightarrow \textcircled{2} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \textcircled{2} - \textcircled{1} \times \frac{2}{3} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & \frac{5}{3} \end{bmatrix} = U$$
$$Lc = Pb \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad Ux = c \Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & \frac{5}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

3.3 迭代方法、误差

要求矩阵 A 为严格对焦点优矩阵， $|a_{ii}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$ ， D 表示 A 的主对角线矩阵， L 表示 A 的下三角矩阵， U 表示 A 的上三角矩阵。
雅可比方法，高斯-赛德尔方法

$$x_{k+1} = D^{-1}(b - (L + U)x_k) \qquad x_{k+1} = D^{-1}(b - Ux_k - Lx_{k+1})$$

连续过松弛 $\omega > 1$ ， $\omega = 1$ 时，退化为高斯-赛德尔方法

$$x_{k+1} = (\omega L + D)^{-1}[(1 - \omega)dx_k - \omega Ux_k - Lx_{k+1}] + \omega(D + \omega L)^{-1}b$$

近似解 x_a 的余项为 $r = b - Ax_a$ ，前向误差为 $\|x - x_a\|$ ，后向误差为 $\|b - Ax_a\|_\infty$ 。

4 插值

4.1 拉格朗日插值

对 n 个数据点 $(x_1, y_1), \cdots, (x_n, y_n)$ ，有 $n - 1$ 阶多项式

$$L_k(x) = \frac{(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}$$
$$P_{n-1}(x) = y_1 L_1(x) + \cdots + y_n L_n(x)$$
$$P_2(x) = y_1 \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} + y_2 \frac{(x - x_3)(x - x_1)}{(x_2 - x_3)(x_2 - x_1)} + y_3 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}$$

4.2 牛顿商差

$$\begin{array}{l|l} x_1 & \begin{array}{l} f[x_1] \\ f[x_1 \ x_2] \\ f[x_1 \ x_2 \ x_3] \end{array} \\ x_2 & \begin{array}{l} f[x_2] \\ f[x_2 \ x_3] \end{array} \\ x_3 & f[x_3] \end{array} \qquad \begin{array}{l} f[x_k] = f(x_k) \\ f[x_k \ x_{k+1}] = \frac{f[x_{k+1}] - f[x_k]}{x_{k+1} - x_k} \\ f[x_k \ x_{k+1} \ x_{k+2}] = \frac{f[x_{k+1} \ x_{k+2}] - f[x_k \ x_{k+1}]}{x_{k+2} - x_k} \\ P_{n-1}(x) = \sum_{i=1}^n f[x_1 \cdots x_i](x - x_1) \cdots (x - x_{i-1}) \end{array}$$

4.3 切比雪夫插值

在区间 $[a, b]$ 内，切比雪夫插值节点，使以下不等式在 $[a, b]$ 内成立

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2i-1)\pi}{2n} \qquad i = 1, 2, \cdots, n \qquad |(x - x_1) \cdots (x - x_n)| \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^n 2^{n-1}$$

4.4 插值误差

插值误差公式，以及误差上界，其中 $x_{min} < c < x_{max}$ ，

$$|f(x) - P(x)| = \frac{(x - x_1) \cdots (x - x_n)}{n!} f^{(n)}(c) \leq \frac{|(x - x_1) \cdots (x - x_n)|}{n!} |f^{(n)}(x_i)|_{max}$$

5 最小二乘法

5.1 不一致方程组

对于不一致系统 $Ax = b$ ，求解 $A^T A \bar{x} = A^T b$

5.2 数据拟合

多项式（线性）模型，周期型数据，指数模型的线性化。

$$y = c_1 + c_2 t + c_3 t^2 + \cdots \qquad y = c_1 + c_2 \cos 2\pi t + c_3 \sin 2\pi t$$
$$y = c_1 e^{c_2 t} \Rightarrow \ln y = \ln c_1 + c_2 t \qquad y = c_1 t e^{c_2 t} \Rightarrow \ln y - \ln t = \ln c_1 + c_2 t$$

5.3 误差

最小二乘解 \bar{x} 的余项为 $r = b - A\bar{x}$ ，后向误差（二范数误差，欧式长度）为

$$\|r\|_2 = \sqrt{r_1^2 + \cdots + r_m^2}$$

平方误差，均方根误差，以及三者直接的关系分别为

$$SE = r_1^2 + \cdots + r_m^2 \qquad RMSE = \sqrt{\frac{r_1^2 + \cdots + r_m^2}{m}} \qquad RMSE = \frac{\sqrt{SE}}{\sqrt{m}} = \frac{\|r\|_2}{\sqrt{m}}$$

5.4 QR 分解

使用格拉姆-斯密特正交找出 $A = (A_1|\cdots|A_n)$ 的消减 QR 分解

$$y_j = A_j - q_1(q_1^T A_j) - q_2(q_2^T A_j) - \cdots - q_{j-1}(q_{j-1}^T A_j) \quad q_j = \frac{y_j}{\|y_j\|_2}$$
$$\begin{cases} r_{jj} = \|y_j\|_2 \\ r_{ij} = q_i^T A_j \end{cases} \quad A = (q_1|\cdots|q_n) \begin{bmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ & & r_{nn} \end{bmatrix} = QR$$

对 $A = (A_1|\cdots|A_n)$ 补齐 $(m-n)$ 个向量 $[1,0,\cdots,0]^T$, 计算 q_{n+1},\cdots,q_{n+m} , 得到完全 QR 分解, 并通过回代 $R\hat{x} = Q^Tb$, 求解最小二乘问题（虚线以下部分直接扔掉）

$$A = (q_1|\cdots|q_m) \begin{bmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ & & r_{nn} \\ \hline 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} = QR \quad \begin{bmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ & & r_{nn} \\ \hline 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = Q^T \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \\ \hline d_{n+1} \\ \vdots \\ d_m \end{bmatrix}$$

6 数值微分积分

6.1 数值微分

二点前向差分公式（一阶导一阶公式），三点中心差分公式（一阶导二阶公式）

$$f'(x) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h} - \frac{h}{2}f''(c) \quad f'(x) = \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} - \frac{h^2}{6}f'''(c)$$

二阶导数的三点中心差分公式（二阶导二阶公式），都可以由泰勒展开推导而来。

$$f''(x) = \frac{f(x-h)-2f(x)+f(x+h)}{h^2} - \frac{h^2}{12}f^{(4)}(c)$$
$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{3!}f'''(x) + \cdots + \frac{h^k}{k!}f^{(k)}(x) + \cdots$$

6.2 理查德外推

对 n 阶近似公式 $F_n(x)$ 外推，至少可以得到 $(n+1)$ 阶近似 Q 的公式

$$Q \approx \frac{2^n F(h/2) - F(h)}{2^n - 1}$$

对三点中心差分公式的外推结果为 4 阶

6.3 数值积分

梯形法则与复合梯形法则

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) \mathrm{d} x = \frac{h}{2}(y_0+y_1) - \frac{h^3}{12} f''(c) \quad h = x_1 - x_0$$
$$\int_a^b f(x) \mathrm{d} x = \frac{h}{2}(y_0+y_m+2 \sum_{i=1}^{m-1} y_i) - \frac{(b-a) h^2}{12} f''(c) \quad h = \frac{b-a}{m}$$

辛普森法则与复合辛普森法则

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) \mathrm{d} x = \frac{h}{3}(y_0+4 y_1+y_2) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(c) \quad h = x_1 - x_0 = x_2 - x_1$$
$$\int_a^b f(x) \mathrm{d} x = \frac{h}{3}(y_0+y_{m_2}+4 \sum_{i=1}^m y_{2 i-1}+2 \sum_{i=1}^{m-1} y_{2 i}) - \frac{(b-a) h^4}{180} f^{(4)}(c) \quad h = \frac{b-a}{2 m}$$

中点法则与复合中点法则

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) \mathrm{d} x = hf(x_0+\frac{h}{2}) + \frac{h^3}{24} f''(c) \quad h = x_1 - x_0$$
$$\int_a^b f(x) \mathrm{d} x = h \sum_{i=0}^{m-1} f(x_i+\frac{h}{2}) + \frac{(b-a) h^2}{24} f''(c) \quad h = \frac{b-a}{m}$$

6.4 龙贝格积分

添加数据进行扩展，直到达到指定的精度，龙贝格积分是对复合梯形法则的外推。

$$h_j = \frac{b-a}{2^{j-1}} \quad R_{11} = \frac{h_1}{2}(f(a)+f(b)) \quad R_{j1} = \frac{1}{2} R_{j-1,1} + h_j \sum_{i=1}^{2^{j-2}} f(a+(2 i-1) h_j)$$

R_{11} R_{22} $R_{jk} = \frac{4^{k-1} R_{j,k-1} - R_{j-1,k-1}}{4^{k-1} - 1}$ $R_{j+1,1}$ 是对 R_{j1} 的步长减半的结果（向下）
 R_{31} R_{32} R_{33} R_{jj} 为定积分的 2^j 阶近似 $R_{j,k+1}$ 是对 R_{jk} 的理查德外推结果（向右）

6.5 高斯积分

对于积分区间不在 $[-1,1]$ 上的积分，利用换元归一化到 $[-1,1]$ 。

$$\int_{-1}^1 f(x) \mathrm{d} x \approx \sum_{i=1}^n c_i f(x_i) \quad \int_a^b f(x) \mathrm{d} x = \int_{-1}^1 f\left(\frac{(b-a) t+b+a}{2}\right) \frac{b-a}{2} \mathrm{d} t$$

n 阶	根 x_i	系数 c_i
2	$-\sqrt{\frac{1}{3}} = -0.577350269189$	$1 = 1.000000000000$
	$\sqrt{\frac{1}{3}} = 0.577350269189$	$1 = 1.000000000000$
3	$-\sqrt{\frac{3}{5}} = -0.774596669241$	$\frac{5}{8} = 0.555555555556$
	$0 = 0.000000000000$	$\frac{8}{8} = 0.888888888889$
	$\sqrt{\frac{3}{5}} = 0.774596669241$	$\frac{5}{8} = 0.555555555556$
4	$-\sqrt{\frac{15+2 \sqrt{30}}{35}} = -0.861136311594$	$\frac{90-5 \sqrt{30}}{180} = 0.347854845137$
	$-\sqrt{\frac{15-2 \sqrt{30}}{35}} = -0.339981043585$	$\frac{90+5 \sqrt{30}}{180} = 0.652145154863$
	$\sqrt{\frac{15-2 \sqrt{30}}{35}} = 0.339981043585$	$\frac{90+5 \sqrt{30}}{180} = 0.652145154863$
	$\sqrt{\frac{15+2 \sqrt{30}}{35}} = 0.861136311594$	$\frac{90-5 \sqrt{30}}{180} = 0.347854845137$

7 常微分方程

7.1 初值问题

欧拉方法，中点方法，显示梯形方法， k 阶泰勒方法，偏导展开

$$w_{i+1} = w_i + hf(t_i, w_i), \quad w_{i+1} = w_i + hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{h}{2} f(t_i, w_i)\right)$$
$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2} f(t_i, w_i) + \frac{h}{2} f\left(t_i + h, w_i + hf(t_i, w_i)\right)$$
$$w_{i+1} = w_i + hf(t_i, w_i) + \frac{h^2}{2} f'(t_i, w_i) + \cdots + \frac{h^k}{k!} f^{(k-1)}(t_i, w_i)$$
$$w_{i+1} = w_i + hf(t_i, w_i) + \frac{h^2}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial t}(t_i, w_i) + \frac{\partial f}{\partial w}(t_i, w_i) f(t_i, w_i) \right] + \cdots$$

二阶龙格库塔，第一种解为显示梯形方法，第二种解为中点方法

$$w_{i+1} = w_i + af(t_i, w_i) + bf\left(t_i + \alpha h, w_i + \beta f(t_i, w_i)\right)$$
$$w_{i+1} = w_i + (a+b)f(t_i, w_i) + bah\frac{\partial f}{\partial t}(t_i, w_i) + b\beta\frac{\partial f}{\partial w}(t_i, w_i)f(t_i, w_i)$$
$$\begin{cases} a+b=h \\ bah=b\beta=\frac{h^2}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=b=\frac{h}{2} \\ \alpha=1, \beta=h \end{cases} \quad \text{or} \quad \begin{cases} a=0, b=h \\ \alpha=\frac{1}{2}, \beta=\frac{h}{2} \end{cases}$$

四阶龙格库塔 $w_{i+1} = w_i + \frac{h}{6}(s_1+2s_2+2s_3+s_4) \quad s_1 = f(t_i, w_i)$

$$s_2 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{h}{2} s_1\right) \quad s_3 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{h}{2} s_2\right) \quad s_4 = f\left(t_i + h, w_i + hs_3\right)$$

7.2 利普希茨连续、唯一性

当存在利普希茨常熟 L 对 $S = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ 中的每一对 $(t, y_1), (t, y_2)$ 都满足

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L|y_1 - y_2| \quad L = \left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, c) \right|_{\max} \quad \begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(a) = y_0 \end{cases} \quad t \in [a, c]$$

则 $f(t, y)$ 相对于 y 在 S 上利普希茨连续，也可以使用求导的方法得到利普希茨常熟。

满足以上条件，且 $\alpha < y_0 < \beta$ ，则存在 $c \in (a, b)$ 使初值问题有唯一解。如果 $f(t, y)$ 相对于 y 在 $S = [a, b] \times (-\infty, \infty)$ 利普希茨连续，则在 $[a, b]$ 上存在唯一解。

满足以上条件，如果 $Y(t), Z(t)$ 是 $y' = f(t, y)$ 在 S 上的解，分别有初始值

$$Y(a), Z(a) \quad \text{则} \quad |Y(t) - Z(t)| \leq e^{L(t-a)} |Y(a) - Z(a)|$$

7.3 边值问题

利用差分公式替换微分方程中的导数，组装矩阵，估计初值，解方程组。

$$\begin{cases} y'' = 4y + t^2 \\ y(a) = y_a \\ y(b) = y_b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_a + (-4h^2 - 2)w_1 + w_2 + h^2 t_1^2 = 0 & t_1 = a + h \text{ 处} \\ w_{i-1} + (-4h^2 - 2)w_i + w_{i+1} + h^2 t_i^2 = 0 & \text{非边界 } t_i \text{ 处} \\ w_{n-1} + (-4h^2 - 2)w_n + y_b + h^2 t_n^2 = 0 & t_n = b - h \text{ 处} \end{cases}$$
$$\begin{bmatrix} -4h^2 - 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4h^2 - 2 & 1 & & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & & \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & 1 & -4h^2 - 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -4h^2 - 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ \vdots \\ w_{n-2} \\ w_{n-1} \\ w_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -h^2 t_1^2 - y_a \\ -h^2 t_2^2 \\ -h^2 t_3^2 \\ \vdots \\ -h^2 t_{n-2}^2 \\ -h^2 t_{n-1}^2 \\ -h^2 t_n^2 - y_b \end{bmatrix}$$

有限差分数 n 个区间，区间大小 $h = 1/(n+1)$ ，并可以得到 n 个方程

$$y'' = 4y + t^2 \Rightarrow \frac{w_{i-1} - 2w_i + w_{i+1}}{h^2} = 4w_i + t_i^2 \quad w_0 = a \quad w_n = b$$