

# Basic Inferential Data Analysis Instructions

I


```
library(datasets)
data(ToothGrowth)
library(ggplot2)

str(ToothGrowth)
## 'data.frame':    60 obs. of  3 variables:
##  $ len : num  4.2 11.5 7.3 5.8 6.4 10 11.2 11.2 5.2 7 ...
##  $ supp: Factor w/ 2 levels "OJ","VC": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
##  $ dose: num  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ...

head(ToothGrowth)
##      len supp dose
## 1  4.2   VC  0.5
## 2 11.5   VC  0.5
## 3  7.3   VC  0.5
## 4  5.8   VC  0.5
## 5  6.4   VC  0.5
## 6 10.0   VC  0.5

summary(ToothGrowth)
##           len           supp           dose
##  Min.      : 4.20    OJ:30    Min.      :0.500
##  1st Qu.:13.07    VC:30    1st Qu.:0.500
##  Median :19.25                Median :1.000
##  Mean   :18.81                Mean   :1.167
##  3rd Qu.:25.27                3rd Qu.:2.000
##  Max.   :33.90                Max.   :2.000

ggplot(data=ToothGrowth, aes(x=as.factor(dose), y=len, fill=supp)) +
  geom_bar(stat="identity") +
  facet_grid(. ~ supp) +
  xlab("Dose (mg)") +
  ylab("Tooth length")
```



```

hypoht1 <- t.test(len ~ supp, data = ToothGrowth)
hypoht1$conf.int
## [1] -0.1710156 7.5710156
## attr("conf.level")
## [1] 0.95
hypoht1$p.value
## [1] 0.06063451
hypoht2<-t.test(len ~ supp, data = subset(ToothGrowth, dose == 0.5))
hypoht2$conf.int
## [1] 1.719057 8.780943
## attr("conf.level")
## [1] 0.95
hypoht2$p.value
## [1] 0.006358607
hypoht3<-t.test(len ~ supp, data = subset(ToothGrowth, dose == 1))
hypoht3$conf.int
## [1] 2.802148 9.057852
## attr("conf.level")
## [1] 0.95
hypoht3$p.value
## [1] 0.001038376
hypoht4<-t.test(len ~ supp, data = subset(ToothGrowth, dose == 2))
hypoht4$conf.int
## [1] -3.79807 3.63807

```

```
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
hypoth4$p.value
## [1] 0.9638516
```