

1. feladat. A definíció alapján határozza meg a

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x^3 - x^2 + x - 1}$$

határértéket.

Megoldás. $\frac{0}{0}$ típusú kritikus határértékről van szó. Mivel

$$\frac{x^2 + 6x - 7}{x^3 - x^2 + x - 1} = \frac{(x-1)(x+7)}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{x+7}{x^2+1} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}),$$

ezért a sejtés:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x^3 - x^2 + x - 1} = 4.$$

A definíció alapján a bizonyításhoz azt kell megmutatnunk, hogy

$$\forall \varepsilon > 0 \text{ számhoz } \exists \delta > 0, \quad \forall x : 0 < |x-1| < \delta \text{ esetén } \left| \frac{x+7}{x^2+1} - 4 \right| < \varepsilon.$$

Rögzítsük az $\varepsilon > 0$ számot. Ekkor

$$\left| \frac{x+7}{x^2+1} - 4 \right| = \frac{|4x^2 - x - 3|}{x^2+1} = \frac{|(x-1)(4x+3)|}{x^2+1} = |x-1| \cdot \frac{|4x+3|}{x^2+1}.$$

Ha (például) $|x-1| < 1$, azaz ha $0 < x < 2$, akkor

$$\frac{|4x+3|}{x^2+1} = \frac{4x+3}{x^2+1} < \frac{4 \cdot 2 + 3}{1} = 11.$$

Így

$$\left| \frac{x+7}{x^2+1} - 4 \right| < 11 \cdot |x-1| < \varepsilon, \quad \text{ha } 0 < |x-1| < 1 \text{ és } 0 < |x-1| < \frac{\varepsilon}{11}.$$

Ez azt jelenti, hogy az $\varepsilon > 0$ számhoz a $\delta := \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{11} \right\}$ választás megfelelő, ezért

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x^3 - x^2 + x - 1} = 4. \quad \blacksquare$$

2. feladat. Számítsa ki az alábbi határértékeket:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x-1} - 1}, \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin 2x}{\sin 3x}, \quad (c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - e^{3x}}{x}.$$

Megoldás. (a) $\frac{0}{0}$ típusú kritikus határértékről van szó. Gyöktelenítés, majd szorzatra bontás után azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x-1} - 1} &= \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x-1} - 1} \cdot \frac{\sqrt{x-1} + 1}{\sqrt{x-1} + 1} = \frac{x^2 - 4}{x-2} \cdot (\sqrt{x-1} + 1) = \\ &= \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} \cdot (\sqrt{x-1} + 1) = (x+2) \cdot (\sqrt{x-1} + 1). \end{aligned}$$

Ez az átalakítás már nem kritikus határértékre vezet, ezért használhatjuk a határérték és a műveletek kapcsolatára vonatkozó tételt:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x-1} - 1} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) \cdot (\sqrt{x-1} + 1) = 4 \cdot 2 = 8. \quad \blacksquare$$

(b) $\frac{0}{0}$ típusú kritikus határértékről van szó. Tudjuk, hogy

$$(*) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x}{\alpha x} = 1 \quad \text{minden } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ esetén.}$$

Ha $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, akkor

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{tg} x - \sin 2x}{\sin 3x} &= \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \sin 2x}{\sin 3x} = \frac{\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot x - \frac{\sin 2x}{2x} \cdot 2x}{\frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3x} = \\ &= \frac{\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} - \frac{\sin 2x}{2x} \cdot 2}{\frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3}. \end{aligned}$$

A (*) és a $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ határértékek, valamint a határérték és a műveletek kapcsolatára vonatkozó tétel alapján azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin 2x}{\sin 3x} = \frac{1 - 2}{3} = -\frac{1}{3}. \blacksquare$$

(c) Írjuk fel az e^{-x} és az e^{3x} ($x \in \mathbb{R}$) függvény hatványsorát. Mivel

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$e^{3x} = 1 + 3x + 3^2 \frac{x^2}{2!} + 3^3 \frac{x^3}{3!} + 3^4 \frac{x^4}{4!} + \dots \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Így

$$\begin{aligned} \frac{e^{-x} - e^{3x}}{x} &= \frac{-4x + \frac{1-3^2}{2!}x^2 - \frac{1+3^3}{3!}x^3 + \frac{1-3^4}{4!}x^4 - \dots}{x} = \\ &= -4 + \frac{1-3^2}{2!}x - \frac{1+3^3}{3!}x^2 + \frac{1-3^4}{4!}x^3 - \dots. \end{aligned}$$

Az utóbbi hatványsor minden $x \in \mathbb{R}$ pontban konvergens, és az összegfüggvényének a határértéke 0-ban az összegfüggvény 0-ban vett helyettesítési értéke, vagyis -4 . Ezért

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - e^{3x}}{x} = -4. \blacksquare$$

3. feladat. Határozza meg az

$$f(x) := \begin{cases} \frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 + 3x + 2}, & \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, -2\} \\ 3, & \text{ha } x = -1 \\ 0, & \text{ha } x = -2 \end{cases}$$

függvény szakadási helyeit és azok fajtáját.

Megoldás. Mivel $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$, ezért -1 és -2 a nevező zérushelye. Racionális törtfüggvény az értelmezési tartományának minden pontjában folytonos, ezért f az $\mathbb{R} \setminus \{-1, -2\}$ halmaz minden pontjában folytonos.

Az $a = -1$ és az $a = -2$ pontokban kell még megvizsgálni a függvényt. Ehhez először a következő átalakítást végezzük el:

$$\frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 + 3x + 2} = \frac{(x+1)(x+4)}{(x+1)(x+2)} = \frac{x+4}{x+2} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, -2\}).$$

Legyen $a = -1$. A fentiek alapján

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+4}{x+2} = 3 = f(1),$$

ezért az $a = -1$ pontban az f függvény *folytonos* (itt nincs szakadási helye).

Legyen most $a = -2$. Ekkor

$$\lim_{x \rightarrow -2+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2+0} \frac{x+4}{x+2} = +\infty \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow -2-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2-0} \frac{x+4}{x+2} = -\infty.$$

Az egyoldali határértékek tehát léteznek és különbözőek. Mivel ezek nem végesek, ezért az $a = -2$ pont az f függvénynek *másodfajú szakadási helye*. ■

4. feladat. A *logaritmusazonosságok alkalmazása után számítsa ki az*

$$f(x) := \ln \frac{\sqrt{1+x}}{(x^2+1)^5} \quad (x > -1)$$

függvény deriváltját.

Írja fel a függvény grafikonjának az $x_0 := 0$ abszcisszájú pontjához tartozó érintőegyenestek az egyenletét.

Megoldás. Az f függvény deriválható minden $x > -1$ pontban (l. az elemi függvények deriválására, valamint a műveletek és a deriváltakra vonatkozó állításokat). A logaritmus azonosságait felhasználva azt kapjuk, hogy

$$f(x) = \frac{1}{2} \ln(1+x) - 5 \ln(x^2+1) \quad (x > -1),$$

ezért

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x} \cdot 1 - 5 \cdot \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x = \frac{1}{2(1+x)} - \frac{10x}{x^2+1} \quad (x > -1).$$

Az f függvény grafikonjának $(x_0, f(x_0))$ pontjában az érintőegyenestek egyenlete:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Mivel

$$f(x_0) = f(0) = \ln 1 = 0$$

és

$$f'(x_0) = f'(0) = \frac{1}{2},$$

ezért az érintőegyenestek egyenlete:

$$y = \frac{x}{2}. \quad \blacksquare$$

5. feladat Milyen a és b valós paraméter esetén lesz az egész \mathbb{R} -en differenciálható az

$$f(x) := \begin{cases} ax^2 + 1, & \text{ha } x < 2 \\ x^2 - bx - 3, & \text{ha } x \geq 2 \end{cases}$$

függvény. Adja meg a deriváltfüggvényt is.

Megoldás. Ha $\boxed{x_0 < 2}$, akkor $f \in D\{x_0\}$ és

$$f'(x_0) = 2ax_0$$

minden $a, b \in \mathbb{R}$ paraméter esetén.

Ha $\boxed{x_0 > 2}$, akkor $f \in D\{x_0\}$ és

$$f'(x_0) = 2x_0 - b$$

minden $a, b \in \mathbb{R}$ paraméter esetén.

Legyen $\boxed{x_0 = 2}$. Ahhoz, hogy az f függvény itt deriválható legyen szükséges, hogy f folytonos is legyen ebben a pontban. Nézzük meg f -nek 2-ben a bal- és a jobb oldali határértékét:

$$f(2-0) = \lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-0} (ax^2 + 1) = 4a + 1$$

és

$$f(2+0) = \lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+0} (x^2 - bx - 3) = 1 - 2b = f(2),$$

ezért

$$f \in C\{0\} \iff f(2-0) = f(2+0) = f(2) \iff 4a + 1 = 1 - 2b \iff b = -2a.$$

A deriválhatóság vizsgálatánál most már feltesszük azt, hogy $b = -2a$. A bal oldali derivált 2-ben:

$$\begin{aligned} f'_-(2) &:= \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{(ax^2 + 1) - (1 - 2b)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{ax^2 - 4a}{x - 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{a(x-2)(x+2)}{x-2} = 4a. \end{aligned}$$

A jobb oldali derivált a 2 pontban

$$f'_+(2) = (x^2 - bx - 3)'_{x=2} = (2x - b)_{x=2} = 4 - b = 4 + 2a.$$

Ezért

$$f'_-(2) = f'_+(2) \iff 4a = 4 + 2a \iff a = 2.$$

Így

$$f \in D\{2\} \iff b = -2a \text{ és } a = 2 \iff a = 2 \text{ és } b = -4. \text{ Ekkor } f'(2) = 8.$$

Összefoglalva: Az f függvény pontosan akkor deriválható az egész \mathbb{R} -en, ha $a = 2$ és $b = -4$. Ekkor a deriváltfüggvény

$$f'(x) = \begin{cases} 4x, & \text{ha } x < 2 \\ 8, & \text{ha } x = 2 \\ 2x + 4, & \text{ha } x > 2. \blacksquare \end{cases}$$