

Diszkrét matematika 2.C szakirány

4. előadás

Nagy Gábor
nagygabr@gmail.com
nagy@compalg.inf.elte.hu
compalg.inf.elte.hu/~nagy

Komputeralgebra Tanszék

2016. ősz

Írányított gráfok

Algoritmus (Dijkstra)

A $G = (\psi, E, V, w)$ élsúlyozott irányított gráfról tegyük fel, hogy az élsúlyok pozitívak, $s \in V$ és $T \subset V$.



- (1) Legyen $S = \emptyset$, $H = \{s\}$ és $f(s) = 0$; minden más v csúcsra legyen $f(v) = \infty$.
- (2) Ha $T \subset S$ vagy $H = \emptyset$, akkor az algoritmus véget ér.
- (3) Legyen $t \in H$ egy olyan csúcs, amelyre $f(t)$ minimális. Tegyük át t -t S -be, és minden e élre, aminek kezdőpontja t , végpontja pedig $v \in V \setminus S$ vizsgáljuk meg, hogy teljesül-e $f(t) + w(e) < f(v)$. Ha igen, akkor legyen $f(v) := f(t) + w(e)$, és ha $v \notin H$, tegyük át v -t H -ba. Menjünk (2)-re.

Tétel


A Dijkstra-algoritmus a csúcshalmazon értelmez egy $f: V \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ függvényt, amely $t \in T$ esetén az adott s csúcsból a t csúcsba vezető irányított séták súlyainak a minimuma (∞ , ha nincs ilyen séta).

Írányított gráfok

Példa




$$S = \emptyset, H = \{s\}$$




$$S = \{s\}, H = \{v_1, v_3\}$$

Irányított gráfok


Példa



$$S = \{s, v_3\}$$
$$H = \{v_1, v_2, v_4\}$$



$$\begin{aligned} S &= \{s, v_3, v_4\} \\ H &= \{v_1, v_2\} \end{aligned}$$



$$S = \{s, v_3, v_4, v_1\}$$
$$H = \{v_2\}$$

Írányított gráfok

Bizonyítás

Az S elemszáma szerinti indukcióval megmutatjuk, hogy:

- 1 minden $t \in S$ -re $f(t)$ az s csúsból a t csúcsba vezető irányított séták súlyainak minimuma;
- 2 ha $v \in H$, akkor minden olyan s -ből v -be vezető irányított sétának, amelynek v -n kívül minden csúcsa S -ben van a súlya legalább $f(v)$.

Inicializálás után ezek nyilvánvalóak.

Tegyük fel, hogy (3)-ban $t \in H$ -t választottuk, és tekintsünk egy tetszőleges s -ből t -be vezető irányított sétát, aminek a súlya W , továbbá legyen t' a séta első olyan csúcsa, amely nincs S -ben. A séta s -ből t' -ig vivő részének W' súlyára $W' \leq W$ (Miért?), az indukciós feltevés második része szerint $f(t') \leq W'$, és mivel t -t választottuk $f(t) \leq f(t')$, így $f(t) \leq W$, amivel az állítás első részét beláttuk.

Írányított gráfok

Biz.folyt.

Miután (3)-ban az $f(v)$ értékeket megváltoztattuk, tekintsünk egy s -ből v -be vezető sétát, aminek csak az utolsó csúcsa nincs S -ben, legyen t' az utolsó előtti csúcsa, e pedig az utolsó éle. Mivel $t' \in S$, az s -től t' -ig vezető részséta súlya legalább $f(t')$, így a teljes séta súlya legalább $f(t') + w(e)$, és amikor t' -t bevettük S -be legfeljebb ennyire állítottuk $f(v)$ értékét, azóta pedig csak csökkenhetett.

Síkgráfok

Definíció

Egy G gráfot **síkgráfnak** nevezünk, ha az felrajzolható a síkra anélkül, hogy az éleinek a csúcspontokon kívül lennének közös pontjai. Egy ilyen felrajzolását a G gráf **síkbeli reprezentációjának** is nevezzük.

Megjegyzés

Nem minden gráf ilyen, ellenben minden gráf \mathbb{R}^3 -ben lerajzolható.

Definíció



A G gráf egy síkbeli reprezentációja esetén **tartománynak** nevezzük az élek által határolt síkidomot. Ez nem feltétlenül korlátos, ilyenkor külső tartományról beszélünk, egyébként pedig belső tartományról.

Megjegyzés



Egy belső tartomány valamely másik reprezentációban lehet külső tartomány is, de a tartományok száma nem függ a reprezentációtól.

Síkgráfok

Példa



Példa



Síkgráfok

Tétel (Euler-formula)

Egy $G = (\varphi, E, V)$ összefüggő síkgráf tetszőleges síkbeli reprezentációját tekintve, melyre t jelöli a tartományok számát, teljesül a következő összefüggés.

$$|E| + 2 = |V| + t$$

Bizonyítás (vázlat)

Ha a gráfban van kör, annak egy élét törölve az általa elválasztott két tartomány egyesül, így a tartományok és élek száma is (vagyis az egyenlet mindkét oldala) 1-gyel csökken. Az eljárás ismétlésével fát kapunk, aminek 1 tartománya van, így teljesül rá az összefüggés (Miért?).

Síkgráfok

Állítás

Ha a $G = (\varphi, E, V)$ egyszerű, összefüggő síkgráfra $|V| \geq 3$, akkor

$$|E| \leq 3|V| - 6.$$

Bizonyítás

$|V| = 3$ esetén 2 ilyen gráf van: P_2 és C_3 , amelyekre teljesül az állítás.
 $|V| > 3$ esetén legalább 3 éle van a gráfnak (Miért?). Mivel G egyszerű, ezért minden tartományát legalább 3 él határolja, ezért a tartományok határán végigszámolva az éleket az így kapott érték legalább $3t$. Mivel minden él legfeljebb két tartományt választ el, ezért $3t \leq 2|E|$. Az Euler-formulát használva $3(|E| + 2 - |V|) \leq 2|E|$, amiből kapjuk az állítást.

Megjegyzés

A becslés nem összefüggő síkgráfok esetén is teljesül, hiszen élek hozzávételével összefüggő síkgráfot kaphatunk.

Síkgráfok

Állítás

Ha $G = (\varphi, E, V)$ egyszerű síkgráf, akkor

$$\delta = \min_{v \in V} d(v) \leq 5.$$

Bizonyítás

Feltehető, hogy $|V| \geq 3$ (Miért?).

Indirekt tfh. $\delta \geq 6$. Ekkor $6|V| \leq 2|E|$ (Miért?), továbbá az előző állítást használva $2|E| \leq 6|V| - 12$, vagyis $6|V| \leq 6|V| - 12$, ami ellentmondás.

Síkgráfok

Állítás

$K_{3,3}$ nem síkgráf.

Bizonyítás

Indirekt tfh. $K_{3,3}$ síkgráf, és jelöljük t -vel a síkbeli reprezentációiban a tartományok számát. Ekkor $|E| = 9$ és $|V| = 6$ miatt az Euler-formula alapján $t = 5$. Mivel egyszerű, páros gráf, így minden tartomány határa legalább 4 élt tartalmaz (Miért?), és minden él legfeljebb két tartomány határán van, ezért $4t \leq 2|E|$, amiből $20 \leq 18$ adódik, ami ellentmondás.

Állítás

K_5 nem síkgráf.

Bizonyítás




Indirekt tfh. K_5 síkgráf. $|E| = 10$ és $|V| = 5$, így az élszámra vonatkozó becslés alapján $10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 9$, ami ellentmondás.

Síkgráfok

Definíció

A G és G' gráfokat **topologikusan izomorf** nevezünk, ha az alábbi lépést, illetve a fordítottját alkalmazva, véges sok lépésben az egyikből a másikkal izomorf gráfot kaphatunk: egy másodfokú csúcsot törölünk, és a szomszédjait összekötjük egy éllel.

Példa



Tétel (Kuratowski) (NB)

Egy egyszerű gráf pontosan akkor síkgráf, ha nincs olyan részgráfja, ami topologikusan izomorf K_5 -tel vagy $K_{3,3}$ -mal.

Gráfok színezése

Szeretnénk egy térképet kiszínezni úgy, hogy a szomszédos régiók különböző színűek legyenek.

A probléma megközelítése gráfokkal: a régióknak felelnek meg a csúcsok. Két csúcs szomszédos, ha a megfelelő régióknak van közös határvonala. A térképnek megfelelő gráf síkgráf lesz.

Tétel (Négyszíntétel) (NB)

Minden síkgráf 4 színnel színezhető.

Megjegyzés

1976-ban bizonyította Appel és Haken. Ez volt az első nevezetes sejtés, aminek a bizonyításához számítógépet is használtak. 1936 lehetséges ellenpéldát ellenőriztek, 1200 órán keresztül futott a program.

Gráfok színezése

Definíció

Egy gráf egy csúcsszínezését **jólszínezésnek** nevezzük, ha a szomszédos csúcsok színe különböző.

Definíció

Egy gráf **kromatikus száma** az a legkisebb n természetes szám, amelyre jólszínezhető n színnel.

Megjegyzés

A kromatikus szám pontosan akkor **1**, ha nincs éle a gráfnak, és ha **2** a kromatikus szám, akkor a gráf páros. A síkgráfok kromatikus száma legfeljebb **4**.

Gráfok mátrixai


Definíció

Ha egy $G = (\psi, E, V)$ irányított gráf élei e_1, e_2, \dots, e_n , csúcsai pedig v_1, v_2, \dots, v_m , akkor az alábbi **illeszkedési mátrix** (vagy **élmátrix**) egyértelműen megadja a gráfot:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & , \text{ ha } e_j\text{-nek } v_i \text{ kezdőpontja;} \\ -1 & , \text{ ha } e_j \text{ nem hurokél, és } v_i \text{ a végpontja;} \\ 0 & , \text{ egyébként.} \end{cases}$$

A megfelelő irányítatlan gráf élmátrixa az $|a_{ij}|$ elemekből áll.

Példa



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Gráfok mátrixai


Definíció

A G irányított gráf **csúcsmátrixában** legyen b_{ij} a v_i kezdőpontú és v_j végpontú élek száma.

A megfelelő irányítatlan gráf csúcsmátrixának elemeire:

$$b_{ij} = \begin{cases} \text{a } v_i\text{-re illeszkedő hurokélek száma} & , \text{ ha } i = j; \\ \text{a } v_i\text{-re és } v_j\text{-re is illeszkedő élek száma} & , \text{ egyébként.} \end{cases}$$

Példa




$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Prüfer-kód

Definíció

Legyen adott egy $F = (\varphi, E, V, w)$ csúcscímkezett fa, az egyes csúcsok címkéi 1 és n közötti különböző egész számok, ahol $n = |V|$. Töröljük az elsőfokú csúcsok közül a legkisebb sorszámút, és írjuk fel ennek szomszédjának a számát. A kapott fára (Miért fa?) folytassuk az eljárást, amíg már csak egy csúcs marad, mégpedig az n címkéjű (Miért?). A sorozat $n - 1$ -edik tagja szükségképpen n , ezért ez elhagyható. A kapott $n - 2$ hosszú sorozat az F fa **Prüfer-kódja**.

Példa



A Prüfer-kód: 4546545(9).

Prüfer-kód

Algoritmus (Prüfer-kódból fa készítése)

Legyen a Prüfer-kód $p_1, p_2, \dots, p_{n-2}, p_{n-1} = n$. Legyen a kódban nem szereplő legkisebb sorszám s_1 . Ha s_i -t már meghatároztuk, akkor legyen s_{i+1} az a legkisebb sorszám, amely különbözik az alábbiaktól:

$s_1, s_2, \dots, s_i; p_{i+1}, p_{i+2}, \dots, p_{n-2}, p_{n-1} = n$. Ilyennek mindig lennie kell, mert n lehetőségből legfeljebb $n-1$ számút nem engedünk meg. Az n csúcsot tartalmazó üres gráfból kiindulva minden i -re ($1 \leq i \leq n-1$) megrajzoljuk az s_i és p_i csúcsokra illeszkedő élt.

Prüfer-kód

45465459 1;5465459 12;465459 123;65459 1237;5459 12376;459 123768;59 1237684;9

Példa

