

Incontinencia fecal y de gases

Guía de cuidados y ejercicios · Información para la paciente

Cuesta hablar de ello, pero tiene tratamiento. Regular las heces, el hábito y la musculatura mejora el control. Da el primer paso.

¿Qué es?

La incontinencia anal es la **dificultad para controlar las heces o los gases**. Es más frecuente de lo que se piensa y, aunque cueste hablar de ella, tiene tratamiento. Suele deberse a un debilitamiento o lesión de los músculos del esfínter y del suelo pélvico.

Buena noticia: regular la consistencia de las heces, reeducar el hábito y fortalecer la musculatura mejora el control en gran parte de los casos.

Regula tus heces y tu hábito intestinal

- **Consigue una consistencia adecuada:** ni heces muy duras ni muy líquidas. Ajusta la fibra y los líquidos; si las heces son demasiado blandas, tu médico puede valorar fibra soluble u otras medidas.
- **Horario regular:** intenta defecar siempre a una hora similar, aprovechando el reflejo tras las comidas.
- **No te aguantes** cuando notes la necesidad, pero **tampoco fuerces**.
- **Postura correcta:** rodillas más altas que las caderas (taburete), tronco inclinado hacia delante y exhala soplando, sin apretar en apnea.
- Identifica y reduce los **alimentos que te disparan los gases o la diarrea** (caféina, picantes, exceso de grasa, edulcorantes).

Ejercicios del esfínter y suelo pélvico

Refuerzan el esfínter anal y mejoran el control. Empieza **tumbada boca arriba, con las rodillas flexionadas**; más adelante, sentada o de pie. Aprieta **como para retener un gas**, cerrando y elevando el ano hacia dentro, sin contraer glúteos ni abdomen.

Ejercicio 1 · lento

Cierra y eleva el ano, contrae 5 s soltando el aire, y **descansa 10 s**. El descanso es tan importante como la contracción.
10 repeticiones

Ejercicio 2 · rápido

Aprieta el esfínter 1 s y descansa 1 s, con un ritmo claro.
10 repeticiones

Frecuencia

Ambos ejercicios 2-3 veces/día. Suelta el aire al contraer y no contengas la respiración.
2-3 veces/día

Anticipa el escape: si notas que va a salir un gas o ante un esfuerzo, **contrae el esfínter con fuerza unos segundos** hasta que pase la sensación.

Medidas generales: hábitos que cuidan tu suelo pélvico

- **Controla tu peso:** dieta rica en fruta, verdura, cereales y legumbres. El sobrepeso añade presión sobre el suelo pélvico.
- **Reduce los irritantes de la vejiga:** café, té, alcohol, chocolate, comidas picantes o grasas.
- **Bebe con moderación:** entre 1,5 y 2 litros al día, repartidos; reduce la ingesta 3-4 horas antes de acostarte.
- **Combate el estreñimiento** con dieta equilibrada y abundante fibra.
- **No fumes:** el humo irrita la vejiga y la tos crónica debilita el suelo pélvico.
- **Ejercicio de bajo impacto** (natación, elíptica, bici de paseo, hipopresivos, o un paseo diario de media hora); evita los deportes de impacto (correr, crossfit, spinning). El Pilates, solo dirigido por un experto.
- **Postura correcta al defecar:** rodillas por encima del nivel de las caderas, codos sobre las rodillas, y exhala lentamente por la boca sin apretar en apnea.
- **Higiene íntima:** lávate solo con agua separando bien los labios, y de delante hacia atrás para evitar infecciones.
- **Evita la ropa que oprima el abdomen** y no abusos del tacán.
- **Revisa tu medicación** con tu médico (antihipertensivos, diuréticos, tranquilizantes) por si conviene ajustar dosis u horarios.

! Cuándo consultar

- ! Pérdida de control nueva o que empeora, sobre todo tras un parto con desgarro.
- ! Sangre en las heces, dolor o cambios persistentes del ritmo intestinal.
- ! El control no mejora pese a las medidas (valora fisioterapia de suelo pélvico y biofeedback).

Recupera el control y la confianza: el primer paso lo das tú.

Elaborado a partir de guías de práctica clínica (NICE NG123, ICS, EAU) y material de la Unidad de Suelo Pélvico. Ejercicios estándar de fisioterapia del suelo pélvico. Pendiente de revisión clínica.