

Incontinencia urinaria mixta

Esfuerzo + urgencia · Guía de cuidados · Información para la paciente

Tienes dos frentes que se tratan a la vez: fortalecer el suelo pélvico y reeducar la vejiga. Con constancia, ambos mejoran.

¿Qué es?

La incontinencia mixta **combina los escapes de esfuerzo** (al toser, reír o cargar peso) **con la urgencia** (necesidad repentina de orinar). El tratamiento aborda los dos componentes a la vez.

Buena noticia: trabajar el suelo pélvico y reeducar la vejiga mejora ambos problemas. Empieza por el síntoma que más te moleste, sin descuidar el otro.

Ejercicios del suelo pélvico (Kegel)

Una vez localizada la musculatura, empieza **tumbada boca arriba, con las rodillas flexionadas** y los pies apoyados. Más adelante podrás hacerlos sentada o de pie. La contracción es **hacia dentro y en sentido ascendente**, como para **aguantar la orina y un gas a la vez**.

Ejercicio 1 · lento

Contrae 5 s soltando el aire por la boca y **descansa 10 s**. El descanso es tan importante como la contracción.
10 repeticiones

Ejercicio 2 · rápido

Contrae 1 s y descansa 1 s, con un ritmo claro de "activar y soltar".
10 repeticiones

Frecuencia y progresión

Ambos ejercicios 2-3 veces/día. Con soltura, alarga la contracción del lento y sube las repeticiones del rápido.
2-3 veces/día

Claves para hacerlos bien

- **Suelta el aire al contraer** y nunca contengas la respiración.
- **Respetar el descanso** tras cada contracción: si no, puedes sobrecargar la musculatura y empeorar los síntomas.
- **No aprietes** la barriga, las piernas ni los glúteos.
- Cuando los domines, intégralos en el día a día: en el transporte, en una cola o viendo el móvil o la tele.

Truco protector ("the knack"): contrae el suelo pélvico **justo antes** de toser, estornudar, reír o levantar peso. Da soporte extra y reduce los escapes.

Controla la urgencia (vejiga hiperactiva)

La vejiga hiperactiva es muy frecuente: más de 1.000 millones de personas la padecen en el mundo. No te avergüences y ten paciencia, porque la mejoría llega tras unas semanas.

Cuando te entren ganas urgentes de orinar, detén la actividad y:

- **Quédate quieta** y respira lentamente; si estás tranquila, es más fácil controlar la vejiga.
- **Contrae los músculos del suelo pélvico** varias veces.
- **Concéntrate y cuenta hasta 100**; cuando ceda la urgencia, ve **despacio** al baño, sin correr.

Micción programada: orina cada 30 minutos al principio y, sucesivamente, espacia hasta 60 y 90 minutos, con el objetivo de alcanzar intervalos de 2 horas y media entre micciones.



Reeducación de la vejiga (entrenamiento vesical)

El objetivo es **reeducar la vejiga para recuperar el control**. La clave es orinar con un horario fijo, con puntualidad, sin adelantarse ni retrasarse aunque sean solo 5 minutos.

- Levántate y acuéstate más o menos a la misma hora, y **orina nada más levantarte**.
- Acude al baño según el intervalo indicado, tengas o no ganas; empieza por la pauta que mejor se adapte a tu ritmo para no tener que correr.
- Cada semana **espacia las micciones 15 minutos** hasta llegar a un intervalo de 2-3 horas.
- Hazlo con puntualidad: si te entran ganas antes de tiempo, es preferible **aplazar o mojar la compresa que alterar el horario**.
- Si notas urgencia, **siéntate, quédate quieta y distráete** (contrae el suelo pélvico, cuenta números, piensa en la lista de la compra) hasta que pase.

1.ª sem	2.ª sem	3.ª sem	4.ª sem	5.ª sem	6.ª sem	7.ª sem	8.ª sem
30 min	45 min	1 h	1 h 15	1 h 30	1 h 45	2 h	progresar hasta 3 h



Medidas generales: hábitos que cuidan tu suelo pélvico

- **Controla tu peso:** dieta rica en fruta, verdura, cereales y legumbres. El sobrepeso añade presión sobre el suelo pélvico.
- **Reduce los irritantes de la vejiga:** café, té, alcohol, chocolate, comidas picantes o grasas.
- **Bebe con moderación:** entre 1,5 y 2 litros al día, repartidos; reduce la ingesta 3-4 horas antes de acostarte.
- **Combate el estreñimiento** con dieta equilibrada y abundante fibra.
- **No fumes:** el humo irrita la vejiga y la tos crónica debilita el suelo pélvico.
- **Ejercicio de bajo impacto** (natación, elíptica, bici de paseo, hipopresivos, o un paseo diario de media hora); evita los deportes de impacto (correr, crossfit, spinning). El Pilates, solo dirigido por un experto.
- **Postura correcta al defecar:** rodillas por encima del nivel de las caderas, codos sobre las rodillas, y exhala lentamente por la boca sin apretar en apnea.
- **Higiene íntima:** lávate solo con agua separando bien los labios, y de delante hacia atrás para evitar infecciones.
- **Evita la ropa que oprima el abdomen** y no abusos del tacón.
- **Revisa tu medicación** con tu médico (antihipertensivos, diuréticos, tranquilizantes) por si conviene ajustar dosis u horarios.



Cuándo consultar

- ! Los escapes o la urgencia no mejoran tras varias semanas.
- ! Escozor, dolor al orinar o sangre en la orina.
- ! Dudas sobre la técnica de los ejercicios (valora fisioterapia de suelo pélvico).

Recupera el control y la confianza: el primer paso lo das tú.

Elaborado a partir de guías de práctica clínica (NICE NG123, ICS, EAU) y material de la Unidad de Suelo Pélvico. Ejercicios estándar de fisioterapia del suelo pélvico. Pendiente de revisión clínica.