INFORME DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 (MMPI-2)

1. Ficha de identificación

Evaluado	Ejemplo ficticio de contraste	**Documento de identidad**	DEMO-001
Fecha de nacimiento	15 de octubre de 1980	**Edad en la aplicación**	46
Sexo normativo	Mujer	**Fecha de aplicación**	3 de noviembre de 2026
Fecha del informe	11 de noviembre de 2026	**Modalidad de aplicación**	Excel
Contexto de evaluación	Clínico	**Evaluador**	Profesional ficticio

2. Motivo y objetivo de la evaluación

Solicitud sintética

3. Antecedentes

Historia documental ficticia de seguimiento, con evolución de las dificultades y apoyos disponibles.

4. Técnica, fuentes y control de calidad

Instrumento de autoinforme de 567 ítems. Referencia normativa seleccionada: Estados Unidos · Minnesota.

Las puntuaciones T se interpretan frente al grupo de referencia. T = 50 es el centro de la escala. En este informe, los rangos descriptivos son Bajo (<=39), Habitual (40–55), Promedio superior (56–59), Alto (60–69) y Muy alto (>=70). Los indicadores de validez conservan sus propios criterios.

5. Examen mental y observación conductual

No consta

6. Validez y estilo de respuesta

Tabla 1. Escalas de validez · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T
VRIN	Inconsistencia de respuestas variables	7	—	46	Habitual
TRIN	Inconsistencia de respuestas verdadero	11	—	65V	Alto
F	Infrecuencia	13	—	82	Muy alto
Fb	Infrecuencia posterior	16	—	85	Muy alto
Fp	Infrecuencia psicopatológica	3	—	65	Alto
L	Mentira	5	—	57	Promedio superior
K	Corrección	19	—	59	Promedio superior
S	Autopresentación superlativa	25	—	49	Habitual

> INTERPRETACIÓN. Inconsistencia de respuestas variables (VRIN, T = 46). Respuestas coherentes entre afirmaciones de contenido similar u opuesto, sin inconsistencia relevante. Inconsistencia de respuestas verdadero (TRIN, T = 65V). Leve predominio de respuestas «Verdadero», sin alcanzar el umbral de inconsistencia relevante. Infrecuencia (F, T = 82). Reconocimiento muy elevado de experiencias poco frecuentes, compatible con malestar intenso o intensificación de síntomas. Infrecuencia posterior (Fb, T = 85). Respuestas poco frecuentes muy elevadas en la parte final del cuestionario, compatibles con malestar intenso o cambios en la forma de responder. Infrecuencia psicopatológica (Fp, T = 65). Sin elevación relevante de experiencias que son raras incluso en población clínica. Mentira (L, T = 57). Reconocimiento de faltas o dificultades cotidianas sin una presentación favorable marcada. Corrección (K, T = 59). Presentación de las dificultades dentro de límites habituales, sin elevación defensiva marcada. Autopresentación superlativa (S, T = 49). Autodescripción positiva dentro de límites habituales, sin idealización marcada de la propia imagen.

Omisiones registradas: 0. Índice F - K (PD): -6.

Lectura del protocolo: interpretable con cautela.

- La infrecuencia elevada puede reflejar malestar intenso o intensificación de síntomas; por sí sola no establece simulación.




Figura 1. Perfil de escalas de validez.

Hay contenidos que requieren indagación clínica directa de seguridad. Documente vigencia, intención, medios y apoyos.

7. Escalas clínicas básicas

Tabla 2. Escalas clínicas básicas · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T
Hs	Hipocondría	17	27	80	Muy alto
D	Depresión	27	—	64	Alto
Hy	Histeria de conversión	37	—	84	Muy alto
Pd	Desviación psicopática	20	28	63	Alto
Mf	Masculinidad–feminidad	29	—	67	Alto
Pa	Paranoia	15	—	67	Alto
Pt	Psicastenia	20	39	72	Muy alto
Sc	Esquizofrenia	29	48	84	Muy alto
Ma	Hipomanía	25	29	76	Muy alto
Si	Introversión social	27	—	50	Habitual

INTERPRETACIÓN. En las escalas clínicas básicas, 6 escalas de contenido clínico presentan T >=65. Mf se interpreta por separado en intereses y roles, sin clasificarla como elevación psicopatológica. La elevación marcada de Histeria de conversión (Hy, T = 84) describe una tendencia a reaccionar al estrés con síntomas físicos, uso de la negación como defensa, necesidad marcada de aprobación y afecto, y escasa conciencia de los propios conflictos emocionales. Esquizofrenia (Sc, T = 84) sugiere sentimientos de alienación y de ser diferente, aislamiento, dificultades de concentración y memoria, confusión y, en elevaciones altas, experiencias inusuales de pensamiento o percepción; en situaciones de estrés intenso puede reflejar desorganización emocional más que un proceso psicótico. Hipocondría (Hs, T = 80) señala preocupación excesiva por el funcionamiento corporal, quejas físicas múltiples y poco específicas, y tendencia a expresar el malestar psicológico a través de síntomas somáticos. Hipomanía (Ma, T = 76) apunta a un nivel elevado de energía y actividad, aceleración, irritabilidad, impulsividad y baja tolerancia a la frustración. Psicastenia (Pt, T = 72) refleja ansiedad, tensión, preocupación constante, rumiación, inseguridad, autoexigencia elevada y sentimientos de culpa, con dificultad para concentrarse y tomar decisiones. Masculinidad–feminidad (Mf, T = 67) describe un patrón de intereses que se aparta de los roles tradicionalmente atribuidos a lo femenino, con un estilo directo, práctico y orientado a la acción; esta escala no mide psicopatología. Paranoia (Pa, T = 67) sugiere suspicacia, hipersensibilidad a la crítica, sensación de ser tratada injustamente y tendencia a atribuir intenciones hostiles a los demás; en elevaciones marcadas conviene explorar ideación de referencia o persecutoria. En rango moderado (T 60–64) se ubican Depresión (D, T = 64; ánimo bajo, desánimo y pesimismo) y Desviación psicopática (Pd, T = 63; insatisfacción, conflicto con normas y alienación), lo que indica tendencias que conviene contrastar en la entrevista. La escala restante se mantiene dentro del rango esperado (T 40–59). Excluidas Mf y Si, que no se consideran en la codificación, el código de dos puntos es 3-8 (Hy-Sc), asociado en la literatura a malestar psicológico con quejas somáticas, confusión y dificultades de concentración. El código no está bien definido, porque la tercera escala (Hs, T = 80) dista menos de cinco puntos de la segunda; por ello, las descripciones del código deben leerse junto con las de esa escala.




Figura 2. Perfil de escalas clínicas básicas.

8. Escalas de contenido

Tabla 3. Escalas de contenido · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T
ANX	Ansiedad	7	—	51	Habitual
FRS	Miedos	8	—	53	Habitual
OBS	Obsesividad	10	—	**63**	**Alto**
DEP	Depresión (contenido)	10	—	58	Promedio superior
HEA	Preocupaciones por la salud	20	—	**77**	**Muy alto**
BIZ	Pensamiento extravagante	7	—	**67**	**Alto**
ANG	Enojo	10	—	**64**	**Alto**
CYN	Cinismo	11	—	53	Habitual
ASP	Prácticas antisociales	9	—	56	Promedio superior
TPA	Comportamiento tipo A	9	—	53	Habitual
LSE	Baja autoestima	13	—	**68**	**Alto**
SOD	Malestar social	9	—	52	Habitual
FAM	Problemas familiares	9	—	57	Promedio superior
WRK	Interferencia laboral	15	—	**61**	**Alto**
TRT	Indicadores negativos de tratamiento	9	—	59	Promedio superior

INTERPRETACIÓN. En las escalas de contenido, 3 escalas alcanzan un nivel clínicamente significativo (T >= 65). La elevación marcada de Preocupaciones por la salud (HEA, T = 77) describe numerosas preocupaciones por la salud y síntomas físicos en distintos sistemas corporales. Baja autoestima (LSE, T = 68) sugiere baja autoestima, autoconcepto negativo e inseguridad respecto de las propias capacidades. Pensamiento extravagante (BIZ, T = 67) señala experiencias de pensamiento o percepción extrañas o inusuales que conviene explorar clínicamente. En rango moderado (T 60–64) se ubican Enojo (ANG, T = 64; dificultad para controlar la ira), Obsesividad (OBS, T = 63; rumiación e indecisión) e Interferencia laboral (WRK, T = 61; dificultades que afectan el desempeño laboral), lo que indica tendencias que conviene contrastar en la entrevista. Las 9 escalas restantes se mantienen dentro del rango esperado (T 40–59).




Figura 3. Perfil de escalas de contenido.

9. Escalas suplementarias y PSY-5

Tabla 4. Escalas suplementarias · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T
A	Ansiedad (Welsh)	14	—	53	Habitual
R	Represión	21	—	**62**	**Alto**
Es	Fuerza del yo	22	—	**<=30**	**Bajo**
MAC-R	Alcoholismo de MacAndrew revisada	23	—	**61**	**Alto**
AAS	Reconocimiento de adicción	5	—	**67**	**Alto**
APS	Potencial de adicción	21	—	44	Habitual
MDS	Malestar marital	5	—	59	Promedio superior
Ho	Hostilidad	22	—	56	Promedio superior
O-H	Hostilidad sobrecontrolada	13	—	48	Habitual
Do	Dominancia	17	—	53	Habitual
Re	Responsabilidad social	16	—	**35**	**Bajo**
Mt	Desajuste profesional	19	—	**60**	**Alto**
GM	Rol de género masculino	25	—	44	Habitual
GF	Rol de género femenino	23	—	40	Habitual
PK	Estrés postraumático (Keane)	17	—	**63**	**Alto**

Es: <=30 corresponde al límite inferior de reporte de la referencia estadounidense. La figura sitúa el resultado en T 30 y conserva el signo <=. La puntuación se clasifica en rango Bajo.

INTERPRETACIÓN. En las escalas suplementarias, una escala alcanza un nivel clínicamente significativo (T >= 65). La elevación de Reconocimiento de adicción (AAS, T = 67) describe reconocimiento abierto de problemas relacionados con el consumo de alcohol u otras sustancias. En rango moderado (T 60–64) se ubican Estrés postraumático (Keane) (PK, T = 63; malestar asociado a vivencias estresantes), Represión (R, T = 62; estilo inhibido y sobrecontrolado), Alcoholismo de MacAndrew revisada (MAC-R, T = 61; rasgos asociados al riesgo de consumo) y Desajuste profesional (Mt, T = 60; ineficacia y malestar ante las demandas), lo que indica tendencias que conviene contrastar en la entrevista. La puntuación baja en Fuerza del yo (Es, T = <=30) indica recursos de afrontamiento percibidos reducidos y sensación de vulnerabilidad ante el estrés actual. La puntuación baja en Responsabilidad social (Re, T = 35) indica menor compromiso con normas y responsabilidades sociales. Las 8 escalas restantes se mantienen dentro del rango esperado (T 40–59).




Figura 4. Perfil de escalas suplementarias. Es: <=30.

Personalidad PSY-5

Tabla 5. Dimensiones PSY-5 · puntuaciones directas (PD), corregidas por K (PD+K) y típicas (T)

Escala	Nombre	PD	PD+K	T	Rango de T
AGGR	Agresividad	9	—	57	Promedio superior
PSYC	Psicoticismo	2	—	46	Habitual
DISC	Falta de control	15	—	**63**	**Alto**
NEGE	Emocionalidad negativa	11	—	49	Habitual
INTR	Introversión/Baja emocionalidad positiva	12	—	53	Habitual

INTERPRETACIÓN. Ninguna de las escalas de personalidad psicopatológica (PSY-5) alcanza un nivel clínicamente significativo (T >= 65). En rango moderado (T 60–64) se ubica Falta de control (DISC, T = 63; desinhibición e impulsividad), lo que indica una tendencia que conviene contrastar en la entrevista. Las 4 escalas restantes se mantienen dentro del rango esperado (T 40–59).




Figura 5. Perfil de dimensiones psy-5.

10. Ítems críticos

Tabla 6. Síntesis de contenidos críticos por tema

Área	Ítems y respuestas	Paráfrasis temática
Ansiedad y activación	2F, 10F, 28V, 59V, 172V, 223F, 463V	Tensión o activación ansiosa.
Atención y experiencias inusuales	96V, 124V, 299V, 311V, 314F, 333V	Dificultades percibidas de atención o confusión. Percepción de amenaza o desconfianza.
Consumo de sustancias	125F, 487V, 489V, 502V	Impacto del consumo de alcohol.
Estado de ánimo y seguridad	9F, 65V, 71V, 75F, 95F, 146V, 388F 411V, 485V, 506V	Malestar depresivo o contenido relacionado con la seguridad. Aclarar su vigencia.
Ira y convivencia	85V, 134V, 389V	Ira o conducta que requiere indagación sobre seguridad interpersonal.

Los contenidos críticos orientan preguntas de entrevista. La valoración actual del riesgo requiere evaluación directa.

11. Integración clínica

Distribución e intensidad de las elevaciones

> INTERPRETACIÓN. De las 40 escalas sustantivas con puntuación T (clínicas, de contenido, suplementarias y subescalas), 6 se sitúan en rango muy alto (T >= 70), 14 en rango alto (T 60–69) y 2 en rango bajo (T <= 39); el resto se mantiene en rangos medios. La mayor proporción de elevaciones se concentra en las escalas clínicas básicas (9 de 10), lo que indica dónde se localiza con más claridad el malestar autoinformado. En las subescalas no se observan elevaciones (T >= 60).

> INTERPRETACIÓN. Las 10 escalas con elevación clínicamente significativa se agrupan en 5 áreas de funcionamiento. La de mayor intensidad corresponde al área somática (Hy, T = 84; Hs, T = 80; HEA, T = 77). Le siguen, por orden de intensidad, el funcionamiento cognitivo y perceptivo (Sc, T = 84; BIZ, T = 67), la regulación de la conducta y los impulsos (Ma, T = 76; AAS, T = 67), el área emocional (Pt, T = 72; LSE, T = 68) y las relaciones interpersonales (Pa, T = 67). La convergencia de varias escalas en una misma área aumenta la solidez de la hipótesis; las elevaciones aisladas requieren mayor contraste con la entrevista y otras fuentes.

Configuración del perfil clínico

Excluidas Mf y Si, que no se consideran en la codificación, el código de dos puntos es 3-8 (Hy-Sc), asociado en la literatura a malestar psicológico con quejas somáticas, confusión y dificultades de concentración. El código no está bien definido, porque la tercera escala (Hs, T = 80) dista menos de cinco puntos de la segunda; por ello, las descripciones del código deben leerse junto con las de esa escala.

V de conversión: Hipocondría e Histeria elevadas por encima de Depresión: tendencia a expresar el malestar en síntomas físicos con menor reconocimiento del componente emocional.

Elevación conjunta de Paranoia y Esquizofrenia: Suspicacia y posible alteración del pensamiento: valorar ideación paranoide.

Elevación conjunta de Psicastenia y Esquizofrenia: Malestar intenso, rumiación, inseguridad y dificultades de concentración; con Pt próxima o superior a Sc predomina el componente ansioso.

12. Recursos y fortalezas

No constan fortalezas documentadas en entrevista ni elevaciones en las escalas de recursos seleccionadas.

13. Contraste longitudinal

Aplicación anterior del 27 de mayo de 2026.

Fuente anterior: Profesional de prueba.

Tabla 7. Puntuaciones anteriores y actuales documentadas

Escala	Puntuación anterior	T actual	Diferencia T	Lectura
VRIN	76	46	—	Contraste documental; sexo normativo anterior sin confirmar
TRIN	50	65V	—	Contraste documental; sexo normativo anterior sin confirmar
Fb	96	85	—	Contraste documental; sexo normativo anterior sin confirmar
Mf	56	67	—	Contraste documental; sexo normativo anterior sin confirmar

Se conservan las puntuaciones previas tal como se documentaron. La diferencia T requiere el mismo baremo, sexo normativo, clave y fuente de corrección.

Las diferencias son descriptivas. Los valores aproximados, pendientes o con límites no se restan.

Se contrastan 4 escalas documentadas del registro anterior con el actual. La comparación disponible es documental: se conservan los valores publicados y la interpretación de cambio clínico permanece pendiente.

Validez y estilo de respuesta. VRIN: T anterior 76 y T actual 46; TRIN: T anterior 50 y T actual 65V; Fb: T anterior 96 y T actual 85.

Escalas clínicas. Mf: T anterior 56 y T actual 67.

La consistencia actual se describe mediante VRIN: el registro actual presenta respuestas coherentes

entre afirmaciones de contenido similar u opuesto. La diferencia entre los valores publicados de ambas fechas requiere confirmar las condiciones y referencias antes de interpretarse como cambio.

Aspectos pendientes de comparabilidad: sexo normativo anterior sin confirmar; versión, clave y fuente de corrección sin confirmar; dirección de trin no coincidente o no documentada. La gráfica muestra las puntuaciones T publicadas en su escala original. Sus diferencias visuales no establecen mejoría, deterioro ni equivalencia normativa.




Figura 6. Contraste documental de T publicadas · comparabilidad pendiente.

14. Impresión diagnóstica (tentativa)

No consta entrevista clínica suficiente para formular una impresión diagnóstica tentativa.

15. Limitaciones de la evaluación

La aplicabilidad de la referencia normativa seleccionada depende de la población y de las condiciones de aplicación.

Entrevista clínica suficiente pendiente de documentar.

16. Conclusiones

En la presente evaluación en contexto clínico, la evaluada respondió el inventario de forma coherente y atenta al contenido de las preguntas, con apertura para reconocer malestar y una tendencia a acentuar su intensidad que puede expresar sufrimiento elevado o una necesidad de ser escuchada, motivo por el cual la magnitud de algunos hallazgos debe ponderarse con prudencia. El hallazgo más prominente se sitúa en el área somática, donde el perfil describe, con una intensidad marcada, síntomas físicos que se intensifican en momentos de tensión, una preocupación persistente por la salud física, quejas corporales diversas y poco específicas y una tendencia a canalizar el malestar emocional a través del cuerpo.

En las relaciones interpersonales se aprecia, de forma igualmente acusada, una necesidad intensa de aprobación y afecto, sentimientos de alienación y distancia respecto de los demás, desconfianza e hipersensibilidad a la crítica e insatisfacción y resentimiento en sus vínculos cercanos. Respecto del funcionamiento cognitivo y perceptivo, las respuestas reflejan, con nitidez, sensación de confusión y dificultad para organizar el pensamiento, una tendencia a interpretar la conducta ajena como hostil y experiencias de pensamiento o percepción inusuales.

En cuanto a la regulación de la conducta y los impulsos, destaca, con claridad, aceleración, irritabilidad e impulsividad, reconocimiento de problemas relacionados con el consumo, irritabilidad y dificultad para modular el enojo y dificultad para ajustarse a normas y exigencias externas. A ello se suma, en el área emocional, ansiedad, tensión y preocupación persistente, rumiación, autoexigencia y sentimientos de culpa, autoestima disminuida e inseguridad personal y ánimo decaído y pesimismo. La coexistencia de quejas corporales y malestar emocional sugiere que la tensión psicológica se vive en buena medida a través del cuerpo, de forma que ambos planos tienden a reforzarse. Las vivencias de confusión o extrañeza pueden corresponder al desbordamiento emocional que acompaña al malestar; su naturaleza y alcance deben precisarse en la entrevista clínica.

En menor grado, aparecen malestar compatible con vivencias estresantes o traumáticas y dificultades que interfieren con el desempeño laboral. En su estilo de personalidad se reconoce poca conciencia de los propios conflictos emocionales, un estilo directo y práctico, poco ajustado a los roles de género tradicionales y un estilo inhibido, convencional y sobrecontrolado. No se identifican indicadores de conflicto familiar. De cara a la intervención, conviene considerar la presencia de recursos de afrontamiento debilitados frente al estrés, lo que hace aconsejable cuidar especialmente la alianza de trabajo y el encuadre de objetivos alcanzables.

Estos resultados describen cómo la persona se percibe y se presenta en el momento de la evaluación; su alcance diagnóstico depende de su integración con la entrevista clínica, la historia personal y la información de otras fuentes. Pese a que las medidas de ánimo no muestran elevación, reconoció pensamientos de contenido suicida que, por su gravedad potencial, requieren una valoración directa del riesgo; esa discrepancia no reduce su relevancia y debe esclarecerse en entrevista.

Entre las afirmaciones de mayor relevancia clínica que reconoció destacan las relativas a estado de ansiedad aguda, ideación suicida depresiva, amenaza de ataque, estrés ocasionado por el alcoholismo y confusión mental, que conviene explorar en entrevista.

17. Recomendaciones

- Realizar una valoración directa y estructurada del riesgo suicida (ideación, plan, intentos previos, acceso a medios y factores protectores), dado el reconocimiento de ítems críticos de contenido suicida, y documentar sus resultados.
- Explorar antecedentes de conducta agresiva y control de impulsos, contrastando con fuentes colaterales, a partir de los ítems críticos de amenaza de ataque reconocidos.
- Contrastar las elevaciones con la entrevista clínica, la historia documentada y otras fuentes, dado el estilo de respuesta observado.
- Coordinar con medicina para descartar o precisar la base orgánica de las quejas físicas y evitar exploraciones redundantes; considerar intervenciones dirigidas a la relación entre estrés y síntomas corporales.
- Valorar la ansiedad y la rumiación con medidas específicas; las intervenciones cognitivo-conductuales y de regulación emocional suelen ser pertinentes.
- Explorar en entrevista la calidad del pensamiento, la concentración y las experiencias perceptivas, para diferenciar desorganización por estrés intenso de alteraciones de otra naturaleza.
- Valorar el manejo de la ira y de los impulsos y, si procede, el riesgo para sí o para terceros.
- Explorar el patrón de consumo de alcohol y otras sustancias con instrumentos de cribado.
- Fortalecer la alianza terapéutica y trabajar las expectativas sobre el tratamiento desde el inicio, dado el pesimismo o la fragilidad de los recursos de afrontamiento.
- Integrar estos resultados con la entrevista clínica, la historia y la información de otras fuentes; el inventario describe el funcionamiento autoinformado y no establece por sí solo diagnósticos ni relaciones causales.

Referencias técnicas

- Butcher, J. N. et al. (2001). MMPI-2: Manual for administration, scoring, and interpretation. University of Minnesota Press.

Evaluador y firma

Ciudad de prueba · 11 de noviembre de 2026

Profesional ficticio