

Every Tabulated Ablation, with Its Measured Interval
Prior Necessity
Factor Knockouts
Coverage (NCR)
SSv2 r5 (tight) · – prior (LIP)
SSv2 r10 (mild) · – prior (LIP)
SSPro r10 (tight) · – prior (LIP)
SSPro r25 (mild) · – prior (LIP)
OmniGUI c25 (tight) · – prior (LIP)
OmniGUI c50 (mild) · – prior (LIP)
M2W c25 (tight) · – prior (LIP)
M2W c50 (mild) · – prior (LIP)
SSv2 r5 (tight) · – diversity
SSPro r10 (tight) · – diversity
OmniGUI c25 (tight) · – diversity
M2W c25 (tight) · – diversity
SSv2 r5 (tight) · – instruction
SSPro r10 (tight) · – instruction
OmniGUI c25 (tight) · – instruction
M2W c25 (tight) · – instruction
OmniGUI c25 (tight) · – coverage (NCR)
M2W c25 (tight) · – coverage (NCR)
+23.74⋆
+20.05⋆
+16.51⋆
+13.79⋆
+5.64⋆
+1.79⋆
+15.50⋆
+5.55⋆
+5.35⋆
+4.74⋆
+2.64⋆
+1.98⋆
+15.57⋆
+14.17⋆
+4.12⋆
+1.39⋆
+3.62⋆
+6.41⋆
0
10
20
30
Δ (pts) when the component is removed (paired 95% interval)