

Работа 1.1.4  
Измерение интенсивности радиационного  
фона

Валеев Рауф Раушанович  
группа 825

10 сентября 2018 г.

**Теоритическая справка.** Если случайные события (регистрация частиц) однородны во времени и каждое последующее событие не зависит от того, когда и как случилось предыдущее, то такой процесс называется пуассоновским, а результаты - количество отсчётов в одном опыте - подчиняются так называемому распределению Пуассона. При больших числах отсчёт это распределение стремится к нулю.

**Цель работы:** применение методов обработки экспериментальных данных для изучения статистических закономерностей при измерении интенсивности радиационного фона.

**В работе используются:** счетчик Гейгера-Мюллера (СТС-6), блок питания, компьютер с интерфейсом связи с счетчиком.

1. Включаем питание компьютера и установки. После загрузки компьютера запускаем программу STAT и таким образом начинаем проведение основного эксперимента.
2. В результате демонстрационного эксперимента убеждаемся, что при увеличении числа измерений:
  - (a) Измеряемая величина флуктуирует;
  - (b) Флуктуации среднего значения измеряемой величины уменьшаются, и среднее значение выходит на постоянную величину;
  - (c) Флуктуации величины погрешности среднего значения уменьшаются, а сама величина убывает;
  - (d) Флуктуации величины погрешности отдельного измерения уменьшаются, и погрешность отдельного измерения (погрешность метода) выходит на постоянную величину.
3. Переходим к основному эксперименту: измерение плотности потока космического излучения за 20 секунд (результаты набрались с момента включения компьютера). На компьютере проведем обработку, аналогичную сделанной в демонстрационном эксперименте. Результаты приведены в табл. 1.
4. Разбиваем результаты из табл. 1 в порядке их получения на группы по 2, что соответствует произведению  $N_2 = 100$  измерений числа частиц за интервал времени, равный 40 с. Результаты приведем в табл. 2.
5. Приведем данные для построения гистограмм распределения числа срабатываний счетчика за 10 с и 40 с в таблицах табл. 3 и табл. 4 соответственно.
6. Так же приведем гистограммы распределений среднего числа отсчетов за 10 и 40 с. (Рис. 1)
7. Используя формулы

$$\bar{n}_1 = \frac{1}{N_1} \sum_{i=1}^{N_1} n_i$$

$$\bar{n}_2 = \frac{1}{N_2} \sum_{i=1}^{N_2} n_i$$

$$\bar{n}_3 = \frac{1}{N_3} \sum_{i=1}^{N_3} n_i$$

8. Определим среднее число срабатываний счетчика за 10, 20 и 40 с соответственно.
9. Найдем среднеквадратичные ошибки отдельных измерений по формулам по формулам

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{1}{N_1 - 1} \sum_{i=1}^{N_1} (n_i - \bar{n}_1)^2}$$

$$\sigma_2 = \sqrt{\frac{1}{N_2 - 1} \sum_{i=1}^{N_2} (n_i - \bar{n}_2)^2}$$

$$\sigma_3 = \sqrt{\frac{1}{N_3 - 1} \sum_{i=1}^{N_3} (n_i - \bar{n}_3)^2}$$

и убедимся в справедливости формул

$$\sigma_1 \approx \sqrt{\bar{n}_1}$$

$$\sigma_2 \approx \sqrt{\bar{n}_2}$$

$$\sigma_3 \approx \sqrt{\bar{n}_3}$$

10. найдем ошибки всех измерений по формулам

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{1}{(N_1 - 1)N_1} \sum_{i=1}^{N_1} (n_i - \bar{n}_1)^2}$$

$$\sigma_2 = \sqrt{\frac{1}{(N_2 - 1)N_2} \sum_{i=1}^{N_2} (n_i - \bar{n}_2)^2}$$

$$\sigma_3 = \sqrt{\frac{1}{(N_3 - 1)N_3} \sum_{i=1}^{N_3} (n_i - \bar{n}_3)^2}$$

11. Зафиксируем все полученные ошибки и средние значения срабатываний в табл. 5.
12. Определим долю случаев, когда отклонения не превышают  $\sigma_i$  и  $2\sigma_i$ , и сравним с теоретическими оценками (табл. 6).
13. Посчитаем относительную ошибку по формуле

$$\varepsilon_{\bar{n}_1} = \frac{\sigma_{\bar{n}_1}}{\bar{n}_1} 100\%$$

$$\varepsilon_{\bar{n}_2} = \frac{\sigma_{\bar{n}_2}}{\bar{n}_2} 100\%$$

$$\varepsilon_{\bar{n}_3} = \frac{\sigma_{\bar{n}_3}}{\bar{n}_3} 100\%$$

14. из табл. 6 следует, что  $n_{t=10c} = 13,32 \pm 0,18, \varepsilon_{\bar{n}_1} = 1,4\%$ ,  $n_{t=20c} = 26,6 \pm 0,36, \varepsilon_{\bar{n}_1} = 1,4\%$ ,  $n_{t=40c} = 53,11 \pm 0,61, \varepsilon_{\bar{n}_1} = 1,2\%$

Рис. 1




Таблица 1: Число срабатываний счетчика за 20 с

№ опыта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	29	21	33	27	22	26	26	27	28	27
10	26	22	25	22	25	31	24	20	23	31
20	31	31	20	19	29	27	25	31	35	21
30	38	25	27	29	30	31	36	23	28	28
40	25	25	29	20	15	26	24	30	25	23
50	21	29	17	32	32	15	29	29	21	27
60	21	22	35	26	23	26	29	19	18	31
70	25	31	36	22	27	29	23	26	29	25
80	22	25	31	33	19	31	23	28	29	27
90	32	22	23	33	22	25	29	26	23	24
100	21	35	27	35	27	25	18	29	28	32
110	33	39	29	30	25	28	23	30	22	25
120	21	23	34	22	19	29	20	35	17	22
130	21	33	19	31	23	28	44	29	23	24
140	32	25	26	26	27	26	21	24	29	34
150	34	27	24	31	23	39	22	35	23	32
160	29	17	28	27	20	30	27	29	28	19
170	38	25	23	25	25	25	27	23	28	24
180	21	28	27	23	30	19	32	22	21	33
190	26	30	28	29	28	34	22	38	21	29

Таблица 2: Число срабатываний счетчика за 40 с

№ опыта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	50	60	48	53	55	48	47	56	44	54
10	62	39	56	56	56	63	56	61	59	56
20	50	49	41	54	48	50	49	47	58	48
30	43	61	49	48	49	56	58	56	49	54
40	47	56	50	51	56	54	56	47	55	47
50	56	62	52	47	60	72	59	53	53	47
60	44	56	48	55	39	54	50	51	73	47
70	57	52	53	45	63	61	55	62	57	55
80	46	55	50	56	47	63	48	50	50	52
90	49	50	49	54	54	56	57	62	60	50

Таблица 3: Данные для построения гистограммы распределения числа срабатываний счетчиков за 10 с

Число импульсов $n_i$	6	7	8	9	10
Число случаев	4	18	18	24	34
Доля случаев $\omega_n$	0,01	0,045	0,045	0,06	0,085
Число импульсов $n_i$	16	17	18	19	20
Число случаев	34	31	19	12	8
Доля случаев $\omega_n$	0,085	0,0775	0,0475	0,03	0,02
Число импульсов $n_i$	21	22	23	24	25
Число случаев	8	1	0	2	0
Доля случаев $\omega_n$	0,02	0,0025	0	0,005	0

Таблица 4: Данные для построения гистограммы распределения числа срабатываний счетчиков за 40 с

Число импульсов $n_i$	39	40	41	42	43	44	45
Число случаев	2	0	1	0	1	2	1
Доля случаев $\omega_n$	0,02	0	0,01	0	0,01	0,02	0,01
Число импульсов $n_i$	46	47	48	49	50	51	52
Число случаев	1	9	7	7	10	2	3
Доля случаев $\omega_n$	0,01	0,09	0,07	0,07	0,1	0,02	0,03
Число импульсов $n_i$	53	54	55	56	57	58	59
Число случаев	4	7	6	15	3	2	2
Доля случаев $\omega_n$	0,04	0,07	0,06	0,15	0,03	0,02	0,02
Число импульсов $n_i$	60	61	62	63	64	65	66
Число случаев	3	3	4	3	0	0	0
Доля случаев $\omega_n$	0,03	0,03	0,04	0,03	0	0	0
Число импульсов $n_i$	67	68	69	70	71	72	73
Число случаев	0	0	0	0	0	1	1
Доля случаев $\omega_n$	0	0	0	0	0	0,01	0,01

Таблица 5: Ошибки и средние значения

	$\bar{n}$	$\sigma_{\text{среднеквадратичная}}$	$\sigma_{\text{примерная}}$	$\sigma_{\text{общая}}$
1	13,32	3,65	3,63	0,18
2	26,6	5,16	5,03	0,36
3	53,11	6,1	7,29	0,61

Таблица 6: Процент попадания точек в промежуток среднего значения с учетом погрешности

Значение	Ошибка	Число случаев	Доля случаев, %	Теоретическая оценка, %
$\bar{n}_1 = 13.32$	$\pm\sigma_1 = \pm 3,65$	286	71	68
	$\pm 2\sigma_1 = \pm 7,3$	389	97	95
$\bar{n}_2 = 13.32$	$\pm\sigma_2 = \pm 5,16$	138	69	68
	$\pm 2\sigma_2 = \pm 10,32$	192	96	95
$\bar{n}_3 = 13.32$	$\pm\sigma_3 = \pm 6,1$	68	68	68
	$\pm 2\sigma_3 = \pm 12,2$	96	96	95