CMER CMER 希瑪醫療 希瑪眼<u>科</u>


- http://www.hkcmereye.com
 - 中環銅鑼灣旺角尖沙咀觀塘沙田元朗荃灣將軍澳

WHAT IS Day Experience ?

眼睛表面的淚水層(淚膜)對於維持眼睛健康、 舒適及良好的視力十分重要。淚膜中的脂質、水液和 黏液層,其中一層出現問題,以致淚水質量或分泌量 有變,便會導致眼睛滋潤不足,並造成「乾眼症」。

乾眼症成因

眼睛表面有一層淚膜,覆蓋在眼角膜及結膜上,形成一層濕潤保護膜,維持眼睛表面健康,淚液層由外到內可分為三層:





脂質層

由眼瞼的皮脂腺所分泌,在最外層,主要功用是增加淚膜表面張力,延緩水液層的蒸發,使眼瞼及眼球表面湿潤。



水液層

由淚腺所分泌,在中間層,使眼睛的表面濕潤、提供角膜氧氣、有殺菌及清除代謝物的作用。



黏液層

由結膜的杯狀細胞所 產生,在最內層,使水 液層能均勻分佈在結 膜表面,減少貶眼時 產生的摩擦。













乾眼症症狀



眼睛乾澀



容易疲倦眼皮緊繃



眼癢、 有異物感



眼痛、 有灼熱感



眼睛分泌物、 黏稠



眼睛會出現 紅腫、充血



怕風、畏光、 對外在刺激很敏感



嚴重者會角膜破皮 視力模糊

乾眼症的類別



缺水型

若淚腺受到破壞、功能退化或異常,淚水分泌會減少。當人年紀增長以致淚腺退化;或女士進入更年期後荷爾蒙改變;或有自體免疫性疾病;這些情況都可能引致淚水分泌不足,造成「缺水型」乾眼症。



缺油型

瞼板腺的開口在上下睫毛根部附近,主要的功能為分泌脂質層,健康的脂質層可減緩淚膜水液層的揮發。當淚液缺少脂質層,水分會快速蒸發,造成「瞼板腺功能障礙」。



混合型(缺水及缺油)

臨床上,多數患者屬於混合型乾眼症,即是 淚水分泌不足(缺水)及淚液蒸發太快(缺油)兩者症狀並存。

患乾眼症的高危人士



長時間配載隱形眼鏡人十



長時間注視電子螢幕人士



長期服用藥物, 如:血管收縮劑、抗抑鬱藥、 安眠藥、降血壓藥



長時間處於乾燥環境, 如:有冷氣或暖氣的室內地方、 陽光下暴曬



免疫系統疾病患者, 如:關節炎、糖尿病、 甲狀腺疾病等



更年期婦女(約45歲以上)

乾眼症的診斷

乾眼症四個等級

級別	第一級	第二級	第三級	第四級
程度	輕微	中度	嚴重	非常嚴重
頻率	偶爾不適	較常不適	經常並持續 感到不適	嚴重不適, 持續不減

DIAGNOSTIC

常見診斷測試

- ① 淚液分泌試紙測試測試時,會在應診者的眼睛滴入表面麻醉的眼藥水,數分鐘後將淚液分泌試紙放在眼角內側,閉上眼5分鐘,讓濾紙吸收淚水,取出濾紙後量度淚水弄濕濾紙的長度。試紙淚水長度多過或等於5毫米可能患上乾眼症。
- ② 裂隙燈淚膜破裂測試是用作分析淚液功能穩定性,醫生會使用裂隙燈及螢光染色,在應診者眼睛的表面點上螢光素,把淚膜染色去觀察淚膜的破裂時間。若淚膜在5秒內破裂,很大機會患上乾眼症。

治療方法

1 消除誘因

- 避免長時間使用電腦及手機
- 減少接觸冷氣及煙塵等誘發眼乾的環境
- 瞼板腺功能障礙人士應注意清潔眼瞼、應用抗生素等

2 淚液成分替代治療

- 使用不含防腐劑的人工淚液
- 嚴重者可能需要使用自體血清

3 減少淚液流失

- 使用淚道塞子堵塞淚道開口
- 嚴重者可考慮永久封閉淚道開口

4 配戴鞏膜鏡

• 鏡片有助淚水停留眼表,滋潤角膜表面

5 其他方法

- 盡量避免服用減少淚液分泌的藥物
- 因免疫因素而引起的乾眼問題,可加用免疫抑制劑或短期局部使用激素
- 減少配戴隱形眼鏡的時間
- 多喝水來補充身體水份
- · 多食用含豐富維他命A和胡蘿蔔素的食物



眼科

牙科

醫美



眼科查詢及預約熱線:3956 2026

「香港希瑪眼科集團」旗下的眼科中心

)中環

● 銅鑼灣

1 旺角

尖沙咀 TSIM SHA TSUI

觀塘

🔾 沙田

🖸 元朗

) 將軍澳

中環 香港中環畢打街1-3號中建大廈1515室(鄰近置地廣場,中環站G出口)

香港銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心1614-15室(銅鑼灣站E出口)

旺角

尖沙咀

觀塘 九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心16樓1601室(觀塘站A2出口)

新界沙田正街11-17號偉華中心2樓1C-1F號舖(鄰近希爾頓中心) 新界沙田正街11-17號偉華中心5A號鋪

元朗 新界元朗青山公路47號誠信商業大廈地鋪(恆香老餅家對面)

荃灣

將軍澳