

Домашка по теории групп

9 мая 2020 г.

Часть 1

1 $\mathcal{U}_{\mathbf{H}}$

Определение. Группой $\mathcal{U}_{\mathbf{H}}$ называется группа невырожденных комплексных матриц T , удовлетворяющих соотношению

$$\mathbf{H} = T^\dagger \cdot \mathbf{H} \cdot T, \quad (1)$$

где \mathbf{H} — некоторая эрмитова матрица.

2 $O(n, \mathbb{C})$

Определение. Ортогональной группой $O(n, \mathbb{C})$ называется группа комплексных ортогональных матриц

$$O^T \cdot O = I_n. \quad (2)$$

Группа вещественных ортогональных матриц $O(n)$ и соответствующее многообразие, вложенное в \mathbb{R}^{n^2} , задаётся системой уравнений (2). Поскольку матрицы $O \cdot O^T$ и I_n — симметричны, то число независимых уравнений, определяющих многообразие $O(n)$, равно $n(n+1)/2$. Отсюда следует, что многообразие группы $O(n)$ имеет размерность

$$\dim(O(n)) = n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2 = \dim(SO(n)). \quad (3)$$

Последнее равенство вытекает из того факта, что многообразие группы $O(n)$ состоит из двух несвязанных частей одинаковой размерности, одна из которых представляет собой многообразие $SO(n) = O_+(n)$ (множество ортогональных матриц O с условием $\det(O) = 1$, а вторая часть $O_-(n)$ (множество ортогональных матриц O с условием $\det(O) = -1$) состоит из элементов смежного класса $R \cdot SO(n)$, где R любой фиксированный элемент из $O_-(n)$.

3 $SO(n, \mathbb{C})$

Определение. Специальной ортогональной группой $SO(n, \mathbb{C})$ называется подгруппа комплексных ортогональных матриц, удовлетворяющих (2), и таких, что $\det(O) = +1$.

Это группа Ли размерности (3) как подгруппа $O(n)$. Алгебра Ли группы $SO(2)$ — $so(2)$. Рассмотрим кривую O_φ около единичного элемента (для малых углов φ)

$$O_\varphi = I_2 + \varphi \mathbf{i} + O(\varphi^2), \quad \mathbf{i} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Сравнивая кривую $g(t) = O_\varphi|_{\varphi=at}$ (t — мало и $a \in \mathbb{R}$ с выражением, связывающим элементы алгебры и группы Ли в малой окрестности

$$g(t) = I_n + tA + O(t^2), \quad (5)$$

мы заключаем что алгебра Ли $so(2)$ состоит из антисимметричных двумерных матриц $a\mathbf{i}$, которые образуют одномерное векторное пространство. Отметим, что любой элемент O_φ группы $SO(2)$ можно представить в виде линейной комбинации матриц I_2 и \mathbf{i}

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = I_2 \cos \varphi + \mathbf{i} \sin \varphi. \quad (6)$$

Имеет место следующее тождество (операторный аналог формулы Эйлера):

$$\exp(\hat{\mathbf{i}}\varphi) = I \cos \varphi + \hat{\mathbf{i}} \sin \varphi, \quad \varphi \in \mathbb{R} \text{ или } \mathbb{C}. \quad (7)$$

Из формулы (7) следует, что любой элемент $O_\varphi \in SO(2)$, заданный в (6), представляется в виде $O_\varphi = \exp(\mathbf{i}\varphi)$, то есть в виде экспоненты от элемента $(\mathbf{i}\varphi)$ алгебры Ли $so(2)$

4 $Sp(2r, \mathbb{R})$

Определение. Симплектической группой $Sp(2r, \mathbb{R})$ называется группа вещественных матриц T , удовлетворяющих условию симплектичности

$$T^T \cdot \begin{pmatrix} 0 & I_r \\ -I_r & 0 \end{pmatrix} \cdot T = \begin{pmatrix} 0 & I_r \\ -I_r & 0 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Алгебра Ли $sp(2r, \mathbb{R})$ группы $Sp(2r, \mathbb{R})$. Для симплектических матриц близких к единице имеем

$$J = (I_{2r} + tA^T + O(n^2)) \cdot J \cdot (I_{2r} + tA + O(t^2)) = J + t(A^T \cdot J + J \cdot A) + O(t^2), \quad (9)$$

то есть

$$A^T \cdot J + J \cdot A = 0, \quad (10)$$

где антисимметричная матрица J задана в (8). Таким образом, $sp(2r, \mathbb{R})$ — это множество матриц, удовлетворяющих условию

$$A^T \begin{pmatrix} 0 & I_r \\ -I_r & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & I_r \\ -I_r & 0 \end{pmatrix} A = 0. \quad (11)$$

Матрицу A можно представить в блочном виде

$$A = \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix}, \quad (12)$$

где X, Y, Z, W — матрицы $r \times r$ с элементами из \mathbb{R} , которые в силу условия (11) удовлетворяют соотношениям

$$Y^T = Y, \quad Z^T = Z, \quad X^T = -W. \quad (13)$$

Вещественная размерность пространства $sp(2r, \mathbb{R})$ равна

$$\dim(sp(2r, \mathbb{R})) = r(2r + 1). \quad (14)$$

Если $A \in sp(2r, \mathbb{R})$, то $\exp(A) \in Sp(2r, \mathbb{R})$.

5 $Sp(p, q)$

Определение. Группой $Sp(p, q)$, где $p + q = r$, называется группа комплексных $2r \times 2r$ матриц T , удовлетворяющих одновременно условию псевдо-унитарности

$$T^\dagger \cdot \begin{pmatrix} I_{p,q} & 0 \\ 0 & I_{p,q} \end{pmatrix} \cdot T = \begin{pmatrix} I_{p,q} & 0 \\ 0 & I_{p,q} \end{pmatrix} \quad (15)$$

и нестандартному условию симплектичности

$$T^T \cdot \begin{pmatrix} 0 & I_{p,q} \\ -I_{p,q} & 0 \end{pmatrix} \cdot T = \begin{pmatrix} 0 & I_{p,q} \\ -I_{p,q} & 0 \end{pmatrix}. \quad (16)$$

Алгебры Ли $sp(p, q)$. Рассматривая элементы группы $Sp(p, q)$, близкие к единичным, получаем, что алгебра Ли $sp(p, q)$ — это множество $2r \times 2r$ (здесь $r = p + q$) комплексных матриц A , удовлетворяющих соотношениям

$$A^T \begin{pmatrix} 0 & I_r \\ -I_r & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -I_r \\ I_r & 0 \end{pmatrix} A, \quad A^\dagger \begin{pmatrix} I_{p,q} & 0 \\ 0 & I_{p,q} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} I_{p,q} & 0 \\ 0 & I_{p,q} \end{pmatrix}. \quad (17)$$

Представим A в виде блочной матрицы (12), где X, Y, Z, W — комплексные $r \times r$ блоки. Из соотношений (17) следуют условия

$$W = -X^T, \quad Z = -I_{p,q} \cdot Y^\dagger \cdot I_{p,q}, \quad (18)$$

$$Y^T = Y, \quad X^\dagger = -I_{p,q} \cdot X \cdot I_{p,q}, \quad (19)$$

и любой элемент $A \in sp(p, q)$ представляется в виде блочной матрицы

$$A = \begin{pmatrix} X & Y \\ -I_{p,q} \cdot Y^\dagger \cdot I_{p,q} & -X^T \end{pmatrix}, \quad (20)$$

где две $r \times r$ матрицы X и Y , удовлетворяют соотношениям обобщённой анти-эрмитовости и симметричности (19). Пространства таких матриц X и Y имеют вещественные размерности r^2 и $(r + 1)r$, соответственно. Поэтому

$$\dim(sp(p, r - p)) = (r + 1)r + r^2 = r(2r + 1). \quad (21)$$

6 $USp(2r)$

Определение. Унитарной симплектической группой $USP(2r)$ называется группа комплексных $2r \times 2r$ матриц T , удовлетворяющих как условию симплектичности (8), так и условию унитарности $T^\dagger \cdot T = I_n$.

Алгебра Ли $usp(2r)$ группы $USp(2r)$. Для унитарных симплектических ($2r \times 2r$ матриц, близких к единичной, кроме соотношения унитарности

$$I_n = UU^\dagger = (I_n + tA + O(t^2))(I_n + tA^\dagger + O(t^2)) = I_n + t(A + A^\dagger) + O(t^2), \quad (22)$$

откуда

$$A^\dagger = A, \quad (23)$$

имеем ещё условие симплектичности. Поэтому алгебра Ли $usp(2r)$ — это множество всех комплексных матриц A , одновременно удовлетворяющих соотношениям (23) и (11), которые можно записать в виде (17), где вместо матрицы $I_{p,q}$ необходимо взять единичную матрицу I_r . Таким образом, $usp(2r) = sp(r, 0) = sp(0, r)$. Теперь мы можем воспользоваться результатами предыдущего пункта и получить для произвольного элемента $A \in usp(2r)$ представление в виде блочной матрицы

$$A = \begin{pmatrix} X & Y \\ -Y^\dagger & -X^T \end{pmatrix}, \quad (24)$$

где X и Y — комплексные $r \times r$ матрицы, удовлетворяющие условиям

$$Y^T = Y, \quad X^\dagger = -X. \quad (25)$$

Легко проверить, что множество матриц $usp(2r)$ (24), (25) образует векторное пространство, замкнутое относительно операции коммутирования. Размерность этого пространства равна

$$\dim(usp(2r)) = r(2r + 1), \quad (26)$$

что следует из (21).

7 $O(p, q)$

Определение. Вещественной псевдо-ортогональной группой $O(p, q)$ называется группа вещественных $(n \times n)$ матриц O , где $n = p + q$, подчиняющихся условию

$$O^T \cdot \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_q \end{pmatrix} \cdot O = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_q \end{pmatrix}. \quad (27)$$

8 $PSO(p, q)$

Определение. Специальной вещественной псевдо-ортогональной группой $SO(p, q)$ называется группа вещественных $(n \times n)$ матриц O , где $n = p + q$, подчиняющихся одновременно условию псевдоортогональности (27), а также условию $\det O = 1$.

Определение. Проективной псевдо-ортогональной группой $PSO(p, q)$ называется фактор-группа $SO(p, q)/\mathbf{Z}_2$.

9 Группа Лоренца

Определение. Группой Лоренца n -мерного пространства называется группа $O(1, n-1)$.

10 $SU(p, q)$

Определение. Специальной псевдо унитарной группой $SU(p, q)$ называется группа комплексных $(n \times n)$ матриц U , удовлетворяющих одновременно условию (1), где в качестве \mathbf{H} выбрана матрица $I_{p,q}$:

$$U^\dagger \cdot \begin{pmatrix} I_{p,q} & 0 \\ 0 & I_{p,q} \end{pmatrix} \cdot U = \begin{pmatrix} I_{p,q} & 0 \\ 0 & I_{p,q} \end{pmatrix} \quad (28)$$

и условию $\det U = 1$.

Центром группы является конечная инвариантная подгруппа матриц

$$U_k = \exp \left(i \frac{2\pi k}{n} \right) I_n \quad (k = 0, 1, \dots, n-1). \quad (29)$$

11 $PSL(n, \mathbb{K})$

Определение. Проективной комплексной линейной группой $PSL(n, \mathbb{C})$ называется фактор-группа $SL(n, \mathbb{C})/\mathbf{Z}_n$.

Определение. Проективной вещественной линейной группой $PSL(2n, \mathbb{R})$ называется фактор-группа $SL(2n, \mathbb{R})/\mathbf{Z}_2$.

12 \mathcal{O}_{I_n}

$$\mathcal{O}_{I_n} \equiv O(n, \mathbb{C})$$

13 Группа анти-де Ситтера

Определение. Группой анти-де Ситтера n -мерного пространства называется группа $O(2, n-2)$.

14 $PSU(p, q)$

Определение. Проективной псевдо-унитарной группой $PSU(p, q)$ называется фактор-группа $SU(p, q)/\mathbf{Z}_n$, где $p + q = n$.

15 \mathcal{O}_J

$$\mathcal{O}_J \equiv Sp(2r, \mathbb{C})$$