

# Уравнения математической физики

Драчов Ярослав

Факультет общей и прикладной физики МФТИ

30 ноября 2020 г.

## Содержание

$\mathbb{R}^3$

$\Delta u = 0$  в  $D$

$D$ : шар, внешность шар или сф. слой либо  $u|_{\partial D} = u_0$ , либо  $u_r|_{\partial D} = u_1$ ,  
либо  $(\alpha u + \beta u_r)|_{\partial D} = u_2$

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{2}{r}u_r + \frac{1}{r^2} \underbrace{\left[ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right]}_{\Delta_{\text{угл}} - \text{оператор Лапласа-Бельтрами}}.$$

Собственные функции  $\Delta_{\text{угл}}$  называются сферическими функциями.

Полиномы Лежандра:

$$P_n(t) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dt^n} (t^2 - 1)^n - \text{полная ортогональная система (базис) в } L_2[-1, 1].$$

Присоединённые полиномы Лежандра

$$P_n^m(t) = \left( \sqrt{1-t^2} \right)^m \frac{d^m}{dt^m} P_n(t) - \text{образуют базис в } L_2[-1, 1] \text{ при каждом } m$$
$$m = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Сферические функции

$$Y_{n,m}(\theta, \varphi) = \begin{cases} P_n^m(\cos \theta) \cos m\varphi \\ P_n^m(\cos \theta) \sin m\varphi \end{cases} \quad \subset \lambda_n = -n(n+1)$$

$$Y_n(\theta, \varphi) = \sum_{m=0}^n [a_{n,m} P_n^m(\cos \theta) \cos m\varphi + b_{n,m} P_n^m(\cos \theta) \sin m\varphi].$$

$$\Delta_{\text{угл}} Y_n(\theta, \varphi) = -n(n+1) Y_n(\theta, \varphi).$$

$$u(z, \theta, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n(z) Y_n(\theta, \varphi).$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n'' Y_n + \frac{2}{r} \sum_{n=0}^{\infty} A_n' Y_n + \frac{1}{r^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-n)(n+1) A_n Y_n = 0.$$

$$\begin{aligned}
A_n'' + \frac{2}{r}A_n' - \frac{n(n+1)}{r^2}A_n &= 0. \\
r^2A_n'' + 2rA_n' - n(n+1)A_n &= 0. \\
\lambda(\lambda-1) + 2\lambda - n(n+1) &= 0. \\
\lambda^2 + \lambda - n(n+1) &= 0. \\
\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4n(n+1)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4n^2+4n}}{2} = \frac{-1 \pm (2n+1)}{2} = n, -n-1. \\
A_n &= C_n r^n + d_n \frac{1}{r^{n+1}}.
\end{aligned}$$

1. В сф. слое

$$\begin{aligned}
u &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[ r^n Y_n(\theta, \varphi) + \frac{1}{r^{n+1}} \tilde{Y}_n(\theta, \varphi) \right] = \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^n \left[ a_{n,m} r^n P_n^m(\cos \theta) \cos m\varphi + b_{n,m} \frac{1}{r^{n+1}} P_n^m(\cos \theta) \cos m\varphi + \right. \\
&\quad \left. + c_{n,m} r^n P_n^m(\cos \theta) \sin m\varphi + d_{n,m} \frac{1}{r^{n+1}} P_n^m(\cos \theta) \sin m\varphi \right].
\end{aligned}$$

2. В шаре

$$u = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^n [a_{n,m} r^n P_n^m(\cos \theta) \cos m\varphi + C_{n,m} r^n P_n^m(\cos \theta) \sin m\varphi].$$

3. Вне шара (+ огр. на  $+\infty$ )

$$u = a + \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^n \left[ b_{n,m} \frac{1}{r^{n+1}} P_n^m(\cos \theta) \cos m\varphi + d_{n,m} \frac{1}{r^{n+1}} P_n^m(\cos \theta) \sin m\varphi \right].$$

Задача  $\Delta u = 0, |x| < 1$ ,

$$\begin{aligned}
u|_{|x|=1} = x_2^2 x_3 = r^3 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi \cos \theta|_{r=1} &= \frac{1}{2}(1 - \cos 2\varphi) \sin^2 \theta \cos \theta = \\
&= \frac{1}{2} \sin^2 \theta \cos \theta - \frac{1}{2} \sin^2 \theta \cos \theta \cos 2\varphi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P_3(t) &= \frac{1}{8 \cdot 6} ((t^2 - 1)^3)''' = \frac{1}{48} (t^6 - 3t^4 + 3t^2 - 1)'' = \frac{1}{48} (6 \cdot 5 \cdot 4t^3 - 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2t) = \\
&= \frac{1}{2} (5t^2 - 3t) \rightarrow P_3(\cos \theta) = -\frac{1}{5} P_3(\cos \theta) + \frac{1}{5} P_1(\cos \theta) - \frac{1}{30} P_3^2(\cos \theta) \cos 2\varphi \frac{1}{2} (5 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta). \\
\frac{1}{2} \sin^2 \theta \cos \theta &= \frac{1}{2} \cos \theta - \frac{1}{2} \cos^3 \theta = -\frac{1}{5} \cdot \underbrace{\frac{1}{2} (5 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta)}_{P_3(\cos \theta)} + \frac{1}{5} \underbrace{\cos \theta}_{P_1(\cos \theta)}.
\end{aligned}$$

$$P_1(t) = \frac{1}{2}(t^2 - 1)' = t \rightarrow P_1(\cos \theta) = \cos \theta.$$

$$P_3^2(t) = (1 - t^2) \cdot \frac{1}{2}(5t^3 - 3t)'' = 15(1 - t^2)t \rightarrow P_3^2(\cos \theta) = 15 \sin^2 \theta \cos \theta.$$

$$u = AP_3(\cos \theta)r^3 + BP_1(\cos \theta)r + CP_3^2(\cos \theta) \cos 2\varphi r^3.$$

$$\begin{aligned} u|_{r=1} &= AP_3(\cos \theta) + BP_1(\cos \theta) + CP_3^2(\cos \theta) \cos 2\varphi = \\ &= -\frac{1}{5}P_3(\cos \theta) + \frac{1}{5}P_1(\cos \theta) - \frac{1}{30}P_3^2(\cos \theta) \cos 2\varphi. \end{aligned}$$

$$A = -\frac{1}{5}, B = \frac{1}{5}, C = -\frac{1}{30}.$$