2.2.Вегетативная регуляция&30

Раздел 1&60&1

Какой частью рефлекторная дуга вегетативного рефлекса отличается от рефлекторной дуги соматического рефлекса?

афферентной частью
эфферентной частью
центральной частью
афферентной и эфферентной частью

Медиатором в симпатических ганглиях является:

ацетилхолин
норадреналин
адреналин
ГАМК
бета-эндорфин

Постганглионарные нервные волокна вегетативной нервной системы относятся к типу:

А-альфа
С
В
А-бета
А-гамма

Холинорецепторы бывают:

Н, М
альфа; бета, Н, М
альфа1; бета1, альфа2; бета2
альфа1; бета1, альфа2; бета2, Н, М

Миметики - это вещества:

блокирующие ацетилхолинэстеразу
стимулирующие проведение возбуждения в синапсе
блокирующие рецепторы постсинаптической мембраны
тормозящие проведение возбуждения в синапсе

Высшие подкорковые центры регуляции вегетативных функций располагаются:

в мозжечке
в продолговатом и среднем мозге
в гипоталамусе
в таламусе
в среднем мозге

Раздражение какого нерва вызывает обильную секрецию жидкой слюны?

симпатического
соматического
парасимпатического

Где располагаются ганглии симпатической нервной системы?

интрамурально
в спинном мозге
в забрюшинном пространстве
в пограничном стволе
в подкорковых ядрах головного мозга

Тела нейронов I порядка симпатической нервной системы локализуются в:

гипоталамусе
коре головного мозга
продолговатом мозге

сакральном отделе спинного мозга
тораколюмбальном отделе спинного мозга
Где располагаются ганглии парасимпатической нервной системы?
интрамурально
в спинном мозге
в продолговатом мозге
в пограничном стволе
в подкорковых ядрах головного мозга
Медиатором в постганглионарных синапсах парасимпатической нервной системы является:
норадреналин
адреналин
ацетилхолин
ГАМК
У вегетативного рефлекса эфферентная часть рефлекторной дуги:
однонейронная
двухнейронная
трехнейронная
аналогична эфферентной части рефлекторной дуги соматического рефлекса
отсутствует
Медиатором в парасимпатических ганглиях является:
ацетилхолин
норадреналин
адреналин
ГАМК
дофамин
Постганглионарные волокна проводят импульсы от:
вегетативных ганглиев к висцеральным эффекторам
внутренних органов к вегетативным ганглиям
центральной нервной системы к скелетным мышцам
центральной нервной системы к вегетативным ганглиям
Какие нервы подходят к потовым железам?
соматические
два вегетативных
парасимпатические
симпатические
Адренорецепторы бывают:
альфа
бета
Н
М
У вегетативной и соматической рефлекторных дуг общими могут являться:
чувствительная часть
центральная часть
двигательная часть
общих частей нет
Адренорецепторы расположены в:
симпатических ганглиях
парасимпатических ганглиях
постганглионарных симпатических синапсах
постганглионарных парасимпатических синапсах
всех ганглиях вегетативной нервной системы

Активация какой системы приводит к стимуляции выделения желудочного сока и усилению моторики желудка?
парасимпатической
симпатической
парасимпатической и симпатической
соматической
соматической и вегетативной
Усиление образования катехоламинов наблюдается при активации:
парасимпатической нервной системы
симпатической нервной системы
К какому типу нервных волокон относятся преганглионарные волокна?
A
B
C
D
М - холинорецепторы расположены в:
симпатических ганглиях
парасимпатических ганглиях
постганглионарных симпатических синапсах
постганглионарных парасимпатических синапсах
соматических синапсах
Литики - это вещества:
стимулирующие проведение возбуждения в синапсе
блокирующие рецепторы пресинаптической мембраны
тормозящие проведение возбуждения в синапсе
блокирующие ацетилхолинэстеразу
Расширение бронхов отмечается при:
активации парасимпатической нервной системы
угнетении парасимпатической нервной системы
угнетении симпатической нервной системы
активации соматической нервной системы
угнетении соматической нервной системы
Исключением из функциональных особенностей вегетативной нервной системы является:
автономность
длительный латентный период
низкая возбудимость
более высокая скорость проведения возбуждения по сравнению с соматической нервной системой
регуляция функций внутренних органов
Эффекты влияния симпатической нервной системы:
усиление слюноотделения
расширение зрачка
урежение сердцебиения
усиление моторики кишечника
Где расположены центральные нейроны вегетативной нервной системы (выберите наиболее полный ответ)?
кора головного мозга, подкорковые ядра
продолговатый мозг, средний мозг
продолговатый мозг, средний мозг, промежуточный мозг
продолговатый мозг, спинной мозг
промежуточный мозг, средний мозг, продолговатый мозг, спинной мозг

Какие функции не характерны для гипоталамуса?
регуляция водно-солевого обмена
терморегуляция
регуляция вегетативных функций
реализация статокинетических рефлексов
Какая нервная система способствует синтезу жиров?
симпатическая
парасимпатическая
Как влияет нейромедиатор ацетилхолин на желудочную секрецию?
тормозит
усиливает
не влияет
Назовите фермент, разрушающий ацетилхолин в синаптической щели:
моноаминооксидаза
ацетил-коэнзим А
ацетилхолинэстераза
холинацетилтрансфераза
Как называется рецептор с которым взаимодействует ацетилхолин?
адренорецептор
холинорецептор
пуринорецептор
Н-рецептор
Как называется рецептор с которым взаимодействует норадреналин?
адренорецептор
холинорецептор
пуринорецептор
Н - рецептор

Раздел 2&30&2

Тела преганглионарных нейронов парасимпатической нервной системы располагаются:
в боковых рогах крестцовых сегментов спинного мозга, ядрах продолговатого и среднего мозга
в задних рогах шейных и грудных сегментов спинного мозга
в боковых рогах шейных и грудных сегментов спинного мозга
в задних рогах крестцовых сегментов спинного мозга, ядрах продолговатого мозга
в спинальных ганглиях
Активация какой системы приводит к сужению зрачка?
симпатической
парасимпатической
соматической
симпатической и соматической
правильного ответа нет
Для того, чтобы заблокировать только симпатические влияния на сердце, вы назначите:
блокатор М-холинорецепторов
блокатор N-холинорецепторов
блокатор бета1-адренорецепторов
блокатор альфа-адренорецепторов
У больного - повышенная кислотность желудка. Препарат какой группы может быть назначен?
блокатор М-холинорецепторов
стимулятор М-холинорецепторов

У больного – симптомы перевозбуждения парасимпатической нервной системы. Какой препарат Вы ему назначите ?
стимулятор адренорецепторов
блокатор адренорецепторов
стимулятор М-холинорецепторов
блокатор М-холинорецепторов
стимулятор N-холинорецепторов
Какая вегетативная система замедляет синтез жиров и усиливает их распад?
симпатическая
парасимпатическая
Рефлекс Ашнера заключается в:
остановке сердца при ударе в эпигастральную область
уменьшении частоты сердечных сокращений при надавливании на глазные яблоки
изменении деятельности сердца при раздражении хеморецепторов каротидного синуса
изменении сердечной деятельности при раздражении барорецепторов каротидного синуса
Симпатические нервные волокна вызывают в кровеносных сосудах:
иногда вазоконстрикцию, иногда вазодилатацию
только вазодилатацию
только вазоконстрикцию
К каким рефлексам относится рефлекс Гольца?
висцеросоматическим
висцеросенсорным
висцеродермальным
висцеро – висцеральным
Наибольшим сродством к норадреналину обладают:
альфа-адренорецепторы
бета-адренорецепторы
Н-халинорецепторы
М-холинорецепторы
Наибольшим сродством к адреналину обладают:
альфа – адренорецепторы
бета – адренорецепторы
Н – халинорецепторы
М – холинорецепторы
Какие рецепторы преобладают в сердце, бронхах, коронарных артериях?
альфа – адренорецепторы
бета – адренорецепторы
холинорецепторы
гистаминорецепторы
Где локализованы бета1 - адренорецепторы?
в стенке сердца
в бронхах
в ЖКТ
в железах внешней секреции
Где локализованы бета2-адренорецепторы?
в сердце
в бронхах
в коронарных артериях
За счет чего эффект симпатического нерва, идущего к сердцу, в отличии от парасимпатического длится дольше?

за счет разной активности медиаторов
за счет разной активности ферментов, разрушающих медиатор
Какой отдел ВНС нужно раздражать, чтобы снять утомление скелетных мышц (феномен Орбели–Гинецинского)?
парасимпатический
симпатический
Какой эффект норадреналина длится дольше?
как гормона мозгового вещества надпочечников
как нейромедиатора
Раздел 3&10&3
Активация каких рецепторов приводит к учащению сердцебиения?
Н-холинорецепторов
М-холинорецепторов
альфа-адренорецепторов
бета1-адренорецепторов
бета2-адренорецепторов
Блокада каких рецепторов приведет к усилению сердцебиения?
Н-холинорецепторов
М-холинорецепторов
альфа-адренорецепторов
бета-адренорецепторов
альфа и бета-адренорецепторов
Для расширения зрачка с целью осмотра глазного дна Вы закапаете в глаза:
стимулятор М- холинорецепторов
стимулятор N- холинорецепторов
блокатор М- холинорецепторов
блокатор N- холинорецепторов
Стимуляция каких нервных проводников приводит к выделению малого количество слюны, богатой органическими веществами?
парасимпатических
возвратного нерва
добавочного нерва
симпатических
Взаимодействие норадреналина с альфа-адренорецепторами гладкомышечных клеток артериальной стенки вызывает:
расширение просвета сосудов
расширение, а затем сужение просвета сосудов
сужение просвета сосудов
не влияет на просвет сосудов
Возбуждение каких рецепторов приводит к сужению артериол?
альфа – адренорецепторов
бета – адренорецепторов
Н – хлинорецепторов
пуринорецепторов
М – холинорецепторов
Возбуждение каких рецепторов приводит к расширению коронарных артерий?
альфа – адренорецепторов
бета – адренорецепторов
Н – холинорецепторов
пуринорецепторов
М – холинорецепторов
У больного приступ стенокардии. Какая группа препаратов расслабит

коронарные сосуды?
Н-холинолитики
бета –адреномиметики
альфа–адреномиметики
Какой препарат из группы миметиков назначают при приступе бронхиальной астмы, чтобы расслабить бронхи?
бета1 - адреномиметики
альфа – адреномиметики
бета2 – адреномиметики
М- холиномиметики
Какой препарат из группы блокаторов назначают при приступе бронхиальной астмы, чтобы снять спазм с бронхов?
Н- холиноблокаторы
М- холиноблокаторы
альфа1– адреноблокаторы
бета2 – адреноблокаторы
У больного повышенное артериальное давление. Повышены показатели СД (систолического давления). Препарат какой группы Вы ему назначите?
Н- холинолитики
М- холиномиметики
альфа1– адренолитики
бета1 – адренолитики
У больного повышенное артериальное давление. Повышены показатели ДД (диастолического давления). Препарат какой группы нормализует состояние?
Н- холинолитики
М- холиномиметики
альфа– адренолитики
С какой целью больному с повышенным артериальным давлением назначают М – холиномиметики?
снять спазм с артерий внутренних органов
расслабить артерии скелетных мышц
ослабить сердечные сокращения