EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR COMPLEMENTARIO

Elemento	Descripción
Indicador de Evaluación	Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control lipídico óptimo
Indicador Complementario	Porcentaje de inercia terapéutica en diabetes mellitus tipo 2 para control lipídico no óptimo (V-2.0).
Definición conceptual	Porcentaje de personas de 20 años y más con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidas que cuentan con control lipídico no óptimo en sus resultados, y que en su abordaje se detecta inercia terapéutica en todo el período. Control lipídico no óptimo: • Resultados de LDL que no cumplen con valores óptimos en todo el período. • Personas que no cuenten con registro de realización (fecha y resultado) de la prueba de laboratorio. Inercia terapéutica: Es una condición individual en la que, a pesar de demostrarse controles lipídicos no óptimos en los últimos cuatro momentos, uno cada tres meses, no se realiza ningún ajuste para controlar los resultados de LDL ya sea dosis o tipo de medicamento. Incluye: • Población: Personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que consultan por primera vez en el año, que cuenten con un último control lipídico no óptimo en el último control y en todo el período, con un mínimo de dos consultas. • Listado de prescripciones de las personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (con fecha, tipo de medicamento y dosis) del último año. Excluye: • Personas que tengan solamente la consulta del listado de base. • Personas que no completen el total de un año en el control a partir del último monitoreo. • Personas que cuenten con uno de los controles lipídicos dentro del período de forma óptima. • Personas que sean atendidas y cuenten con control no óptimo en el período, pero no tengan prescripción de medicamentos.
Variables involucradas en la medición	• Número de personas atendidas por DM2 con control lipídico no óptimo en el período y con inercia terapéutica. • Número de personas atendidas por DM2 con control lipídico no óptimo en el período.

Fórmula de cálculo	• $\frac{\text{Número de personas atendidas por DM2 con control lipídico no óptimo en el período y con inercia terapéutica}}{\text{Número de personas atendidas por DM2 con control lipídico no óptimo en el período}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisibles-Diabetes Mellitus tipo 2
Línea base	En construcción con los resultados del año 2026	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Cardiovascular DM2): • Consultas de primera vez de personas con 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. • Pruebas de laboratorio clínico (perfil lipídico) registradas en el énfasis correspondiente que cuenten con fecha y resultado. Expediente Digital Único en Salud (Prescripciones-SIES, Base de Datos AES): • Listado de prescripciones de las personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Perfil lipídico	
Clasificación	Indicador de Resultado	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	No aplica.	