EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

[1]

<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Código</td><td>01-04-2.1</td></tr>
<tr><td>Nombre</td><td>Porcentaje de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones según edad gestacional.</td></tr>
<tr><td>Definición conceptual</td><td>Porcentaje de embarazadas que reciben atención en la consulta externa de primera vez a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones para el control prenatal correspondiente a la edad gestacional.

A continuación, se detalla las intervenciones que aplican según el rango de edad gestacional al momento de la fecha de corte:

<table>
<tr><td colspan="5">Intervenciones del paquete básico según rango de edad gestacional al momento del corte para la evaluación</td></tr>
<tr><td>1 a 19 semanas</td><td>20 a 28 semanas</td><td>29 a 32 semanas</td><td>33 a 40 semanas</td><td>41 semanas y más</td></tr>
<tr><td colspan="5">Primer control en las primeras 11 semanas</td></tr>
<tr><td colspan="5">Toma de presión arterial (PA) en el primer control</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td colspan="4">Detección de VDRL en las primeras 19 semanas</td></tr>
<tr><td colspan="4">Detección de VIH en las primeras 19 semanas</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></td><td colspan="3">Detección de DM pregestacional en las primeras 23 semanas</td></tr>
<tr><td colspan="3">Detección de DM gestacional entre 24 y 28 semanas</td></tr>
<tr><td colspan="3">Segundo control entre 12 y 20 semanas</td></tr>
<tr><td colspan="3">Toma de PA en el segundo control</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tercer control entre 21 y 28 semanas</td></tr>
<tr><td colspan="3">Toma de PA en tercer control</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td colspan="2">Cuarto control entre 29 y 32 semanas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Toma de PA en el cuarto control</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>Quinto control entre 33 y 40 semanas</td></tr>
<tr><td>Toma de PA en el quinto control</td></tr>
</table>

Incluye:
• Consultas de primera vez en el embarazo (medicina general, enfermería, ginecología y medicina familiar): población de mujeres desde el momento de la concepción hasta las 42 semanas de gestación y que cuente con FUR válida para el periodo.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">La FUR se considera válida cuando la diferencia entre la fecha de consulta de primera vez en el embarazo y la fecha de última regla (FUR) registrada en el apartado control prenatal ítem datos embarazo del expediente digital único en salud (EDUS) está entre una a 42 semanas.

• Pruebas de laboratorio clínico: serología para VDRL, serología para VIH, glicemia en ayunas y curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, realizadas en el periodo.

Excluye:
• No aplica.</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">• Número de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones según edad gestacional en el periodo.
• Número de embarazadas con FUR válida para el periodo.</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$\frac{\text{Número de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones según edad gestacional en el periodo}}{\text{Número de embarazadas con FUR válida para el periodo}} \times 100$</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Primer Nivel</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Prevención</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Salud materno infantil</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">43 %</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td colspan="2">Quinquenal: 47 %</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Anual</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Perinatal):
• Consultas de primera vez en el embarazo por código CIE-10: Z321. Embarazo confirmado, Z33. Estado de embarazo incidental, Z34. Supervisión de embarazo normal, Z35. Supervisión de embarazo de alto riesgo, Z640. Problemas relacionados con embarazo no deseado, O300. Embarazo doble, O308. Otros embarazos múltiples y O309. Embarazo múltiple, no especificado.
• Consultas de primera vez de mujeres en el periodo posnatal por códigos CIE-10: Z390. Atención y examen inmediatamente después del parto, Z391. Atención y examen de madre en periodo de lactancia, Z392. Seguimiento postparto de rutina, Z370. Nacido vivo único, Z379. Producto de parto no específico, O800. Parto único espontáneo presentación cefálica de vértice, O03. Aborto espontaneo, O04. Aborto médico, O05. Otro aborto, O06. Aborto no especificado, O021 Aborto retenido y O60 Parto prematuro.

Sistema integrado de laboratorio clínico y LabCore®:
• Pruebas de laboratorio clínico realizadas en el periodo: serología para VDRL, serología para VIH, glicemia en ayunas y curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos.

Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Perinatal):
• Pruebas de laboratorio clínico registradas en el énfasis correspondiente</td></tr>
</table>

	con fecha y resultado del periodo: serología para VDRL y serología para VIH.
Clasificación	Indicador de proceso
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (anual y monitoreo). • Informe de resultados de la evaluación de la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención (anual).
Comentarios generales	Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios por intervención del paquete básico según grupo al momento del corte para la evaluación: • Porcentaje de embarazadas entre siete y 19 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones • Porcentaje de embarazadas entre 20 y 28 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones • Porcentaje de embarazadas entre 29 y 32 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones • Porcentaje de embarazadas entre 33 y 40 semanas de gestación a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones • Porcentaje de embarazadas 41 semanas de gestación y más a quienes se les completa un paquete básico de intervenciones