EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR COMPLEMENTARIO

Elemento	Descripción
Indicador de Evaluación	Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control glicémico óptimo
Indicador Complementario	Porcentaje de inercia terapéutica en diabetes mellitus tipo 2 para control glicémico no óptimo (V-2.0).
Definición conceptual	Porcentaje de personas de 20 años y más con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidas que cuentan con control glicémico no óptimo en sus resultados, y que en su abordaje se detecta inercia terapéutica en todo el período. Control glicémico no óptimo: • Resultados de A1c que no cumplen con valores óptimos en el período. • Personas que no cuenten con registro de realización (fecha y resultado) de la prueba de laboratorio en el período. Inercia terapéutica: Es una condición individual en la que, a pesar de demostrarse controles glicémicos no óptimos en los últimos cuatro momentos, uno cada tres meses, no se realiza ningún ajuste para controlar los resultados de la hemoglobina glicosilada ya sea dosis o tipo de medicamento. Incluye: • Población: Personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que consultan por primera vez en el año, que cuenten con un último control glicémico no óptimo en el último control y en todo el período, con un mínimo de dos consultas. • Listado de prescripciones de las personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (con fecha, tipo de medicamento y dosis). Excluye: • Personas que tengan solamente la consulta del listado de base. • Personas que no completen el total de un año en el control a partir del último monitoreo. • Personas que cuenten con uno de los controles glicémicos dentro del período de forma óptima. • Personas que sean atendidas y cuenten con control no óptimo en el período, pero no tengan prescripción de medicamentos.
Variables involucradas en la medición	• Número de personas atendidas por DM2 con control glicémico no óptimo en el período y con inercia terapéutica. • Número de personas atendidas por DM2 con control glicémico no óptimo en el período.
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas atendidas por DM2 con control glicémico no óptimo en el período y con inercia terapéutica}}{\text{Número de personas atendidas por DM2 con control glicémico no óptimo en el período}} \times 100$

Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisibles-Diabetes Mellitus tipo 2
Línea base	En construcción con los resultados del año 2026	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Cardiovascular DM2): • Consultas de primera vez de personas con 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. • Pruebas de laboratorio clínico (A1c) registradas en el énfasis correspondiente que cuenten con fecha y resultado. Expediente Digital Único en Salud (Prescripciones-SIES, Base de Datos AES): • Listado de prescripciones de las personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • A1c	
Clasificación	Indicador de Resultado	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	No aplica.	