EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR COMPLEMENTARIO

Elemento	Descripción
Indicador de Evaluación	Control óptimo de la presión arterial en personas de 20 años y más con hipertensión (HT).
Indicador Complementario	Porcentaje de Inercia terapéutica en hipertensión para control de presión arterial no óptimo (V-2.0).
Definición conceptual	Corresponde al porcentaje de personas de 20 años y más atendidas por HT (código diagnóstico CIE-10: I10x) con inercia terapéutica, del total de atendidos. Definiéndose inercia terapéutica en las personas con hipertensión como una condición en la que, a pesar de demostrarse cifras no óptimas de presión arterial (PA) en los últimos 12 meses (cuatro momentos, uno cada tres meses), no se realiza ningún ajuste en el tratamiento antihipertensivo -dosis o tipo de medicamento-. Cifras no óptimas de presión arterial: valores mayores al límite superior de presión arterial sistólica y diastólica según el protocolo vigente para el manejo de personas con esta patología, esas cifras pueden ser registradas en cualquier consulta (sea esta por HT o no). Dentro de esta definición se incluye: La ausencia de presión arterial registrada en las consultas en que se tenían las condiciones para incluirlas en EDUS. Incluye: • Consultas de primera vez de personas de 20 años y más, con diagnóstico de HT en el periodo. • Última consulta con posibilidad de registro de PA (cuando se tienen las condiciones para incluir en EDUS los registros), en personas de 20 años y más, con diagnóstico de HT, en los cuatro momentos el periodo. • Tratamiento antihipertensivo: Proveniente de listado de prescripciones de (Irbesartan 150 mg, Amlodipino 5 mg, Hidroclorotiazida 25 mg, Enalapril 20 y 5 mg, Atenolol 50 mg, Furosemida 40 mg, Espironolactona 100 mg, Carvedilol 6,25 y 12,5 mg, Propanolol Clorhidrato 40 mg, Metildopa Levo-Alfa 250 mg, Verapamilo Clorhidrato 80 mg, Isosorbide dinitrato 20 mg, Hidralazina Clorhidrato 50 mg, Sacubitrilo y Valsartan 50, 100 y 200 mg, Sacubitrilo 24,3 mg y Valsartan 25,7 mg); en personas de 20 años y más, con diagnóstico de HT (con fecha, tipo de medicamento y dosis). Excluye: • Cifras de PA inconsistentes (PAS< 50 mmHg, PAD < 40 mmHg). • Consultas sin registro de PA; que son realizadas en puestos de visita periódica y que no cuentan con Sistema Integrado de Expediente en Salud (SIES). •Tratamiento antihipertensivo con una prescripción no interpretable (dosis o frecuencia)
Variables involucradas en la medición	• Número de personas de 20 años y más con HT y cifras no óptimas de PA, sin ajuste del tratamiento antihipertensivo, en el periodo • Número de personas de 20 años y más con cifras no óptimas de PA, en el periodo.

Fórmula de cálculo	Número de personas con inercia terapéutica, en el periodo. X100 Número de personas con cifras no óptimas de PA, en el periodo	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	Prevención Tratamiento
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisibles: ECNT-HT
Línea base	No se tiene disponible.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (EDUS) • Reporte de hipertensión • Listado de prescripciones	
Clasificación	Indicador de Resultado	
Presentación de resultados	Reporte de resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual y monitoreo) Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)	
Comentarios generales	Se realiza el diseño y evaluación con la normativa y los recursos institucionales existentes. Se podrán realizar actualizaciones y cambios a esta ficha técnica si ocurren modificaciones en alguna de estas. Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Control óptimo de la presión arterial en personas con hipertensión (HT), según grupo de edad y sexo.	