


データの整理と活用

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 ちひろさんたちは、折り方のちがう紙飛行機A・Bを、それぞれ10回ずつ飛ばして、飛んだきりを調べました。下のドットプロットは、その記録です。



- こうへい 平均値でくらべると、Aのほうが大きいよ。Aのほうがよく飛ぶ紙飛行機だね。
- まいか でも、Aには1回だけ、ほかの記録からはなれた16mがあるよ。
- ちひろ それなら、ほかの代表値でもくらべてみようよ。

- (1) ㉠～㉤にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

Aの平均値は㉠m、Bの平均値は㉡mです。Aは、はなれた記録の16mがあるので、平均値が大きくなっています。記録を大きさの順に並べたとき真ん中にある㉢でくらべると、Aは㉣m、Bは㉤mで、Bのほうが大きくなります。

㉠

㉡

㉢

㉣

㉤

- 2 Bの記録のうち、8mだった1回が、もし18mだったとします。

(1) Bの平均値

(2) Bの中央値

- (3) 1つだけはなれた値があると、㉠は大きく変わりますが、㉡は変わりにくいです。

㉠

㉡

データの整理と活用

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1


2

3

4

めやす 15分

- 1 ちひろさんたちは、折り方のちがう紙飛行機A・Bを、それぞれ10回ずつ飛ばして、飛んだきりを調べました。下のドットプロットは、その記録です。



こうへい 平均値でくらべると、Aのほうが大きいよ。Aのほうがよく飛ぶ紙飛行機だね。

まいか でも、Aには1回だけ、ほかの記録からはなれた16mがあるよ。

ちひろ それなら、ほかの代表値でもくらべてみようよ。

- (1) ㉠～㉤にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

Aの平均値は㉠m、Bの平均値は㉡mです。Aは、はなれた記録の16mがあるので、平均値が大きくなっています。記録を大きさの順に並べたとき真ん中にある㉢でくらべると、Aは㉣m、Bは㉤mで、Bのほうが大きくなります。

㉠ 7

㉡ 6.7

㉢ 中央値

㉣ 6

㉤ 7

- 2 Bの記録のうち、8mだった1回が、もし18mだったとします。

(1) Bの平均値 7.7m

(2) Bの中央値 7m

- (3) 1つだけはなれた値があると、㉠は大きく変わりますが、㉡は変わりにくいです。

㉠ 平均値

㉡ 中央値

考え方

大問1 合計はAが70m、Bが67mです。中央値は5番目と6番目の平均で、Aは6m、Bは7mです。

大問2 合計は67-8+18=77mで、平均値は77÷10=7.7m。中央値は7mのままです。