

中学1年 理科	単元1 いろいろな生物とその共通点 2章 植物の分類	月 日
	花のつくりと種子植物	名前

ポイント

花のつくり

● 受粉

花粉がめしべの柱頭につくことです。子房は果実に、胚珠は種子になります。

● 被子植物

胚珠が子房の中にあります。種子は果実の中にできます。

● 裸子植物

子房がなく、胚珠がむき出しです。マツ、スギ、イチヨウなどです。

1 図は、被子植物の花の断面を表したものです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

各部分の名前

(1) A

名前

(2) B

名前

(3) C

名前

(4) D

名前

2 受粉と、果実・種子のでき方について、次の問いに答えなさい。

受粉と果実・種子

(1) 花粉がめしべの柱頭につくことを何といいますか。

答え

(2) 大問1の図のA～Dのうち、受粉したあとに果実になる部分と、種子になる部分の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア 果実：A 種子：B

イ 果実：B 種子：C

ウ 果実：C 種子：D

エ 果実：D 種子：C

(3) ある果実の中に、種子が12個ありました。この果実になる前の花の子房には、胚珠が少なくとも何個ありましたか。

答え

(4) 花のつくりについて正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

答え

ア やくの中に、胚珠が入っている。

イ 花の中心は、めしべである。

ウ がくは、花弁の内側にある。

エ 子房の中に、胚珠が入っている。


中学1年 理科	単元1 いろいろな生物とその共通点 2章 植物の分類	月 日
	花のつくりと種子植物（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

マツの花と種子植物

【観察】 マツの枝と、雌花・雄花のりん片を観察しました。


- ① 右の図のマツの枝で、花がついている位置を調べました。
- ② 雌花と雄花から、りん片を1まいずつ取りました。
- ③ 2まいのりん片を、ルーペで観察しました。



(1) 右の図で、雄花を表しているのは、A、Bのどちらですか。記号で答えなさい。

答え

(2) 右の図のC、Dは、雌花と雄花から取ったりん片です。
それぞれについてつくりの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。



答え

- ア C：雌花、胚珠 D：雄花、花粉のう
- イ C：雌花、花粉のう D：雄花、胚珠
- ウ C：雄花、胚珠 D：雌花、花粉のう
- エ C：雄花、花粉のう D：雌花、胚珠

(3) 被子植物の特徴として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 胚珠がむき出しでついている。
- イ 子房がない。
- ウ 胚珠が子房の中にある。
- エ 受粉すると、子房が果実になる。


答え

(4) 被子植物と裸子植物のちがいを、「子房」「胚珠」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 各部分の名前

考え方 花は、中心から外側へ、めしべ、おしべ、花弁、がくの順についています。めしべは、柱頭、花柱、子房からできています。



(1) A

柱頭

- めしべの先の部分で、花粉がつくと受粉します。

(2) B

やく

- おしべの先にある、花粉の入った袋です。

(3) C

子房

- めしべのもとのふくらんだ部分で、中に胚珠が入っています。

(4) D

胚珠

- 子房の中にある粒で、受粉したあと種子になります。

2 受粉と果実・種子

考え方 受粉すると、子房は果実に、胚珠は種子になります。部分の名前と、成長したあとの姿を結びつけます。

(1) 花粉が柱頭につくこと

受粉

- 花粉がめしべの柱頭につくことを、受粉といいます。

(2) 果実と種子になる部分

ウ

- 子房 (C) は果実に、胚珠 (D) は種子になります。

(3) 種子12個の果実

12個

- 種子は胚珠が成長してできます。
- 胚珠1個から種子が1個できるので、胚珠は少なくとも12個です。

(4) 花のつくり

イ、エ

- 花は、中心から外側へ、めしべ、おしべ、花弁、がくの順です。
- 胚珠は子房の中にあり、やくの中には花粉が入っています。


3 マツの花と種子植物

考え方 マツの雌花と雄花のりん片を比べて、胚珠と花粉のうの場所を確かめます。

(1) 雄花を表す記号

B


- 雌花は新しい枝の先に、雄花は新しい枝のもとにつきます。
- Bは新しい枝のもとにあるので、雄花です。



(2) りん片についているつくり

ア

- 雌花のりん片には、胚珠がむき出しでついています。
- 雄花のりん片には、花粉の入った花粉のうがついています。
- Cには白い粒（胚珠）が、Dには黄色い花粉のうが見えます。



(3) 被子植物の特徴

ウ、エ

- 被子植物は、胚珠が子房の中にあります。
- 受粉すると、子房が果実になり、中に種子ができます。
- ア、イは、裸子植物の特徴です。

(4) 被子植物と裸子植物のちがい

被子植物は胚珠が子房の中にあるが、裸子植物には子房がなく、胚珠がむき出しである。

- 被子植物では、胚珠が子房の中にあります。
- 裸子植物には子房がなく、胚珠がむき出しです。

まちがえやすいところ

- 子房が種子になると考えないように、子房は果実に、胚珠は種子になります。
- 裸子植物にも子房があると考えないように、裸子植物には子房がなく、胚珠がむき出しです。