

1 シダ植物のからだ

考え方 シダ植物は、胞子のうの胞子でふえます。茎は地下にあるものが多く、地下茎といいます。



(1) Aの名前

胞子のう

- 葉の裏にある、胞子が入った袋の集まりを、胞子のうといいます。

(2) Bの名前

地下茎

- 地面の線より下にある、太い茎を、地下茎といいます。

(3) ふえるもと

胞子

- 胞子は、胞子のうの中でつくられ、地面に落ちて新しい個体になります。


(4) シダ植物の特徴

ウ

- シダ植物は、種子ではなく胞子でふえ、根・茎・葉の区別と維管束があります。

2 コケ植物のからだ

考え方 コケ植物には、根・茎・葉の区別がありません。仮根でからだを固定し、水は体の表面からとり入れます。



(1) Aの名前

仮根

- からだを地面に固定する、根のようなつくりを、仮根といいます。

(2) Bの名前

雌株

- ゼニゴケの胞子のうは、雌株にできます。

(3) 水を取り入れるところ

からだの表面全体

- コケ植物は、水を体の表面全体からとり入れます。

(4) 維管束があるのは

シダ植物

- シダ植物には維管束があり、コケ植物にはありません。

3 植物の分類

考え方 図の観点を順にたどると、どの植物がどのグループに入るかがわかります。

(1) P～Sの言葉

P 種子植物 Q 被子植物 R シダ植物 S コケ植物

- Pは、種子をつくる種子植物です。
- Qは、そのうち胚珠が子房の中にある被子植物です。
- Rはシダ植物、Sはコケ植物です。

(2) Rに入る植物

ア、エ

- Rはシダ植物です。スギナとイヌワラビが入ります。
- ゼニゴケはコケ植物、マツは種子植物です。

(3) アブラナとイネを分ける観点

ウ

- アブラナは双子葉類、イネは単子葉類です。
- 同じ被子植物の中を分けるのは、子葉の数です。

(4) ふえ方のちがい

種子植物は種子でふえ、シダ植物とコケ植物は胞子でふえる。

- 種子植物は、花がさいて種子をつくり、種子でふえます。
- シダ植物とコケ植物は、胞子でふえます。

まちがえやすいところ

- コケ植物の仮根を、水を吸い上げる根と考えないように、からだを地面に固定するためのつくりと考えます。
- シダ植物とコケ植物を、種子でふえる植物と考えないように、どちらも胞子でふえる植物と考えます。