


1 各部分の名前

考え方 アブラナの花は、がく4枚、花弁4枚、おしべ6本、めしべ1本です。めしべの先が柱頭、もとが子房です。



(1) A

柱頭

- めしべの先の部分で、花粉がつくと受粉します。

(2) B

やく

- おしべの先にある、花粉の入った袋です。

(3) C

子房

- めしべのもとの部分で、中に胚珠が入っています。
- アブラナの子房は、細長い形をしています。

(4) D

胚珠

- 子房の中にある粒で、受粉したあと種子になります。

2 受粉と果実・種子

考え方 受粉すると、子房は果実に、胚珠は種子になります。部分の名前と、成長したあとの姿を結びつけます。

(1) 花粉が柱頭につくこと

受粉

- 花粉がめしべの柱頭につくことを、受粉といいます。

(2) 果実と種子になる部分

ウ

- 子房 (C) は果実に、胚珠 (D) は種子になります。

(3) 種子12個の果実

12個

- 種子は胚珠が成長してできます。
- 胚珠1個から種子が1個できるので、胚珠は少なくとも12個です。

(4) 花のつくり

イ、エ

- 花は、中心から外側へ、めしべ、おしべ、花弁、がくの順です。
- 胚珠は子房の中にあり、やくの中には花粉が入っています。

3 マツの花と種子植物

考え方 マツの雌花と雄花のりん片を比べて、胚珠と花粉のうの場所を確かめます。

(1) 雄花を表す記号

B

- 雌花は新しい枝の先に、雄花は新しい枝のもとにつきます。
- Bは新しい枝のもとにあるので、雄花です。



(2) りん片についているつくり

ア

- 雌花のりん片には、胚珠がむき出しでついています。
- 雄花のりん片には、花粉の入った花粉のうがついています。
- Cには白い粒 (胚珠) が、Dには黄色い花粉のうが見えます。



(3) 被子植物の特徴

ウ、エ

- 被子植物は、胚珠が子房の中にあります。
- 受粉すると、子房が果実になり、中に種子ができます。
- ア、イは、裸子植物の特徴です。

(4) 被子植物と裸子植物のちがい

被子植物は胚珠が子房の中にあるが、裸子植物には子房がなく、胚珠がむき出しである。

- 被子植物では、胚珠が子房の中にあります。
- 裸子植物には子房がなく、胚珠がむき出しです。

まちがえやすいところ

- 子房が種子になると考えないように、子房は果実に、胚珠は種子になります。
- 裸子植物にも子房があると考えないように、裸子植物には子房がなく、胚珠がむき出しです。