


1 シダ植物のからだ

考え方 シダ植物は、胞子のうの胞子でふえます。茎は地下にあるものが多く、地下茎といいます。



(1) Aの名前

胞子のう

- 葉の裏の茶色の細長い部分にある、胞子が入った袋を、胞子のうといいます。

(2) Bの名前

地下茎

- 地面の線より下にある、太い茎を、地下茎といいます。

(3) ふえるもと

胞子

- 胞子は胞子のうの中でつくられ、しめった地面に落ちると発芽します。


(4) シダ植物の特徴

ウ

- シダ植物は、種子ではなく胞子でふえ、根・茎・葉の区別があります。

2 コケ植物のからだ

考え方 コケ植物には、根・茎・葉の区別がありません。仮根でからだを固定し、水はからだの表面からとり入れます。



(1) Aの名前

仮根

- からだを地面に固定する、根のようなつくりを、仮根といいます。

(2) Bの名前

雌株

- ゼニゴケには雄株と雌株があり、胞子のうは雌株にできます。

(3) 水を取り入れるところ

からだの表面全体

- コケ植物は、水をからだの表面全体からとり入れます。

(4) 双眼実体顕微鏡のよい点

イ

- 両目で見るので立体的に見え、プレパラートをつくらずに観察できます。

3 植物の分類

考え方 図の基準を順にたどると、どの植物がどのグループに入るかがわかります。

(1) P～Sの言葉

P 種子植物 Q 被子植物 R シダ植物 S コケ植物

- Pは、種子をつくる種子植物です。
- Qは、そのうち胚珠が子房の中にある被子植物です。
- Rはシダ植物、Sはコケ植物です。

(2) Rに入る植物

ア、エ

- Rはシダ植物です。スギナとイヌワラビが入ります。
- ゼニゴケはコケ植物、マツは種子植物です。

(3) アブラナとイネを分ける基準

ウ

- アブラナは双子葉類、イネは単子葉類です。
- 同じ被子植物の中を分けるのは、子葉が1枚かどうかです。

(4) ふえ方のちがい

種子植物は種子でふえ、シダ植物とコケ植物は胞子でふえる。

- 種子植物は、花がさいて種子をつくり、種子でふえます。
- シダ植物とコケ植物は、胞子でふえます。

まちがえやすいところ

- コケ植物の仮根を、種子植物の根と同じものと考えないように、おもにからだを地面に固定するつくりと考えます。
- シダ植物とコケ植物を、種子でふえる植物と考えないように、どちらも胞子でふえる植物と考えます。