FICHA 1 2011/2012

Funções trigonométricas inversas

1. Calcule:

- a) $arcsen(-\frac{\sqrt{2}}{2})$
- b) 2arcsen(-1)
- c) $\cos(arcsen\frac{1}{2})$
- d) $tg\left(\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)$
- e) $\cot g \left(arcsen(-\frac{4}{5}) \right)$
- f) $sen(arcsen(-\frac{5}{13}))$
- g) $sen(\frac{\pi}{3} arctg\frac{4}{5})$
- **h**) $\cos \left[arcsen(\frac{1}{2}) \arccos(\frac{3}{5}) \right]$

2. Determine o número real designado por:

- a) $arcsen(sen\frac{\pi}{2}) + 4arcsen(-\frac{1}{2}) + 2arccos(-\frac{\sqrt{2}}{2})$
- b) $\cos^2\left(\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{3}\right) \sin^2\left(\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{3}\right)$
- c) $tg^2(arcsen\frac{3}{5}) \cot g^2(arc\cos\frac{4}{5})$

3. Considere as seguintes funções reais de variável real:

- a) $f(x) = 2\arcsin(2x 1) + \pi$ b) $g(x) = \cos \pi + 3\arccos(1 4x)$
- c) $h(x) = 2 \arccos\left(\frac{3}{x+2}\right) + \frac{\pi}{2}$ d) $i(x) = \frac{\pi}{3} + arctg\left(\frac{1}{x+5}\right)$

Determine o domínio e o contradomínio das funções indicadas. Caracterize as suas funções inversas.

4. Considere a função real de variável real definida por

$$p(x) = \frac{\pi}{3} - 2\arccos(x+1)$$

- a) Calcule $p(-1) p(-\frac{3}{2})$.
- b) Determine o domínio e o contradomínio da função.
- c) Calcule caso existam, os zeros de p.
- d) Caracterize a função inversa de p.
- e) Resolva a seguinte inequação; $p(x) \leq -\frac{\pi}{3}$.

- 5. Determine a expressão das derivadas das funções:
 - a) f(x) = xarcsen(4x)
- b) $g(t) = arctg^2(7t)$
- c) $h(y) = \sqrt{seny} + \arccos(\frac{1}{y})$ d) $i(x) = \cos(arctg(3x))$
- e) $j(t) = 3t.arcsen\left(\sqrt{t^2 1}\right)$ f) $m(y) = \frac{1}{\cos y} arctg(\frac{y}{2})$
- 6. Considere a função real de variável real definida por

$$t(x) = \frac{\pi}{4} + arctg\left(\frac{1}{x+1}\right)$$

- a) Calcule t(0) + t(-2).
- b) Determine o domínio e o contradomínio de t.
- c) Determine o conjunto de solução de A

$$A = \{x \in IR : t(x) > 0\}.$$

- d) Caracterize a função inversa de t.
- e) Escreva a equação da recta tangente de t, no ponto de abcissa 0.
- f) Que pode concluir acerca da continuidade de t no ponto de abcissa 0. Justifique a resposta.
- 7. Considere a função real de variável real definida por

$$g(x) = \frac{\pi}{3} + 2arcsen\left(\frac{1}{x}\right)$$

- a) Calcule g(1) + g(-2).
- b) Determine o domínio e o contradomínio de g.
- c) Determine o conjunto de solução de A

$$A = \left\{ x \in IR : g(x) \le \frac{2\pi}{3} \right\}.$$

- d) Caracterize a função inversa de q.
- e) Escreva a equação da recta tangente de g, no ponto de abcissa -2.