



Nazwa wskaźnika	15.3 Wskaźnik liczebności ptaków pospolitych krajobrazu rolniczego FBI (2000 = 100)
Cel Zrównoważonego Rozwoju	Cel 15. Życie na łądzie
Zadanie	-
Definicja	Zagregowany indeks stanu populacji 22 gatunków ptaków typowych dla siedlisk krajobrazu rolniczego (rok bazowy 2000=100).
Jednostka prezentacji	-
Dostępne wymiary	ogółem
Wyjaśnienia metodologiczne	<p>Gatunki ptaków, których indeksy liczebności składają się na FBI dla Polski: bocian biały, pustutka, czajka, rycyk, dudek, turkawka, skowronek, dzierlatka, świergotek łąkowy, pliszka żółta, dymówka, pokląskwa, kłaskawka, cierniówka, gąsiorek, mazurek, szpak, makolągwa, kulczyk, potrzuszcz, trznadel i ortolan.</p> <p>Wskaźnik wykalibrowany jest w relacji do roku bazowego, którym w przypadku Polski jest rok 2000. Oznacza to, że wartość FBI dla roku 2000 przyjęto umownie za 100. Wartość wskaźnika wynosząca 88 w roku 2010 oznacza, że w tym roku FBI był o 12% niższy niż w roku bazowym.</p> <p>Wskaźnik FBI jest obecnie jednym z oficjalnie stosowanych wskaźników stanu środowiska w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jest on traktowany jako wskaźnik stanu 'zdrowia' ekosystemów użytkowanych rolniczo.</p> <p>Wartości FBI uzyskiwane są na podstawie danych zbieranych w programie 'Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych'.</p>
Źródło danych	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Częstotliwość i dostępność danych	Dane roczne; od 2010 r.
Uwagi	-