

Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla priorytetów krajowych



2.7.b Odsetek dzieci w wieku 5-9 lat cierpiących na otyłość
Cel 2. Zero głodu
Promocja zdrowego stylu życia, w tym m.in. zdrowego odżywiania się zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci (zmniejszenie odsetka osób z nadwagą i otyłością)
Udział dzieci w wieku 5-9 lat cierpiących na otyłość w ogólnej liczbie dzieci w tej grupie wieku.
procent [%]
ogółem
Otyłość to nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej, stanowiące zagrożenie dla zdrowia. Miernikiem najpowszechniej stosowanym do rozpoznania i oceny stopnia otyłości jest wskaźnik masy ciała BMI (body mass index). Do oceny stanu odżywienia dzieci w wieku rozwojowym stosowane są tabele lub siatki centylowe wartości BMI uwzględniające wiek, osobne dla chłopców i dziewcząt. Zgodnie z obowiązującą definicją WHO: - nadwaga to zaburzenie, w którym wartość wskaźnika BMI jest równa lub większa od 85 centyla (≥85c), a mniejsza niż 97 centyla (<97c); - otyłość rozpoznajemy, gdy wartość wskaźnika BMI jest równa lub większa od 97 centyla (≥97c).
Światowa Organizacja Zdrowia
Dane roczne; od 2010 r.

Ostatnia aktualizacja: 15-12-2020, 08:20