
GluSynapse_v2 fit to paired L5→L5 data (reduced_gpu_subset_pl5r50_td3_s3)
a
Markram 1997
Sjöström 2001
Sjöström 2003 timing
Sjöström 2003 drugs
EPSP ratio (after / before)
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
10 Hz -10 ms
10 Hz 5 ms
10 Hz 10 ms
0.1 Hz -10 ms
0.1 Hz +10 ms
10 Hz -10 ms
10 Hz +10 ms
20 Hz -10 ms
20 Hz +10 ms
40 Hz -10 ms
40 Hz +10 ms
50 Hz -10 ms
50 Hz +10 ms
0.1 Hz -200 ms
0.1 Hz -120 ms
0.1 Hz -25 ms
burst 5x20Hz_r50 -200 ms
burst 5x20Hz_r50 -120 ms
0.1 Hz -10 ms
20 Hz -10 ms
50 Hz +10 ms
0.1 Hz -10 ms
20 Hz -10 ms
50 Hz +10 ms
b
χ² = 20.6 / 24 targets
|z| > 2: 0 median |z| = 0.71
fit
experiment
0.5
1.0
1.5
2.0
fit: control
fit: AM251 / ifenprodil (T block)
fit: 2V (NMDAR block)
experiment (mean ± SEM)