R1C
ПУСТЕЛЬНІ СТЕПИ
DESERT STEPPE

Загальний вигляд біотопу, Азово-Сиваський НПП, Херсонська обл.



Вигляд біотопу із квадрокоптера, Азово-Сиваський НПП, Херсонська обл.

Опис біотопу

Пустельні степи в Україні поширені лише на крайньому півдні, переважно вздовж берегової смуги Чорного та Азовського морів і в районі затоки Сиваш. Під ними сформувалися каштанові ґрунти та південні чорноземи, іноді з невеликим засоленням. Цей тип біотопів є одним з найтрансформованіших, оскільки зазнав майже тотального розорювання. Залежно від ступеня засолення виділяють два варіанти пустельних степів – засолені та справжні. Вцілілі невеликі ділянки, зайняті справжніми пустельними степами, збереглися по берегах морських лиманів (Тилігульський, Березанський, Бузький, Дніпровський), на схилах до Чорного моря, а також, дуже рідко, по правому корінному берегу Дніпра, де вони трапляються на досить крутих схилах переважно південної експозиції. У районі озера Сиваш залишилися також рівнинні або слабкопохилі ділянки зі справжніми пустельними степами. Рослинний покрив характеризується переважанням злаків (*Agropyron cristatum* subsp. *pectinatum*, *Festuca valesiaca* aggr., *Stipa ucrainica*), а також ксерофітних чагарничків і напівчагарничків (*Artemisia lerchiana*, *A. taurica*, *Caragana scythica, Salsola laricina, Bassia prostrata, Tanacetum achilleifolium*). Значною є також участь ефемерів та ефемероїдів, що пов'язано з раннім настанням весни та тривалою літньою посухою (*Alyssum* ssp., *Cerastium* ssp., *Gagea* ssp.,*Astragalus guttatus*, *Draba verna*, *Lamium amplexicaule*, *Medicago monspeliaca*, *Tulipa gesneriana*, *Veronica arvensis*, *V. verna, Vicia lathyroides* тощо). Слабко засолені степи поширені на Ягорлицькому півострові, а також у районі озера Сиваш. Вони займають здебільшого рівні плакорні ділянки, які піддаються поступовому засоленню внаслідок трансгресії Чорного моря. Флористичний склад характеризуєтсья домінуванням степових злаків (*Agropyron cristatum* subsp. *pectinatum*, *Festuca valesiaca* aggr.), а також участю галофітних видів, зокрема хамефітів (*Artemisia santonica*, *Camphorosma monspeliaca*, *Halimione verrucifera*, *Limonium gmelini*). При підвищенні засолення вони трансформуються у галофітні степи, що належать до типу R62. Характерною особливістю пустельних степів є наявність значної кількості накипних або дрібнолистуватих лишайників у міждернинних проміжках, звичайно *Enchylium tenax, Blennothallia crispa, Placidium squamulosum, Toninia sedifolia*, рідше *Squamarina lentigera, Psora decipiens, Fulgensia fulgens, F. desertorum, Athelium imperceptum*.

Індикатори оптимального стану:

- високе видове багатство;
- присутність рідкісних видів та / або тих, що перебувають під загрозою, переважно реліктового походження;
- значна участь хамефітів;
- відсутність інвазійних та рудеральних видів;
- традиційне землекористування з підтримання випасу низької інтенсивності.

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Agropyron cristatum* subsp. *cristatum, Bassia prostrata, Artemisia taurica, Artemisia lerchiana, Carduus uncinatus, Ferula caspica, Bromus squarrosus* subsp. *squarrosus, Prangos odontalgica, Ornithogalum orthophyllum, Lamium amplexicaule* var. *amplexicaule, Astragalus corniculatus, Verbascum blattaria, Camelina microcarpa, Ceratocephala falcata, Ranunculus oxyspermus, Valerianella turgida, Astragalus reduncus, Buglossoides arvensis, Achillea stepposa, Atriplex aucheri, Allium rotundum, Salvia aethiopis, Goniolimon tataricum var. taurica, Limonium sareptanum, L. tschurjukiense, Meniocus linifolius, Senecio leucanthemifolius* subsp. *vernalis, Klasea erucifolia, Galium tenuissimum, Marrubium peregrinum*

Мохоподібні: не характерні

Лишайники: *Fulgensia fulgens, F. desertorum, Placidiopsis cinerascens, Squamarina lentigera, Athelium imperceptum.*

Рідкісні види: *Allium regelianum*, Astragalus reduncus*, Bupleurum tenuissimum*, Caragana scythica*, Crambe tataria*, Goniolimon rubellum*, Limonium tschurjukiense*, Odontarrhena tortuosa*, Psathyrostachys juncea*, Stipa capillata*, S. lessingiana* subsp. *lessingiana*, S. ucrainica*, Tulipa gesneriana**

Чужорідні види рослин: *Elaeagnus angustifolia, Grindelia squarrosa, Erigeron canadensis , Peganum garmala, Lepidium draba, Centaurea diffusa*

Тварини

Молюски: не характерні

Комахи: *Bolivaria brachyptera*, Lixus canescens*, Megamecus argentatus, Paracossulus thrips**, Zegris eupheme*, Euchloe ausonia*, Triphysa phryne*, Pseudophilotes bavius***, Chazara briseis*, Hipparchia statilinus*, Chelis maculosa*, Zekelita antiqualis, Amata marjana, Eublemma ostrina, Cucullia argentina*, C. lactea*, C. santonici, Dichagyris duskei, D. vallesiaca, Xestia trifida, Anoplius samariensis*, Sphex funerarius*, Paravespa rex**

Плазуни: *Lacerta agilis, Vipera renardi*, Hierophis caspius*, Podarcis tauricus*

Птахи: *Calandrella brachydactyla**, Galerida cristata, Calandrella rufescens*, Burhinus oedicnemus***,* біля берегів моря та солоних озер – *Himantopus himantopus**, Recurvirostra avosetta***, Glareola nordmanni, G. pratincola***, Tadorna tadorna, Motacilla feldegg*

Ссавці: *Allactaga major*, Microtus socialis, Apodemus witherbyi, Sicista subtilis***, Cricetulus migratorius*, Mus spicilegus*

Класифікації біотопів

UkrBiotop
E:2.2131 Біотопи ксеротичних угруповань на елювіальних відкладах, глинистих відслоненнях
E:2.2132 Біотопи ксеротичних угруповань на коричневих щебенистих ґрунтах та елювіальних відкладах
Національний каталог біотопів України
T1.5 Пустельні степи / Desertified steppes
EUNIS (old)
E1.45 Sub-Mediterranean *Artemisia* steppes / Субсередземноморські полинові степи

Характерні види судинних рослин

Полин кримський
(*Artemisia taurica*)

Житняк гребінчастий
(*Agropyron cristatum* subsp. *pectinatum*)

Полин Лерхе
(*Artemisia lerchiana*)

Будяк гачкуватий
(*Carduus uncinatus*)

Курай модриновий
(*Salsola laricina*)

Ферула прикаспійська
(*Ferula caspica*)

Астрагал ріжкуватий
(*Astragalus corniculatus*)

Серпій колючий
(*Klasea erucifolia*)

Зубний корінь солонцевий
(*Prangos odontalgica*)

Жовтець гостронасінний
(*Ranunculus oxyspermus*)

Дивина тарганяча
(*Verbascum blattaria*)

Рястка прямолиста
(*Ornithogalum orthophyllum*)

Характерні види лишайників

Бленноталія курчава
(*Blennothallia crispa*)

Сквамарина сочевиценосна
(*Squamarina lentigera*)

Рідкісні види

Цибуля Реґеля
(*Allium regelianum*)

Ламкоколосник ситниковий
(*Psathyrostachys juncea*)

Тюльпан Геснера
(*Tulipa gesneriana*)

Кермечник червонуватий
(*Goniolimon rubellum*)

Астрагал зігнутий
(*Astragalus reduncus*)

Чужорідні види рослин

Маслинка вузьколиста
(*Elaeagnus angustifolia*)

Гармала звичайна
(*Peganum harmala*)

Робінія звичайна
(*Robinia pseudoacacia*)

Степовий гірчак повзучий
(*Rhaponticum repens*)

Волошка розчепірена
(*Centaurea diffusa*)

Ґринделія розчепірена
(*Grindelia squarrosa*)

Злинка канадська
(*Erigeron canadensis*)

Комахи

Ліксус катрановий
(*Lixus canescens*)

Псевдострокатка Мар'яна
(*Amata marjana*)

Сатир Брісеїда
(*Chazara briseis*)

Каптурниця молочно-біла
(*Cuculia lactea*)

Каптурниця срібляста
(*Cucullia argentina*)

Каптурниця полинова південна
(*Cucullia santonici*)

Совка Дуске
(*Dichagyris duskei*)

Червиця трипс
(*Paracossulus thrips*)

Совка трифіда
(*Xestia trifida*)

Плазуни

Ящірка прудка
(*Lacerta agilis*)

Птахи

Лежень
(*Burhinus oedicnemus*)

Ссавці

Хом'ячок сірий
(*Cricetulus migratorius*)

Резолюція 4 Бернської конвенції — Додаток I Оселищної Директиви
Частково 62CO Ponto-Sarmatic steppes / Понтично-Сарматські степи.

Синтаксономія:

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947
Galatello villosae-Stipetalia lessingianae Vynokurov 2021
Tanaceto millefolii-Galatellion villosae Vynokurov in Kolomiichuk et Vynokurov 2016
Artemisio tauricae-Festucion Korzhenevsky et Klyukin 1991
Psoretea decipientis Mattick ex Follmann 1974
Toninietalia coeruleonigricantis Hadač 1962
Toninion coeruleonigricantis Hadač in Klika 1948

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Загрози

Однією з найбільших загроз залишається розорювання пустельних степів. Меншою мірою - деградація через відсутність випасу. Також страждають від рекреаційного навантаження (у приморській частині). При неправильному господарюванні можливе заростання біотопу деревами та чагарниками, у тому числі чужорідними (*Elaeagnus angustifolia*). Через невисоке проєктивне покриття в біотопі вільні ніші займають види з високим інвазійним потенціалом, як *Anisantha tectorum*. В останні роки загрозою стало будівництво вітрових електростанцій.

Охорона і менеджмент

Створення заповідних об'єктів у місцях поширення біотопу. Помірний випас. За відсутності випасу збереженню екосистем пустельних степів сприяють нечасті пожежі. У разі поширення деревних та адвентивних рослин доцільне їх видалення. Нормування рекреаційного навантаження.

Поширення в Україні



Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
3	4	3	2	12	67	II	3	3	3	2	2	3	3	4	3	4	30	67	II	94	II

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
EN	VU	EN	VU	VU	VU	VU	LC	VU	VU	VU	VU