R21
МЕЗОФІЛЬНІ ПОСТІЙНІ ПАСОВИЩА РІВНИННИХ І ГІРСЬКИХ РЕГІОНІВ
MESIC PERMANENT PASTURE OF LOWLANDS AND MOUNTAINS

Луки пасовищного використання в заплаві середньої течії р. Горинь, Рівненська обл.

Луки пасовищного використання в заплаві р. Сіверський Донець, Харківська обл.

Опис біотопу

Цей тип об'єднує мезотрофні пасовища на глибоких добре дренованих ґрунтах, які широко розповсюджені по всій помірній зоні Європи, хоча у горах їхнє поширення обмежується більш теплими і континентальними регіонами. Такі пасовища є основою для тваринництва по всій Європі, але режими випасу суттєво відрізняються, від досить інтенсивного до легкого, від цілорічного до літнього і можуть включати ВРХ, коней, овець, кіз або різні їх комбінації. Напівдикі стада коней також можуть використовуватися у регіонах зі значними площами пасовищ. Дикі травоїдні, такі як олені й зайці, можуть мати локальне значення.

Перехід до R22 (рівнинні та низькогірні сінокісні луки) спостерігається, особливо коли відбувається посилення випасу навесні та в кінці літа, але на відміну від сінокісних лук на подібних ґрунтах, ці пасовища містять у своєму флористичному складі багато розеткових видів і менше високих злаків і різнотрав'я. Порівняно з сінокосами, які відзначаються весняним цвітінням, їхнє цвітіння переважно розтягнуто впродовж вегетаційного сезону. Якщо на цих луках здійснюється належне землекористування, у їхньому складі міститься багато кормових трав із високою поживною цінністю. Ці луки зазвичай характеризуються переважанням *Cynosurus cristatus*, *Bellis perennis*, *Trifolium repens* і *Lolium perenne* у рівнинних і гірських регіонах, а також *Poa alpina* і *Leontodon hispidus* у гірських регіонах з деякими асоційованими парами вікаруючих видів у відповідних ареалах, наприклад *Phleum pratense – Phleum rhaeticum*, *Trifolium repens – Trifolium thalii* і *Poa pratensis – Poa alpina*. Інші регіональні підтипи поширені у Південній Європі, де завдяки сприятливим кліматичним умовам, луки можуть використовуватися і як пасовища, і як сіножаті. Існують також варіації, зумовлені відмінностями ґрунтового покриву. На карбонатних ґрунтах *Plantago media, Briza media, Sanguisorba minor* і *Galium verum* вказують на перехід до лучних степів (тип R1A), тоді як на кислих, бідних на поживні речовини ґрунтах відбувається перехід до маловидових безкарбонатних угруповань типу R1M, ознаками чого є присутність *Nardus stricta, Potentilla erecta, Danthonia decumbens* і *Pilosella officinarum*. У бореальній зоні до них додається *Galium boreale*, в альпійських регіонах – *Gentiana nivalis, Gymnadenia carpatica* і види роду *Crocus*, а на вологих витоптуваних місцях на високогір'ї може домінувати *Poa supina*.

Зазвичай такі пасовища є багатовидовими з участю рідкісних видів, можуть витримувати деякі зміни у пасовищному режимі і тимчасові зміни в режимі землекористування, але вразливі до будь-яких суттєвих змін у практиці господарювання, особливо підживлення мінеральними добривами. Інколи буває підсів кормових трав, щоб отримати більш продуктивні маловидові пасовища. У таких випадках зміни відбуваються швидше, особливо у Західній Європі, де в останні роки цьому сприяли сільськогосподарські субсидії ЄС. У деяких гірських регіонах та у Східній Європі припинення випасу призводить до вторгнення кущів і дерев. Втрати площ та якості цього типу біотопу наразі мають великий масштаб і дуже мало перспектив щодо зменшення або припинення таких негативних тенденцій. Лише частина великих пасовищних ландшафтів у поєднанні з сінокосами, своєрідною архітектурою, топонімікою і фермерськими фестивалями збереглася фрагментарно, навіть у Східній Європі, і лише за умови фінансової підтримки природоохоронного менеджменту. Відновлення таких екосистем потребує обережного і обґрунтованого втручання й значно ускладнюється, якщо родючість ґрунту досягає високого рівня, або на просунутих сукцесійних стадіях заростання лісом.

Індикатори оптимального стану:

- продовження традиційного пасовищного землекористування;
- високе видове багатство;
- наявність характерних рідкісних видів;
- присутність грибів, характерних для «старих лук»;
- відсутність збагачення поживними речовинами за рахунок внесення мінеральних добрив або впливу атмосферного азоту;
- відсутність ознак перевипасу з поширенням неїстівних бур'янів, таких як види родів *Rumex, Cirsium, Senecio*;
- відсутність ознак недостатнього випасу з поширенням високих злаків, напр., *Arrhenatherum elatius.*

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Achillea millefolium* aggr., *Plantago lanceolata, Elytrigia repens* aggr., *Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Trifolium repens, Schedonorus pratensis, Galium verum, Prunella vulgaris, Convolvulus arvensis, Centaurea jacea* subsp. *jacea, Scorzoneroides autumnalis, Carex praecox, Ranunculus acris* aggr., *Potentilla argentea, Medicago lupulina, Agrostis capillaris, Poa pratensis, Cynosurus cristatus, Bellis perennis, Lolium perenne, Trifolium dubium, Plantago major*

Мохоподібні: *Thuidium delicatulum, Atrichum undulatum, Brachythecium rutabulum*

Лишайники: не характерні

Рідкісні види: *Anacamptis coriophora*, Carex secalina*, Fritillaria meleagroides*, Gladiolus tenuis**

Чужорідні види рослин: *Matricaria discoidea, Veronica filiformis, Juncus tenuis, Erigeron annuus, Trifolium hybridum*

Тварини

Молюски: *Cochlicopa lubrica, Euconulus fulvus, Vertigo pygmaea*

Комахи: *Zygaena purpuralis*, *Hesperia comma*, *Thymelicus sylvestris*, *Th. lineola*, *Pyrgus alveus*, *Colias hyale*, *Lycaena virgaureae*, *L. alciphron*, *Cupido minimus*, *Phengaris arion***, *Boloria dia*, *Fabriciana niobe*, *Lemonia taraxaci**, *Phytometra viridaria*, *Talpophila matura*, *Actinotia polyodon*, *Tholera decimalis*, *Th. cespitis*, *Cerapteryx graminis*, *Actebia praecox*, *Agrotis clavis*, *A. cinerea*, *Graphiphora augur*

Земноводні: *Rana arvalis, Pelobates fuscus, Bombina bombina*** (розливи, калюжі на заплавних луках), *B. variegata**** (калюжі на луках)

Плазуни: *Lacerta agilis, Zootoca vivipara* (біля межі з лісом), *Natrix natrix, N. tessellata*

Птахи: *Circus pygargus***, Coturnix coturnix, Perdix perdix, Phasianus colchicus* (біля чагарників та очеретяних заростей), *Crex crex**, Vanellus vanellus,*

Характерні види судинних рослин



Стокротки багаторічні
(*Bellis perennis*)

Тонконіг лучний
(*Poa pratensis*)

Пажитниця багаторічна
(*Lolium perenne*)

Гребінник звичайний
(*Cynosurus cristatus*)

Любочки осінні
(*Scorzoneroides autumnalis*)

Конюшина лучна
(*Trifolium pratense*)

Конюшина рівнинна
(*Trifolium campestre*)

Конюшина сумнівна
(*Trifolium dubium*)

Люцерна хмелевидна
(*Medicago lupulina*)

Конюшина повзуча
(*Trifolium repens*)

Суховершки звичайні
(*Prunella vulgaris*)

Подорожник великий
(*Plantago major*)

Характерні види мохів

Безволосник хвилястий
(*Atrichum undulatum*)

Короткокошик кочерговий
(*Brachythecium rutabulum*)

Рідкісні види

Плодоріжка блощична
(*Anacamptis coriophora*)



Рябчик малий
(*Fritillaria meleagroides*)

Косарики тонкі
(*Gladiolus tenuis*)

Чужорідні види рослин

Ромашка запашна
(*Matricaria discoidea*)

Вероніка нитковидна
(*Veronica filiformis*)

Ситник тонкий
(*Juncus tenuis*)

Злинка однорічна
(*Erigeron annuus*)



Конюшина гібридна
(*Trifolium hybridum*)

Характерні види тварин

Молюски

Агатівка звичайна
(*Cochlicopa lubrica*)

Комахи

Перлівець малий
(*Boloria dia*)

Підсрібник Ніобея
(*Fabriciana niobe*)

Синявець крихітний
(*Cupido minimus*)

Головчак кома
(*Hesperia comma*)

Совка похмура
(*Thalpophila matura*)

Совка пажитницева білосмугаста
(*Tholera decimalis*)

Фітометра червоно-зелена
(*Phytometra viridaria*)

Шовкопряд кульбабовий
(*Lemonia taraxaci*)

Головчак тире
(*Thymelicus lineola*)

Земноводні

Жаба гостроморда
(*Rana arvalis*)

Часничниця звичайна
(*Pelobates fuscus*)

Плазуни

Ящірка прудка
(*Lacerta agilis*)

Ящірка живородна
(*Zootoca vivipara*)

Вуж звичайний
(*Natrix natrix*)

Птахи

Коловодник звичайний
(*Tringa totanus*)

Брижач
(*Philomachus pugnax*)

Очеретянка лучна
(*Acrocephalus schoenobaenus*)

Фазан
(*Phasianus colchicus*)

Чайка чубата
(*Vanellus vanellus*)

Ссавці

Сліпак подільський
(*Spalax zemni*)

Ховрах європейський
(*Spermophilus citellus*)

Ховрах крапчастий
(*Spermophilus suslicus*)

Перегузня звичайна
(*Vormela peregusna*)

Tringa totanus і *T. stagnatilis** (заболочені ділянки заплавних сінокісних лук), *Philomachus pugnax*** (заболочені ділянки заплавних сінокісних лук), *Gallinago media****, *G. gallinago* (поблизу боліт), *Motacilla flava, M. alba, M. werae* (поблизу боліт), *M. cinerea* (у горах – поблизу гірських потоків), *Upupa epops, Saxicola rubetra, S. rubicola, Sylvia communis, Acrocephalus schoenobaenus, A. paludicola**** (осокові болота посеред заплавних лук), *Locustella fluviatilis* та *L. naevia* (поблизу озер та струмків), *Alauda arvensis, Anthus pratensis, A. spinoletta* (гірські луки), *Sturnus vulgaris* (у місцях із рідколіссям та біля узлісь), *Luscinia svecica*** (ділянки поблизу очеретяних заростей), *Emberiza citrinella, Miliaria calandra, Linaria cannabina, Lanius collurio***, (*L.excubitor** – на ділянках із чагарниковою рослинністю), (*Sylvia nisoria*** – на ділянках із чагарниковою рослинністю)

Ссавці: *Spermophilus suslicus****, *S. pygmaeus**, *S. citellus****, *Spalax arenarius****, *S.zemni****, *S. microphthalmus*; для Сходу України серед хижих ссавців характерним видом є *Vormela peregusna****

Класифікації біотопів

UkrBiotop
E:1.212 Мезофітні луки пасовищного використання
E:1.25 Кримські луки
Національний каталог біотопів України
T2.2.1 Рівнинні та низькогірні пасовища
T2.2.2 Гірські пасовища Карпат
T2.2.3 Гірські пасовища Криму
EUNIS (old)
E2.1 Permanent mesotrophic pastures and aftermath-grazed meadows / Постійні мезотрофні пасовища і луки, що випасаються по отаві
Резолюція 4 Бернської конвенції —
Додаток I Оселищної Директиви —

Синтаксономія:

Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937
Arrhenatheretalia elatioris Tx. 1931
Cynosurion cristati Tx. 1947
Poo alpinae-Trisetetalia Ellmauer et Mucina 1993
Poion alpinae Gams ex Oberd. 1950
Trifolio pratensis-Brizion elatioris Didukh et Kuzemko 2009
Helictotricho compressi-Bistortion officinalis Didukh et Kuzemko 2009

Загрози

Цей тип біотопу зазнав суттєвої трансформації унаслідок змін у землекористуванні і сільськогосподарських практиках. Сільськогосподарське «поліпшення» з метою збільшення родючості для молочної продукції і тваринництва, що почалося у Західній Європі й набуло широкого розповсюдження, значно збільшилось за обсягом та інтенсивністю впродовж останніх десятиліть у європейському масштабі, з одного боку, завдяки фінансовій підтримці від ЄС, а з іншого – через занепад традиційних практик сільського гоподарства. Додавання хімічних добрив, поверхневий підсів, культивування і пересівання зменшують видове багатство і регіональну різноманітність цього типу на значній частині території, формуючи дуже маловидові пасовища з домінуванням *Lolium perenne,* ін. високопродуктивних і конкурентоспроможних злаків і бобових. Це теж сприяє поширенню нітофільних синантропних видів: *Ballota nigra, Echinochloa crus-galli, Galinsoga quadriradiata, Iva xanthiifolia, Urtica urens*. Зростання пасовищного навантаження, що зумовлює деградацію ґрунту, витоптування і поширення бур'янів (у тому числі й адвентивних *Grindelia squarrosa*, *Erigeron canadensis* тощо), може також становити загрозу, а в деяких регіонах – переведення пасовищ в орні землі. Особливо у східних та північних, а також гірських регіонах відмова від традиційного пасовищного режиму є дуже розповсюдженим явищем, що призводить до розвитку серійних сукцесійних стадій заростання трав'яних біотопів чагарниковими і лісовими. В Україні в останні роки у зв'язку із земельною реформою і прогалинами у природоохоронному законодавстві відбувається швидке перетворення пасовищ на орні землі. Часто цей тип біотопу зберігається лише на охоронюваних територіях з певною фінансовою субсидією на підтримку традиційних пасовищ. За винятком таких випадків, і там, де існують місцеві програми відновлення, жодних ознак зменшення загроз наразі немає.

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Охорона і менеджмент

Охорона цього типу біотопу має бути спрямована на підтримання традиційних елементів фермерського господарства, наскільки це можливо: відповідних рівнів пасовищного навантаження, використання як добрива лише угноєння, вапнування та легких фосфатів. Зазвичай це означає виплату фермерам компенсації за втрачений дохід, оскільки у наші дні існує постійний тиск щодо інтенсифікації продукції тваринництва або перетворення пасовищ на орні землі. Для організації цієї фінансової підтримки мають застосовуватися різні схеми агроекологічного фінансування. У разі пошкодження біотопів даного типу, мета їхнього відновлення, так чи інакше, має бути спрямована на відновлення елементів традиційної практики, але часто заважає накопичена родючість (особливо зв'язаного фосфату) у ґрунтах та ширший перехід до інтенсивного

землеробства, що зумовлений ринковим попитом та субсидується значним заохоченням.

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
VU	VU	VU	VU	LC	LC	LC	LC	VU	VU	VU	LC

Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
2	3	2	2	9	42	III	3	1	1	2	1	3	2	3	3	1	20	33	IV	53	IV



Гірське пасовище. Чивчинські гори, Чернівецька обл.