R22
РІВНИННІ ТА НИЗЬКОГІРНІ СІНОКІСНІ ЛУКИ
LOW AND MEDIUM ALTITUDE HAY MEADOW

Загальний вигляд біотопу, заплава середньої течії р. Південний Буг, Вінницька обл.

Вигляд біотопу із квадрокоптера, заплава р. Горинь, Рівненська обл.

Опис біотопу

Це найбільш поширений тип лучних біотопів із традиційним землекористуванням у рівнинних регіонах та низькогір'ях помірної зони Європи, який включає багато локальних типів, що відрізняються особливостями клімату, геоморфології та традицій сінокосіння. Часто цей тип біотопів характеризується високим видовим багатством і значною участю рідкісних видів рослин.

Цей тип включає луки, які косять для отримання сіна і які формуються на глибоких, добре дренованих мезофітних ґрунтах у більшій частині Європи. Найбільше поширення вони мають у неморальній і борео-неморальній зонах, переважно у низовинах. У Південній Європі вони приурочені до територій з високою кількістю опадів на значних висотах, трапляючись у горах північної частини Іберійського півострова, на Апеннінах і в супра-Середземноморській зоні Балканського півострова. Ці луки зазвичай угноюють або злегка підживлюють хімічними добривами і косять раз або двічі за сезон, переважно для отримання сіна, а не на силос, інколи з незначним випасанням навесні або по отаві.

Домінантами у них виступають високопродуктивні злаки, такі як *Arrhenatherum elatius, Briza media, Dactylis glomerata, Schedonorus pratensis, Festuca rubra, Poa pratensis, Trisetum flavescens*, дводольні трави, особливо розеткові, з більш високими квітконосами, такі як *Crepis biennis, Heracleum sphondylium, Knautia arvensis*, *Leucanthemum vulgare*, *Pimpinella major, Plantago lanceolata* і *Rumex acetosa,* клональні геофіти, такі як *Geranium pratense* і *Sanguisorba officinalis*. Видове багатство може бути високим, особливо на територіях, де низькоінтенсивне землекористування тривало довгий час. Такі луки також краще відображають регіональні відмінності клімату, ґрунтового покриву. Перехід до типу R21 часто спостерігається у рівнинних регіонах, особливо там, де відбувається перехід від сінокосіння до помірного випасання, що сприяє формуванню більш низької структури травостою, випадінню кормових злаків, запобіганню поширенню більш високих розеткових гемікриптофітів. Хоча луки цього типу все ще широко розповсюджені у неморальній і борео-неморальній зонах, їхні площі скорочуються впродовж багатьох десятиліть як через перетворення на інтенсивні пасовища, так і через надмірне внесення добрив і пересівання для отримання силосу. Такі інтенсивні луки косяться три і більше разів на рік. Занедбаність із наступним заміщенням деревно-чагарниковою рослинністю також є широко розповсюдженим явищем.

Інтенсифікація таких лук у останні десятиліття сильно заохочується у країнах ЄС сільськогосподарськими субсидіями. У країнах Східної і Північної Європи, традиційні сінокоси занепадають і заміщуються деревно-чагарниковими біотопами внаслідок природної сукцесії. Втрати масштабів та якості біотопів цього типу спостерігаються нині по всій Європі, причому призупинити ці процеси вдається поки лише у кількох країнах. Тільки частина обширних сільськогосподарських ландшафтів зі своєрідними пасовищами, архітектурою, топонімікою і фермерськими фестивалями, що можуть служити гарними прикладами цього типу, збереглися нині фрагментарно навіть у Східній Європі і лише за умови фінансової підтримки природоохоронного землекористування. Відновлення потребує значних зусиль і ускладнюється у випадку високої родючості ґрунту або вторгнення деревно-чагарникової рослинності.

Індикатори оптимального стану:

- підтримання традиційного господарювання з одним або двома укосами на рік;
- слабкий випас навесні та / або по отаві або повна відсутність випасу;
- високе видове багатство;
- відсутність видів рослин, вимогливих до багатства ґрунту, високорослих конкурентоспроможних дводольних трав;
- відсутність чужорідних видів рослин;
- відсутність дерев та кущів;
- відсутність ознак перевипасу;
- відсутність ознак збільшення родючості ґрунту шляхом внесення хімічних добрив.

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Leucanthemum vulgare* aggr., *Trifolium pratense, Centaurea jacea* subsp. *jacea, Campanula patula* aggr., *Cynosurus cristatus, Anthoxanthum odoratum* aggr., *Briza media, Holcus lanatus, Plantago lanceolata, Polygala vulgaris, Schedonorus pratensis, Festuca rubra* aggr., *Lotus corniculatus, Stellaria graminea, Leontodon hispidus, Achillea millefolium* aggr., *Pimpinella saxifraga, Dactylis glomerata, Trifolium medium, Rumex acetosa, Rhinanthus minor, Crepis biennis, Poa pratensis, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Heracleum sphondilium, Knautia arvensis, Pimpinella major, Geranium pratense, Sanguisorba officinalis*

Мохоподібні: *Brachythecium salebrosum, B. rutabulum, Weissia controversa, Cirriphyllum piliferum, Thuidium delicatulum, Hypnum lindbergii, Atrichum undulatum, Rhytidiadelphus squarrosus*

Лишайники: не характерні

Рідкісні види: *Anacamptis morio*, A. pyramidalis*, Colchicum autumnale*, Dactylorhiza maculata*, Festuca heterophylla*, Gladiolus imbricatus*, Gymnadenia conopsea*, Orchis mascula* aggr.**, Platanthera bifolia*, Traunsteinera globosa**

Чужорідні види рослин: *Veronica filiformis, Lupinus polyphyllus, Sisyrinchium montanum, Erigeron annuus, Trifolium hybridum*

Тварини

Молюски: *Cochlicopa lubrica, Euconulus fulvus, Vertigo pygmaea*

Комахи: *Hepialus humuli*, *Lycaena dispar**, L. hippothoe*, *Cupido argiades*, *C. decoloratus*, *Phengaris nausithous***, *Ph. teleius***, *Cyaniris semiargus*, *Boloria selene*, *Brenthis ino*, *Melitaea athalia*, *Coenonympha glycerion*, *Melanargia galathea*, *Erebia medusa*, *Minois dryas*, *Hemaris tityus**, *Perizoma albulata*, *Epirrhoe tristata*, *Aplocera plagiata*, *Odezia atrata*, *Diacrisia sannio*, *Lygephila pastinum*, *Diachrysia zosimi**, *Cucullia umbratica*, *Apamea monoglypha*, *Conisania luteago*, *Hadena confusa*

Характерні види судинних рослин

Королиця звичайна
(*Leucanthemum vulgare*)

Конюшина лучна
(*Trifolium pratense*)

Дзвоники розлогі
(*Campanula patula*)

Волошка лучна
(*Centaurea jacea* subsp. *jacea*)

Китятки звичайні
(*Polygala vulgaris*)

Гребінник звичайний
(*Cynosurus cristatus*)

Костриця лучна
(*Schedonorus pratensis*)

Трясучка середня
(*Briza media*)

Зірочник злакоподібний
(*Stellaria graminea*)

Подорожник ланцетолистий
(*Plantago lanceolata*)



Пахуча трава звичайна
(*Anthoxanthum odoratum*)

Костриця червона
(*Festuca rubra*)

Любочки шорсткі
(*Leontodon hispidus*)

Бухарник шерстистий
(*Holcus lanatus*)

Характерні види мохів

Короткокошик кочерговий
(*Brachythecium rutabulum*)

Пофалдовник відстовбурчений
(*Rhytidiadelphus squarrosus*)

Рідкісні види

Плодоріжка салепова
(*Anacamptis morio*)

Плодоріжка пірамідальна
(*Anacamptis pyramidalis*)

Билинець комарниковий
(*Gymnadenia conopsea*)

Зозулинець чоловічий
(*Orchis mascula*)

Пізньоцвіт осінній
(*Colchicum autumnale*)



Траунштейнера куляста
(*Traunsteinera globosa*)

Косарики черепичасті
(*Gladiolus imbricatus*)

Любка дволиста
(*Platanthera bifolia*)

Чужорідні види рослин



Злинка однорічна
(*Erigeron annuus*)

Вероніка нитковидна
(*Veronica filiformis*)

Конюшина гібридна
(*Trifolium hybridum*)

Люпин багатолистий
(*Lupinus polyphyllus*)

Характерні види тварин

Молюски

Агатівка звичайна
(*Cochlicopa lubrica*)

Комахи

Синявець темно-синій
(*Cyaniris semiargus*)

Металовидка родовикова
(*Diachrysia zosimi*)

Синявець вицвілий
(*Cupido decolorata*)

Каптурниця сіра
(*Cucullia umbratica*)

Ведмедиця лучна
(*Diacrisia sannio*)

Евклідія конюшинова руда
(*Euclidia glyphica*)

Гірняк Медуза
(*Erebia medusa*)

Мереживниця Галатея
(*Melanargia galathea*)

Рябець Аталія
(*Melitaea athalia*)

Земноводні

Жаба гостроморда
(*Rana arvalis*)

Часничниця звичайна
(*Pelobates fuscus*)

Часничниця Палласа
(*Pelobates vespertinus*)

Плазуни

Ящірка прудка
(*Lacerta agilis*)

Ящірка живородна
(*Zootoca vivipara*)

Вуж звичайний
(*Natrix natrix*)

Птахи

Брижач
(*Philomachus pugnax*)

Коловодник звичайний
(*Tringa totanus*)

Фазан
(*Phasianus colchicus*)

Очеретянка лучна
(*Acrocephalus schoenobaenus*)

Кобилочка річкова
(*Locustella fluviatilis*)

Земноводні: *Rana arvalis, Pelobates fuscus, P. vespertinus, Pelophylax lessonae, P. esculentus, Bombina bombina*** (розливи, калюжі на заплавних луках), *B. variegata****

Плазуни: *Lacerta agilis, Zootoca vivipara* (біля межі з лісом), *Natrix natrix, N. tessellata*

Птахи: *Circus pygargus****, *Coturnix coturnix, Perdix perdix, Phasianus colchicus* (біля чагарників та очеретяних заростей), *Crex crex**, *Vanellus vanellus, Tringa totanus* і *T. stagnatilis** (заболочені ділянки заплавних сінокісних лук), *Philomachus pugnax*** (заболочені ділянки заплавних сінокісних лук), *Gallinago media****, *G. gallinago* (поблизу боліт), *Motacilla flava, M. alba, M. werae* (поблизу боліт), *M. cinerea* (у горах – поблизу гірських потоків), *Upupa epops, Saxicola rubetra, S. rubicola, Sylvia communis, Acrocephalus schoenobaenus, A. paludicola**** (осокові болота посеред заплавних лук), *Locustella fluviatilis* та *L. naevia* (поблизу озер та струмків), *Alauda arvensis, Anthus pratensis*, *Sturnus vulgaris* (у місцях із рідколіссям та біля узлісь), *Luscinia svecica*** (ділянки поблизу очеретяних заростей), *Emberiza citrinella, Miliaria calandra, Linaria cannabina, Lanius collurio***, (*L. excubitor** – на ділянках із чагарниковою рослинністю), (*Sylvia nisoria*** – на ділянках із чагарниковою рослинністю)

Ссавці: *Micromys minutus*

Класифікації біотопів

UkrBiotop
E:1.222 Сінокісні луки на багатих дерново-глейових ґрунтах
Національний каталог біотопів України
T2.3.1 Рівнинні та низькогірні сінокісні луки
EUNIS (old)
E2.2 Low and medium altitude hay meadows / Рівнинні та низькогірні сінокісні луки
Резолюція 4 Бернської конвенції
E2.2 Low and medium altitude hay meadows / Рівнинні та низькогірні сінокісні луки
Додаток I Оселищної Директиви
6510 Lowland hay meadows (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*) / Низинні сінокісні луки (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)

Синтаксономія:
Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937
Arrhenatheretalia elatioris Tx. 1931
Arrhenatherion elatioris Luquet 1926

Загрози

Цей тип був суттєво змінений через зміни у фермерських практиках і землекористуванні. Відхід від традиційної заготівлі сіна, з певним весняним та осіннім випасом худоби і внесенням лише органічних добрив (тваринного гною), який відбувся по всій Європі, починаючи із заходу, значно прискорився після Другої світової війни, значно збільшився за масштабами й інтенсивністю в останні десятиліття через фінансову підтримку ЄС. Внесення хімічних добрив, поверхневий підсів, культивація і пересівання призвели до зниження видового багатства і регіональної різноманітності цього типу на більшій частині Північно-Західної Європи з формуванням дуже маловидового травостою з домінуванням *Lolium perenne* та ін. високопродуктивних і конкурентоспроможних злаків і бобових. Вони тепер косяться переважно на силос, інколи кілька разів на рік і більш інтенсивно випасаються навесні і восени. В інших випадках такі луки були перетворені на інтенсивні постійні пасовища або орні землі чи заліснені. У Східній та Північній Європі, особливо у передгір'ях, припинення традиційного сінокісного використання призводить до їх заміщення деревно-чагарниковою рослинністю. В Україні в останні роки у зв'язку із земельною реформою і прогалинами у природоохоронному законодавстві відбувається швидке перетворення сіножатей на орні землі. У деяких регіонах Європи цей тип нині залишився лише на охоронюваних територіях з певними фінансовими субсидіями для підтримання традиційного сінокосіння. За винятком таких випадків і там, де існують місцеві програми відновлення, жодних ознак зменшення загроз немає.

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Охорона і менеджмент

Охорона цього типу біотопу має бути спрямована на підтримку традиційних фермерських практик: припинення випасання пізньої весни, заготівля сіна влітку, використання лише органічних добрив (угноєння), вапнування і внесення м'яких фосфатів. Зазвичай це означає виплати фермерам компенсацій за втрачений дохід, оскільки в наші дні заготівля сіна є не завжди економічно вигідною. Для управління цією фінансовою підтримкою в ЄС впроваджені різні схеми фінансування сільського господарства. У тих місцях, де сінокоси зазнали деградації, відновлення так чи інакше має бути спрямоване на відновлення елементів традиційних практик – повторних викошувань сіна з метою зниження родючості ґрунту, зниження інтенсивності весняного випасу, пізнє викошування для отримання сіна або сінажу та підсипання зеленого сіна, зібраного з лук вищої якості, разом із насінням цінних видів.

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
EN	VU	VU	VU	NT	LC	LC	LC	VU	EN	EN	DD

Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
2	3	2	2	9	42	III	3	1	1	2	2	3	2	3	3	1	23	43	IV	60	III

Загальний вигляд біотопу, передгір’я Карпат, Івано-Франківська обл.