



Observatorio Nacional de Drogas

Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2020



Observatorio Nacional de Drogas

Décimo Cuarto
Estudio Nacional de Drogas
en Población General
de Chile, 2020

Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020

Observatorio Nacional de Drogas
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile
Santiago, Chile
2021

© SENDA
Registro de Propiedad Intelectual N° 2022-A-925
ISBN: 978-956-9141-74-4

Equipo Responsable: Observatorio Nacional de Drogas
Edición: Marly Mora Neumann
Diagramación: M. Bethania Rodrigues Alfaro

Contenido

5	PRINCIPALES ASPECTOS METODOLÓGICOS
7	Serie de estudios nacionales de drogas en población general
8	Objetivos del estudio
8	Objetivos generales
8	Objetivos específicos
8	Metodología
8	Marco muestral y unidades de muestreo
12	Muestra y diseño muestral
14	Factores de expansión
17	Antecedentes previos al inicio del trabajo de terreno
19	Metodología de aplicación de las encuestas
25	Prevalencia y drogas estudiadas
26	Consideraciones para el análisis de la información
27	PRINCIPALES RESULTADOS
29	Tendencias del consumo de alcohol y otras drogas
29	Consumo de marihuana
31	Consumo de clorhidrato de cocaína
32	Consumo de pasta base
33	Consumo de alcohol
34	Consumo de bebidas energéticas
34	Consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos
36	Prevalencias de otras drogas
37	Incidencias de consumo en el último año
38	Percepción de uso de drogas
38	Percepción de riesgo
39	Oferta y disponibilidad de alcohol y otras drogas
39	Disponibilidad de alcohol
40	Percepción de facilidad de acceso a drogas
41	Disponibilidad de drogas
44	Frecuencia de consumo y trastornos por uso de sustancias
44	Frecuencia en el uso de alcohol y otras drogas
46	Consumo problemático de drogas
47	Embriaguez y consumo de riesgo de alcohol
49	Conducción de vehículos y consumo de sustancias
49	Otros indicadores asociados al consumo
49	Consumo de drogas en el hogar
51	Percepción de problemas en el barrio de residencia

52	Opinión pública
52	Evaluación de medidas para la regulación y control de drogas
53	Escenario en regiones
57	PRINCIPALES RESULTADOS REGIONALES
59	Región de Arica y Parinacota
69	Región de Tarapacá
79	Región de Antofagasta
89	Región de Atacama
99	Región de Coquimbo
109	Región de Valparaíso
119	Región Metropolitana de Santiago
129	Región del Libertador Bernardo O'Higgins
139	Región del Maule
149	Región de Ñuble
157	Región del Biobío
167	Región de La Araucanía
177	Región de Los Ríos
187	Región de Los Lagos
197	Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
207	Región de Magallanes y La Antártica Chilena
217	ANEXOS
217	Anexo I: Cuadros estadísticos con información nacional complementaria serie SENDA 1994-2020
305	Anexo II: Situación regional del consumo de alcohol y otras drogas
330	Anexo III: Cuestionario aplicado



Principales Aspectos Metodológicos

Principales Aspectos Metodológicos

SERIE DE ESTUDIOS NACIONALES DE DROGAS EN POBLACIÓN GENERAL

SENDA ha realizado el *Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile* en conformidad con el compromiso de observar las tendencias en el uso de alcohol y otras drogas en el país a través de un estudio sistemático, metodológicamente consistente y a escala nacional. La serie de estudios en población general se realiza cada dos años, durante el segundo semestre de los años pares.

La serie en población general consta de catorce estudios: los nueve primeros (1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 y 2010) se llevaron a cabo bajo la responsabilidad del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE); los cinco últimos (2012, 2014, 2016, 2018 y 2020) se han realizado bajo formato, procedimientos y responsabilidad del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).

El trabajo de campo del *Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile* (ENPG 2020) se realizó entre los meses de noviembre de 2020 y junio de 2021. La encuesta se aplicó a un total de 16.662 personas de entre 12 y 65 años de edad, de ambos sexos y distintos niveles socioeconómicos, pertenecientes a las 16 regiones del país.

La cobertura del ENPG 2020 (viviendas particulares de los sectores urbanos de 109 comunas del país con población de 30.000 o más habitantes) corresponde aproximadamente al 70% del total de la población nacional. La aplicación de la encuesta fue realizada por un organismo externo al SENDA, convocado mediante licitación pública: Ipsos Chile.

La serie en población general ha conservado sus características fundamentales: está basada en un cuestionario que se aplica por medio de entrevistas cara a cara en hogares contenidos en viviendas, en población de ambos sexos de entre 12 y 64 años de

edad en todas las regiones del país¹. El formato de las preguntas que registran consumo de drogas (prevalencias, edad de inicio, incidencia, frecuencia, entre otras) ha sido siempre el mismo. Las muestras no han variado sustancialmente en tamaño y cobertura de las comunas seleccionadas. El número de comunas que configuran el universo del estudio ha permanecido estable desde el año 2000 en adelante, con aumentos derivados de la subdivisión de comunas antiguas, del crecimiento de otras que han sobrepasado los 30.000 habitantes o de la creación de nuevas regiones.

Sin embargo, y en atención a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, se realizaron adaptaciones metodológicas para permitir la aplicación del cuestionario en este contexto. No obstante lo anterior, se establece que dichas adaptaciones mantienen la comparabilidad de la serie de estudios.

¹ En el *Séptimo Estudio Nacional de Drogas en Población General* se amplió el límite de edad de la población entrevistada hasta 65 años para cumplir con normas de comparabilidad internacional. El examen de tendencias nacionales considera solamente la población de entre 12 y 64 años de edad.

TABLA 1
Serie de Estudios Nacionales de Drogas en Población General de Chile. 1994-2020.

Año	Estudio	Número de comunas	Tamaño muestral	Universo
1994	I Estudio Nacional de Drogas en Población General	66	8.271	6.186.528
1996	II Estudio Nacional de Drogas en Población General	72	12.421	6.917.182
1998	III Estudio Nacional de Drogas en Población General	62	31.665	6.940.727
2000	IV Estudio Nacional de Drogas en Población General	86	44.421	7.779.905
2002	V Estudio Nacional de Drogas en Población General	87	16.476	8.392.058
2004	VI Estudio Nacional de Drogas en Población General	87	16.366	8.715.567
2006	VII Estudio Nacional de Drogas en Población General	91	17.192	8.876.262
2008	VIII Estudio Nacional de Drogas en Población General	95	17.113	8.954.639
2010	IX Estudio Nacional de Drogas en Población General	108	16.000	9.738.623
2012	X Estudio Nacional de Drogas en Población General	108	17.154	9.940.512
2014	XI Estudio Nacional de Drogas en Población General	108	20.113	10.088.247
2016	XII Estudio Nacional de Drogas en Población General	108	19.147	10.356.863
2018	XIII Estudio Nacional de Drogas en Población General	109	19.427	10.992.349
2020	XIV Estudio Nacional de Drogas en Población General	109	16.662	11.159.046

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivos generales

- Describir la magnitud del consumo de alcohol y otras drogas y su distribución geográfica, de acuerdo a variables psicosociales del individuo, su familia y su entorno, en la población de 12 a 65 años de edad que reside en sectores urbanos de las 16 regiones del país.
- Describir las tendencias del consumo de alcohol y otras drogas a nivel nacional y regional, tomando como base la serie de Estudios Nacionales de Drogas en Población General de Chile (CONACE, 1994-2010; SENDA, 2012-2020).

Objetivos específicos

- Determinar las tasas y tendencias de prevalencia e incidencia del consumo de drogas según las principales características sociodemográficas: sexo, edad y nivel socioeconómico.
- Describir las principales características del uso de alcohol y otras drogas, tales como edad de inicio, policonsumo y frecuencia e intensidad de uso.

- Determinar las prevalencias de dependencia declaradas en drogas ilícitas y consumo de riesgo de alcohol.
- Conocer la magnitud y las características del consumo de drogas en poblaciones específicas.
- Describir la relación del consumo de alcohol y otras drogas con las características del entorno: uso en el medio social inmediato, interacción con personas que consumen, consumo de alcohol y otras drogas en el grupo de pares, percepción de disponibilidad de drogas, opinión y actitud respecto de las drogas.
- Determinar el nivel de conocimiento y evaluación de distintas políticas vinculadas al consumo de alcohol y otras drogas.

METODOLOGÍA

La muestra del ENPG 2020 fue proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sobre la base de una selección aleatoria de manzanas y viviendas, que se completa con un procedimiento de selección, también aleatorio, de personas dentro de las viviendas. Se excluye población que vive o se encuentra en situación de calle y en instituciones como hospitales y cárceles, entre otras.

Desde 1994 hasta 2008 la encuesta se aplicó con cuestionarios de papel. A partir de 2010 la encuesta se aplica en modalidad CAPI (*Computer-Assisted Personal Interviewing*). En ambas modalidades se disponía de un apartado autoaplicado que entregaba la opción al entrevistado de registrar por sí mismo respuestas de los módulos de drogas. En 2020, además de la modalidad CAPI, se dispuso de la modalidad telefónica o CATI (*Computer-Assisted Telephones Interviewing*) para la aplicación del cuestionario en caso de que las condiciones sanitarias no permitan la aplicación CAPI. Esto se tradujo en la eliminación de la opción de responder el cuestionario de forma autoaplicada, rephrasear preguntas y alternativas, junto a la eliminación del uso de tarjetas por parte del encuestador.

Marco muestral y unidades de muestreo

El marco muestral utilizado en este estudio es generado a partir de la cartografía digital proveniente del Censo de Población y Vivienda 2002, actualizado a 2015. La información del marco se actualiza con antecedentes de los registros administrativos asociados a nuevas construcciones que otorgan los municipios, lo que permite mantener actualizado el número total de viviendas en la manzana e incorporar aquellas creadas con posterioridad al Censo de Población y Vivienda del año 2002. Las unidades que componen este marco muestral en el área urbana se denominan "manzanas" y corresponden a delimitaciones geográficas fijas; en adelante, se denominará como Marco Muestral de Manzanas (MM2015).

A partir de este marco se seleccionan las unidades de la primera etapa, las que son sometidas a un proceso de "enumeración", para luego seleccionar las unidades de la segunda etapa que posteriormente son encuestadas. Estas unidades están definidas por:

- Unidad de primera etapa: manzanas.
- Unidad de segunda etapa: viviendas particulares ocupadas.

ESTRATIFICACIÓN DEL MARCO MUESTRAL

El marco muestral está compuesto de dos listados de áreas geográficas conformadas a partir del Censo de Población y Vivienda 2002. Estos listados sirven de base para seleccionar las viviendas requeridas en diversas encuestas y contienen las unidades geográficas del país, organizadas de forma jerárquica. Esta ordenación se denomina división político-administrativa y las divisiones corresponden, en orden descendente, a los niveles región, provincia y comuna. Al interior de cada comuna se conforma la división censal que da origen a las áreas urbana y rural. Así, el listado que contiene las áreas urbanas corresponde al MM2015, definido por subdivisiones denominadas manzanas. El listado que contiene las entidades rurales y el resto de las áreas urbanas que no están en el MM2015 se denomina Marco de Secciones 2002 (MS2002), definido por subdivisiones denominadas secciones.

Estas subdivisiones (manzanas) son las unidades geográficas más pequeñas y corresponden a las unidades de muestreo diseñadas para este estudio. De esta manera, esta encuesta solo considera el área urbana de las 109 comunas que se encuentran en el MM2015 y, por lo tanto, las unidades seleccionadas corresponden a manzanas.

Para esta versión y de igual manera que en el estudio anterior, se definieron seis grupos de tamaño. De esta manera, cada manzana del marco quedó estratificada en forma geográfica (división político-administrativa) en estos grupos. Luego, los estratos de muestreo para el área urbana corresponden a la intersección de comuna con los grupos de tamaño.

A continuación, se muestra la conformación de los grupos de tamaño y el número de viviendas y manzanas dentro de cada grupo²:

TABLA 2
Total de manzanas y viviendas en MM2015,
según grupo de tamaño.

Grupo de tamaño	Rango de viviendas en el grupo	Número de manzanas en el grupo	% del total de manzanas	Número de viviendas en el grupo	% del total de viviendas
Total		113.166	100	3.595.622	100
0	1 - 7	10.117	8,9	38.678	1,1
1	8 - 23	52.249	46,2	828.082	23,0
2	24 - 44	35.320	31,2	1.097.355	30,5
3	45 - 81	9.370	8,3	536.222	14,9
4	82 - 154	3.659	3,2	404.071	11,2
5	155 y más	2.451	2,2	691.214	19,2

2 Por definición existen seis grupos de tamaño. Sin embargo, para efectos de selección de unidades primarias de muestro, no se considera el grupo denominado "0", por estar formado por manzanas que contienen menos de 8 viviendas. Esta decisión, que ha sido consistente a lo largo de la serie de estudios, se justifica por el elevado costo asociado a temas operativos que implica el levantamiento de la encuesta en esas manzanas.

COBERTURA DEL MARCO MUESTRAL

La encuesta considera el área urbana de 109 comunas del país. Para calcular la cobertura se debe considerar la información del marco muestral completo, es decir, la información de ambos listados. Por un lado, del listado urbano correspondiente al MM2015, las 109 comunas de la muestra representan a nivel nacional 87,5% de las viviendas en el área urbana; a nivel regional, representan como mínimo un 66,3% de las viviendas de la Región de Ñuble hasta un 98,2% de las viviendas de las regiones de Arica y Parinacota y Metropolitana.

Por otro lado, el listado correspondiente al MS2002 contiene una pequeña cantidad de áreas urbanas que no están presentes en el listado de manzanas y que se excluyen de la selección de la muestra. Para calcular la cobertura de las 109 comunas de la muestra es necesario juntar ambos listados. Así, a nivel nacional, en el marco muestral completo representa 84,6% de las viviendas del área urbana total; a nivel regional, la muestra representa entre 59,0% y 97,8% de las viviendas del área urbana total para las regiones de Ñuble y Arica y Parinacota, respectivamente.

TABLA 3
Cobertura total del estudio según ambos listados (MM2015–MS2002) y listado urbano (MM2015). Chile, 2020.

Región	Total viviendas			Total manzanas		
	MS2002 - MM2015	MM2015	Marco SENDA (Grupos de tamaño 1 a 5)	MS2002 - MM2015	MM2015	Marco SENDA (Grupos de tamaño 1 a 5)
Nacional	4.202.895	4.064.511	3.556.944	135.401	133.759	103.049
Tarapacá	79.347	78.556	75.715	2.308	2.295	1.999
Antofagasta	141.778	141.342	123.106	5.705	5.698	4.346
Atacama	75.974	75.289	51.751	3.976	3.966	2.139
Coquimbo	161.596	154.540	121.832	6.914	6.824	4.645
Valparaíso	537.852	523.949	399.443	19.527	19.346	12.475
O'Higgins	182.262	165.379	123.957	6.002	5.789	3.745
Maule	204.654	185.055	150.592	6.943	6.703	4.999
Biobío	378.801	365.180	298.420	13.624	13.460	9.438
La Araucanía	193.755	174.050	128.715	7.441	7.202	4.732
Los Lagos	153.892	142.534	105.935	5.469	5.332	3.638
Aysén	24.881	22.253	21.799	1.071	1.029	911
Magallanes	47.015	45.711	38.781	2.095	2.073	1.583
Metropolitana	1.797.850	1.784.073	1.752.522	46.094	46.017	42.743
Los Ríos	74.298	67.913	53.900	2.648	2.569	1.780
Arica y Parinacota	58.280	58.057	57.007	2.428	2.424	2.144
Ñuble	90.660	80.630	53.469	3.156	3.032	1.732

TABLA 4
Cobertura total del estudio según ambos listados
(MM2015–MS2002) y listado urbano (MM2015).
Chile, 2020.

Región	Cobertura marco SENDA (%) según MS2002–MM2015		Cobertura marco SENDA (%) según MM2015	
	Viviendas	Manzanas	Viviendas	Manzanas
Nacional	84,6	76,1	87,5	77,0
Tarapacá	95,4	86,6	96,4	87,1
Antofagasta	86,8	76,2	87,1	76,3
Atacama	68,1	53,8	68,7	53,9
Coquimbo	75,4	67,2	78,8	68,1
Valparaíso	74,3	63,9	76,2	64,5
O'Higgins	68,0	62,4	75,0	64,7
Maule	73,6	72,0	81,4	74,6
Biobío	78,8	69,3	81,7	70,1
La Araucanía	66,4	63,6	74,0	65,7
Los Lagos	68,8	66,5	74,3	68,2
Aysén	87,6	85,1	98,0	88,5
Magallanes	82,5	75,6	84,8	76,4
Metropolitana	97,5	92,7	98,2	92,9
Los Ríos	72,5	67,2	79,4	69,3
Arica y Parinacota	97,8	88,3	98,2	88,4
Ñuble	59,0	54,9	66,3	57,1

SELECCIÓN DE UNIDADES MUESTRALES

La selección de unidades muestrales se realiza en tres etapas. En una primera etapa se seleccionan manzanas (unidades de primera etapa); luego, se seleccionan viviendas particulares ocupadas (unidades de segunda etapa) y, finalmente, se selecciona el informante (unidad de tercera etapa) que responde en representación de sí mismo y caracteriza su hogar.

SELECCIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES DE PRIMERA ETAPA

La selección de las unidades de primera etapa (manzanas) en cada una de las comunas pertenecientes a la muestra, y dentro de cada grupo de tamaño, se efectuó en forma independiente, sistemática y con igual probabilidad.

El estrato de muestreo considera el grupo de tamaño con el fin de optimizar la selección de las manzanas, en el sentido de elegir tanto manzanas grandes como pequeñas dentro de cada comuna, manteniendo la proporcionalidad de los grupos de tamaño.

El procedimiento de selección de manzanas se realiza a través de una selección sistemática de manzanas, a partir de una semilla aleatoria. La selección fue realizada considerando como estratos el cruce de

las variables comuna y grupo de tamaño. Previo a la selección, se ordenan las manzanas de acuerdo a variables de región, comuna, grupo de tamaño, distrito censal, zona censal y código de manzana.

Luego, la probabilidad de inclusión de la i -ésima Unidad de Primera Etapa dentro de cada comuna h por grupo de tamaño g es igual a:

$$P_{hg}(i) = \frac{n_{hg}}{N_{hg}}$$

Donde:

h representa el índice de la comuna.

g representa el índice del grupo de tamaño.

n_{hg} es el número de manzanas seleccionadas en la comuna h del grupo de tamaño g .

N_{hg} es el número de manzanas en el marco en la comuna h del grupo de tamaño g .

Posteriormente, hubo un procedimiento de verificación que se realizó en gabinete con la información de PreCenso 2016, debido a las condiciones de contingencia nacional originadas por la emergencia sanitaria de la pandemia de COVID-19. En el caso de que existan manzanas que presenten un cambio significativo en términos de su estructura, estas podrían ser reemplazadas, o bien eliminadas de la muestra, distribuyendo sus viviendas entre manzanas pertenecientes al mismo estrato de muestreo.

SELECCIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES DE SEGUNDA ETAPA

La selección de las unidades de segunda etapa (viviendas particulares ocupadas) se efectuó una vez finalizado el proceso anterior. Consiste en la selección de viviendas en cada manzana seleccionada aleatoriamente de forma sistemática, con igual probabilidad de selección para todas las viviendas particulares ocupadas. Esta selección se realiza sobre el listado de direcciones ya existentes que posee el PreCenso 2016, para cada una de las manzanas seleccionadas.

La selección de viviendas se implementa usando una semilla aleatoria a fin de poder replicar la selección.

Así, la probabilidad de inclusión de la j -ésima vivienda dentro de la i -ésima manzana del grupo de tamaño g , de la comuna h , es igual a:

$$P_{hgi}(j|i) = \frac{m_{hgi}}{MM'_{hgi}}$$

Donde:

m_{hgi} es el número de viviendas a seleccionar en la manzana i de la comuna h del grupo de tamaño g .

MM'_{hgi} es el número actualizado de viviendas³ luego del proceso de verificación, en la manzana i de la comuna h del grupo de tamaño g .

3 Cabe mencionar que la actualización del número de viviendas dentro de la manzana se realiza en la eventualidad de que el listado de viviendas elegibles, según PreCenso 2016, tenga un número distinto al reportado por el marco (MM2015); en este caso, se anota el nuevo número de viviendas y se registra.

Una vez realizada la selección de viviendas, se elabora el directorio con la selección de viviendas en formato electrónico, la letra Kish para selección del informante por vivienda seleccionada y la cartografía de apoyo en formato digital (croquis de manzanas y el servicio de mapas).

SELECCIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES DE TERCERA ETAPA

En esta última etapa, la selección del informante para recolectar los datos del estudio está basada en el método Kish, que asigna la misma probabilidad de ser elegido como informante a todos aquellos miembros de la vivienda que están dentro del rango de edad de la encuesta y no tienen impedimento físico o mental para comprender la entrevista.

La asignación de la letra Kish se realiza en cada comuna, a través de las manzanas que la conforman y que han sido seleccionadas en la muestra. Dentro de cada comuna, se comienzan a distribuir las letras (en un ordenamiento predefinido) en las viviendas que fueron seleccionadas, terminando la asignación cuando la última vivienda a encuestar, dentro de la última manzana seleccionada, de la última comuna, ha recibido una letra. Este proceso se repite por cada comuna que conforma la muestra y, cada vez que se cuente con una nueva comuna, se retoma la secuencia inicial, independiente de la letra en que se haya terminado en la comuna anterior. De esta manera, una vez asignada la letra Kish a cada vivienda seleccionada, el procedimiento de selección del informante se puede realizar.

Al llegar a la vivienda, el encuestador debe anotar el número de personas que residen habitualmente en ella. A continuación, se registran a todas las personas que habitan la vivienda, independiente del hogar al que pertenecen.

Luego del ordenamiento de las personas dentro de la vivienda, se debe realizar una enumeración de los potenciales informantes de la encuesta, es decir, personas de entre 12 y 65 años que no forman parte del servicio doméstico puertas adentro ni poseen alguna situación de discapacidad que les impida comprender las preguntas⁴.

La enumeración es a nivel de vivienda. Se consideran todos los hogares y se deben ordenar sus integrantes según sexo y edad; primero los hombres de mayor a menor y, luego, las mujeres de mayor a menor. Los menores de 12 años y mayores de 65 no son considerados para la enumeración.

Finalmente, al interior de la tabla se encuentran distribuidos una serie de números que guardan relación con el número de personas que habitan la vivienda y que cumplen las características para ser consideradas como posibles informantes. Estos números determinan la persona que será seleccionada en la vivienda, según el ordenamiento previo de ellas, y la letra Kish asignada a la vivienda asegura la aleatoriedad de la selección del informante.

4 Ejemplos de estos casos son las personas con Alzheimer o síndrome de Down, entre otros. Individuos con trastornos por uso de alcohol y otras drogas sí son considerados. Sin embargo, si han sido seleccionados y no se encuentran en condiciones de responder la encuesta, se debe volver a la vivienda hasta cuatro veces para lograrla, en caso contrario, se omite la vivienda y se categoriza como elegible no responde, por impedimento propio de la persona.

Muestra y diseño muestral

El diseño muestral del ENPG 2020 corresponde a una muestra probabilística, estratificada geográficamente y por tamaño poblacional en el área urbana, trietápica, con probabilidad de selección de la unidad de primera etapa (manzanas) proporcional al tamaño, con relación al número de viviendas y al número de manzanas, en cada subgrupo.

El marco muestral está compuesto de unidades muestrales caracterizadas por tener límites geográficos fijos. A su vez, solo se puede llegar al entrevistado mediante la identificación de la vivienda en que reside, la cual está inserta en solo una manzana. Las viviendas particulares ocupadas son identificadas como las unidades secundarias de muestreo. Para llegar al informante se realiza una selección aleatoria dentro de la vivienda, donde el individuo seleccionado es quien proporciona la información referente a las características del hogar que constituye y sobre sí mismo. Los individuos seleccionados de manera probabilística mediante la tabla de Kish son denominados unidades terciarias de muestreo.

TABLA 5
Distribución de la muestra teórica y efectiva por regiones. Chile, 2020.

Región	Muestra teórica	Muestra efectiva	Porcentaje de logro (%)
Tarapacá	1.404	969	69,0
Antofagasta	925	689	74,5
Atacama	1.266	846	66,8
Coquimbo	901	586	65,0
Valparaíso	2.093	1.508	72,0
O'Higgins	1.383	966	69,8
Maule	1.381	1.133	82,0
Biobío	1.659	1.264	76,2
La Araucanía	1.620	1.237	76,4
Los Lagos	1.312	932	71,0
Aysén	976	660	67,6
Magallanes	1.052	742	70,5
Metropolitana	3.766	2.628	69,8
Los Ríos	1.143	835	73,1
Arica y Parinacota	1.134	698	61,6
Ñuble	1.541	969	62,9
Nacional	23.556	16.662	70,7

El nivel de logro del ENPG 2020 fue de 70,7%, con un total de 16.662 casos levantados entre 12 y 65 años. La Región de Arica y Parinacota mostró un menor nivel de logro con 61,6%, mientras que la Región de Maule alcanzó el mayor nivel de logro con un 82,0%.

TAMAÑO DE LA MUESTRA Y PRECISIÓN MUESTRAL

La determinación del tamaño de la muestra se sustenta en la información obtenida de la última versión de la encuesta. Con ello se logra optimizar el tamaño muestral a nivel regional y nacional sobre la base del área urbana de las comunas consideradas en el estudio.

Se consideraron dos requerimientos para contar con un tamaño y una distribución muestral que permitiera obtener estimaciones con márgenes de precisión adecuados a nivel regional para la variable de interés "Proporción de la población que ha consumido algún tipo de droga ilícita⁵ al menos una vez en la vida". Los dos requerimientos son:

- Errores absolutos asociados a la estimación de la variable de interés, no superiores a 5%.
- Error relativo inferior a 30%.

A continuación, se describe en detalle cada una de las etapas realizadas para definir el número de viviendas a encuestar en cada región r .

Utilizando la base de datos del estudio anterior, se obtienen estimaciones del parámetro de interés a nivel regional ($\hat{p}_{r0}$), junto con sus estadísticos asociados, tales como error estándar ($SE(\hat{p}_{r0})$) y total de unidades logradas ($n_{r0} \cdot \bar{m}_{r0}$). Posteriormente, se calculan los errores absolutos regionales (ea_{r0}) a partir de los errores estándar obtenidos en el estudio previo ($SE(\hat{p}_{r0})$), estableciendo un nivel de confianza de 95% bajo un valor fijo de $T=2$. El cálculo se aprecia en la siguiente ecuación:

$$ea_{r0} = 2 \cdot SE(\hat{p}_{r0})$$

A continuación, se proponen errores absolutos regionales (ea_{r1}) acordes a los objetivos ya mencionados. Estos dependen, en gran medida, de los errores absolutos obtenidos en la etapa anterior (ea_{r0}). Se calcula el tamaño muestral de viviendas a nivel regional (m_{r1}) basado en el error absoluto propuesto para la región (ea_{r1}) y en el tamaño y error absoluto obtenido en la versión anterior del estudio:

$$m_{r1} = m_{r0} \cdot \frac{ea_{r0}^2}{ea_{r1}^2}$$

Los tamaños muestrales regionales obtenidos deben corregirse por un ponderador que da cuenta de la condición de población finita (fracción de muestreo, FRm_r). Esta fracción se obtiene a partir de:

$$FRm_r = \frac{m_{r1}}{MM_r}$$

Obtenida la fracción de muestreo a nivel regional, se determina el tamaño muestral "corregido por finitud", según:

$$m_{r2} = \frac{m_{r1}}{(1 + FRm_r)}$$

Una vez obtenidos los tamaños regionales corregidos por finitud, se deben distribuir entre las comunas que forman parte de la muestra en cada región, para obtener el tamaño de muestra por comuna (C), denotado (m_{c1}). Esta distribución se realiza en forma proporcional, similar a la distribución de la muestra lograda del estudio anterior. Finalmente, una vez asociado el tamaño muestral en las 109 comunas, se aplica un factor que corresponde a la tasa de no logro (tnl_c) obtenida del estudio previo a nivel comunal, con la finalidad de salvaguardar la precisión de la estimación del parámetro de interés. Así, la siguiente ecuación define el tamaño muestral considerando el ajuste por no logro a nivel comunal:

$$m_{c2} = \frac{m_{c1}}{1 - tnl_c}$$

Luego, el tamaño regional con sobremuestreo m_{r3} , es calculado como la agregación regional del total de viviendas determinado en cada una de las comunas presentes en la muestra. Esto se observa en la ecuación:

$$m_{r3} = \sum_{c \in r} m_{c2}$$

Con los tamaños muestrales regionales propuestos se obtienen errores absolutos asociados a la variable de interés, que fluctúan entre 4,5% y 2,7%.

5 Para efectos del cálculo del tamaño de la muestra, se definió "droga ilícita" como aquel consumo en una unidad determinada de tiempo de marihuana, cocaína y/o pasta base.

TABLA 6
Errores esperados para la estimación de la variable de interés sobre la muestra teórica, según regiones. Chile, 2020.

Región	Prevalencia Vida (%)	Error Absoluto propuesto (%)	Error Relativo propuesto (%)	Muestra teórica	Muestra con sobremuestreo
Tarapacá	34,1	3,9	11,4	1.404	2.161
Antofagasta	26,3	3,7	14,1	925	1.428
Atacama	31,3	3,7	11,8	1.266	1.828
Coquimbo	28,0	3,4	12,1	901	1.276
Valparaíso	39,9	3,0	7,5	2.093	3.916
O'Higgins	31,8	3,5	11,0	1.383	2.433
Maule	26,1	3,9	14,9	1.381	2.109
Biobío	25,0	3,0	12,0	1.659	2.735
La Araucanía	28,6	3,0	10,5	1.620	2.865
Los Lagos	15,8	3,2	20,3	1.312	2.257
Aysén	23,5	3,5	14,9	976	1.610
Magallanes	21,3	3,3	15,5	1.052	1.931
Metropolitana	40,6	2,7	6,6	3.766	10.066
Los Ríos	21,0	3,5	16,7	1.143	1.820
Arica y Parinacota	36,9	3,8	10,3	1.134	1.860
Ñuble	35,6	4,5	12,7	1.541	2.827
Nacional	33,7	1,2	3,7	23.556	43.122

Así, se obtiene una muestra objetivo de 23.556 viviendas; al considerar la tasa de no logro del estudio anterior, se obtiene como resultado un tamaño muestral con sobremuestreo de 43.122 viviendas.

Considerando la muestra efectiva de 16.662 viviendas, se presentan a continuación los errores efectivos absolutos y relativos a nivel regional, asociados a la variable “Consumo de cualquier droga ilícita alguna vez en la vida”.

TABLA 7
Errores obtenidos sobre la muestra efectiva para la estimación de la variable de interés, según regiones. Chile, 2020.

Región	Prevalencia vida (%)	Error absoluto (%)	Error relativo (%)	Muestra efectiva
Tarapacá	31,0	3,7	12,0	969
Antofagasta	32,9	4,4	13,4	689
Atacama	29,0	3,8	13,1	846
Coquimbo	32,8	5,6	17,0	586
Valparaíso	39,7	4,9	12,5	1.508
O'Higgins	33,3	4,9	14,8	966
Maule	28,8	4,9	17,0	1.133
Biobío	36,8	4,4	11,9	1.264
La Araucanía	30,8	3,5	11,3	1.237
Los Lagos	17,4	3,5	20,3	932
Aysén	30,6	4,1	13,4	660
Magallanes	21,8	4,3	19,7	742
Metropolitana	43,0	2,5	5,8	2.628
Los Ríos	28,6	5,0	17,6	835
Arica y Parinacota	30,5	4,9	15,9	698
Ñuble	29,3	5,0	17,1	969
Nacional	37,3	1,4	3,7	16.662

Factores de expansión

El factor de expansión se obtiene según el diseño muestral. Por lo tanto, para esta encuesta dicho factor corresponde al aplicado a una muestra en tres etapas y su cálculo depende del número total de personas dentro de la vivienda encuestada, el número de viviendas que tiene la manzana y el número de manzanas que tiene cada comuna por grupo de tamaño.

Los componentes del factor de expansión se obtienen como el producto de los inversos de las probabilidades de selección de las unidades de primera etapa (manzanas), de las probabilidades de selección de las unidades de segunda etapa (viviendas) seleccionadas desde los conglomerados ya muestreados, y de las probabilidades de selección de las unidades de tercera etapa (personas) seleccionadas en las viviendas ya muestreadas en la segunda etapa.

El factor de expansión incluye un ajuste a la población de personas por comuna, determinado por las proyecciones de población por sexo y tramo de edad⁶, correspondientes al período de referencia de la encuesta. Con este ajuste y con la información obtenida de la muestra se busca aumentar la precisión de las estimaciones respecto del total de personas.

6 Personas de entre 12 y 65 años de edad.

Adicionalmente, para dar cuenta de las incidencias presentadas durante el levantamiento de la información y la desactualización del marco, es necesario incorporar una serie de ajustes que eviten posibles sesgos.

En consecuencia, la metodología de cálculo de los factores de expansión consiste en la aplicación secuencial de siete ponderadores o ajustes:

- Ponderador de selección de unidades de primera etapa.
- Ponderador de selección de unidades de segunda etapa.
- Ajuste por elegibilidad de las viviendas (elegibilidad desconocida y no elegibilidad de unidades de segunda etapa).
- Ajuste por no respuesta de unidades de segunda etapa.
- Ponderador de selección de unidades de tercera etapa.
- Suavizamiento del factor de expansión de tercera etapa.
- Calibración al total de población según proyecciones por comuna, región, sexo y tramo de edad.

PONDERADOR DE SELECCIÓN DE UNIDADES DE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA (MANZANAS Y VIVIENDAS)

El ponderador de selección de unidades de primera y segunda etapa dentro de cada manzana seleccionada, refleja a cuántas viviendas en la población representa la vivienda seleccionada en la muestra. En términos generales, se calcula como el inverso de la probabilidad de selección de la vivienda, condicionado a la selección de la manzana dentro del estrato de muestreo al que pertenece. Este ponderador queda definido por la siguiente expresión:

$$w_{hgi} = \frac{N_{hg}}{n_{hg}} \cdot \frac{M'_{hgi}}{m_{hgi}}$$

Donde:

- w_{hgi} es el ponderador de selección de la vivienda j perteneciente a la manzana i , del estrato hg .
- N_{hg} es el número de manzanas en el marco MM2015 del grupo tamaño g de la comuna h .
- n_{hg} es el número de manzanas seleccionadas del grupo tamaño g de la comuna h .
- M'_{hgi} es el número de viviendas particulares (actualizado según verificación en terreno) en la manzana i que pertenece al estrato hg .
- m_{hgi} es el número de viviendas seleccionadas en la manzana i , que pertenece al estrato hg .

AJUSTE POR ELEGIBILIDAD

La población objetivo del estudio son las personas de edades comprendidas entre 12 y 65 años, que residen habitualmente en viviendas particulares en las zonas urbanas de las 109 comunas definidas para componer la muestra. La selección de las unidades muestrales se obtiene a partir de las manzanas que componen el marco muestral. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que

se realizan por mantener este marco muestral actualizado, siempre existe la posibilidad de errores de inclusión (o de exclusión) debido a la desactualización natural del marco muestral.

Es por ello que, al término del levantamiento de la encuesta, a cada una de las viviendas seleccionadas inicialmente le es asignado un código de visita que da cuenta de la elegibilidad de la unidad muestral. Estos códigos de visita permiten clasificar las viviendas en tres grupos:

- Viviendas elegibles: corresponde a viviendas identificadas como viviendas particulares ocupadas.
- Viviendas no elegibles: corresponde a viviendas identificadas como negocios, viviendas colectivas, viviendas deshabitadas, viviendas de veraneo, viviendas destruidas, entre otros casos.
- Viviendas de elegibilidad desconocida: corresponde a viviendas en las que no se pudo determinar su estado. Este es el caso, por ejemplo, de unidades que nunca fueron enviadas a terreno o viviendas que no pudieron ser localizadas, entre otros casos similares.

Hasta este punto, el ponderador de selección de viviendas tiene valores válidos para las viviendas elegibles, no elegibles y de elegibilidad desconocida. Por esta razón, es importante ajustar las probabilidades de selección de las viviendas seleccionadas para incorporar el hecho de que una proporción de estas resulte ser no elegibles y, en otros casos, simplemente se desconozca su elegibilidad.

A continuación, se exponen los ajustes aplicados según condición de las viviendas de elegibilidad desconocida y no elegibles.

AJUSTE POR ELEGIBILIDAD DESCONOCIDA Y NO LEGIBLE

La muestra de viviendas seleccionadas incluye, en principio, solo viviendas particulares ocupadas. Sin embargo, durante el levantamiento ocurre que, en algunos casos, este estado no se puede comprobar, por lo que a estas viviendas se les asigna el estado de "elegibilidad desconocida". En ese sentido, se hace necesario realizar un ajuste con el objetivo de que no se subestime el total de viviendas en la población.

Este ajuste consiste en redistribuir los pesos acumulados por las viviendas de elegibilidad desconocida entre las viviendas con elegibilidad conocida (elegibles y no elegibles) dentro de cada comuna y grupo de tamaño.

A partir de este ajuste, las viviendas con estado "no elegibles" no se consideran para el cálculo de los siguientes factores, lo que se materializa asignando un *missing* a la ponderación.

AJUSTE POR NO RESPUESTA

Una vez que se realiza el ajuste por elegibilidad de las viviendas, se deben considerar solo las viviendas en condición de elegibles, sin embargo, podrían ocurrir, entre otras, las siguientes situaciones: los residentes manifiestan no querer participar en la encuesta, exista imposibilidad de seleccionar un informante Kish o ausencia de moradores en el momento del levantamiento. Dichas situaciones originan la no respuesta.

El ajuste por no respuesta busca corregir los pesos para que la encuesta, a partir de las unidades que responden, sea representativa de toda la población. Como resultado, los pesos de las unidades que respondieron a la encuesta se incrementan para compensar el peso de las unidades que no respondieron.

PONDERADOR DE SELECCIÓN DE UNIDADES DE TERCERA ETAPA (PERSONAS)

Luego de obtener el ponderador de viviendas ajustado por no respuesta, se obtiene el factor de expansión base para incorporar la tercera etapa de selección, es decir, para las personas seleccionadas al interior de cada vivienda. Dado que la selección se realiza mediante el método Kish —que asigna la misma probabilidad de ser elegido como informante de la encuesta a todos aquellos miembros de la vivienda que cumplen determinadas características—, la probabilidad condicional de selección de la persona queda determinada por:

$$p_k = \frac{1}{n_k}$$

Donde:

p_k es la probabilidad condicional de seleccionar a la persona k .

n_k es el total de personas seleccionables en la vivienda.

Obtenido el ponderador de tercera etapa, el factor de expansión queda constituido a través de la ecuación:

$$w_{hgi}^{**} = w_{hgi}^* \cdot n_k$$

Donde:

w_{hgi}^{**} es el factor de expansión correspondiente a la selección de tercera etapa.

w_{hgi}^* es el factor ajustado por no respuesta.

SUAVIZAMIENTO DEL FACTOR DE EXPANSIÓN DE SELECCIÓN DE UNIDADES DE TERCERA ETAPA

Debido a la incorporación de diferentes ajustes a los ponderadores iniciales de las unidades, se identifican unidades con factores de expansión anómalos. Por ello, es necesario incorporar un procedimiento de suavizado de los factores con el objetivo de compensar la variabilidad introducida. Dicho procedimiento consiste en trunca los factores de expansión que se ubican por encima de un umbral definido para luego redistribuir, en forma proporcional, la diferencia resultante entre los factores que se encuentran por debajo de este umbral.

El factor suavizado se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$w_{hgi}^{t*} = \begin{cases} w_{hgi}^{**} \cdot \frac{(\sum_{g \in \Psi_h} \sum_{i \in \Theta_g} \sum_{j \in \Omega_i} w_{hgi}^{**} - \sum_{g \in \Psi_h} \sum_{i \in \Theta_g} \sum_{w_{hgi}^{**} > M_{ha}} w_{hgi}^{**})}{\sum_{g \in \Psi_h} \sum_{i \in \Theta_g} \sum_{w_{hgi}^{**} \leq M_{ha}} w_{hgi}^{**}} & ; \text{ si } w_{hgi}^{**} \leq M_{ha} \\ M_{ha} & ; \text{ si } w_{hgi}^{**} > M_{ha} \end{cases}$$

Donde:

w_{hgi}^{t*} es el factor de expansión suavizado.

w_{hgi}^{**} es el ponderador correspondiente a la selección de tercera etapa.

Ψ_h es el conjunto de grupos de tamaño asociados a la comuna h .

Θ_g es el conjunto de manzanas en la muestra asociadas al grupo de tamaño g .

Ω_i es el conjunto de viviendas asociadas a las manzanas de la muestra.

a es el punto de corte en el cual se minimiza el error cuadrático medio de la variable de interés (proporción de personas que ha consumido alguna droga ilícita al menos una vez en la vida). En este caso, se prueba con los valores entre 4 y 10, resultando como corte más favorable $a = 7$.

M_{ha} es el producto entre el punto de corte y la media del factor de expansión a nivel de comuna.

FACTOR DE EXPANSIÓN PARA PERSONAS DE ENTRE 12 Y 65 AÑOS AJUSTADO POR SEXO A NIVEL COMUNAL

El factor de expansión que se empleará para la presentación de resultados de este informe corresponde al factor de expansión de personas construido a partir del factor teórico, ajustado por la razón entre la población proyectada y la estimación de población de entre 12 y 65 años, diferenciada por sexo, a nivel de área urbana de cada comuna.

Este factor corresponde al factor de expansión de selección de tres etapas suavizado, ajustado por la población entre 12 y 65 años, diferenciada por sexo, a nivel comunal. La expresión de cálculo queda definida de la siguiente manera:

$$w_{hgi_c} = w_{hgi}^{t*} \cdot \frac{P_{h \geq 12_65 \text{ años}}^S}{\hat{P}_{h \geq 12_65 \text{ años}}^S}$$

Donde:

w_{hgi_c} es el factor de expansión de personas ajustado por la población entre 12 y 65 años, de sexo s , a nivel comunal.

w_{hgi}^{t*} es el factor de expansión suavizado.

$P_{h \geq 12_65 \text{ años}}^S$ es la proyección de población entre 12 y 65 años, de sexo s en la comuna h .

$\hat{P}_{h \geq 12_65 \text{ años}}^S$ es la estimación de población entre 12 y 65 años, de sexo s en la comuna h .

Donde:

$$\hat{P}_{h \geq 12_65 \text{ años}}^S = \sum_i \sum_j w_{hgi}^{t*}$$

Antecedentes previos al inicio del trabajo de terreno

El trabajo de terreno del ENPG 2020 fue estructurado a partir de la presencia, durante el levantamiento de información, de una Jefatura Nacional de Terreno que delegaba funciones en un Coordinador de Terreno. Este último se relacionaba directamente con un grupo de Coordinadores de Sedes y estos, a su vez, con los encuestadores. Paralelamente existía un equipo de supervisión independiente para monitorear el levantamiento de información.

En cada una de las sedes definidas para la realización de este estudio existía una oficina debidamente acondicionada para coordinar el trabajo de campo y la recepción del material asociado al trabajo de campo (material cartográfico, hojas de ruta y cuestionarios).

Junto a lo anterior, el proceso de capacitación de encuestadores, inicialmente contemplado en modalidad presencial, fue realizado en modalidad telemática. A su vez, se efectuaron cambios en la estructura del cuestionario para garantizar su aplicación en modalidad presencial o telefónica. El cuestionario aplicado en el trabajo de campo se encuentra en la sección de anexos de este informe.

PRETEST DE LA ENCUESTA

Previo al inicio del trabajo de terreno, y en atención a la emergencia sanitaria derivada por la pandemia de COVID-19, se debió sustituir la realización de un pretest de carácter cuantitativo en una muestra reducida⁷ por una fase de levantamiento de tipo cualitativo con personas del equipo técnico, jefaturas de terreno y encuestadores que hayan participado en versiones anteriores de este estudio.

El propósito de esta etapa fue recolectar información para la toma de decisiones sobre cómo abordar el trabajo de campo del presente estudio, considerando las restricciones sanitarias, y cómo optimizar el proceso.

En los días 20 y 21 de octubre de 2020, se realizaron dos grupos de discusión: uno con el equipo técnico y las jefaturas de terreno, y otro donde participaron solo encuestadores. El objetivo de las reuniones fue sistematizar experiencias, opiniones y recomendaciones de las personas involucradas directa e indirectamente en el proceso de realización del estudio.

En estos grupos de discusión se abordaron los siguientes ejes:

- Metodologías de aplicación: se discutieron recomendaciones y orientaciones para aplicar el estudio considerando el contexto asociado a la emergencia sanitaria.
- Situación de pandemia: se discutió en torno a las mejores medidas a tomar en la situación sanitaria, para la visita en terreno y selección de informante Kish.
- Rol institucional: en base a la experiencia en esta y otras encuestas, se discutió el abordaje de posibilidades a la presentación del estudio y cómo presentar el respaldo institucional.

⁷ Su propósito era evaluar el diseño, la comprensión de las preguntas, el tiempo de aplicación y otros aspectos asociados al procedimiento de contacto con los encuestados.

TABLA 8
Distribución de la muestra grupos de discusión. Chile, 2020

Número de grupos	Nº Participantes	Segmento
1	5	Equipo técnico y jefaturas de terreno
1	7	Encuestadores

TEMÁTICAS DE INTERÉS

A continuación, se describen las posturas discutidas para cada uno de los hitos mencionados.

1. Cómo lograr que se atienda al encuestador o encuestadora, qué estrategias o prácticas se podrían llevar a cabo para facilitar su aceptación

Las opiniones sobre estos aspectos se concentran en torno a dos puntos: temas sanitarios relacionados al contexto de la pandemia y credibilidad con la persona entrevistada con la situación de encuesta. Respecto a este último punto, se refiere al uso de una credencial con datos como el nombre y RUT de cada encuestador, así como teléfonos de contacto, además de los logos de IPSOS y de gobierno.

Particularmente los encuestadores manifiestan la relevancia de demostrar el cumplimiento con medidas de seguridad sanitaria (mascarilla y alcohol gel), puntualizar el no uso de tarjeteros y evitar también el contacto directo del entrevistado con el tablet. Junto a lo anterior, se manifiesta la preocupación de la extensión y la duración de la encuesta, considerando la imposibilidad de ingresar al domicilio del entrevistado para realizar una aplicación del cuestionario de manera más cómoda.

2. Dificultades propias de la selección aleatoria y entrega de datos de contacto

Se considera que se trata de una etapa posterior al logro de una confianza en el estudio por parte de la persona informante idónea, pero que abre una nueva dificultad: cómo lograr confianza en el proceso de selección de una persona específica, la solicitud de datos de contacto y momentos en que se puede ubicar.

Un primer aspecto relevado es la necesidad de concretizar un protocolo claro, simple de entender y explicar por parte de los encuestadores. Se menciona que es común que, en terreno, ante preguntas personales de datos y personas, se consulte por qué y para qué se utilizará esa información; ante esta situación, es necesario que el personal de terreno tenga claro cómo explicar esto de manera entendible, sencilla y convincente. Se menciona, como ejemplo, la utilización de datos en políticas públicas. Un segundo aspecto es la necesidad de contar con documentación de presentación del estudio, donde se menciona la necesidad de una carta que respalde la seriedad del estudio y que, nuevamente, contenga los logos institucionales y de la empresa que realizará el trabajo de campo.

Respecto a la entrega de una carta de presentación, se sugiere su envío por correo electrónico o por mensajería instantánea. Junto a lo anterior, se estima también que es necesario contar con material físico —esto es, una carta de presentación e invitación elaborada—, ya que permitirá explicar en el momento por qué

se necesita registrar y seleccionar a una persona de la casa. De esta manera, se sugiere que la presentación del estudio sea en modalidad mixta, pues es posible que en estratos socioeconómicos de mayor vulnerabilidad (así como también en grupos etarios determinados) exista menos familiarización con el uso de tecnología y redes sociales, lo que implicaría un riesgo para el levantamiento del estudio en esos grupos.

Con relación a las estrategias para facilitar el contacto y aplicación de la selección aleatoria en la vivienda, se menciona que lo ideal es poder realizar un agendamiento, establecer una fecha y hora de aplicación para evitar visitas de coordinación, y aplicar de forma telefónica o presencial este proceso. Ante la consulta sobre cómo asegurar que la entrega de un número de teléfono de contacto sea correcta, se propone la idea de llamar en ese momento al número entregado para corroborarlo, ante lo cual se menciona nuevamente la utilidad de realizar un agendamiento.

3. Cómo facilitar el contacto efectivo y la colaboración de la persona seleccionada aleatoriamente

Este aspecto responde a la dificultad de contactar y lograr disposición de la persona seleccionada aleatoriamente con Tabla Kish, considerando como dificultad adicional que esta persona pueda estar ausente al momento de realizar el contacto en la vivienda con el informante idóneo.

Se menciona que, en un primer escenario —en el cual el informante Kish está en la vivienda al momento de la visita—, se debería replicar el protocolo de presentación y motivación a participar en el estudio, mencionado antes. Se enfatiza, además, lo conveniente de aplicar de inmediato la encuesta si se presenta la oportunidad.

Frente a la imposibilidad de aplicar el cuestionario en forma inmediata, se debe realizar el contacto y la encuesta por teléfono. Para ello, se recomienda comprobar inmediatamente el número telefónico, llamando en el mismo momento para evitar la pérdida de información y para no tener que revisitar la vivienda para obtener un dato de contacto. Así también, se recomienda solicitar más de un teléfono de contacto (e incluso un correo electrónico), así como también solicitar días y horarios en que la persona seleccionada esté disponible. Respecto a este último punto, se menciona la necesidad de que la solicitud de datos debe darse solo si se siente que existe una confianza preestablecida.

4. Cómo minimizar el riesgo de rechazo y postergaciones constantes

Frente a escenarios donde no es posible ubicar a la persona entrevistada en reiteradas ocasiones por no disponibilidad o por reticencia, se obtienen recomendaciones mixtas.

En el caso de los encuestadores, estos mencionan que cuando existe rechazo, se trata en general de un fenómeno que mayormente se produce de forma inmediata en quienes no tienen disposición a contestar. Así también, se destaca la experiencia del encuestador y su manejo de la situación de presentación. En ese sentido, debería ponerse énfasis en la selección del equipo del trabajo de campo, que tendría mayores requerimientos que en el caso de estudios más sencillos, o de temáticas de menor sensibilidad.

Por su parte, el grupo de jefaturas analizan la disposición de las personas a recibir a los encuestadores, considerando el contexto

asociado a la pandemia de COVID-19. Al respecto, se menciona que no existiría un temor instalado que dificulte la disposición a contestar, comentando que incluso las personas encuestadoras se resguardan más que las mismas personas entrevistadas.

5. Seguridad del equipo de terreno

Desde una perspectiva de trabajo de la empresa, se menciona que existen protocolos internos de trabajo orientados a garantizar la seguridad del equipo de encuestadoras y encuestadores, considerando el uso de mascarilla, el mantenimiento de la distancia social, el uso de alcohol gel, el monitoreo constante de posibles síntomas y también la prohibición de salir a terreno en zonas en fases que implican cuarentena.

Junto a lo anterior, se establece que, ante todo, cada encuestadora o encuestador debe velar por cuidar su salud. Este procedimiento tiene directa relación con la disposición de elementos de seguridad por parte de la empresa encuestadora, así como también con aspectos de capacitación o protocolos internos de trabajo en terreno que consideren la distancia social como aspecto de autocuidado y cuidado con la persona entrevistada.

6. Facilitadores para la entrada en condominios y edificios

Este aspecto es un obstaculizador constante del trabajo de terreno y representa un desafío mayor considerando el contexto derivado de la emergencia sanitaria. Se considera que será un aspecto de especial dificultad en vista de situaciones tales como:

- Restricciones sanitarias para entrar a edificios y registro de visitas por trazabilidad.
- Inexistencia de citófonos en algunos edificios.
- Imposibilidad de acceder al citófono cuando está disponible.
- Desconfianza por parte del conserje a cargo.
- Normativas prohibitivas de las propiedades para el acceso de trabajadores externos de distinto tipo.

Frente a este conjunto de obstaculizadores y considerando la experiencia previa en estos temas, una recomendación compartida por las jefaturas es la necesidad de contacto previo con la administración. Se afirma que no es una tarea que pueda dejarse únicamente a la gestión de la persona encuestadora y que podría requerir, incluso, apoyo especial por parte de la institución mandante, a través del envío de algún tipo de documento acreditador, tales como cartas por medios digitales o físicos u otros.

El grupo de encuestadores refiere que hay dos aspectos a considerar. En primer lugar, uno que responde al rol de la persona encuestadora y que se trata del contacto con la consejería: una adecuada presentación personal frente a la persona, en vistas de que se trata de quien controla el acceso. En segundo lugar, la necesidad de un contacto directo con la administración de los edificios. Se menciona al respecto que en sectores de estratos socioeconómicos altos la entrada es, por lo general, imposible.

7. Cómo presentar la institución mandante del estudio para facilitar su aceptación

Respecto a la presentación del estudio a las personas entrevistadas, se discutió junto a las jefaturas de terreno cuál podría ser la mejor forma de comunicar el motivo del estudio y de presentar a la institución mandante, con el fin de facilitar su aceptación y evitar eventuales obstaculizaciones.

Un primer aspecto corresponde a la mención histórica de la orientación de “salud pública” del estudio. Respecto a ella, se menciona que dado el contexto podría ser asociado al COVID-19, generando un rechazo o dando una sensación de engaño al avanzar en la encuesta. Otras opiniones refieren a que muchas veces esto no es entendido por las personas entrevistadas, quienes no asocian salud pública a las temáticas tratadas por la encuesta. Al respecto, no se obtienen recomendaciones por parte de la jefatura que permitan complementar o mejorar este aspecto.

Un segundo aspecto refiere a la mención de la institución mandante. Se tematizan opciones tales como referir a “SENDA”, “Gobierno” o “Ministerio”. Tras discutir las ventajas y desventajas de las distintas opciones, se llega a un consenso general en torno a la conveniencia de apuntar al nivel más genérico posible, para evitar la asociación inmediata de la institución con control policial o control de temáticas de drogas. Respecto a la mención a “SENDA”, desde el grupo de encuestadores se menciona que podría generar resistencias, particularmente en estratos socioeconómicos de mayor vulnerabilidad. Por otra parte, se observa un consenso en que mencionar las temáticas de alcohol y otras drogas resultaría perjudicial, en especial con personas que sean consumidoras de sustancias.

En este punto, nuevamente se menciona la ventaja de señalar que se trata de un estudio realizado por un rango de tiempo amplio, así como también los posibles beneficios de la toma de información. No se logra una opinión clara o consensuada respecto a qué tipo de información sería útil compartir con las personas entrevistadas para aumentar su motivación a participar, pero sí se menciona la necesidad de que existan protocolos claros de presentación, que permitan que encuestadoras y encuestadores presenten de mejor forma el estudio.

Se establece como consenso que la mejor forma de presentar el estudio en terreno será un tema a monitorear de manera constante y no un tema cerrado

JORNADAS DE CAPACITACIÓN

Las jornadas de capacitación enfocadas en los encuestadores, los jefes de terreno y los supervisores se realizaron de manera online y simultáneamente por zona de aplicación. La duración de cada jornada fue entre 4 y 5 horas durante la mañana, en cada uno de los días definidos.

Junto a esta capacitación, cada miembro del equipo de terreno recibió un manual de capacitación en el que se detallaban todos los puntos abordados en la jornada, junto a diversas instancias de conexión directa con las jefaturas de campo que permitan ir resolviendo dudas o problemáticas previas al trabajo de campo.

TABLA 9
Distribución de jornadas de capacitación de encuestadores, según regiones. Chile 2020.

Región	Fecha
Tarapacá	09-11-2020
Antofagasta	09-11-2020
Atacama	09-11-2020
Coquimbo	09-11-2020
Valparaíso	30-10-2020
O'Higgins	30-10-2020
Maule	04-11-2020
Biobío	04-11-2020
La Araucanía	05-11-2020
Los Lagos	05-11-2020
Aysén	05-11-2020
Magallanes	05-11-2020
Metropolitana	30-10-2020
Los Ríos	05-11-2020
Arica y Parinacota	09-11-2020
Ñuble	04-11-2020

Metodología de aplicación de las encuestas

ESTÁNDARES DE APLICACIÓN

El cuestionario del presente estudio se compuso de 19 módulos en total, los que no consideran en ninguna instancia la opción de entregar respuestas del tipo autoaplicada. Vale decir, el encuestador aplica la encuesta en su totalidad, y sin excepción deberá leer la totalidad de las preguntas. Junto a lo anterior, el encuestador en ninguna etapa de la visita presencial debe hacer entrega de documentos o elementos al encuestado. En este sentido, el estudio no considera el uso de tarjetas.

El cuestionario final fue aplicado por medio de un dispositivo electrónico en modalidad CATI o CAPI, según las condiciones sanitarias al momento de la realización de la entrevista. A pesar de lo anterior, la selección del informante Kish se realizó presencialmente en cada una de las viviendas en modalidad CAPI, por lo que la aplicación del cuestionario (ya con el informante Kish seleccionado) podía realizarse en alguna de las dos modalidades de aplicación.

A nivel nacional, un 89,0% de las entrevistas se realizó en modalidad presencial (CAPI) y un 11,0% de manera telefónica. A nivel regional, la Región de Aysén tuvo el mayor porcentaje de entrevistas realizadas en modalidad CAPI con un 98,0% y la Región de Los Lagos, la mayor proporción de encuestas telefónicas con un 37,2% del total.

TABLA 10
Distribución de modalidades de aplicación del
cuestionario, según regiones. Chile, 2020.

Región	Presencial		Telefónica	
	n	%	n	%
Tarapacá	887	91,5	82	8,5
Antofagasta	650	94,3	39	5,7
Atacama	821	97,0	25	3,0
Coquimbo	548	93,5	38	6,5
Valparaíso	1.211	80,3	297	19,7
O'Higgins	934	96,7	32	3,3
Maule	1.102	97,3	31	2,7
Biobío	1.009	79,8	255	20,2
La Araucanía	1.151	93,0	86	7,0
Los Lagos	585	62,8	347	37,2
Aysén	647	98,0	13	2,0
Magallanes	687	92,6	55	7,4
Metropolitana	2.484	94,5	144	5,5
Los Ríos	599	71,7	236	28,3
Arica y Parinacota	611	87,5	87	12,5
Ñuble	898	92,7	71	7,3
Nacional	14.824	89,0	1.838	11,0

El uso de dispositivos electrónicos para la aplicación de encuestas permite reducir los errores, ya que sus campos son programados a partir de una malla de validación que sigue los saltos lógicos de la encuesta; esto sucede en tiempo real, a medida que se avanza en el cuestionario. Cada vez que se cometía un error en el ingreso de la información aparecía un mensaje que le indicaba dicha situación al encuestador; de esta forma, el encuestador solo debía preocuparse de leer adecuadamente las preguntas, aclarar conceptos y seguir el protocolo de aplicación correctamente.

Bajo estas modalidades de aplicación se mantuvo el control de los datos ingresados, ya que diariamente las encuestas realizadas se sincronizaban y almacenaban en un servidor web dispuesto para este estudio, lo que permitió hacer un seguimiento en línea de la cantidad de encuestas realizadas. Todos los instrumentos del estudio (hoja de ruta, tabla de Kish, cuestionario y pauta de supervisión) fueron programados en el tablet a través de la plataforma Ipsos iField.

A continuación, se describen algunas medidas diseñadas para asegurar una correcta relación con los distintos agentes en el proceso de encuestaje (esto es, el informante idóneo y el encuestado) para proporcionar la información requerida para el estudio:

- En primer lugar, al momento de visitar una vivienda, el encuestador debe cumplir con las medidas sanitarias con las que debe trabajar, tanto por su seguridad como también por la seguridad del encuestado. Existe prohibición de visitar una vivienda sin los implementos sanitarios que facilitará la jefatura de campo.
- Las medidas sanitarias implementadas serán las siguientes:
 - Uso de mascarilla y protector facial.
 - Alcohol constante para encuestador y entrevistado.
 - Mantener distancia de a lo menos 1 metro y medio.
 - Realizar diariamente actualización de salud por parte del encuestador a través de la plataforma iField.
- Descripción clara y convincente del tipo de estudio que se está llevando a cabo, con el objetivo de que los participantes entiendan su importancia para futuras políticas públicas en torno al tema. Se recalca que se trata de un estudio de salud pública y que la selección de quien responde la encuesta (informante Kish) es aleatoria entre las personas que residen habitualmente en la vivienda. Por temas sanitarios, no está considerado entregar ningún tipo de documento al encuestado, por lo que la carta no debe ser entregada al informante idóneo o seleccionado Kish.
- Seguridad en la información: el encuestador debe transmitirle confianza al encuestado. En este sentido, se le informa que toda la información reportada se maneja con absoluta reserva, siendo inaccesible para otros individuos o entidades que quieran hacer uso indebido de ella. Esto plantea que el estudio es confidencial y anónimo, por lo que no se solicitan nombres completos ni otros datos de identificación que puedan comprometer la identificación de los residentes de la vivienda.
- Se le informa al entrevistado que los datos del estudio serán entregados de forma agregada, no siendo posible la identificación de los encuestados. Se hace hincapié en el uso adecuado de la información para garantizar la confidencialidad y el anonimato, a fin de acceder a información fidedigna del encuestado.
- Dadas las características del estudio, es importante mantener un comportamiento neutro ante el entrevistado, cuidando de no manifestar opiniones, sugerencias ni visiones respecto a los temas consultados en el cuestionario. De igual manera, y como fue transmitido en las jornadas de capacitación, el encuestador mostrará total disposición y conocimiento para resolver cualquier duda respecto a las preguntas del cuestionario.
- En ausencia de informante Kish o si el informante idóneo indica que no está disponible para responder a las preguntas iniciales, se debe agendar una nueva fecha donde sí exista disponibilidad para continuar el proceso.

SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS

Participaron del ENPG 2020 personas de entre 12 a 65 años de las viviendas seleccionadas.

Al acceder a la vivienda, el encuestador debe identificar primeramente a un informante que se denomina informante idóneo; esta es la persona, de 18 años o más, que entregará la información de todos los integrantes de la vivienda, por lo que debe tener el conocimiento necesario para ello. Esta persona deberá ser capaz de entregar

información sociodemográfica de todos los integrantes de la vivienda, como nombre⁸, edad y sexo.

Para seleccionar a un miembro de la vivienda de entre 12 a 65 años de edad, el encuestador empleó la tabla de Kish, previamente programada en el dispositivo electrónico. El encuestador debía ingresar a todos los miembros residentes habituales de la vivienda y el dispositivo entregaba de forma automática al individuo seleccionado. Es importante destacar que debía ingresarse a la totalidad de los miembros de la vivienda, incluyendo adultos mayores y niños menores de 12 años.

MÉTODO DE CAPTURA DE ENCUESTA

Para el ENPG 2020, de igual manera que en la última versión del estudio, la totalidad de los casos se aplicó por medio del dispositivo electrónico; solo para las jornadas de capacitación y para la elaboración de este informe, el cuestionario se diagramó en papel (ver Anexo III). El modo utilizado para la aplicación de la encuesta, sea presencial o telefónica, tiene la ventaja de que permite validar —al momento de la entrevista— los flujos de respuestas y los saltos dentro del flujo del cuestionario, además de reducir el tiempo de entrevista y mejorar la calidad de la encuesta, ya que evita errores producidos por el encuestador. El contenido del cuestionario, el fraseo de las preguntas y el orden de las mismas fue el mismo para las modalidades de aplicación CATI y CAPI.

Otra ventaja de este tipo de aplicación es que optimiza el monitoreo del trabajo de terreno. Este sistema permite llevar un registro diario de los Códigos de Disposición Final (CDF) de casos. Esta información es relevante para tomar decisiones durante el trabajo de campo y evaluar oportunamente las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de cobertura de este estudio. Finalmente, se disminuyen los tiempos de procesamiento de las bases de datos, toda vez que la información queda guardada automáticamente en medios magnéticos, en servidores debidamente adecuados para la realización de este estudio. De esta forma, se evitan las tareas de digitación y validación posteriores, y errores no muestrales vinculados a cada una de estas etapas.

La captura de datos a través de dispositivos electrónicos permitió incorporar sintaxis de validación al instrumento que no son posibles de implementar en formularios de papel; por ejemplo, sintaxis de flujo de preguntas o de contenidos específicos del cuestionario. Esto, además de reducir los tiempos de aplicación, evita errores no muestrales que pueda realizar el encuestador al momento de aplicar el cuestionario.

Para la programación del cuestionario, el protocolo de recolección de respuestas es adaptado y parametrizado para ingresar los datos luego de la aplicación de cada módulo. El dispositivo electrónico, una vez conectado a internet, envía los datos recopilados y, en caso de existir actualizaciones, en la misma instancia se actualiza en las bases de datos de la plataforma la información.

TRABAJO DE TERRENO

El trabajo de terreno se desarrolló a través de una entrevista personal o telefónica, utilizando el dispositivo electrónico. La entrevista se realizó a un participante seleccionado a través de la tabla de Kish, que cumpliera con los criterios de inclusión para el estudio. Ante la eventualidad de que la persona seleccionada no estuviera presente en ese momento, se solicitó información respecto al horario en que se le podía encontrar en la vivienda o información para poder contactarlo directamente e invitarlo a participar en el estudio.

Para este estudio se consideró un límite de cinco visitas a la vivienda. Por tanto, el coordinador debe enviar en cinco oportunidades al encuestador a la vivienda para la identificación de la persona seleccionada a través de la tabla de Kish. De acuerdo con la progresión de los CDF observados por cada coordinador, por protocolo se estableció que el coordinador de sede tiene la autoridad para cambiar al encuestador y reasignarlo a otra zona, de modo de que otro encuestador acuda a la vivienda.

El trabajo de terreno se inició en distintas fechas dependiendo de las sedes y la región. Esta fecha estuvo determinada por diversos factores: fecha de la capacitación de encuestadores, elección de una oficina sede para recibir el material y a los encuestadores, recepción del material para los encuestadores, recepción de la muestra proveniente de la coordinación de terreno y la situación de la comuna según el Plan Paso a Paso.

El trabajo de campo del estudio se coordinó a través de 22 zonas, que corresponden a agrupaciones de comunas bajo la dirección de una jefatura zonal. Se establecieron cinco sedes en la Región de Valparaíso, tres sedes en la Región del Biobío (una de ellas incluye a la Región de Ñuble) y dos sedes en la Región de Los Lagos; en el resto de las regiones se estableció una sede. En el estudio trabajaron efectivamente cerca de 350 encuestadores durante la totalidad del trabajo de campo en las 16 regiones del país. El tiempo empleado para completar el proceso de visitas de viviendas a levantar fue de 189 días. Las regiones donde tomó menos tiempo finalizar esta etapa del estudio fueron Antofagasta y Maule con 80 y 83 días, respectivamente; la Región del Biobío fue la que más demoró, con 189 días.

8 Frente a la posibilidad de que el informante idóneo no quiera entregar nombres, se consignó a cada integrante de la vivienda con una identificación que permita saber quién es, por ejemplo, hijo 1, hijo 2, mamá, papá, otros.

TABLA 11
Distribución del trabajo en terreno según regiones y zonas.
Chile, 2020.

Sede	Región	Cobertura Comunas	Muestra total	Distribución relativa (%)
1	Arica y Parinacota	Arica	1.860	4,3
2	Tarapacá	Iquique - Alto Hospicio	2.161	5,0
3	Antofagasta	Antofagasta - Calama	1.428	3,3
4	Atacama	Copiapó - Vallenar	1.828	4,2
5	Coquimbo	Coquimbo - La Serena - Ovalle	1.276	3,0
6	Valparaíso	Los Andes - San Felipe	461	1,1
7	Valparaíso	San Antonio	272	0,6
8	Valparaíso	Limache - Quilpué - Viña del Mar - Calera	1.724	4,0
9	Valparaíso	Valparaíso - Concón	833	1,9
10	Valparaíso	Quillota - Villa Alemana	626	1,5
11	O'Higgins	Rancagua - Chimbarongo - Graneros - Mostazal - Machalí - San Fernando - San Vicente - Rengo	2.433	5,6
12	Maule	Cauquenes - Constitución - Curicó - Linares - Parral - Talca	2.109	4,9
13	Biobío	Hualpén - Penco - Tomé - Chiguayante - Lota - Coronel	1.244	2,9
14	Biobío	Concepción - Talcahuano - San Pedro de La Paz	1.146	2,7
15	Ñuble y Biobío	Chillán - Chillán Viejo - Los Ángeles - Curanilahue	3.172	7,4
16	La Araucanía	Temuco - Angol - Lautaro - Padre Las Casas - Pitrufquén - Victoria - Villarrica - Nueva Imperial	2.865	6,6
17	Los Ríos	Valdivia - Panguipulli - Río Bueno - La Unión	1.820	4,2
18	Los Lagos	Osorno	760	1,8
19	Los Lagos	Puerto Montt - Castro - Ancud	1.497	3,5
20	Aysén	Coyhaique - Aysén	1.610	3,7
21	Magallanes	Punta Arenas	1.931	4,5
22	Metropolitana	Gran Santiago - Buin - Colina - Melipilla - Peñaflor - Talagante - Padre Hurtado	10.066	23,3
	Nacional		43.122	100

La primera zona en comenzar el trabajo en terreno fue la Región de Valparaíso, el 16 de noviembre de 2020, luego de cumplir todos los requisitos para iniciar el trabajo de campo y con la aprobación del cuestionario en medio digital, el protocolo de trabajo y la carta de presentación del estudio de parte del equipo del SENDA. La descripción del trabajo en terreno de todas las sedes se presenta a continuación:

TABLA 12
Descripción del trabajo en terreno según regiones.
Chile, 2020.

Región	Días de terreno	Fecha de inicio de terreno	Muestra lograda
Tarapacá	175	07-12-2020	969
Antofagasta	80	07-12-2020	689
Atacama	122	07-12-2020	846
Coquimbo	97	05-12-2020	586
Valparaíso	142	16-11-2020	1.508
O'Higgins	178	05-12-2020	966
Maule	83	21-11-2020	1.133
Biobío	189	23-11-2020	1.264
La Araucanía	187	27-11-2020	1.237
Los Lagos	171	03-12-2020	932
Aysén	138	14-01-2021	660
Magallanes	134	15-01-2021	742
Metropolitana	185	28-11-2020	2.628
Los Ríos	107	30-11-2020	835
Arica y Parinacota	84	14-12-2020	698
Ñuble	186	08-12-2020	969
Nacional	189	16-11-2020	16.662

TASAS DE RESPUESTA, RECHAZO, CONTACTO Y COOPERACIÓN

Para registrar el resultado de las visitas hechas a las direcciones pertenecientes a la muestra, se utilizó un listado de códigos de disposición, basado en la codificación elaborada por la American Association for Public Opinion Research (AAPOR)⁹. Dado que la medición considera la posibilidad de aplicación presencial y telefónica, se amplió esta codificación, de modo de poder dar cuenta de los resultados tanto en el momento de la visita presencial como en los casos donde se logra contactar u obtener los datos de contacto de la persona seleccionada mediante tabla Kish; a su vez, se registra si este contacto se debió hacer de forma telefónica o presencial.

9 The American Association for Public Opinion Research. (2016). Standard Definitions: Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys (9ª ed.) (p. 75). AAPOR. http://www.aapor.org/AAPOR_Main/media/publications/Standard-Definitions20169theditionfinal.pdf

Las tasas de respuesta, rechazo, contacto y cooperación se calculan con base en los Códigos de Disposición Final (CDF) registrados por los encuestadores en el dispositivo electrónico en el apartado de la Hoja de Ruta. Dichos códigos se basan en la clasificación establecida por la AAPOR y establece cuatro grandes grupos: 1) entrevistados, 2) elegibles que no son entrevistados (no encuestado), 3) casos de elegibilidad desconocida, no entrevistados, y 4) casos que no son elegibles.

Los entrevistados se dividen en dos grupos: a) completos y b) parciales. Con relación a los elegibles no entrevistados, estos se obtienen a partir de tres tipos de no respuesta: a) aquellos que rechazaron la encuesta o aquellos en donde la encuesta fue interrumpida, b) no contactos y c) otros. El primer tipo corresponde a los casos en donde existió algún tipo de contacto con la unidad, pero declinó de realizar la entrevista o la aplicación del instrumento, o cuando se logró iniciar, pero fue interrumpida repentinamente. El segundo tipo corresponde a situaciones en donde i) se impide el acceso al hogar o ii) el informante no se encuentra o no está disponible para responder la encuesta. Por último, los otros casos representan instancias en donde, a pesar de no haber rechazado la encuesta, la entrevista no puede llevarse a cabo debido a que el informante se encuentra impedido física o mentalmente o existen problemas de lenguaje; muerte del informante u otras razones de diversa índole.

Los casos de elegibilidad desconocida y no entrevistados incluyen situaciones en donde se desconoce si la unidad (por ejemplo, hogar) elegida existe o no, y aquellos casos en donde si bien existe, se desconoce si hay presente un informante elegible en la unidad. Los no elegibles corresponden a los siguientes casos: a) unidades fuera de muestra, b) estructuras que no son hogares, c) hogares que no poseen los niveles a evaluar, y d) situaciones en que los cupos ya han sido llenados.

TABLA 13
Número de casos según Códigos de Disposición Final para muestra total. Chile, 2020.

Clasificación AAPOR	Código	Categoría	Número de casos
[E] Entrevista completa	101	Encuesta completa	16.662
[P] Entrevista parcial	213	Se interrumpió la entrevista a seleccionado Kish	11
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	P21	Rechazo a nivel vivienda	5.038
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	R01	Rechazo seleccionado Kish	1.152
[NC] Unidades no contactadas	P31	Vivienda ocupada, sin moradores presentes	7.456
[NC] Unidades no contactadas	P32	Se impide el acceso a la vivienda	827
[NC] Unidades no contactadas	P33	Informante Kish no ubicable o sin dato de contacto	70
[NC] Unidades no contactadas	P34	Informante Kish ausente en periodo de levantamiento de encuesta	5
[NC] Unidades no contactadas	T33	Informante Kish no ubicable	134
[NC] Unidades no contactadas	T49	Otra razón de no entrevista	4
[NC] Unidades no contactadas	T71	Marca tono, pero sin respuesta	8
[NC] Unidades no contactadas	T72	Responde buzón de voz	2
[NC] Unidades no contactadas	T74	Se encuentra ocupado o fuera del área de cobertura	1
[NC] Unidades no contactadas	T76	Número telefónico equivocado	8
[O] Otro motivo de no entrevista	P41	Informante Kish impedido física y/o mentalmente para contestar	16
[O] Otro motivo de no entrevista	P44	Concertó cita con el informante Kish	115
[O] Otro motivo de no entrevista	P70	Informante indica que vuelva en otro momento	3
[O] Otro motivo de no entrevista	T41	Informante Kish impedido física y/o mentalmente para contestar	2
[O] Otro motivo de No Entrevista	T44	Concertó cita con el informante Kish	12
[UH] Se desconoce si existe hogar (vivienda) elegible	P52	No fue posible localizar la dirección	493
[UH] Se desconoce si existe hogar (vivienda) elegible	P53	Inaccesibilidad por razones climáticas o desastres naturales	10
[UH] Se desconoce si existe hogar (vivienda) elegible	P54	Área peligrosa	173
[UH] Se desconoce si existe hogar (vivienda) elegible	311	No se envió a terreno	7.103
[UH] Se desconoce si existe hogar (vivienda) elegible	-	Encuesta anulada	360
[UO] Se desconoce si entrevistado es elegible/otra razón de elegibilidad desconocida	P59	Otra razón de elegibilidad desconocida	156
[NE] No elegible	P61	Establecimiento, oficina de gobierno u otra organización	88
[NE] No elegible	P62	Institución	39
[NE] No elegible	P63	Dormitorio colectivo	42
[NE] No elegible	P64	Vivienda en demolición, incendiada, destruida o erradicada	138
[NE] No elegible	P65	Vivienda desocupada	475
[NE] No elegible	P66	Vivienda de verano o de uso temporal	55
[NE] No elegible	P67	Edificación no calificable	64
[NE] No elegible	P68	No existe informante Kish elegible entre 12 y 65 años	2.155
[NE] No elegible	P69	Otra razón para ser considerado Kish no elegible	245
Total			43.122

En consideración a lo anterior, las tasas de respuesta (TRR1), de cooperación (TCC1), de rechazo (TR1) y de contacto (TC1) son las siguientes:

TABLA 14**Resultados de visita según tasas de resultados. Chile, 2020.**

Tasa	Definición	Porcentaje (%)
TRR1	Proporción de entrevistas realizadas de todos los casos elegibles	41,8
TCC1	Proporción del número de entrevistas realizadas de aquellos casos que han sido contactados durante el período de trabajo de campo	72,4
TC1	Proporción de todos los casos en los que algún miembro de la vivienda ha sido contactado por el encuestador, aunque después se haya negado a responder o no haya podido dar ningún tipo de información	57,8
TR1	Proporción de todos los casos elegibles estimados que se niegan a contestar	15,5

A nivel regional se observa una relativa heterogeneidad en los resultados obtenidos para las tasas obtenidas a partir de los Códigos de Disposición Final. La tasa de respuesta más alta se observó en la Región de Maule, con 64,2%, mientras que la menor fue en la Región Metropolitana, con 27,3%. Las tasas de rechazo variaron entre 6,9% (Región de Tarapacá) y 47,5% (Región de Arica y Parinacota).

TABLA 15**Resultados de visita según tasas de resultados por región. Chile, 2020.**

Tasas de resultados				
Región	TRR1	TCC1	TR1	TC1
Tarapacá	46,7	86,8	6,9	53,8
Antofagasta	50,4	75,1	16,7	67,1
Atacama	50,2	84,2	9,2	59,6
Coquimbo	51,8	79,8	13,1	64,9
Valparaíso	42,7	68,8	18,8	62,0
O'Higgins	43,2	62,9	25,4	68,6
Maule	64,2	82,6	13,3	77,7
Biobío	51,7	79,2	13,3	65,3
La Araucanía	45,2	82,7	8,5	54,6
Los Lagos	44,2	63,4	25,1	69,6
Aysén	47,9	86,7	7,0	55,3
Magallanes	43,7	74,1	15,3	59,0
Metropolitana	27,3	65,9	13,6	41,5
Los Ríos	49,9	75,0	16,2	66,5
Arica y Parinacota	40,2	45,8	47,5	87,7
Ñuble	36,6	81,8	7,6	44,7
Nacional	41,8	72,4	15,5	57,8

SUPERVISIÓN

La etapa de supervisión permite garantizar la correcta ejecución de la metodología del estudio. Su enfoque se basa en el aseguramiento de la calidad de las encuestas aplicadas, es decir, confirmar por un lado la efectiva aplicación de las preguntas del cuestionario y, por otro, velar también por el acceso a la vivienda adecuada, el correcto ingreso de la totalidad de los integrantes de la vivienda y, consecuentemente, la correcta selección del informante Kish y de la enumeración de los hogares encontrados en dicha vivienda.

La supervisión se dividió en tres etapas:

- Supervisión de la selección de la vivienda por parte del encuestador.
- Supervisión del correcto ingreso de todos los integrantes de la vivienda en el listado asociado a la tabla de Kish.
- Supervisión de la correcta aplicación del cuestionario (duración, supervisión de ítems).

La supervisión aplicada en el estudio se realizó a través de diversas técnicas: georreferenciación, escucha y reaplicación de aspectos claves (vía cuestionario de supervisión).

Se supervisó al 100% de los encuestadores en las distintas técnicas de control de calidad. La supervisión fue vía telefónica, de acuerdo con las condiciones sanitarias derivadas por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, todos aquellos casos supervisados en los que el equipo de calidad dispuesto por la empresa ejecutora determinó que era necesario visitar en terreno, se procedió de esa forma.

El proceso de supervisión fue realizado por un supervisor externo al equipo de encuestadores a cargo del trabajo en terreno. La cantidad de encuestadores supervisores a nivel regional fue de 24.

El trabajo de supervisión se organizó de manera centralizada: un Coordinador de Supervisión a cargo de todo el país organizó un equipo paralelo de encuestadores y asignó la muestra a supervisar. Se estableció como protocolo la supervisión de al menos una encuesta para todos los encuestadores y la inclusión de al menos una encuesta por segmento. Junto con la selección aleatoria, también era posible que el coordinador solicitara de forma intencionada la supervisión de folios de encuestas únicas al equipo central. Las supervisiones se realizaron tanto de manera presencial como telefónica.

La supervisión se realizó en paralelo al levantamiento de datos en terreno y completó 44,3% de la muestra total cubierta por este estudio. Se identificaron como encuestas con problemas los siguientes casos:

- Encuestas donde no se registraron todos los integrantes de la vivienda.
- Encuestas donde la persona que respondió no correspondía al seleccionado Kish.
- Encuestas de supervisión donde se declaró que no se había aplicado encuestas en la dirección.
- Encuestas donde no coincidía la dirección con la del directorio asignado por el INE.

En cuanto al proceso de supervisión efectivo, a continuación, se muestra la distribución según regiones.

TABLA 16
Distribución del proceso de supervisión efectivo del
trabajo de campo, según regiones. Chile, 2020.

Región	Encuestas logradas	Total supervisadas	Supervisión (%)	Nº de supervisores
Tarapacá	969	355	36,6	1
Antofagasta	689	284	41,2	1
Atacama	846	361	42,7	1
Coquimbo	586	201	34,3	1
Valparaíso	1.508	706	46,8	3
O'Higgins	966	489	50,6	1
Maule	1.133	411	36,3	2
Biobío	1.264	605	47,9	2
La Araucanía	1.237	445	36,0	1
Los Lagos	932	399	42,8	1
Aysén	660	291	44,1	1
Magallanes	742	508	68,5	1
Metropolitana	2.628	1.130	43,0	4
Los Ríos	835	421	50,4	2
Arica y Parinacota	698	311	44,6	1
Ñuble	969	456	47,1	1
Nacional	16.662	7.373	44,3	24

SITUACIONES DE TERRENO

Desde que se dio inicio al trabajo de campo del ENPG 2020, el nivel de logro se vio afectado a nivel nacional por la emergencia sanitaria, lo que limitó la posibilidad de acudir a terreno debido a las cuarentenas que se habían levantado a lo largo del país (Plan Paso a Paso), y por la sensación de inseguridad que experimentaban las personas debido a los riesgos de contagio por contacto con individuos externos a su vivienda (según reportes desde el equipo de trabajo de campo).

Sin embargo, a través de distintas medidas establecidas para los protocolos de visita y aplicación en terreno, se buscó disminuir el efecto de este problema, realizando los esfuerzos necesarios para mantener en aplicación el estudio en la mayor parte del territorio nacional durante el periodo total en el que se desarrolló el trabajo de campo.

A continuación, se detallan distintas situaciones surgidas a lo largo del trabajo de campo, principalmente asociadas a problemáticas ligadas a la pandemia y vinculadas a las medidas sanitarias que fue fijando la autoridad durante el desarrollo del estudio.

a) Casos activos o en cuarentena

Durante el período de campo, se presentaron situaciones en algunas regiones donde algunas personas de los equipos de campo se vieron afectadas por el COVID-19, o bien tuvieron que estar sometidas a períodos de cuarentena. Se pueden mencionar algunos ejemplos como el caso de la Región de O'Higgins, donde

la coordinadora de campo y parte de su equipo de encuestadores fueron examinadas con resultado positivo para el virus, por lo que fue necesario recurrir a una encargada regional de reemplazo.

Acorde a la situación anterior, el contexto de pandemia afectó la cantidad de encuestadores disponibles a trabajar tanto en la etapa inicial como final del trabajo de campo, periodos en los que existía una alta cantidad de contagios a nivel nacional, con la correspondiente implementación de medidas de cuarentena en gran parte de las zonas del país.

b) Plan Paso a Paso

Como fue mencionado, la fijación del sistema de confinamiento o cuarentenas llevó a que en distintas zonas los encuestadores no pudiesen seguir trabajando en campo por no contar con los permisos para desplazarse, puesto que la aplicación de encuestas no era considerada como un servicio esencial en el Plan Paso a Paso. Esto ocurría principalmente en las comunas señaladas en el paso 1 de este plan, pero también en el paso 2 (transición). En este último caso se veía limitado el desplazamiento durante los días sábado y domingo, dificultando la aplicación de encuestas a personas que podrían no estar en su domicilio durante los días hábiles, o cuando no disponían de tiempo durante aquellos días.

A su vez, y como consecuencia de la situación sanitaria, los traslados interurbanos o a comunas cercanas a capitales regionales, se vieron afectados debido a la baja en la frecuencia de los recorridos y el ajuste de los horarios de funcionamiento del transporte público. A modo de ejemplo, no se lograba trabajar después de las 17 h, debido a que no se contaba con transporte público para el retorno de los encuestadores. Esta situación se hizo crítica en las zonas que se encontraban apartadas de las comunas de origen de los encuestadores.

c) Riesgos o temor de contagio

La seguridad de los encuestadores a la hora de realizar el trabajo de campo es primordial. En este sentido, y pese a la entrega de equipamiento para prevenir el contagio, existieron varios casos de personas del equipo de trabajo de campo que se rehusaron a participar del estudio durante ciertos periodos del trabajo en terreno, por razones de seguridad personal o de sus familiares.

d) Control de seguridad ciudadana

A nivel nacional, en algunas comunas existió control por parte de los organismos de seguridad que impidió o dificultó el trabajo en terreno. Dichas situaciones fueron intercedidas por el SENA que gestionó la autorización para que los encuestadores pudieran aplicar sus encuestas.

PREVALENCIA Y DROGAS ESTUDIADAS

Para describir la magnitud del uso de drogas ilícitas, el SENA utiliza como medida de referencia la prevalencia de consumo en el último año (aquellos que declaran haber consumido al menos una vez la droga señalada en los últimos doce meses). Este informe describe, en particular, el comportamiento frente a las drogas ilícitas de uso más frecuente, tales como marihuana, pasta base, cocaína (clorhidrato de cocaína) y medicamentos sin receta médica. Pasta base y clorhidrato de cocaína se analizan también bajo el formato de cocaína total (cocaína y/o pasta base) que describe el uso global

de cocaína sin contar el crack. También se informa acerca del uso de otras drogas de menor prevalencia, así como del consumo de alcohol, donde la medida de referencia es la proporción de individuos que ha consumido alcohol al menos una vez en los últimos 30 días. Para el consumo de tabaco se toma como referencia la proporción de personas que ha fumado al menos un cigarrillo en 20 o más días en el último mes.

CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La inferencia estadística de los datos del *Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile* y de las versiones anteriores se efectuó a un nivel de significancia del 5%. A su vez, los intervalos de confianza presentados en la sección de anexos de este informe se elaboraron a un nivel de confianza del 95%.

Todos los análisis estadísticos se realizaron empleando los factores de expansión ajustados a la población representada y a las etapas de muestreo para obtener una estimación insesgada de la varianza.

Tal como ha sido mencionado en el informe, el levantamiento de información del presente estudio fue realizado en población de 12 a 65 años, la presentación de resultados del informe se hará considerando el tramo de 12 a 64 años tal como se ha realizado desde 1994.

El análisis comparado respecto a estudios pasados considera la dimensión de nivel socioeconómico. Esta variable se construye a partir de dos ítems que completa el encuestador al inicio de la aplicación de la encuesta en cada vivienda (en ausencia del entrevistado)¹⁰. Estas preguntas hacen referencia a la calidad del barrio y de la vivienda, a partir de las cuales se elabora un índice sumatorio con el que se establecen tres categorías de nivel socioeconómico (bajo, medio y alto).

La distribución de la población representada por nivel socioeconómico es la siguiente:

TABLA 17
Distribución del total de la población estimada de 12 a 64 años, según nivel socioeconómico. Chile, 1994–2020.

Serie	Total población	Nivel socioeconómico		
		Bajo (%)	Medio (%)	Alto (%)
1994	6.186.528	50,8	23,3	25,9
1996 ¹¹	6.917.182			
1998	6.940.727	27,9	23,6	48,5
2000	7.779.667	43,8	28,3	27,9
2002	8.392.058	45,3	28,8	26,0
2004	8.715.567	42,0	33,0	25,0
2006	8.761.229	37,6	34,8	27,6
2008	8.954.639	35,9	39,5	24,6
2010	9.536.602	21,6	41,9	36,4
2012	9.731.731	22,2	36,6	41,2
2014	9.828.181	21,5	37,0	41,5
2016	10.115.249	21,0	36,1	42,9
2018	10.598.556	25,5	39,0	35,5
2020	10.893.883	27,1	41,5	31,4

10 Respecto a las mediciones anteriores, este proceso se realizó al inicio de la aplicación debido a la modalidad mixta de aplicación del cuestionario.

11 En la medición de 1996 no se disponía de los ítems del índice sumatorio para la construcción de la variable de nivel socioeconómico.



Principales Resultados

Principales Resultados


TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Consumo de marihuana

La prevalencia de uso de marihuana alguna vez en la vida muestra una variación significativa al alza, pasando de 34,8% en 2018 a 38,2% en 2020, mientras que la prevalencia de uso en el último mes se mantiene estable respecto al estudio anterior y llega a 7,9%.

Las declaraciones de uso de marihuana en el último año marcan una tendencia ascendente en la década de los 90, para establecerse en una prevalencia máxima de 7,2% en 2006 y luego descender hasta establecerse en 2010 con prevalencias bajo el 5%. Posteriormente, los reportes desde 2010 a 2016 mostraron un aumento sistemático del consumo de esta droga en el país, estableciéndose en valores superiores al 10%. Los últimos estudios publicados confirman esta tendencia.

GRÁFICO 1
Evolución de prevalencias (%) de consumo de marihuana.
Chile, 1994-2020.



La medida principal que emplea el SENDA para caracterizar el consumo de marihuana en Chile es la prevalencia de uso en el último año. En la presente versión del estudio, la proporción de usuarios de marihuana en el último año muestra una estabilización respecto a 2018 con un 11,4%, reafirmando el descenso observado en el estudio anterior. A pesar de esto, esta cifra representa la tercera más alta de toda la serie de estudios.

La desagregación por sexo de los resultados muestra una estabilización en hombres y mujeres respecto a 2018, con valores de 16,0% y 6,8%, respectivamente. Al igual que en estudios anteriores, la brecha observada de 9,2 puntos porcentuales entre hombres y mujeres en la prevalencia de uso en 2020 es estadísticamente significativa.

Por primera vez desde 2010, las declaraciones de uso de marihuana en adolescentes de 12 a 18 años presentaron una disminución estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, llegando a un 5,8% en 2020 (10,1% en 2018). Por su parte, y por segundo estudio consecutivo, no se observaron cambios significativos en el

grupo de jóvenes de 19 a 25 años respecto a la medición pasada, llegando a 27,2% en 2020. Con relación a los tres grupos de mayor edad, y al igual que en 2018, ninguna de las variaciones observadas respecto al estudio anterior es estadísticamente significativa. El análisis de brecha en este estudio muestra que la prevalencia del tramo de 19 a 25 años es significativamente mayor a la observada en todos los demás grupos; a su vez, sacando este último grupo de edad, la prevalencia de uso del grupo de 26 a 34 años es mayor a las restantes.

Según nivel socioeconómico (NSE), las prevalencias del NSE Medio y Alto se mantuvieron estables respecto a 2018, con valores de 12,6% y 11,5%, respectivamente. No obstante, el descenso observado en el NSE Bajo fue estadísticamente significativo, de 12,4% en 2018 a 9,4% en 2020. Respecto a las brechas, se observa que la diferencia de 3,2 puntos porcentuales entre el NSE Bajo y Medio es estadísticamente significativa.

TABLA 18
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	4,0	6,1	1,9	5,6	8,7	4,7	1,6	0,2	3,6	3,2	5,2
1996	4,0	5,9	2,2	6,7	10,6	3,5	1,1	0,2			
1998	4,8	7,2	2,4	7,6	12,1	4,8	1,7	0,3	5,4	5,0	4,2
2000	5,7	8,5	3,1	8,1	14,7	6,7	2,4	0,4	5,7	4,9	6,6
2002	5,0	7,9	2,3	6,2	13,0	6,7	2,0	0,5	5,5	4,3	5,0
2004	5,4	7,6	3,2	6,2	14,7	6,5	2,4	0,7	5,0	4,5	7,0
2006	7,2	9,7	4,7	7,4	18,5	9,8	3,8	1,3	5,8	6,0	10,3
2008	6,4	8,8	4,2	9,1	17,9	6,7	2,8	0,9	7,4	5,6	6,4
2010	4,6	7,1	2,1	5,3	12,3	6,7	2,6	0,5	6,1	3,3	5,1
2012	7,1	9,8	4,4	6,7	17,5	10,3	4,4	1,9	7,4	6,9	7,1
2014	11,3	14,6	8,1	13,5	24,0	17,1	9,0	4,2	10,6	10,4	12,5
2016	14,5	18,4	10,6	12,6	33,8	23,4	9,4	5,5	14,4	12,1	16,6
2018	12,7	18,1	7,4	10,1	32,1	20,0	9,3	3,9	12,4	12,3	13,3
2020	11,4	16,0	6,8	5,8	27,2	18,1	11,0	3,7	9,4	12,6	11,5

Desde el estudio de 2012 se pregunta por el tipo de marihuana consumida con mayor frecuencia en los últimos 12 meses entre quienes declararon haber consumido marihuana en el último año: prensada (tipo paraguaya), verde y de alta potencia. En el estudio de 2016, a esas tres opciones de respuestas, se agregaron otras dos para pesquisa de “marihuana verde o yerba” y “marihuana de alta potencia o *skunk*”; a cada una se le agregó la palabra “autocultivo”. Para efectos de este informe, se reagruparon las categorías de respuesta a fin de hacer comparables las proporciones obtenidas y hacer el análisis de tendencia.

Tal como en las mediciones anteriores, se mantiene la tendencia iniciada en el estudio de 2014, por cuanto siguen disminuyendo las declaraciones de uso de marihuana prensada: la disminución de 3,8% en 2018 a 2,2% en 2020 es una variación estadísticamente significativa. Con una declaración de uso del 83,1%, la marihuana verde presenta la mayor proporción de uso, y representa, además, un aumento estadísticamente significativo respecto a 2018. Por último, un 8,3% declaró consumir en mayor medida la marihuana *skunk* o de alta potencia, lo que ratifica la estabilidad reportada en el estudio anterior.

A pesar de registrarse un descenso en la proporción total de uso de marihuana prensada, no se observan variaciones por sexo, tramos de edad y NSE respecto a 2018. En el caso de marihuana verde, se observan aumentos en ambos sexos, en los tramos de 12 a 18 años y de 45 a 64 años, y en el NSE Bajo y Medio. Finalmente, el análisis comparado del uso de marihuana de alta potencia muestra en 2020 variaciones significativas a la baja en el tramo de 12 a 18 años y en el NSE Bajo.

El análisis de brechas por sexo y NSE no muestra diferencias estadísticamente significativas para los tres tipos de marihuana en la actual medición. Por tramos de edad, y tal como en el estudio anterior, la marihuana consumida con mayor frecuencia por adolescentes (12 a 18 años) y jóvenes (19 a 25 años) es la verde con 84,6% y 76,7%, respectivamente.

TABLA 19


Evolución de consumo de tipos de marihuana entre prevalentes en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2020.

Porcentaje que declara haber consumido con mayor frecuencia un tipo de marihuana (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
Marihuana prensada (paraguaya)											
2012	32,1	36,4	22,6	42,4	31,9	26,1	26,3	36,2	39,6	36,9	23,7
2014	15,9	17,7	12,6	30,9	12,6	14,7	12,1	13,2	25,7	20,4	8,3
2016	8,1	9,4	5,9	13,8	6,4	7,4	11,7	6,3	16,0	10,6	3,3
2018	3,8	4,1	3,3	4,4	3,5	3,2	2,7	7,4	6,3	4,4	1,2
2020	2,2	2,3	1,9	2,3	1,8	3,4	1,5	1,4	3,0	2,4	1,4
Marihuana verde											
2012	54,4	50,0	64,1	49,4	50,7	60,5	63,0	55,4	53,8	49,7	58,8
2014	68,9	65,7	74,5	54,4	78,3	62,1	73,9	69,0	64,6	70,3	69,8
2016	72,9	70,9	76,4	65,2	75,3	76,1	66,7	72,3	65,4	75,6	74,5
2018	74,4	72,7	78,4	54,0	72,2	81,0	84,4	71,3	69,5	71,2	81,1
2020	83,1	81,9	85,8	84,6	76,7	87,7	85,8	86,9	82,2	84,1	82,2
Marihuana skunk o de alta potencia											
2012	6,2	7,4	3,5	2,2	10,2	4,2	4,0	2,7	0,9	4,3	10,8
2014	5,7	6,9	3,8	4,4	3,2	13,5	3,0	3,1	1,5	4,2	8,8
2016	9,7	11,6	6,3	8,7	11,9	9,9	9,9	4,3	7,7	6,4	12,5
2018	12,1	14,5	6,4	25,1	15,0	10,1	6,2	3,2	16,9	14,8	6,1
2020	8,3	9,1	6,4	4,8	13,3	5,9	6,4	3,5	7,1	7,7	10,2

GRÁFICO 2

Evolución de prevalencias (%) de consumo de clorhidrato de cocaína. Chile, 1994-2020.



Las declaraciones de uso de cocaína en el último año disminuyen significativamente de 1,0% en 2018 a 0,5% en 2020, siendo esta cifra la menor de toda la serie de estudios. De esta manera, se reafirma la tendencia de las mediciones pasadas, por cuanto la magnitud del consumo de cocaína se mantiene entre los menores valores observados desde 1994.

La desagregación de la prevalencia por sexo —como ha sido tendencia a lo largo de la serie de estudios— muestra una brecha estadísticamente significativa entre hombres (1,0%) y mujeres (0,1%) en 2020. Respecto al estudio anterior, en ambos sexos se observan descensos significativos de 0,8 y 0,2 puntos porcentuales respecto a 2018.

Consumo de clorhidrato de cocaína

En el caso de clorhidrato de cocaína, la prevalencia de uso alguna vez en la vida aumenta significativamente 1,1 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, pasando de 5,5% en 2018 a 6,6% en 2020. Por otro lado, la prevalencia de uso durante los últimos 30 días muestra un descenso estadísticamente significativo respecto a lo observado en 2018, pasando de 0,4% a 0,2%.

TABLA 20
Evolución de prevalencia (%) de consumo de clorhidrato de cocaína en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	0,9	1,5	0,3	0,8	1,7	1,5	0,6	-	0,8	0,9	1,2
1996	0,9	1,4	0,4	0,9	2,4	1,2	0,1	<0,1			
1998	1,4	2,3	0,5	0,9	3,4	2,0	0,9	0,1	1,5	1,5	1,3
2000	1,5	2,5	0,5	1,1	3,6	2,3	1,0	0,1	1,6	1,6	1,3
2002	1,5	2,6	0,5	0,8	4,0	2,8	0,8	0,1	1,9	1,6	0,9
2004	1,3	2,2	0,5	0,7	3,5	2,1	0,7	0,3	1,6	1,2	1,1
2006	1,3	2,0	0,6	0,7	2,8	1,8	1,5	0,3	1,6	1,3	0,7
2008	1,8	3,2	0,6	1,0	3,8	2,4	1,7	0,9	2,4	1,6	1,5
2010	0,7	1,2	0,1	0,4	1,3	1,3	0,7	0,2	1,0	0,3	0,8
2012	0,9	1,3	0,5	0,3	2,0	1,6	0,7	0,3	1,5	0,6	0,7
2014	1,4	2,2	0,6	1,6	1,9	2,7	1,5	0,6	2,1	1,3	1,1
2016	1,1	1,6	0,5	0,3	1,8	2,1	1,4	0,3	2,0	0,9	0,7
2018	1,0	1,8	0,3	0,1	2,0	1,9	1,3	0,4	1,6	1,0	0,7
2020	0,5	1,0	0,1	<0,1	0,9	0,8	0,8	0,3	0,8	0,4	0,4


Por tramos de edad, la menor prevalencia de consumo se observa entre los 12 y 18 años (<0,1%), siendo esta brecha estadísticamente significativa respecto al resto de los tramos de edad. Respecto al estudio anterior, se reporta un descenso significativo en la prevalencia de consumo del tramo de 26 a 34 años, pasando de 1,9% en 2018 a 0,8% en 2020.

Por nivel socioeconómico, se reportan variaciones significativas a la baja en el NSE Bajo (de 1,6% a 0,8%) y en el NSE Medio (de 1,0% a 0,4%) respecto a la medición pasada. El análisis de brechas por NSE, a diferencia de estudios previos, no muestra variaciones en las prevalencias de uso de cocaína entre NSE Alto y Bajo.

Consumo de pasta base

La prevalencia de uso alguna vez en la vida de pasta base, tal como en el estudio anterior, se mantiene estable respecto a la medición previa, pasando de 2,4% en 2018 a 2,6% en 2020. De igual manera a lo observado en la prevalencia vida, las prevalencias de último año y último mes tampoco muestran cambios significativos respecto al estudio pasado.

GRÁFICO 3
Evolución de prevalencias (%) de consumo de pasta base. Chile, 1994-2020.



La desagregación por sexo de la prevalencia de último año muestra una brecha estadísticamente significativa entre lo declarado por hombres y mujeres en 2020 con 0,5% y 0,1%, respectivamente. No se registran variaciones estadísticamente significativas por sexo respecto al estudio anterior.

Por tramos de edad, no se observan variaciones significativas respecto a 2018. Por su parte, el análisis de brechas muestra que la prevalencia observada en el tramo de 12 a 18 años es significativamente menor a la reportada en los tramos de edad entre 26 y 64 años. Respecto al tramo de 19 a 25 años, las declaraciones de uso son significativamente menores a las del tramo de 35 a 44 años.

Por nivel socioeconómico, y por segundo estudio consecutivo, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a la medición pasada. El análisis de brechas no muestra diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos de NSE.


TABLA 21
Evolución de prevalencia (%) de consumo de pasta base en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	0,9	1,6	0,3	1,2	1,2	1,7	0,5	-	1,2	0,7	0,5
1996	0,7	1,0	0,3	0,8	1,5	1,1	0,1	<0,1			
1998	0,8	1,4	0,3	1,0	1,8	1,1	0,5	0,1	1,5	1,0	0,4
2000	0,7	1,2	0,2	0,7	1,4	1,3	0,4	0,1	1,1	0,6	0,2
2002	0,5	0,9	0,1	0,2	1,3	0,8	0,4	<0,1	0,8	0,5	0,1
2004	0,6	1,1	0,2	0,7	1,3	1,0	0,5	0,1	1,3	0,3	0,1
2006	0,6	1,1	0,2	0,6	1,1	1,2	0,5	0,1	1,1	0,4	0,1
2008	0,7	1,1	0,4	0,4	1,9	0,8	0,8	0,1	1,4	0,2	0,5
2010	0,4	0,7	0,1	0,3	0,9	0,8	0,3	0,1	1,1	0,2	0,2
2012	0,4	0,8	0,1	0,2	0,5	1,0	0,4	0,2	0,9	0,5	<0,1
2014	0,5	0,8	0,1	0,3	0,5	1,0	0,6	0,2	1,4	0,3	0,1
2016	0,4	0,7	0,1	0,3	0,6	0,7	0,6	0,1	0,7	0,4	0,2
2018	0,4	0,7	0,2	<0,1	0,4	0,8	0,7	0,3	0,9	0,4	0,2
2020	0,3	0,5	0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,8	0,2	0,5	0,3	0,2

Consumo de alcohol

Los resultados respecto del uso de alcohol continúan la tendencia iniciada en estudios anteriores. La prevalencia de uso alguna vez en la vida aumenta significativamente de 77,7% en 2018 a 79,8% en 2020; por su parte, el uso en el último año se estabiliza en 58,5% en 2020 (61,0% en 2018). Ambos indicadores continúan manteniéndose en valores mayores a los observados a inicios de la presente década.

GRÁFICO 4
Evolución de prevalencias (%) de consumo de alcohol. Chile, 1994-2020.



La prevalencia de uso de alcohol en el último mes se estabiliza luego de descender durante dos estudios consecutivos. La prevalencia mes pasa de 43,3% en 2018 a 44,3% en 2020, y se mantiene entre los menores valores observados en toda la serie de estudios, sin mostrar una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

La desagregación de la prevalencia de último mes por sexo muestra una estabilización en las declaraciones de hombres (de 52,5% en 2018 a 51,5% en 2020) y de mujeres (de 34,2% en 2018 a 37,2% en 2020). A su vez, la brecha de 14,3 puntos porcentuales en la prevalencia observada entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa, como ha sido tendencia en la serie de estudios.

Según tramos de edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto al estudio anterior. El análisis de brechas muestra que la prevalencia de uso de alcohol en adolescentes (13,6%) es significativamente menor que en el resto de los tramos de edad, mientras que las declaraciones entre 45 y 64 años (43,8%) son significativamente menores a las reportadas en el tramo de 19 a 44 años.

La desagregación según nivel socioeconómico no muestra cambios respecto al estudio anterior. Al igual que en los últimos tres estudios, la prevalencia de consumo en el NSE Alto (46,3%) es significativamente mayor que en el NSE Bajo (40,5%), no observándose otras brechas en la actual medición.

TABLA 22
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	40,4	50,6	31,0	24,4	49,4	46,7	43,7	36,5	38,1	38,1	47,0
1996	48,1	56,9	39,8	31,4	56,7	52,3	51,5	46,6			
1998	53,0	64,0	42,5	30,9	60,3	58,3	57,9	54,4	49,1	52,8	55,3
2000	54,4	63,4	45,8	30,6	61,1	60,5	59,8	57,2	51,6	53,2	60,2
2002	59,6	66,8	52,8	35,5	65,8	66,6	65,9	61,7	58,2	59,3	62,5
2004	57,9	66,6	49,4	31,5	65,4	65,3	63,0	61,2	55,3	57,1	63,2
2006	58,1	65,9	50,5	32,3	64,0	65,9	63,9	61,0	53,9	58,1	64,2
2008	49,8	60,0	39,9	27,2	60,8	60,8	53,7	47,1	46,2	49,3	55,9
2010	40,5	48,9	32,2	18,4	55,4	47,7	44,4	39,0	35,2	37,3	47,1
2012	40,8	49,2	32,5	18,1	50,2	51,8	45,0	40,4	39,9	37,7	44,0
2014	48,9	55,3	42,5	22,9	53,8	57,3	54,4	49,5	46,5	46,1	52,5
2016	46,0	52,6	39,3	18,7	56,7	58,1	50,2	44,1	41,0	42,5	51,3
2018	43,3	52,5	34,2	18,7	53,2	52,7	48,5	40,5	39,7	42,7	46,7
2020	44,3	51,5	37,2	13,6	54,8	50,4	52,6	43,8	40,5	45,3	46,3

Consumo de bebidas energéticas

Las tres medidas de prevalencias de uso de bebidas energéticas muestran cambios estadísticamente significativos respecto al estudio anterior. La prevalencia de uso alguna vez en la vida varía a la baja, pasando de 48,9% en 2018 a 42,1% en 2020; por su parte, la prevalencia de último año disminuye a 27,3% (29,7% en 2018) y la prevalencia de último mes aumenta significativamente 2,3 puntos porcentuales, llegando a 16,4% en 2020.

De igual manera, respecto al consumo de bebidas energéticas combinadas con bebidas alcohólicas, su uso combinado con alcohol muestra variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018, con disminuciones en las tres medidas reportadas. Así, para esta medición la prevalencia vida llega a 11,2%, la prevalencia último año a 4,9% y la prevalencia último mes a 1,6%, estableciéndose en los menores valores de la serie de estudios.

TABLA 23
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas y bebidas energéticas combinadas con alcohol. Chile, 2006–2020.

Serie	Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			Prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)		
	Vida	Año	Mes	Vida	Año	Mes
2006	19,4	12,9	4,1			
2008						
2010	15,3	11,1	4,0			
2012	30,1	20,7	8,9	8,9	5,7	2,1
2014	45,3	29,3	12,8	13,4	8,8	3,1
2016	47,8	29,7	13,1	13,8	7,9	2,7
2018	48,9	29,7	14,1	15,0	7,7	2,6
2020	42,1	27,3	16,4	11,2	4,9	1,6

Al desagregar la prevalencia de último año por sexo, y respecto al estudio anterior, la variación a la baja observada tanto en hombres como en mujeres es estadísticamente significativa, llegando a 6,9% y 2,9%, respectivamente. Por su parte, la brecha observada de 4,0 puntos porcentuales entre ambos sexos es significativa en 2020.

Respecto al estudio anterior, se reportan descensos significativos en tres tramos de edad: de 19 a 25 años, de 26 a 34 años y de 35 a 44 años. Siguiendo la tendencia desde el inicio de la serie, los tramos de 19 a 25 años y de 26 a 34 años presentan las más altas prevalencias de consumo: 10,6% y 8,2%, respectivamente. Por tercer estudio consecutivo, el uso declarado en ambos tramos de edad es significativamente mayor respecto a lo declarado en los demás tramos.

Por nivel socioeconómico, no se reportan brechas en 2020. A su vez, los descensos observados en el NSE Medio (de 7,8% a 4,2%) y el NSE Alto (de 8,6% a 4,9%) respecto al estudio anterior son estadísticamente significativos.


TABLA 24
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	5,7	8,1	3,4	3,9	15,6	10,9	2,4	1,1	4,4	5,2	7,0
2014	8,8	11,5	6,2	6,7	19,9	14,3	6,6	3,8	7,6	7,7	10,4
2016	7,9	9,7	6,1	7,0	21,6	13,5	4,9	1,3	6,1	6,6	9,9
2018	7,7	11,4	4,1	5,6	19,1	12,4	5,8	2,4	6,3	7,8	8,6
2020	4,9	6,9	2,9	4,1	10,6	8,2	3,8	1,6	5,7	4,2	4,9

Consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos

Las prevalencias de uso de tabaco en población general confirman una tendencia a la baja iniciada en 2018 en dos de las cuatro medidas de uso reportadas. En 2020, la prevalencia de uso alguna vez en la vida y de uso diario se mantienen estables respecto a 2018 con 60,9% y 19,5%, respectivamente. La prevalencia de uso en el último año muestra un descenso estadísticamente significativo, pasando de 35,2% en 2018 a 32,5% en 2020. Finalmente, la prevalencia de último mes varía de 31,1% a 28,6%, lo que se traduce en un descenso estadísticamente significativo respecto al estudio anterior.

GRÁFICO 5
Evolución de prevalencias (%) de consumo de tabaco. Chile, 1994–2020.



Las declaraciones sobre uso diario de tabaco permanecieron estables respecto a la medición anterior por cuarto estudio consecutivo (de 19,6% en 2018 a 19,5% en 2020).

La desagregación por sexo no muestra variaciones significativas respecto a 2018. La brecha observada entre hombres y mujeres (20,1% frente a 19,0%) no es estadísticamente significativa en 2020.

Por tramos de edad y por segundo estudio consecutivo, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a

la medición pasada. Tal como ha sido tendencia desde 2014, las prevalencias de uso de los tramos de 19 a 25 años (15,1%) y de 12 a 18 años (2,4%) son significativamente menores a las reportadas en los otros grupos de edad.

Por tercer estudio consecutivo, la desagregación por nivel socioeconómico muestra que la prevalencia de consumo diario de tabaco en el NSE Bajo (21,3%) es significativamente mayor que la reportada en el NSE Alto (17,0%). No se registran variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018 por nivel socioeconómico.

TABLA 25

Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	30,6	33,3	28,0	14,1	36,9	34,0	38,9	28,4	32,1	29,7	28,9
2004	30,5	32,1	28,9	14,8	38,6	35,7	35,5	28,1	31,8	30,1	28,7
2006	28,8	31,8	25,8	12,7	30,1	34,2	31,4	32,3	29,6	29,5	26,9
2008	28,2	29,9	26,5	12,7	31,8	33,2	30,9	30,0	30,3	28,3	25,0
2010	24,5	26,4	22,8	11,1	27,4	29,0	27,4	26,4	27,4	22,9	24,8
2012	21,9	23,8	20,1	6,4	21,0	25,6	26,7	26,1	24,2	21,5	21,0
2014	22,7	23,2	22,2	8,4	18,9	25,3	26,5	26,3	27,4	22,5	20,5
2016	21,2	22,7	19,7	5,5	16,5	25,6	27,2	24,3	26,5	20,6	19,2
2018	19,6	20,4	18,8	3,5	16,6	21,6	25,4	22,5	22,0	20,6	16,8
2020	19,5	20,1	19,0	2,4	15,1	20,5	25,4	24,2	21,3	20,3	17,0

Desde 2014, se incorporó en el instrumento de población general un módulo dedicado a la caracterización del uso de dispositivos de cigarrillos electrónicos. Dicho módulo se inicia preguntando al entrevistado si conoce o ha escuchado hablar de estos dispositivos. En caso de ser positiva la respuesta, se da inicio al Módulo de Cigarrillos Electrónicos con la pregunta de uso alguna vez en la vida y el resto de las preguntas que lo componen.

Respecto al total de la población, 73,9% declaró conocer los cigarrillos electrónicos en 2020, lo que representa un aumento estadísticamente significativo respecto al estudio anterior (66,1%). Este aumento se explica por aumentos significativos en ambos sexos, en todos los tramos de edad con excepción del tramo de 12 a 18 años, y en los tres niveles socioeconómicos.

El nivel de conocimiento es significativamente mayor en hombres (77,1%) que en mujeres (70,7%); por edad, el mayor conocimiento se observa entre los 19 y 25 años (85,2%) y el menor de 45 a 64 años (65,5%) respecto al resto de los tramos. Según nivel socioeconómico, es significativamente mayor el conocimiento en el NSE Alto (79,3%) respecto a los NSE Bajo (72,8%) y Medio (70,4%).

Entre quienes declararon usar cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida se consultó si sabían que el dispositivo contenía nicotina. En 2020, un 43,2% declaró saberlo lo que representa una estabilización respecto a las declaraciones de 2018 (38,3%). A pesar de la estabilidad a nivel nacional, se reportan aumentos estadísticamente significativos en hombres y en el NSE Medio. Respecto a las brechas, en 2020 únicamente se observan diferencias entre hombres y mujeres (49,8% frente a 33,5%), no así en tramos de edad y niveles socioeconómicos.


TABLA 26

Evolución de conocimiento de cigarrillos electrónicos y presencia de nicotina en dispositivo, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2014-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
Conoce cigarrillos electrónicos											
2014	46,9	48,8	45,0	38,2	56,4	55,3	48,7	41,6	35,8	43,5	55,6
2016	66,5	67,1	66,0	63,7	76,2	73,8	70,0	58,4	59,0	63,2	72,9
2018	66,1	68,0	64,2	65,7	73,8	74,8	67,9	57,7	62,2	66,5	68,8
2020	73,9	77,1	70,7	72,0	85,2	79,6	76,9	65,5	72,8	70,4	79,3
Presencia de nicotina en cigarrillos electrónicos											
2014	30,7	32,8	28,3	25,9	29,8	33,9	35,5	27,1	24,8	27,7	35,1
2016	39,4	42,2	36,2	34,0	45,5	42,0	36,1	36,3	30,4	37,2	43,7
2018	38,3	38,7	37,8	29,5	46,9	37,9	40,3	33,1	28,7	32,9	48,6
2020	43,2	49,8	33,5	40,7	43,8	37,3	51,9	43,8	35,8	43,4	48,5

Las prevalencias de consumo, calculadas a partir del total de la población, muestran por segundo estudio consecutivo una estabilización en la medida alguna vez en la vida, pasando de 14,2% en 2018 a 15,3% en 2020. En tanto, la prevalencia de consumo en el último mes muestra un descenso estadísticamente significativo de 0,6 puntos porcentuales y llega a 0,9% en 2020.

GRÁFICO 6
Evolución de prevalencias (%) de consumo de cigarrillos electrónicos. Chile, 2014-2020.



La prevalencia de uso de cigarrillos electrónicos en el último año muestra un descenso de 2,5 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, lo que representa una variación estadísticamente significativa. Respecto a 2018, se observan variaciones estadísticamente significativas a la baja en hombres, mujeres y tramos de edad (de 12 a 18 años, de 26 a 34 años y de 35 a 44 años), además en los NSE Bajo y Alto. Respecto a las brechas, en este estudio se observa el uso significativamente mayor en hombres (4,1%) que en mujeres (1,4%); por edad, se observan mayores prevalencias entre 19 y 34 años comparadas con el tramo de 35 a 64 años. Por su parte, por nivel socioeconómico, el NSE Bajo muestra una prevalencia significativamente menor al NSE Medio (1,6% frente a 3,4%).

TABLA 27
Evolución de prevalencia (%) de consumo último año de cigarrillos electrónicos, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2014-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2014	3,6	3,9	3,3	3,6	5,4	4,1	3,9	2,5	3,1	2,7	4,6
2016	6,5	7,0	6,0	8,3	12,0	7,6	5,3	3,6	4,9	6,7	7,2
2018	5,3	6,1	4,4	8,5	9,8	6,7	4,0	2,2	5,1	5,1	5,7
2020	2,8	4,1	1,4	2,8	6,5	3,6	1,1	1,5	1,6	3,4	2,9

Prevalencias de otras drogas

El instrumento de población general también pesquiza el uso de drogas menos frecuentes, con prevalencias de último año generalmente cercanas al error muestral del estudio. La mayoría de estas prevalencias se construyen a partir de reportes de distintos medicamentos o sustancias asociadas a un grupo específico (por ejemplo, inhalables o estimulantes sin receta médica), mientras que otras prevalencias responden a categorías de drogas en sí mismas (por ejemplo, éxtasis).

De este grupo de drogas, destaca el uso alguna vez en la vida de tranquilizantes sin receta médica, alucinógenos y analgésicos sin receta médica; estas tres sustancias muestran aumentos estadísticamente

significativos en la prevalencia vida respecto al estudio anterior, con valores de 5,3%, 3,5% y 3,4%, respectivamente. A su vez, aumenta el uso alguna vez de éxtasis en esta población, pasando de 0,7% en 2018 a 1,3% en 2020, y desciende significativamente el uso de marihuana sintética (de 3,5% en 2018 a 1,9% en 2020). El resto de los grupos de drogas o drogas del listado no muestran variaciones en la prevalencia alguna vez en la vida en 2018 respecto al estudio anterior.

TABLA 28
Evolución de prevalencias de otras drogas alguna vez en la vida. Chile, 2002-2020.

Serie	Prevalencia vida (%)							
	Tranquilizantes s/r	Inhalables	Estimulantes s/r	Éxtasis	Alucinógenos	Analgésicos s/r	Hachís	Marihuana sintética
2002	8,5	2,3	3,1	0,2	0,9	1,0		
2004	7,0	2,2	2,8	0,3	0,9	1,0		
2006	8,0	1,4	2,6	0,5	1,4	1,0		
2008	6,6	1,9	2,3	0,3	1,0	1,1	1,1	
2010	2,5	0,7	1,6	0,5	0,7	0,6	0,7	
2012	3,1	0,8	1,8	0,4	1,6	0,6	1,1	
2014	3,9	1,0	1,8	0,4	1,4	1,0	2,0	1,5
2016	4,2	1,3	2,0	0,5	2,2	2,3	2,7	2,5
2018	3,7	1,5	1,4	0,7	1,8	2,5	2,1	3,5
2020	5,3	1,7	1,7	1,3	3,5	3,4	1,7	1,9

s/r: sin receta médica.

Con relación a las prevalencias de uso en el último año de otras drogas, se observa un descenso significativo en marihuana sintética, llegando a 0,6% en 2020. A su vez, el uso de analgésicos sin receta médica se estabilizó en 1,2% en las últimas tres mediciones de este estudio. Por su parte, el uso de tranquilizantes sin receta en el último año, si bien aumentó 0,6 puntos porcentuales respecto a 2018, no mostró cambios estadísticamente significativos. En el resto de las drogas presentadas no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto al estudio anterior.

12 En 2014, y en virtud del compromiso de monitorear nuevas sustancias psicoactivas, el SENDA incorporó la marihuana sintética (spice, K2) en el módulo Otras Drogas del instrumento.

TABLA 29

Evolución de prevalencias de otras drogas en el último año. Chile, 2002-2020.

Prevalencia año (%)								
Serie	Tranquilizantes s/r	Inhalables	Estimulantes s/r	Éxtasis	Alucinógenos	Analgésicos s/r	Hachís	Marihuana sintética
2002	3,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,4		
2004	3,0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,4		
2006	3,5	0,1	0,4	0,1	0,4	0,3		
2008	3,2	0,2	0,4	0,1	0,2	0,6	0,3	
2010	1,3	0,2	0,3	<0,1	0,2	0,3	0,1	
2012	1,4	0,1	0,3	<0,1	0,3	0,3	0,3	
2014	1,2	0,1	0,2	0,1	0,5	0,6	0,8	0,5
2016	1,7	0,2	0,4	0,1	0,6	1,2	1,2	1,0
2018	1,4	0,2	0,3	0,3	0,5	1,2	1,0	1,1
2020	2,0	0,3	0,2	0,3	0,8	1,2	0,5	0,6

s/r: sin receta médica.

Respecto a la medición pasada, no se observan variaciones en el uso de tranquilizantes y analgésicos sin receta médica en el último año. A pesar de lo anterior, se reportan en 2020 aumentos significativos en hombres (de 1,1% a 2,2%) y en el NSE Bajo (de 1,1% a 2,9%) para tranquilizantes sin receta médica. Por su parte, en analgésicos s/r solo se observa una variación significativa en el tramo de edad de 12 a 18 años, disminuyendo de 1,4% en 2018 a menos de 0,1% en 2020. No se observan variaciones respecto a 2018 por sexo, nivel socioeconómico o el resto de los tramos de edad.

Respecto al análisis de brechas, y de igual manera que en los últimos dos estudios, no se observan diferencias estadísticamente significativas por sexo y nivel socioeconómico para ambas sustancias. Por edad, la prevalencia de analgésicos sin receta entre 12 y 18 años es significativamente menor al resto de los tramos.

TABLA 30

Evolución de prevalencia (%) de consumo de tranquilizantes sin receta médica en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2010-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2010	1,3	0,6	1,9	0,4	1,0	1,2	1,7	1,6	1,2	1,3	1,4
2012	1,4	1,2	1,6	0,5	1,7	1,9	1,2	1,6	1,3	1,1	1,8
2014	1,2	0,9	1,4	0,2	1,3	1,0	1,3	1,4	1,5	0,8	1,3
2016	1,7	1,5	1,9	0,8	1,3	1,8	2,3	1,8	1,2	1,5	2,1
2018	1,4	1,1	1,6	0,8	1,9	1,6	1,3	1,3	1,1	1,4	1,5
2020	2,0	2,2	1,7	1,7	3,7	1,6	1,4	1,7	2,9	1,6	1,6

TABLA 31

Evolución de prevalencia (%) de consumo de analgésicos sin receta médica en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2010-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2010	0,3	0,1	0,4	<0,1	0,5	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,5
2012	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,7	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2
2014	0,6	0,5	0,6	0,3	1,1	0,6	0,5	0,4	0,8	0,4	0,6
2016	1,2	0,9	1,5	0,7	0,8	1,2	1,8	1,3	1,3	1,2	1,2
2018	1,2	1,2	1,1	1,4	1,9	1,1	0,8	1,0	1,1	1,0	1,3
2020	1,2	1,3	1,0	<0,1	2,1	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	1,5

INCIDENCIAS DE CONSUMO EN EL ÚLTIMO AÑO

Otro indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile es la tasa de incidencia en el último año, definida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado uso alguna vez en la vida. En el estudio anterior, el análisis de la tasa de incidencia en el último año para drogas principales mostró aumentos estadísticamente significativos para tabaco y alcohol, y estabilidad en marihuana, cocaína y pasta base. En la presente versión del estudio, se observan descensos estadísticamente significativos para las cinco drogas presentadas respecto a 2018.

TABLA 32
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Chile, 1994-2020.

Incidencias de consumo último año (%)					
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana	Pasta base	Cocaína
1994	17,5	29,3	1,9	0,5	0,5
1996	4,7	13,6	1,3	0,3	0,4
1998	4,5	11,8	1,4	0,3	0,5
2000	6,6	21,8	1,1	0,2	0,4
2002	8,3	28,1	0,8	0,1	0,3
2004	3,8	15,0	0,9	0,1	0,2
2006	8,0	24,3	1,7	0,2	0,3
2008	11,4	25,4	1,3	0,2	0,5
2010	9,9	18,9	0,8	0,1	0,1
2012	10,2	19,0	1,6	0,1	0,1
2014	9,5	21,7	2,8	0,1	0,4
2016	8,7	21,9	3,4	0,1	0,2
2018	12,5	28,3	3,8	0,2	0,3
2020	3,6	9,9	1,1	<0,1	0,1

La desagregación de la incidencia para el caso de tabaco y alcohol muestra variaciones estadísticamente significativas a la baja respecto a 2018 en ambos sexos, en todos los tramos de edad y niveles socioeconómicos.

El análisis de brechas de la incidencia de último año de tabaco muestra que por sexo no hay diferencias significativas (4,1% en hombres frente a 3,1% en mujeres). En el tramo de 12 a 18 años la prevalencia es significativamente menor a la de todos los otros tramos de edad y la brecha reportada entre el NSE Alto y el NSE Medio (2,8% frente a 4,7%) es estadísticamente significativa.

En alcohol, la brecha de 5,2 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. Por edad, la incidencia reportada entre 45 y 64 años (7,8%) es significativamente menor a la observada en los tramos de 26 a 34 años y de 35 a 44 años (12,6% y 13,5%, respectivamente). Por último, y por tercer estudio consecutivo, la incidencia de último año en el NSE Alto (14,8%) es significativamente mayor a lo apreciado en el NSE Bajo (7,7%) y en el NSE Medio (7,6%).

En marihuana, y respecto al estudio anterior, se observa una disminución estadísticamente significativa por sexo, por nivel socioeconómico y en todos los tramos de edad, excepto en el grupo de adolescentes donde se aprecia una estabilidad con una tasa de 2,0% en 2020. Por sexo, la brecha observada entre hombres y mujeres en 2020 es significativa (1,5% frente a 0,7%). La tasa de incidencia observada en el tramo de 19 a 25 años es significativamente mayor a la reportada en los restantes tramos de edad, con excepción del tramo de 12 a 18 años. Además, la tasa observada en el tramo de 45 a 64 años es significativamente menor a los restantes tramos de edad, con excepción del tramo de 12 a 18 años. Finalmente, y

de igual manera que en el estudio anterior, por NSE no se aprecian brechas significativas.

En el caso de cocaína y pasta base, es necesario aclarar que la incidencia se mantiene en valores bajo el error muestral de la encuesta con 0,1% y con un valor menor a 0,1%, respectivamente. De todas maneras, se observa un descenso estadísticamente significativo para ambas sustancias con respecto a 2018. El descenso observado en cocaína se explica por variaciones significativas a la baja en hombres, en los tramos de 19 a 25 años y de 26 a 34 años, y en el NSE Medio; en el caso pasta base, se explica por descensos significativos en hombres y en el NSE Bajo, y ausencia de reportes en adolescentes, en el tramo de 45 a 64 años y en el NSE Alto.

TABLA 33
Evolución de tasa de incidencia (%) de consumo de sustancias principales en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2018-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
Tabaco											
2018	12,5	14,2	10,8	6,3	15,6	15,3	15,2	11,3	11,9	12,0	13,0
2020	3,6	4,1	3,1	1,6	4,4	3,8	4,3	3,7	3,3	2,8	4,7
Alcohol											
2018	28,3	35,2	22,3	18,3	35,8	37,0	36,2	23,0	23,8	26,5	33,5
2020	9,9	12,8	7,6	8,7	10,3	12,6	13,5	7,8	7,7	7,6	14,8
Marihuana											
2018	3,8	5,6	2,2	4,1	11,0	5,8	2,6	1,1	3,1	3,9	4,1
2020	1,1	1,5	0,7	2,0	2,5	1,0	1,1	0,3	1,3	0,9	1,1
Cocaína											
2018	0,3	0,5	<0,1	0,1	0,6	0,5	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2
2020	0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,4	<0,1	0,2	<0,1	0,1
Pasta base											
2018	0,2	0,2	0,1	-	<0,1	0,3	0,3	0,1	0,4	0,2	<0,1
2020	<0,1	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1	0,2	-	<0,1	0,1	-

PERCEPCIÓN DE USO DE DROGAS

Percepción de riesgo

La percepción de riesgo con relación al consumo diario de tabaco se estabiliza respecto a 2018, luego de observarse descensos en los últimos dos estudios. La percepción de riesgo en población general llega a 80,8% en la actual medición.

Respecto a la percepción de riesgo de uso de alcohol, 85,6% de la población percibe como un gran riesgo el consumo de cinco o más tragos de alcohol al día, cifra que representa una estabilización con relación al estudio anterior. Sin embargo, la percepción de riesgo para uso ocasional de alcohol (ingesta de tres o más tragos en una

ocasión) disminuye significativamente, pasando de 41,0% en 2018 a 37,6% en 2020.

La percepción de riesgo frente al consumo experimental de marihuana (probar una o dos veces) muestra un descenso significativo, pasando de 35,3% en 2018 a 31,4% en 2020. Por otro lado, la percepción de riesgo del consumo frecuente se mantiene estable y llega a 64,0% en el estudio actual.

Respecto a la percepción de riesgo del consumo experimental de cocaína, esta no muestra variaciones por segundo estudio consecutivo (71,8% en 2020). Por su parte, la percepción de riesgo frente al consumo frecuente muestra un descenso estadísticamente significativo, pasando de 93,3% en 2018 a 90,9% en 2020.

La percepción de riesgo del consumo experimental de pasta base muestra un descenso significativo de 3,1 puntos porcentuales y llega a 80,0% en 2020. Finalmente, la percepción de riesgo de uso frecuente de pasta base también descende significativamente, con un 91,4% en 2020.

TABLA 34
Evolución de percepción de riesgo. Chile, 2000-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Diario de tabaco	Cinco o más tragos de alcohol al día	Tres o más tragos de alcohol por ocasión	Experimental de marihuana	Frecuente de marihuana	Experimental de cocaína	Frecuente de cocaína	Experimental de pasta base	Frecuente de pasta base
2000	85,5	86,4							
2002	84,7	85,7							
2004	82,1	84,9							
2006	82,0	83,0		46,6	88,3	69,4	97,2	77,2	97,6
2008	83,1	85,4		51,8	84,2	74,5	95,3	81,1	96,2
2010	83,0	85,3		48,1	78,9	69,6	94,0	78,2	95,3
2012	85,6	87,9		46,8	79,0	74,2	94,8	81,6	95,4
2014	85,7	86,9		34,4	67,2	73,7	94,5	82,7	95,4
2016	84,0	88,0	36,0	29,2	62,8	71,6	93,7	82,8	94,4
2018	79,4	85,9	41,0	35,3	65,8	73,3	93,3	83,1	94,2
2020	80,8	85,6	37,6	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4

OFERTA Y DISPONIBILIDAD DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Disponibilidad de alcohol

Con el propósito de caracterizar el acceso a bebidas alcohólicas por parte de la población, el cuestionario busca pesquisar los lugares más frecuentes de compra de alcohol entre quienes han consumido bebidas alcohólicas en el último año. Para la pregunta Pensando en los últimos 30 días, ¿ha comprado alcohol en alguno de los siguientes lugares?, los encuestados disponían de un listado de lugares establecidos y otro de lugares no establecidos sobre

los cuales declarar haber realizado alguna compra durante los últimos 30 días antes de la fecha de encuesta. En la actual versión de la encuesta se sustituyó la categoría "A la entrada de conciertos, estadios, eventos" por "delivery".

Entre los lugares establecidos, y tal como ha sido tendencia, las botillerías y los supermercados son utilizados mayoritariamente para comprar alcohol y son mencionados con 40,1% y 46,5%, respectivamente. Un 2,1% de los entrevistados declara comprar en restaurantes y 3,4% en bares, pubs o discotecas. Respecto a 2018 se reportan variaciones estadísticamente significativas en bares, pubs o discotecas, restaurantes y supermercados.

Entre las declaraciones de compra en lugares no establecidos, las vías de acceso más comunes son delivery y locales clandestinos con un 4,3% y 1,7%, respectivamente. Las variaciones observadas para ferias libres o mercados, fiestas particulares y otros son estadísticamente significativas respecto al estudio anterior.

TABLA 35
Evolución de lugares de compra de alcohol.
Chile, 2012-2020.

Proporción que declara lugares de compra de alcohol en los últimos 30 días (%)

Lugares de compra de alcohol					
	2012	2014	2016	2018	2020
Locales establecidos					
Bares, pubs o discotecas	18,6	12,4	12,3	12,4	3,4
Restaurantes	8,9	6,1	7,1	6,5	2,1
Botillerías/licorerías	36,3	34,7	34,0	37,0	40,1
Supermercados	42,9	40,1	43,1	40,4	46,5
Servicentros	1,4	0,8	0,8	0,7	0,2
Otros	2,5	1,8	1,6	0,8	1,3
Locales no establecidos					
Ferias libres o mercados	1,3	1,4	1,7	2,1	1,0
Fiestas particulares	8,3	5,7	4,2	4,8	0,7
Locales clandestinos	2,8	2,4	2,1	2,6	1,7
Delivery					4,3
Productores artesanales	1,5	1,6	1,7	1,9	1,3
Otros	2,6	2,9	2,2	0,7	1,6

Respecto a los locales establecidos, según nivel socioeconómico se observan descensos estadísticamente significativos para los tres NSE en el caso de bares, pubs o discotecas y restaurantes; junto a ello, la compra en el NSE Alto es significativamente mayor a los NSE Bajo y Medio en ambos lugares. En el caso de supermercados, se aprecian aumentos en los NSE Bajo y Medio; aun así, la compra en supermercado es significativamente menor en el NSE Bajo (40,2%) respecto al NSE Medio (47,1%) y al NSE Alto (50,3%). Por el contrario, en el caso de botillerías, si bien no se aprecian variaciones respecto a 2018, la compra de alcohol es mayor en el NSE Bajo (46,1%) respecto a los NSE Medio (39,8%) y Alto (36,1%).

Sobre locales no establecidos, se observa respecto a 2018 una variación significativa a la baja en los NSE Bajo y Medio para la compra en ferias libres o mercados y fiestas particulares; para este último, también el descenso en el NSE Alto es significativo. Para estos dos lugares no se aprecian brechas por NSE. Respecto a locales clandestinos, si bien no se observan cambios respecto a 2018, es significativamente más frecuente en el NSE Bajo (3,3%) que en el NSE Alto (0,9%). Por su parte, la compra por delivery es significativamente menor en el NSE Bajo (2,0%) respecto a los NSE Alto y Medio (4,9% y 5,1%, respectivamente).

TABLA 36
Evolución de lugares de compra de alcohol, según nivel socioeconómico. Chile, 2018-2020.
Proporción que declara lugares de compra de alcohol en los últimos 30 días (%)

Lugares de compra de alcohol							
Locales establecidos				Locales no establecidos			
Serie	Bajo	Medio	Alto	Serie	Bajo	Medio	Alto
Bares, pubs o discotecas				Ferias libres o mercados			
2018	7,5	11,1	17,1	2018	1,7	2,1	2,5
2020	1,8	2,4	5,8	2020	0,7	0,8	1,6
Restaurantes				Fiestas particulares			
2018	3,6	4,4	10,5	2018	4,9	3,7	5,9
2020	1,2	0,7	4,5	2020	0,5	0,7	0,9
Botillerías/licorerías				Locales clandestinos			
2018	44,1	37,3	31,8	2018	3,5	2,5	1,7
2020	46,1	39,8	36,1	2020	3,3	1,4	0,9
Supermercados				Delivery			
2018	28,8	38,1	50,7				
2020	40,2	47,1	50,3	2020	2,0	5,1	4,9
Servicentros				Productores artesanales			
2018	0,6	0,4	1,1	2018	1,6	1,1	3,0
2020	0,3	0,1	0,3	2020	1,8	1,2	1,0
Otros				Otros			
2018	1,1	0,9	0,5	2018	0,5	0,9	0,7
2020	1,3	0,9	1,9	2020	1,9	1,6	1,5

Percepción de facilidad de acceso a drogas

Entre los factores de riesgo asociados al consumo de drogas se encuentra la percepción de facilidad de acceso, entendida como la proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga.

En el caso de marihuana, la percepción de facilidad de acceso confirma el descenso observado en el estudio anterior, y se mantiene estable respecto a 2018 en 51,4%. En el caso de cocaína y pasta base, la percepción de facilidad de acceso en 2020 se encuentra en 29,1% y 28,0%, respectivamente. De esta manera, ninguna de las variaciones observadas es estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

TABLA 37
Percepción de facilidad de acceso a drogas. Chile, 1994-2020.
Proporción de individuos que declaran que sería fácil conseguir droga (%)

Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
1994	39,9	14,2	21,7
1996	34,6	12,0	20,2
1998	45,3	25,6	33,5
2000	52,7	29,3	36,1
2002	52,1	24,2	32,9
2004	51,9	27,1	34,6
2006	55,6	30,8	37,2
2008	53,2	32,8	35,2
2010	36,1	21,3	24,6
2012	46,7	31,8	32,1
2014	51,0	31,0	31,2
2016	56,5	28,8	27,2
2018	50,3	27,6	27,4
2020	51,4	29,1	28,0

La desagregación de la percepción de facilidad de acceso a marihuana muestra que no hubo variaciones significativas en sexo, edad y NSE respecto al estudio anterior. El análisis de brechas muestra que esta es significativamente mayor en hombres que en mujeres (55,9% frente a 47,0%). Este análisis muestra, además, que la totalidad de las brechas por tramos de edad son significativas, con excepción de la brecha entre los tramos de 12 a 18 años y de 45 a 64 años, y que la facilidad de acceso es significativamente menor en el NSE Alto respecto a los NSE Medio y Bajo.

Respecto a cocaína, la percepción de facilidad de acceso solo muestra un aumento significativo en el NSE Alto respecto al estudio anterior (de 16,0% en 2018 a 22,6% en 2020), recuperando el descenso observado en 2018. La brecha por sexo es estadísticamente significativa (32,1% en hombres frente a 26,1% en mujeres), es significativamente menor en los tramos de 12 a 18 años y de 45

a 64 años respecto al resto, y la gradiente observada por NSE es significativa por segundo estudio consecutivo.

Finalmente, en pasta base se aprecian variaciones significativas respecto al estudio anterior en el NSE Bajo (de 42,4% a 35,5%) y en el NSE Alto (de 15,0% a 19,5%). Respecto a las brechas, la diferencia entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa (31,7% frente a 24,3%) y, de manera similar a lo observado en cocaína, es significativamente menor en el tramo de 12 a 18 años y existe gradiente por NSE.

TABLA 38
Percepción (%) de facilidad de acceso de drogas en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2018-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
Marihuana											
2018	50,3	53,6	47,1	44,5	65,7	60,7	51,2	40,5	59,8	50,7	43,3
2020	51,4	55,9	47,0	41,7	69,0	59,6	52,1	43,2	54,9	52,1	47,6
Cocaína											
2018	27,6	29,2	26,0	18,9	30,7	33,4	31,1	24,7	41,3	28,9	16,0
2020	29,1	32,1	26,1	17,1	33,1	32,9	33,9	27,4	36,1	29,4	22,6
Pasta base											
2018	27,4	28,6	26,3	19,6	27,2	31,9	32,0	25,7	42,4	28,7	15,0
2020	28,0	31,7	24,3	16,1	30,9	30,0	31,3	28,5	35,5	29,5	19,5

Disponibilidad de drogas

MARIHUANA

La proporción que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana durante el último año muestra un descenso estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, pasando de 21,4% en 2018 a 17,6% en 2020. Respecto a la medición pasada, se observan descensos en ambos sexos, en los tramos de 12 a 18 años y de 26 a 34 años, y en los NSE Bajo y Alto. El análisis de brechas muestra que la proporción de ofrecimientos es significativamente mayor en hombres que en mujeres (23,0% frente a 12,2%) y que la totalidad de las brechas por edad son significativas, por lo tanto, a partir del tramo de 19 a 25 años la distribución por edad forma una gradiente decreciente; al igual que en el estudio anterior, no se observan diferencias por NSE en 2020.

TABLA 39
Exposición a oferta de marihuana en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2020.

Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de marihuana en el último año (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	13,9	19,9	8,1	19,9	31,1	17,1	7,2	2,2	14,3	12,5	14,6
2004	15,1	20,0	10,4	21,7	35,3	17,4	7,9	2,8	15,6	13,2	16,7
2006	16,0	20,9	11,1	21,5	33,2	20,1	10,6	3,9	14,7	14,8	19,1
2008	15,8	21,0	10,6	25,2	34,7	18,6	7,3	3,8	17,1	13,9	16,9
2010	10,3	13,9	6,7	13,6	25,2	12,8	6,7	2,3	12,4	8,5	11,1
2012	15,7	20,7	10,7	22,9	32,7	18,9	8,3	5,8	16,5	15,8	15,1
2014	18,6	22,2	15,2	25,3	35,4	27,5	13,9	8,2	20,2	17,7	18,7
2016	22,9	28,2	17,6	26,2	47,7	32,0	16,2	10,2	21,9	20,2	25,6
2018	21,4	27,4	15,5	24,0	45,8	30,4	19,0	7,3	20,9	20,2	23,1
2020	17,6	23,0	12,2	11,9	41,8	25,7	16,7	5,9	17,0	17,9	17,6

COCAÍNA

El porcentaje de la población que declara haber recibido ofrecimientos de cocaína en el último año muestra un descenso significativo, pasando de 6,4% en 2018 a 3,6% en 2020. Respecto al estudio anterior se observan variaciones estadísticamente significativas a la baja en todas las categorías salvo en el grupo de 45 a 64 años. El análisis de brechas muestra que la proporción de ofrecimientos es significativamente mayor en hombres que en mujeres (5,9% frente a 1,4%), que todas las brechas por edad son significativas, excepto los tramos de 26 a 34 años y de 35 a 44 años que no muestran diferencias significativas, y que no existen diferencias entre los tres niveles socioeconómicos.

TABLA 40

Exposición a oferta de cocaína en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2020.

Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de cocaína en el último año (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	4,4	7,1	1,8	3,1	9,6	7,1	3,3	0,9	4,6	4,5	3,8
2004	5,2	7,7	2,9	3,7	12,2	8,4	3,7	1,1	5,6	4,6	5,3
2006	5,0	7,4	2,6	3,6	8,6	8,5	5,1	1,4	5,5	5,2	4,0
2008	6,4	9,6	3,2	6,2	12,1	9,0	4,3	3,1	7,5	6,0	5,5
2010	3,0	4,8	1,1	2,2	6,0	5,4	2,6	1,0	4,5	2,3	2,8
2012	4,8	7,1	2,5	3,9	9,8	7,5	2,6	2,6	6,3	5,2	3,5
2014	5,2	7,2	3,2	4,7	9,1	7,9	4,9	2,7	7,5	5,6	3,6
2016	6,1	9,0	3,2	3,8	11,6	9,5	5,6	3,3	8,1	6,4	4,9
2018	6,4	9,6	3,1	3,2	12,6	10,1	7,4	2,6	7,4	6,7	5,0
2020	3,6	5,9	1,4	0,8	7,7	4,6	4,2	2,1	4,5	3,6	2,9

PASTA BASE

El porcentaje de la población que declara haber recibido algún ofrecimiento de pasta base en los últimos doce meses desciende significativamente respecto a la medición anterior, pasando de 3,0% en 2018 a 1,5% en 2020; de esta manera, se rompe la estabilidad observada entre 2010 y 2018. Similar a lo observado en cocaína, se aprecian variaciones estadísticamente significativas a la baja en ambos sexos, en todos los tramos de edad (con excepción del tramo de 35 a 44 años), y en todos los niveles socioeconómicos. Los ofrecimientos en el último año en hombres son significativamente mayores que en mujeres: 2,5% frente a 0,4%. Los ofrecimientos entre 12 y 18 años son menores a los reportados entre 19 y 44 años. De igual manera que en 2018, en el NSE Alto se reportan significativamente menos ofrecimientos de último año de pasta base que en los niveles Medio y Bajo (0,7% frente a 1,6% y 2,2%).

TABLA 41

Exposición a oferta de pasta base en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2020.

Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de pasta base en el último año (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	2,8	4,7	1,0	2,8	5,7	3,9	2,4	0,7	4,1	2,1	1,4
2004	3,9	5,7	2,2	4,8	7,9	4,7	3,1	1,0	5,6	3,1	2,0
2006	4,0	6,1	2,0	3,5	6,0	5,4	4,3	2,0	5,5	3,9	2,0
2008	3,9	5,8	2,1	4,7	7,7	4,4	3,3	1,5	5,4	3,4	2,7
2010	2,6	4,2	1,2	2,5	5,5	3,6	1,9	1,3	4,9	2,1	1,9
2012	2,8	4,4	1,2	2,6	5,0	4,1	1,7	1,8	4,5	3,1	1,5
2014	2,7	4,0	1,4	2,7	3,8	3,7	2,6	1,8	4,7	2,8	1,5
2016	2,8	4,4	1,2	2,6	4,8	3,3	3,0	1,7	5,2	3,2	1,3
2018	3,0	4,3	1,7	2,4	4,4	3,9	3,9	1,7	4,0	3,4	1,7
2020	1,5	2,5	0,4	0,3	2,5	1,4	2,5	1,0	2,2	1,6	0,7

Entre las variables asociadas a la oferta de marihuana, cocaína y pasta base, se encuentra el último lugar donde el entrevistado recibió ofrecimiento de droga (entre quienes declararon recibir algún ofrecimiento en el último año). Para las tres drogas bajo análisis, y por tercer estudio consecutivo, los lugares que concentran la mayor proporción de últimos ofrecimientos son el barrio o comuna y las fiestas o recitales.

En el caso de marihuana, 31,3% de los ofrecimientos se realizaron en el barrio o comuna y 33,3% en fiestas durante 2020. Respecto a la medición anterior, se observa un descenso estadísticamente significativo en ofrecimientos en lugares de estudio o trabajo, pasando de 17,4% en 2018 a 8,0% en 2020. Por otro lado, en el caso de ofrecimientos en casa, esta variable muestra un aumento estadísticamente significativo de 5,3 puntos porcentuales, llegando a un 12,8% en el presente estudio.

Para cocaína, en la actual versión de la encuesta la proporción de ofrecimientos en barrio o comuna y en fiestas es de 34,0% y 42,7%, respectivamente. A su vez, no se observan variaciones estadísticamente significativas en las categorías respecto al estudio anterior.

En el caso de pasta base, el barrio o comuna concentran, como ha sido en la serie de estudios, más de la mitad de los últimos ofrecimientos con un 63,0%, lo que representa un aumento significativo de 10,0 puntos porcentuales respecto a 2018. Con relación al estudio previo, disminuye significativamente la proporción de lugar de ofrecimiento asociado a otros lugares, pasando de 11,4% en 2018 a 3,6% en 2020. No se observan otros cambios respecto a la medición anterior.

TABLA 42

Evolución de lugar de último ofrecimiento de droga en los últimos 12 meses. Chile, 2012-2020.

Proporción que declara lugar de último ofrecimiento de marihuana, cocaína y pasta base en últimos 12 meses (%)

Lugares de ofrecimiento de droga					
	2012	2014	2016	2018	2020
Marihuana					
En la casa	7,7	6,5	9,8	7,5	12,8
En el barrio o comuna	32,7	29,6	25,8	31,0	31,3
En lugar de estudio o trabajo	15,2	16,9	18,8	17,4	8,0
En alrededores de lugar de estudios o trabajo	6,3	4,7	7,1	6,3	4,5
En una fiesta, junta, discoteca, recitales	31,2	31,0	31,7	29,3	33,3
Por internet, mail o chat	1,7	1,2	0,7	1,4	2,3
En otro lugar	5,1	7,6	6,0	7,2	7,8
Cocaína					
En la casa	2,1	1,2	1,2	1,4	1,5
En el barrio o comuna	48,8	44,0	38,5	38,8	34,0
En lugar de estudio o trabajo	10,5	12,0	10,0	11,3	10,0
En alrededores de lugar de estudios o trabajo	4,2	4,6	5,3	4,6	3,1
En una fiesta, junta, discoteca, recitales	30,6	29,3	39,0	35,9	42,7
Por internet, mail o chat	0,4	0,4	0,9	1,3	3,6
En otro lugar	3,5	5,9	5,1	6,7	5,1
Pasta base					
En la casa	3,4	0,7	0,3	3,1	1,8
En el barrio o comuna	64,8	57,1	56,3	53,0	63,0
En lugar de estudio o trabajo	8,3	12,0	6,9	8,5	10,9
En alrededores de lugar de estudios o trabajo	2,3	3,3	6,9	7,2	4,8
En una fiesta, junta, discoteca, recitales	17,9	18,7	15,7	14,9	12,9
Por internet, mail o chat	0,3	0,6	0,3	1,9	3,0
En otro lugar	3,0	5,0	13,8	11,4	3,6

TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA

En el instrumento del presente estudio existe una pregunta que contestan solo aquellas personas que declararon consumir tranquilizantes sin receta médica alguna vez en el último año, con el fin de detectar cómo obtuvieron el medicamento.

La forma más frecuente a través de la cual los consumidores de tranquilizantes sin receta médica declaran adquirirlos es a través de una feria libre o mercado (30,0%), luego a través del conviviente/pareja, un familiar y/o amigo/a con un 24,8%, le sigue "estaba en mi casa y lo tomé" con 18,5%, y por otras formas de acceso (13,8%). Un aspecto que debe ser considerado en el análisis es la exclusión de la categoría "No sabe" y "No contesta". Respecto al estudio anterior se aprecia un descenso estadísticamente significativo en la categoría de obtención vía conviviente/pareja, familiar y/o amigo/a, que pasa de 36,4% en 2018 a 24,8% en 2020.

La forma más común de adquirir o conseguir tranquilizantes sin receta médica es través de un traspaso directo de una persona cercana al entrevistado (conviviente/pareja, un familiar y/o amigo/a) en el NSE Medio (29,1%), mientras que en los NSE Bajo y Alto la forma es comprarlos en una feria libre o mercado, con un 24,9% y 40,7%, respectivamente.

De igual manera que en el estudio anterior, el análisis de brechas en 2020 no muestra diferencias estadísticamente significativas por nivel socioeconómico.

TABLA 43
Vías de acceso a tranquilizantes sin receta médica, según nivel socioeconómico. Chile, 2016–2020.
Proporción de individuos que declaran última vía de acceso a tranquilizantes sin receta médica (%)

Serie	Total	Nivel socioeconómico		
		Bajo	Medio	Alto
Lo compré en una farmacia con una receta médica de otra persona				
2016	15,7	6,8	10,0	21,4
2018	5,7	1,4	6,8	5,6
2020	5,3	2,0	9,8	5,0
Lo compré en una feria libre o mercado				
2016	20,5	20,2	30,0	14,9
2018	21,7	26,9	13,9	27,4
2020	30,0	24,9	28,0	40,7
Lo compré por internet				
2016	-	-	-	-
2018	4,6	4,3	9,3	0,2
2020	2,5	5,8	0,3	-
Me lo pasó mi conviviente/pareja, un familiar y/o amigo/a				
2016	49,7	52,5	47,8	50,1
2018	36,4	24,0	34,9	45,0
2020	24,8	18,4	29,1	29,5
Me lo pasaron en el consultorio				
2016	2,8	1,7	4,8	1,9
2018	2,4	1,6	4,2	1,0
2020	5,1	8,9	1,1	4,1
Estaba en mi casa y lo tomé				
2016	6,3	3,8	6,5	6,8
2018	17,7	14,2	20,0	17,4
2020	18,5	21,7	14,7	18,1
Lo conseguí de otra forma				
2016	5,0	15,0	0,9	4,9
2018	11,6	27,5	11,0	3,4
2020	13,8	18,2	17,1	2,5

FRECUENCIA DE CONSUMO Y TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS


Frecuencia en el uso de alcohol y otras drogas

Las prevalencias de consumo —es decir, la proporción de individuos que ha consumido una determinada droga en un período de tiempo— son indicadores útiles para conocer la magnitud de la población que usa una droga. Sin embargo, esta no permite establecer con certeza el patrón de consumo ni otros factores asociados a él. En este sentido, para medir la intensidad de uso se emplea el número de días en que se ha consumido droga en los últimos 30 días, calculado sobre aquellos individuos que reportaron consumo en el último mes.

MARIHUANA Y COCAÍNA

Los resultados del presente estudio muestran que quienes han consumido marihuana en los últimos 30 días lo han hecho, en promedio, 13,8 días; por su parte, aquellos que han consumido cocaína en el último mes la han usado en promedio 8,7 días. A pesar de los aumentos observados, ninguna de estas variaciones es estadísticamente significativa respecto a 2018.

GRÁFICO 7
Evolución del promedio de días de consumo de marihuana y cocaína en el último mes. Chile, 2002–2020.



Para marihuana, el número de días de consumo en hombres es 4,1 días mayor que el de mujeres (brecha estadísticamente significativa). En términos generales, no se observan diferencias significativas por tramos de edad. Por nivel socioeconómico, se aprecia una menor frecuencia de uso en el NSE Medio (11,7 días) respecto al NSE Bajo (17,8 días), lo que se traduce en una brecha estadísticamente significativa. Respecto al estudio anterior, ninguna de las variaciones por sexo, tramos de edad y NSE es estadísticamente significativa.

TABLA 44

Evolución del promedio de días de consumo de marihuana en el último mes, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	8,8	9,1	7,8	6,8	9,1	9,8	9,5	6,6	9,9	9,2	6,1
2004	9,6	10,6	6,3	8,2	9,8	11,8	6,0	5,1	10,5	8,9	8,9
2006	10,5	11,8	6,5	7,2	12,3	11,6	9,3	5,2	11,8	10,1	9,8
2008	11,7	12,7	8,5	11,4	11,6	13,3	8,0	15,5	14,5	7,2	12,1
2010	10,1	10,6	8,4	8,9	9,4	10,0	12,5	15,4	13,7	8,9	8,1
2012	10,9	12,3	7,4	9,8	12,0	9,9	7,0	14,4	11,6	11,6	10,0
2014	9,9	10,9	8,2	12,4	9,5	10,8	8,2	8,7	12,1	9,8	9,1
2016	11,0	11,6	9,5	10,5	10,8	13,9	8,9	7,0	11,8	12,6	9,6
2018	12,4	13,1	10,2	12,5	13,1	12,9	10,2	10,3	14,6	12,2	10,6
2020	13,8	15,0	10,9	16,5	15,5	12,9	12,3	11,5	17,8	11,7	13,9

Para cocaína, en 2020 se aprecia una mayor frecuencia de uso en hombres que en mujeres: 9,7 frente a 3,0 días (brecha significativa). Por edad, la mayor cantidad de días de consumo se reporta entre los 35 y 64 años. La brecha observada entre los NSE Bajo y Alto respecto al NSE Medio en 2020 es estadísticamente significativa (9,7 y 9,4 días frente a 6,6 días). Respecto al estudio anterior, las variaciones en hombres, mujeres y en los tramos de 26 a 34 años y de 45 a 64 años, son estadísticamente significativas. No obstante lo anterior, este fenómeno es propio de una característica observada en el marco de un fenómeno bajo el error muestral de una encuesta (similar a lo ocurrido en 2018).

TABLA 45

Evolución del promedio de días de consumo de cocaína en el último mes, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	3,8	3,7	4,0	6,4	2,6	4,0	3,0	24,2	3,6	4,7	2,9
2004	4,1	4,1	3,8	1,1	2,0	3,1	10,2	7,2	3,6	6,3	1,6
2006	3,4	3,8	2,4	2,6	2,3	5,4	3,4	2,6	4,1	3,0	1,6
2008	4,7	3,5	11,2	4,6	6,5	4,8	4,4	2,2	4,9	2,4	7,9
2010	5,1	5,0	6,0	1,5	3,4	6,5	5,8	1,3	8,1	4,8	2,0
2012	6,3	7,2	5,0	6,2	6,7	7,9	3,2	4,9	4,6	4,4	8,3
2014	5,1	4,4	6,9	2,2	5,5	2,6	2,9	14,7	5,5	3,9	6,8
2016	3,8	4,0	1,9	1,2	1,7	3,8	4,2	6,8	3,5	4,2	3,8
2018	6,2	3,0	15,3	1,0	2,1	4,5	9,7	3,5	8,9	3,5	3,4
2020	8,7	9,7	3,0		1,2	1,5	11,5	13,5	9,7	6,6	9,4

TABACO Y ALCOHOL

Sobre aquellos individuos que declararon consumir tabaco durante los últimos 30 días, se observa que el uso promedio es de 22,0 días en 2020, lo que representa un aumento estadísticamente significativo respecto a 2018 (20,8 días). En el caso de alcohol, el número de días de uso ha permanecido sin variaciones en los últimos estudios, con un promedio de 4,6 días en 2020, lo que no representa un aumento significativo respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 8

Evolución del promedio de días de consumo de tabaco y alcohol en el último mes. Chile, 2002-2020.



Respecto a los días de consumo de tabaco, no se aprecian diferencias significativas entre hombres y mujeres en 2020 (21,7 días frente a 22,4 días). Por edad, el mayor promedio de días se observa entre 45 y 64 años con 24,2 días, lo que representa en 2020 una brecha significativa respecto al resto de los tramos de edad, con excepción

del tramo de 12 a 18 años. A su vez, el tramo de 19 a 25 años es estadísticamente menor respecto al resto de los tramos de edad, excepto el tramo de 12 a 18 años. Por nivel socioeconómico, la brecha del NSE Bajo (23,6 días) respecto al NSE Alto (20,8 días) y al NSE Medio (21,8 días) es estadísticamente significativa por segundo estudio consecutivo. Respecto a la medición pasada, se reportan aumentos significativos en hombres, en el tramo de 45 a 64 años y en el NSE Bajo.

TABLA 46
Evolución del promedio de días de consumo de tabaco en el último mes, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	22,7	22,7	22,7	18,9	21,8	22,3	23,9	24,4	23,2	22,0	22,6
2004	22,3	22,1	22,5	19,1	21,7	21,8	22,7	24,4	22,7	22,2	21,7
2006	22,1	22,6	21,5	17,6	19,7	21,5	22,5	26,0	21,9	22,7	21,5
2008	22,2	21,9	22,7	17,3	20,7	21,3	23,1	25,4	22,3	22,7	21,3
2010	22,3	22,4	22,2	20,4	20,0	21,6	22,5	24,6	22,9	21,9	22,3
2012	21,4	21,3	21,4	17,4	19,1	19,7	22,0	24,1	21,6	21,0	21,6
2014	21,6	21,5	21,7	18,4	18,5	21,0	21,2	23,9	22,8	21,6	20,8
2016	21,0	20,9	21,2	15,5	17,6	20,5	21,7	23,2	22,7	20,6	20,4
2018	20,8	20,2	21,4	14,7	17,5	19,0	22,2	23,1	22,1	20,6	20,0
2020	22,0	21,7	22,4	18,9	17,9	20,6	22,5	24,2	23,6	21,8	20,8

El uso de alcohol es significativamente mayor en hombres (5,0 días) que en mujeres (3,9 días). Según tramos de edad, el número de días de consumo en adolescentes es significativamente menor respecto a todos los tramos de edad (3,1 días); por otro lado, y de igual manera que en 2018, según nivel socioeconómico no se observan brechas en el número de días promedio de consumo. Respecto al estudio anterior, se aprecia un aumento significativo en mujeres, y no se observan variaciones en las demás categorías.

TABLA 47
Evolución del promedio de días de consumo de alcohol en el último mes, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	4,2	5,0	3,1	2,7	3,8	3,6	3,9	5,6	3,7	3,7	5,3
2004	3,9	4,7	2,9	2,9	3,8	3,8	3,3	5,0	3,6	3,8	4,6
2006	4,4	5,1	3,5	3,2	4,5	3,8	4,5	4,9	3,7	4,0	5,5
2008	3,6	4,2	2,8	2,8	3,6	3,6	3,4	4,1	3,4	3,7	3,8
2010	4,2	4,8	3,3	3,4	4,2	4,2	4,0	4,5	4,8	4,1	4,1
2012	4,1	4,6	3,4	3,3	4,1	4,2	3,6	4,6	4,3	4,0	4,1
2014	4,2	4,8	3,3	3,5	4,0	4,3	3,9	4,4	4,2	3,8	4,4
2016	4,4	4,9	3,8	3,0	4,4	4,5	4,2	4,8	4,5	4,0	4,8
2018	4,4	5,1	3,3	3,1	4,7	4,3	4,4	4,5	4,2	4,4	4,5
2020	4,6	5,0	3,9	3,1	4,1	4,5	4,6	5,0	4,7	4,6	4,4

Consumo problemático de drogas

Los criterios utilizados para pesquisar consumo problemático de drogas ilícitas son definidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV)¹³, para abuso, y en la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)¹⁴, para dependencia. Estas prevalencias se estiman sobre aquellos que declararon consumo en los últimos 12 meses. La definición de consumo problemático de drogas considera a quienes presentan abuso y/o dependencia de una droga (o de más de una), de acuerdo con los sistemas de clasificación antes mencionados.

La tasa de dependencia se calcula a partir de la presencia de tres o más de los seis criterios establecidos en el CIE-10: deseo intenso (o vivencia de una compulsión a consumir), disminución de la capacidad para controlar el consumo, abstinencia, tolerancia, abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversión (o aumento del tiempo necesario para obtener la sustancia o para recuperarse de sus efectos) y persistencia en el consumo de la sustancia.

En el caso de la tasa de abuso, la estimación se realiza a partir de la presencia de uno de los cuatro criterios establecidos en el DSM-IV: uso recurrente de la sustancia con el consiguiente fracaso en obligaciones laborales, escolares o domésticas; uso recurrente de la sustancia en situaciones en las cuales es físicamente peligroso; problemas legales recurrentes como consecuencia del uso de la sustancia; y uso continuo de la sustancia a pesar de tener problemas sociales o interpersonales provocados o exacerbados por esta.

13 American Psychiatric Association. (1994). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (4a. ed.). Masson.

14 Organización Mundial de la Salud. (2003). CIE-10. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. Mediator.

Los resultados de este estudio muestran estabilidad en los indicadores para las drogas consideradas en la encuesta (marihuana, cocaína y pasta base) al medir dependencia, abuso y consumo problemático.

Los reportes muestran que la proporción de consumidores de marihuana en el último año que declaran síntomas de dependencia ha oscilado entre 14% y 20% en casi toda la serie. Las tasas de dependencia de pasta base y cocaína tampoco han sufrido variaciones estadísticamente significativas. La pasta base es la sustancia que muestra el mayor porcentaje de personas con síntomas de dependencia y abuso en toda la serie: 69,2% y 59,0%, respectivamente.

Al observar el agregado de los reportes de abuso y dependencia (consumo problemático) para cada droga, y de igual manera que en los últimos tres estudios, no se observan variaciones significativas respecto a 2018 en ninguna de las drogas bajo análisis. En el caso de marihuana, la proporción de consumo problemático entre prevalentes de último año en 2020 es de 23,5%, mientras que en el caso de cocaína es 50,7% y en pasta base, 75,7%.

TABLA 48
Evolución de indicadores de severidad del consumo de drogas. Chile, 2006-2020.

Proporción de prevalentes con algún trastorno por consumo de drogas (%)

Trastorno por uso según drogas									
Serie	Marihuana			Cocaína			Pasta base		
	Dependencia	Abuso	Problemático	Dependencia	Abuso	Problemático	Dependencia	Abuso	Problemático
2006	19,8	18,9	28,0	29,4	25,5	40,2	52,2	65,4	70,2
2008	24,2	22,3	33,5	20,5	29,7	33,6	50,2	66,5	67,5
2010	16,2	16,6	23,8	24,7	31,7	39,6	54,6	50,8	61,9
2012	19,4	15,3	24,9	33,8	33,0	46,8	57,7	64,6	70,3
2014	16,4	10,2	21,7	22,1	21,8	35,2	65,6	54,8	68,2
2016	14,8	11,5	20,3	29,6	23,6	37,9	44,6	47,6	54,8
2018	20,3	10,2	24,7	25,6	31,8	37,4	57,4	59,1	64,4
2020	20,2	9,6	23,5	33,2	44,2	50,7	69,2	59,0	75,7

A continuación, se presentan los mismos indicadores de severidad pero respecto al total de la población de entre 12 y 64 años. El comportamiento observado en este conjunto de indicadores es similar a lo reportado en la tabla previa, puesto que mide la magnitud del problema en la totalidad de la población, mientras que la anterior da cuenta de características y condiciones propias de los usuarios de drogas de último año.

En la actual medición, 2,3% y 1,1% de población general presenta síntomas de dependencia y de abuso de marihuana, respectivamente; si bien se observan variaciones respecto a 2018 en ambos indicadores, estos no son estadísticamente significativos. En el caso de cocaína y pasta base, las prevalencias de abuso y dependencia son de 0,2%. La prevalencia de consumo problemático de cocaína llega a 0,3% en 2020 y a 0,2% en el caso de pasta base, siendo ninguna

de estas variaciones significativas respecto al estudio anterior y manteniéndose estables durante los últimos estudios.

TABLA 49
Evolución de indicadores de severidad del consumo de drogas sobre población general. Chile, 2006-2020.

Proporción de individuos con algún trastorno por consumo de drogas (%)

Trastorno por uso sobre población general según droga									
Serie	Marihuana			Cocaína			Pasta base		
	Dependencia	Abuso	Problemático	Dependencia	Abuso	Problemático	Dependencia	Abuso	Problemático
2006	1,4	1,4	2,0	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,4
2008	1,6	1,4	2,2	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5
2010	0,7	0,8	1,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
2012	1,4	1,1	1,8	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3
2014	1,9	1,2	2,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
2016	2,1	1,7	2,9	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
2018	2,6	1,3	3,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
2020	2,3	1,1	2,7	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2

Embriaguez y consumo de riesgo de alcohol

EMBRIAGUEZ (BINGE DRINKING)

Entre los entrevistados que reportaron consumo de alcohol en el último mes, la proporción que declaró haber bebido cinco o más tragos en una sola ocasión (cuatro o más para mujeres) durante los últimos 30 días fue de 50,2% en 2020, prevalencia significativamente menor a la reportada en 2018 (56,3%), volviendo así a los valores reportados en 2016. Respecto al estudio anterior, se observan descensos significativos en mujeres, en los tramos de 35 a 44 años y de 45 a 64 años, y en el NSE Alto.

El análisis de brechas muestra que un 55,2% de los hombres y un 43,3% de las mujeres que han usado alcohol en el último mes han tenido a lo menos un episodio de embriaguez; la brecha observada entre hombres y mujeres en 2020 es estadísticamente significativa. Según tramos de edad, la prevalencia entre los 45 y 64 años es significativamente menor a lo reportado entre los 19 y 34 años. Por nivel socioeconómico, la brecha de 8,5 puntos porcentuales entre el NSE Alto y el NSE Bajo es estadísticamente significativa.

TABLA 50
Evolución de prevalencia de embriaguez, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2020.
Proporción de prevalentes de último mes que declaran haber bebido 5 tragos o más (4 o más en mujeres) en una ocasión (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	52,1	59,3	41,4	57,6	63,7	57,9	44,9	44,4	60,6	50,9	48,8
2014	43,7	51,3	34,0	38,4	58,5	48,3	45,5	34,9	47,9	44,2	41,4
2016	51,1	55,4	45,3	57,7	60,2	59,1	50,2	40,7	58,6	50,3	48,7
2018	56,3	59,5	51,4	54,3	60,3	62,2	57,3	50,0	59,3	56,3	53,9
2020	50,2	55,2	43,3	57,5	59,2	55,0	49,0	42,7	54,4	51,1	45,9

Al analizar el indicador sobre el total de la población —a diferencia de la proporción sobre los usuarios de último mes—, se observa que la prevalencia de embriaguez no ha cambiado respecto al último estudio y llega a 22,2% en 2020, de igual manera que en la medición pasada. Así, respecto al estudio anterior solo el descenso observado en el NSE Alto (de 25,2% en 2018 a 21,2% en 2020) es estadísticamente significativo.

La desagregación por sexo muestra que el consumo intenso de alcohol es significativamente mayor en hombres (28,4%) que en mujeres (16,1%) en 2020. Por edad, tal como en 2018, la prevalencia de embriaguez en el total de la población es significativamente menor en adolescentes (de 12 a 18 años) respecto al resto de los tramos de edad; de igual forma, es menor en el tramo de 45 a 64 años respecto al resto. El análisis por nivel socioeconómico no muestra brechas significativas en 2020.

TABLA 51
Evolución de prevalencia de embriaguez sobre el total de población general, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2020.
Proporción de prevalentes de último mes que declaran haber bebido 5 tragos o más (4 o más en mujeres) en una ocasión sobre el total de la población (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	21,2	29,2	13,5	10,4	32,0	30,0	20,2	17,9	24,2	19,2	21,5
2014	21,3	28,4	14,5	8,8	31,5	27,7	24,7	17,3	22,2	20,4	21,8
2016	23,5	29,2	17,8	10,8	34,2	34,3	25,2	18,0	24,1	21,4	25,0
2018	24,4	31,2	17,6	10,1	32,1	32,8	27,8	20,2	23,5	24,0	25,2
2020	22,2	28,4	16,1	7,8	32,4	27,7	25,7	18,7	22,1	23,1	21,2

CONSUMO DE RIESGO DE ALCOHOL

El puntaje del “Test de Identificación de Trastornos debido al Consumo de Alcohol” (AUDIT, por sus siglas en inglés) posee un rango de 0 a 40, derivado de la sumatoria de diez ítems, donde ocho o más puntos identifican el consumo de riesgo. El indicador de consumo de riesgo de alcohol (puntaje AUDIT mayor o igual a 8) se calcula sobre los consumidores de último año, vale decir, aquellas personas que respondieron el instrumento AUDIT.

La prevalencia de consumo de riesgo de alcohol no ha mostrado variaciones significativas respecto al estudio anterior, manteniéndose estable en 9,8% en 2020. Por sexo, el consumo de riesgo es significativamente mayor en hombres que en mujeres: 14,9% y 3,6%, respectivamente. Según edad, la prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en población adolescente y de 45 a 64 años es significativamente menor al resto de los tramos y, a su vez, el consumo de riesgo en adolescentes es significativamente menor que entre 45 y 64 años. Finalmente, no se reportan brechas por NSE en el presente estudio.

En términos generales, y respecto al estudio anterior, no se observan variaciones significativas por sexo, tramos de edad y NSE en este indicador.

TABLA 52
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol durante el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2008-2020.
Proporción de prevalentes de último año que presentan consumo de riesgo de alcohol (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2008	9,2	14,0	3,4	9,0	12,8	12,2	6,9	6,4	12,6	7,8	6,3
2010	8,7	13,9	2,4	8,1	14,0	10,3	6,2	6,4	12,5	8,0	7,2
2012	9,2	14,2	3,1	6,1	14,5	9,1	5,6	9,1	13,5	9,5	6,8
2014	8,7	12,2	4,7	8,0	11,1	11,1	7,9	7,2	13,1	6,4	8,6
2016	9,3	13,8	4,1	6,0	15,3	12,1	7,8	6,3	13,6	8,3	8,3
2018	9,3	13,3	4,3	3,5	14,7	11,1	8,9	6,8	12,1	8,5	7,8
2020	9,8	14,9	3,6	3,0	14,3	10,9	11,9	6,8	12,0	9,6	8,6

Al analizar el indicador de consumo de riesgo sobre la población total, no se observan variaciones respecto al estudio anterior en la prevalencia sobre población general, llegando a 5,8% en 2020. Según sexo, el consumo de riesgo en hombres (9,6%) es significativamente mayor que en mujeres (1,9%), lo que representa una brecha significativa. La brecha de la prevalencia observada en población adolescente y de 45 a 64 años es significativamente distinta con el resto de los tramos de edad en 2020. Al evaluar por nivel socioeconómico, no se observan brechas en 2020.

De igual manera a lo reportado en el indicador sobre usuarios de último año, no se observan cambios significativos respecto a 2018.

TABLA 53

Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol durante el último año sobre población general, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2008-2020.

Proporción de consumidores de último año que presentan consumo de riesgo de alcohol sobre el total de la población (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2008	6,3	10,6	2,1	4,1	10,0	9,5	5,0	4,4	8,2	5,4	4,5
2010	5,0	8,9	1,2	2,5	10,0	6,7	3,9	3,7	7,4	4,4	4,3
2012	5,1	8,8	1,6	2,0	9,5	6,2	3,4	5,0	7,5	5,0	4,0
2014	5,5	8,4	2,8	2,9	7,7	8,1	5,6	4,5	8,1	3,9	5,7
2016	6,0	9,5	2,4	2,1	11,3	9,0	5,6	3,9	8,0	5,0	5,7
2018	5,6	9,0	2,3	1,1	10,3	7,9	6,0	4,1	7,1	5,1	5,0
2020	5,8	9,6	1,9	0,7	10,0	7,3	7,9	4,0	6,3	5,7	5,3

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS Y CONSUMO DE SUSTANCIAS

En atención al desarrollo de políticas públicas que buscan regular el uso de alcohol y otras drogas, el SEDA indaga desde el año 2012 sobre el consumo de sustancias cuando los entrevistados se encuentran frente al volante. A este módulo del cuestionario accedieron todas aquellas personas mayores de 17 años que declararon tener licencia de conducir.

Los resultados muestran que 8,2% de los entrevistados condujo bajo la influencia del alcohol alguna vez en el último año, lo que representa un descenso estadísticamente significativo de 5,6 puntos porcentuales respecto al estudio anterior. Este resultado se explica por descensos en hombres, en los tramos de edad de 26 a 34 años y de 45 a 64 años, y en los NSE Medio y Alto. Por sexo, el análisis de brechas muestra que esta conducta es significativamente mayor en hombres (9,8%) que en mujeres (5,3%) en 2020. Por edad y NSE no se observan brechas en la medición actual.

En el caso de marihuana, el 2,6% de los conductores en 2020 manejaron bajo los efectos de esta droga, lo que representa un descenso de 1,5 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (variación no significativa). A su vez, no se reportan variaciones estadísticamente significativas por sexo, tramos de edad y NSE respecto a 2018. El análisis de brechas muestra por sexo una prevalencia significativamente mayor en hombres que en mujeres, con 3,6% frente a 0,8%. Por edad, el tramo de edad de 45 a 64 años es significativamente menor que el tramo de 17 a 34 años; por nivel socioeconómico, no se observan brechas en la conducta.

Las declaraciones de uso de otras drogas antes de conducir —tales como cocaína, éxtasis, pasta base o algún medicamento— llegan a 0,7% en 2020, lo que no representa un cambio significativo respecto al estudio anterior (0,4% en 2018). En la presente encuesta, no se observan variaciones significativas por sexo, edad y NSE respecto a 2018, como tampoco brechas significativas.

TABLA 54

Evolución de prevalencia de drogas al momento de conducir, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2020.

Proporción que declara haber consumido bajo la influencia de la droga especificada en los últimos 12 meses (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad				Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	17 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
Alcohol										
2012	15,5	16,5	13,2	22,1	18,5	14,8	11,9	13,6	14,1	16,7
2014	14,2	16,2	10,0	13,8	22,9	15,4	10,2	13,9	10,9	16,2
2016	13,5	16,0	8,5	11,5	19,5	14,5	10,3	14,1	10,3	15,1
2018	13,8	17,4	6,2	21,0	18,4	11,8	10,8	8,8	11,6	17,2
2020	8,2	9,8	5,3	10,2	9,8	9,1	6,6	8,4	7,2	9,1
Marihuana										
2012	2,8	3,1	2,0	5,6	4,1	2,8	1,0	3,2	3,1	2,5
2014	3,2	3,8	2,0	4,4	9,1	2,5	0,9	2,9	1,8	4,1
2016	3,5	4,5	1,6	10,1	7,9	2,0	0,5	3,7	2,6	4,0
2018	4,1	5,3	1,7	10,5	9,0	2,3	1,1	4,8	3,2	4,6
2020	2,6	3,6	0,8	6,3	4,8	2,5	0,9	3,1	2,7	2,4
Otra droga										
2012	0,6	0,8	0,2	0,5	0,6	1,1	0,4	1,1	0,5	0,6
2014	1,0	0,9	1,0	0,4	2,0	1,6	0,3	2,1	0,4	1,0
2016	1,0	1,1	0,8	1,7	1,1	1,9	0,2	2,6	0,2	1,0
2018	0,4	0,5	0,1	0,3	0,5	0,7	0,1	0,4	0,5	0,2
2020	0,7	0,6	0,7	0,1	1,5	1,1	0,1	0,1	0,9	0,8


OTROS INDICADORES ASOCIADOS AL CONSUMO

Consumo de drogas en el hogar

Existen numerosas investigaciones que señalan al hogar como factor protector o de riesgo para el consumo de drogas, principalmente en población joven y adolescente. El consumo de sustancias en el hogar se asocia a una mayor disponibilidad y a una disminución de la percepción de riesgo frente al uso de drogas.

En este estudio, el consumo de drogas en el hogar —es decir, la proporción de individuos que declara que algún miembro del hogar consume alguna droga— presenta un descenso significativo para marihuana de 11,7% en 2018 a 9,7% en 2020, volviendo así a los niveles de 2016. De igual manera, para cocaína y pasta base se observan variaciones significativas a la baja de 0,8 y 0,7 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

GRÁFICO 9
Evolución de porcentaje que declara consumo de drogas en el hogar. Chile, 2000–2020.



En el caso del uso de marihuana en el hogar, y respecto al estudio anterior, se reportan descensos significativos en hombres, en los tramos de edad de 12 a 18 años y 26 a 34 años, y en el NSE Alto. No se reportan brechas por sexo y nivel socioeconómico en 2020. De igual manera que en la medición pasada, los entrevistados entre 19 y 34 años reconocen significativamente en mayor proporción que viven con una persona que consumió marihuana en el último año, respecto al resto de los tramos de edad; sin embargo, si no se considerara entre 19 y 25 años, el tramo de 26 a 34 años tiene reportes significativamente mayores que el resto de los tramos de edad.

TABLA 55
Evolución de prevalencia (%) de marihuana en el hogar, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2000–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2000	6,1	6,8	5,4	7,0	10,7	6,2	4,6	3,6	7,0	4,8	6,0
2002	4,1	3,2	4,9	4,9	7,9	3,9	2,3	2,7	4,5	4,5	2,8
2004	4,3	3,8	4,7	5,6	7,8	4,0	3,3	2,1	5,1	4,0	3,2
2006	6,8	5,8	7,8	5,3	15,4	8,1	5,2	3,1	6,3	6,6	7,7
2008	5,4	5,2	5,5	6,8	9,0	6,4	3,1	3,4	7,1	4,3	4,3
2010	4,2	5,0	3,3	3,0	7,3	5,1	2,5	3,8	6,1	4,0	3,2
2012	5,2	5,8	4,6	5,4	8,3	5,3	3,8	4,2	6,4	4,7	5,0
2014	5,9	6,1	5,8	6,0	8,9	8,4	4,2	4,5	7,6	6,4	4,6
2016	9,8	9,2	10,3	8,7	17,0	13,0	6,2	7,3	10,0	7,5	11,5
2018	11,7	13,6	9,8	12,6	19,6	16,1	9,8	7,0	12,1	10,7	12,3
2020	9,7	10,0	9,3	7,4	18,1	11,0	6,7	7,7	11,7	9,1	8,7

En el caso de cocaína, se observan descensos significativos respecto a 2020 en hombres, en el tramo de 26 a 34 años y en el NSE Medio. Respecto a las brechas por sexo, tramos de edad y NSE, no se observan diferencias estadísticamente significativas en 2020.

TABLA 56
Evolución de prevalencia (%) de cocaína en el hogar, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2000–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2000	1,6	1,8	1,5	1,8	2,7	1,6	1,4	1,0	1,7	1,3	1,8
2002	0,7	0,6	0,7	1,0	1,3	0,8	0,3	0,4	0,9	0,6	0,5
2004	0,9	0,9	0,9	1,0	1,6	1,0	0,9	0,4	1,2	0,8	0,6
2006	1,6	1,2	2,1	1,5	2,6	2,6	1,3	0,7	1,7	1,9	1,2
2008	1,4	1,4	1,4	1,5	2,0	1,1	1,2	1,3	2,5	1,0	0,4
2010	0,8	1,1	0,5	0,5	0,8	1,0	0,5	0,9	1,1	0,9	0,4
2012	1,2	0,9	1,5	1,0	1,1	1,3	1,2	1,3	1,4	1,6	0,7
2014	1,1	1,1	1,2	0,7	2,0	1,2	1,1	0,9	2,2	1,3	0,5
2016	1,5	1,1	1,9	0,8	2,7	1,9	1,6	1,1	2,3	1,3	1,3
2018	1,7	1,9	1,6	1,4	2,2	2,7	1,3	1,4	2,0	2,1	1,1
2020	0,9	0,8	1,0	0,6	1,3	0,6	0,6	1,2	1,7	0,6	0,7

Para pasta base, no se observan variaciones estadísticamente significativas en sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico respecto al estudio anterior. A su vez, y de igual manera que en cocaína, ninguna brecha es estadísticamente significativa en 2020, con excepción de la brecha observada entre 45 y 64 años frente al tramo de 35 a 44 años.

TABLA 57
Evolución de prevalencia (%) de pasta base en el hogar,
según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2000-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2000	2,0	2,1	1,9	2,0	2,5	1,9	2,1	1,7	2,7	1,6	1,3
2002	0,8	0,5	1,1	0,8	1,1	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,4
2004	1,2	1,2	1,2	1,5	1,6	0,9	1,2	0,9	2,0	0,9	0,3
2006	1,6	1,2	1,9	1,4	1,5	3,0	1,3	0,9	2,4	1,3	0,6
2008	1,3	1,4	1,2	1,3	2,7	1,2	0,7	0,9	2,3	0,8	0,6
2010	1,5	2,1	1,0	1,4	2,3	0,9	1,0	1,8	2,6	2,0	0,4
2012	1,5	1,2	1,7	1,3	1,4	1,7	1,7	1,4	2,4	1,8	0,7
2014	1,4	1,4	1,5	0,9	1,7	1,3	1,2	1,6	3,0	1,6	0,5
2016	1,4	1,2	1,6	0,6	1,5	1,3	1,7	1,6	3,0	1,1	0,9
2018	1,7	1,7	1,6	1,5	1,6	1,9	1,2	1,9	2,9	1,5	0,9
2020	1,0	1,0	1,1	0,7	0,8	0,9	0,6	1,5	1,8	0,9	0,5

Percepción de problemas en el barrio de residencia


A continuación, se presenta un conjunto de reportes asociados a la percepción de fenómenos que ocurren en los barrios de las personas que fueron entrevistadas. El propósito de esta caracterización es medir la ocurrencia de estos hechos y monitorear su tendencia en el tiempo.

Aquellas conductas que tienen una mayor percepción en los barrios de residencia en el presente estudio son “consumo de drogas en lugares públicos” con un 35,8%, seguido por “tráfico de drogas” (31,2%) y “jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas” con un 31,9%.

Con relación al estudio anterior, se observa una estabilidad en la percepción de “rayado en las paredes, daños al alumbrado o cosas similares” que llega a 22,7% en 2020, esto luego de presentar dos descensos significativos entre 2016 y 2018. Por su parte, se aprecia un aumento estadísticamente significativo en las declaraciones asociadas a “balaceras y acciones violentas con armas de fuego”, pasando de 17,5% en 2018 a 22,2% en 2020.

Por su parte, “venta clandestina de alcohol” se mantiene estable bajo el 12% (11,3% en 2020), tal como ha sido su tendencia. En el resto de la percepción de problemas en barrios de residencia no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto al estudio anterior.

GRÁFICO 10
Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Chile, 2016-2020.



Un aspecto que se debe considerar al momento de reportar fenómenos de esta índole tiene relación con la dimensión socioeconómica: la totalidad de los indicadores presenta una marcada gradiente socioeconómica, esto es, que se aprecian valores significativamente mayores en el NSE Bajo respecto a los NSE Medio y Alto. A su vez, existen diferencias significativas entre niveles medios y altos en este tipo de fenómenos, con excepción para “asaltos o robos en las calles” y “robos en las casas” que en este estudio no muestra diferencias entre el NSE Alto y el NSE Medio.

Particularmente en el NSE Alto se reportan aumentos significativos respecto a 2018 en la percepción de existencia en el barrio de “tráfico de drogas”, “consumo de drogas en lugares públicos”, “jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas” y “balaceras y acciones violentas con armas de fuego”. Junto a ello, en el NSE Bajo se reportan descensos significativos en “tráfico de drogas”,

“jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas” y “consumo de drogas en lugares públicos”. Finalmente, en el NSE Medio se reporta un descenso significativo en la percepción de “robos en las casas” y un aumento en “balaceras y acciones violentas con armas de fuego”.

En 2018, la percepción de ocurrencia de “tráfico de drogas” era cuatro veces mayor en el NSE Bajo (48,1%) respecto al NSE Alto (12,2%); en la presente versión del estudio es dos veces mayor (41,3% frente a 20,2%). Los reportes de “balaceras y acciones violentas con armas de fuego” en 2018 eran casi cinco veces mayores en el NSE Bajo respecto al NSE Alto; en 2020, es 31,5% frente a 14,3%, es decir, alrededor de dos veces mayor.

TABLA 58
Evolución de percepción de problemas en el barrio de residencia, según nivel socioeconómico. Chile, 2018-2020.
Proporción que declara mucho/bastante ocurrencia de los fenómenos de la lista (%)

Problemas en barrio de residencia							
Serie	Bajo	Medio	Alto	Serie	Bajo	Medio	Alto
Tráfico de drogas				Asaltos o robos en las calles			
2018	48,1	30,3	12,2	2018	30,7	22,8	17,4
2020	41,3	32,9	20,2	2020	35,7	22,5	20,4
Robos en las casas				Jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas			
2018	29,3	23,2	17,5	2018	50,8	34,5	16,2
2020	25,2	19,2	19,4	2020	43,4	32,7	20,9
Rayado en las paredes, daños al alumbrado				Balaceras y acciones violentas con armas de fuego			
2018	33,5	20,6	14,1	2018	33,0	17,3	6,2
2020	29,2	22,1	17,9	2020	31,5	22,1	14,3
Consumo de drogas en lugares públicos				Venta clandestina de alcohol			
2018	52,6	37,1	19,8	2018	20,6	10,9	4,4
2020	45,2	36,5	26,7	2020	18,1	10,7	6,3

OPINIÓN PÚBLICA

Evaluación de medidas para la regulación y control de drogas

En el estudio se incorporan preguntas que tienen por finalidad captar la opinión de los encuestados respecto a medidas de control vinculadas al fenómeno de las drogas distintas del alcohol.

Frente a las preguntas de opinión sobre políticas de drogas, se mantienen estables respecto al estudio anterior las opiniones sobre “dar la misma pena a quienes trafican con marihuana que los que trafican con cocaína o pasta base” (55,0% en 2020), “la marihuana debería ser legal para mayores de 18 años” (47,9%) y “permitir el uso de marihuana para fines terapéuticos” con un 83,5%.

Respecto a la opinión de “suspender el juicio a quienes han delinquido por primera vez a cambio de ingresar a tratamiento”, esta muestra una variación estadísticamente significativa al alza de 56,1% en 2018 a 60,6% en 2020, recuperando parcialmente el descenso reportado en el estudio anterior. El aumento en esta medición se explica por

aumentos en ambos sexos, en los tramos de edad de 12 a 18 años y de 19 a 25 años, y en el NSE Bajo.

Por otra parte, el apoyo a “penalizar el porte y consumo de marihuana, aunque sea en pequeñas cantidades y para uso personal” muestra un descenso estadísticamente significativo de 7,8 puntos porcentuales respecto a 2018 (46,0% en 2020), siendo este el menor valor en la serie de estudios. Este descenso se reportó en todas las categorías, con excepción del tramo de edad de 12 a 18 años y en el NSE Alto, que se mantuvieron estables respecto a la medición anterior.

Respecto a las brechas por sexo, en 2020 la única frase que muestra una brecha significativa entre hombres y mujeres es “la marihuana debería ser legal para mayores de 18 años”, con 51,2% frente a 44,6%.

Por edad, el grado de aprobación con las frases “la marihuana debería ser legal para mayores de 18 años” y “permitir el uso de marihuana para fines terapéuticos” es significativamente mayor entre los 19 y 34 años respecto al resto de los tramos de edad. Por su parte, “suspender el juicio a quienes han delinquido por primera vez a cambio de ingresar a tratamiento” tiene el mayor grado de aprobación entre 12 y 18 años respecto al resto de los grupos de edad. La frase “penalizar el porte y consumo de marihuana aunque sea en pequeñas cantidades y para uso personal” tiene la menor aprobación en el tramo de 19 a 34 años.

Finalmente, respecto a las brechas observadas por nivel socioeconómico, cabe mencionar que en el NSE Bajo los grados de acuerdo con las frases “suspender el juicio a quienes han delinquido por primera vez a cambio de ingresar a tratamiento” (64,3%) y “penalizar el porte y consumo de marihuana aunque sea en pequeñas cantidades y para uso personal” (50,7%) son significativamente mayores respecto a los NSE Alto y Medio; por su parte, la frase “permitir el uso de marihuana para fines terapéuticos” es menor en el NSE Bajo (80,2%) respecto al NSE Medio y Alto. Finalmente, el grado de acuerdo respecto a “dar la misma pena a quienes trafican con marihuana que los que trafican con cocaína o pasta base” en el NSE Alto (51,3%) es significativamente menor respecto a los NSE Medio y Bajo.

TABLA 59
Evolución de aprobación de políticas de regulación y control de drogas, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2008-2020.

Proporción que declara estar muy de acuerdo/de acuerdo con las políticas del encabezado (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
Suspender el juicio a quienes han delinquido por primera vez a cambio de ingresar a tratamiento											
2008	59,8	60.1	59.4	62.4	55.1	57.5	61.1	61.3	61.0	61.2	55.7
2010	64,6	65.0	64.2	65.1	64.8	62.4	64.9	65.1	63.6	65.8	63.8
2012	61,5	61.6	61.4	62.6	58.3	58.2	62.0	63.8	64.3	63.1	58.5
2014	64,0	64.0	64.0	65.1	65.7	63.0	62.8	64.0	62.6	64.7	64.2
2016	62,1	63.0	61.3	65.5	57.8	60.4	60.2	64.5	60.8	62.3	62.6
2018	56,1	56.3	55.9	56.7	57.4	50.4	52.8	59.8	56.8	55.4	56.6
2020	60,6	61.5	59.7	70.7	62.6	54.9	56.0	61.3	64.7	58.9	59.5
Dar la misma pena a quienes trafican con marihuana que los que trafican con cocaína o pasta base											
2008	71,1	69.5	72.7	70.0	68.4	69.4	71.8	73.7	69.9	73.4	69.1
2010	67,5	66.9	68.2	67.3	64.9	67.2	66.6	69.6	71.4	68.4	64.3
2012	63,6	62.2	64.9	65.3	59.0	64.7	63.4	64.5	63.3	65.8	61.7
2014	51,6	52.3	50.9	53.7	46.5	46.7	54.5	53.5	55.5	51.5	49.6
2016	57,0	55.8	58.1	57.1	48.2	56.8	60.6	59.0	61.4	60.2	52.1
2018	54,7	52.7	56.8	56.1	48.6	50.3	56.1	58.3	60.3	56.1	49.4
2020	55,0	54.7	55.3	57.3	45.8	49.6	59.0	58.7	58.6	55.4	51.3
Penalizar el porte y consumo de marihuana aunque sea en pequeñas cantidades y para uso personal											
2008	74,6	71.2	78.0	74.4	64.3	71.1	79.7	79.2	75.2	77.7	68.7
2010	72,6	71.1	74.1	71.2	62.3	68.6	74.9	78.9	74.5	74.5	69.4
2012	65,0	61.0	68.9	64.8	53.9	61.1	67.6	71.0	67.5	67.4	61.5
2014	51,6	51.0	52.2	52.7	44.1	47.2	53.3	55.3	55.3	53.8	47.7
2016	50,3	48.1	52.6	53.5	39.2	46.7	51.6	54.9	53.8	54.6	45.1
2018	53,8	50.4	57.2	56.4	38.8	45.4	56.7	61.7	57.5	57.3	47.4
2020	46,0	44.7	47.2	51.3	31.5	39.3	46.5	53.2	50.7	44.7	43.6
Permitir el uso de marihuana para fines terapéuticos											
2008	57,5	63.1	52.1	57.3	64.7	60.4	56.4	52.6	54.2	58.6	60.6
2010	59,4	62.3	56.5	54.6	68.3	63.1	58.2	56.6	59.5	57.0	62.1
2012	68,2	72.2	64.2	63.7	74.0	74.1	68.4	64.7	65.0	67.4	70.5
2014	84,8	85.1	84.5	81.6	89.4	88.6	85.0	82.3	85.5	84.1	85.0
2016											
2018	82,5	82.8	82.2	75.6	87.2	84.9	82.6	81.7	81.4	82.8	83.3
2020	83,5	84.2	82.7	78.1	90.6	87.7	84.2	79.9	80.2	84.4	85.1
La marihuana debería ser legal para mayores de 18 años											
2008	26,5	30.3	22.7	26.5	34.4	29.3	23.2	22.5	26.9	26.0	26.6
2010	25,6	28.4	22.8	23.6	36.0	30.4	24.4	20.1	27.2	23.7	26.8
2012	34,6	40.0	29.5	33.5	44.0	37.8	30.4	31.4	35.4	36.6	32.5
2014	45,7	48.6	42.9	45.0	56.7	51.3	41.6	41.1	48.8	44.9	44.8
2016	50,6	53.5	47.6	45.2	62.1	57.5	48.0	45.8	49.5	51.4	50.4
2018	47,0	51.3	42.8	42.5	59.9	50.6	46.5	41.8	47.9	46.9	46.4
2020	47,9	51.2	44.6	42.5	62.9	57.6	46.9	39.2	48.8	48.2	46.7

ESCENARIO EN REGIONES

A nivel regional, la situación del consumo de drogas muestra ciertos cambios respecto al estudio anterior, lo que hace que existan variaciones particulares asociadas a cada región. De igual manera que a nivel nacional, el análisis de significancia estadística se efectuó a un 95% de confianza, ajustado por el diseño muestral de los últimos dos estudios nacionales.

En el caso de tabaco, si bien a nivel nacional no se observa un cambio en la prevalencia de uso diario, a nivel regional se registran descensos significativos en las regiones de Arica y Parinacota, Atacama y aumentos en las regiones de La Araucanía y Aysén.

Respecto a la prevalencia de uso en el último mes de alcohol, se observa a nivel nacional una estabilización; sin embargo, se aprecian descensos en las regiones de O'Higgins y Ñuble, y un aumento significativo en la Región de Aysén (por segundo estudio consecutivo).

En el caso de la prevalencia de uso de marihuana en el último año, se aprecian descensos significativos en las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso (por segundo estudio consecutivo) y O'Higgins, mientras se observan aumentos en las regiones de Aysén (por segundo año consecutivo) y Los Ríos.

El consumo de cocaína total se presenta agregando los consumos de clorhidrato de cocaína y pasta base. A nivel nacional, se observa un descenso estadísticamente significativo de 1,3% en 2018 a 0,7% en 2020; en esta línea, a nivel regional se registran descensos en las regiones de Atacama, Coquimbo, Metropolitana y Maule.

Respecto al consumo de otras drogas, como tranquilizantes y analgésicos sin receta médica, a nivel nacional se observó una estabilización en las prevalencias de último año por segundo estudio consecutivo. A nivel regional, en el caso de tranquilizantes sin receta médica, se registra un descenso significativo en la Región de Los Lagos y aumentos en las regiones del Biobío y Aysén. Por su parte, para analgésicos sin receta médica, se observa un aumento estadísticamente significativo en la Región del Maule.

GRÁFICO 11

Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco, según regiones. Chile, 2018-2020.




GRÁFICO 12

Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes, según regiones. Chile, 2018-2020.




GRÁFICO 13

Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según regiones. Chile, 2018-2020.




GRÁFICO 14

Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total (cocaína y/o pasta base) en el último año, según regiones. Chile, 2018-2020.




GRÁFICO 15

Evolución de prevalencia (%) de tranquilizantes sin receta médica en el último año, según regiones. Chile, 2018-2020.





GRÁFICO 16

Evolución de prevalencia (%) de analgésicos sin receta médica en el último año, según regiones. Chile, 2018-2020.





Principales Resultados Regionales

Región de Arica y Parinacota

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región de Arica y Parinacota la muestra efectiva fue de 660 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 282 son hombres y 378 mujeres, 274 tienen entre 12 y 34 años y 386 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 161.017 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

La comuna incluida en esta versión del estudio fue Arica.

TABLA 60
Distribución de la muestra, según sexo y edad.
Región de Arica y Parinacota.

	Sexo		Tramos de edad		Total
	Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64	
Porcentaje	42,7	57,3	41,5	58,5	100
Muestra (N)	282	378	274	386	660
Población	81.010	80.007	76.970	84.047	161.017

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.


En la Región de Arica y Parinacota, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos no varía significativamente respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 2,8 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 5,4 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 25,6% a 21,6%.

TABLA 61
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región de Arica y Parinacota, 1994-2020.
Prevalencias de consumo de tabaco (%)

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	68,9	47,0	40,8	
1996	74,1	42,9	37,3	
1998	70,3	41,6	33,4	
2000	71,5	46,5	38,7	
2002	65,6	44,5	38,3	23,1
2004	70,8	44,4	37,6	21,0
2006	68,7	38,9	32,2	17,2
2008	67,4	40,6	33,7	19,6
2010	40,5	32,8	27,3	8,4
2012	49,0	33,4	28,5	17,2
2014	52,7	33,8	26,9	15,1
2016	48,6	26,1	21,5	11,5
2018	60,1	33,2	25,6	14,9
2020	57,3	27,8	21,6	8,2

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) desciende significativamente respecto a la medición anterior, pasando de 14,9% en el estudio 2018 a 8,2% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Arica y Parinacota bajo el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 17
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región de Arica y Parinacota, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; así, en hombres se observa una variación de 11,6 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 10,4% en 2018 a 8,0% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 13,3% en 2018 a 4,9% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 5,2 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 0,5 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 62
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad.
Región de Arica y Parinacota, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	23,1	24,5	21,7	21,8	24,5
2004	21,0	24,3	18,0	15,4	27,4
2006	17,2	19,8	14,9	13,6	22,1
2008	19,6	21,8	17,6	14,9	24,5
2010	8,4	8,1	8,7	9,7	6,8
2012	17,2	26,0	9,5	6,4	32,5
2014	15,1	13,1	16,8	10,9	19,6
2016	11,5	12,4	10,8	8,1	14,8
2018	14,9	20,1	10,4	13,3	16,5
2020	8,2	8,5	8,0	4,9	11,3

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.


En la Región de Arica y Parinacota, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 4,3 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 3,9 puntos porcentuales respecto a 2018: pasa de 60,3% a 56,4%.

TABLA 63
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región de Arica y Parinacota, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	84,9	64,7	38,7
1996	88,4	70,0	45,5
1998	86,4	72,2	54,3
2000	88,5	75,4	48,3
2002	82,1	69,7	53,6
2004	79,1	66,9	51,2
2006	83,4	71,0	54,5
2008	85,4	72,2	48,0
2010	60,8	52,2	21,8
2012	60,0	45,0	24,1
2014	59,1	48,8	34,5
2016	65,4	46,5	24,2
2018	83,7	60,3	41,5
2020	79,4	56,4	40,0

La prevalencia de último mes de alcohol no varía significativamente, pasando de 41,5% en el estudio 2018 a 40,0% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Arica y Parinacota bajo el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 18
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes. Región de Arica y Parinacota, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; así, en hombres se observa una variación de 3,6 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 32,7% en 2018 a 31,6% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a la medición anterior. Así, en el tramo de 12 a 34 años, la prevalencia

pasa de 42,2% en 2018 a 45,0% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 5,3 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 16,8 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 64
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes, según sexo y edad.
Región de Arica y Parinacota, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	38,7	48,4	29,2	41,4	35,0
1996	45,5	53,3	36,6	42,0	49,5
1998	54,3	66,8	41,1	47,5	63,1
2000	48,3	58,8	38,8	45,5	51,8
2002	53,6	60,5	47,4	47,2	60,5
2004	51,2	62,1	41,4	45,9	57,2
2006	54,5	64,8	45,5	51,3	58,8
2008	48,0	54,1	42,2	45,8	50,3
2010	21,8	32,3	12,4	24,8	17,6
2012	24,1	31,8	17,4	23,9	24,5
2014	34,5	38,5	31,2	32,2	37,0
2016	24,2	29,4	20,0	25,9	22,6
2018	41,5	52,0	32,7	42,2	40,8
2020	40,0	48,4	31,6	45,0	35,5

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región de Arica y Parinacota, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, no mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 12,6% en 2018 a 7,5% en 2020. La diferencia observada de 6,4 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio 2018, no se observan cambios por sexo, y no se aprecian variaciones por edad.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia una estabilización: pasa de 7,6% en 2018 a 4,2% en 2020 en el uso de riesgo de alcohol. En la desagregación por sexo respecto a 2018 no se observan cambios, y por tramos de edad no se aprecian variaciones.

TABLA 65
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol
en el último año, según sexo y edad.
Región de Arica y Parinacota, 2008–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2008	7,5	13,7	0,6	9,8	5,2
2010	12,0	21,2	0,0	14,6	8,7
2012	13,5	17,6	7,2	7,8	19,1
2014	12,1	24,3	1,2	15,4	8,7
2016	7,6	8,2	6,8	8,2	7,0
2018	12,6	16,8	8,2	18,1	6,5
2020	7,5	10,3	3,9	8,4	6,5
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2008	5,4	10,6	0,4	6,8	4,0
2010	6,3	13,3	0,0	7,5	4,7
2012	6,1	10,3	2,4	2,9	10,5
2014	5,9	12,2	0,6	7,3	4,4
2016	3,5	4,5	2,7	3,7	3,3
2018	7,6	11,3	4,5	11,2	3,8
2020	4,2	6,4	2,0	5,0	3,4

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran un descenso significativo respecto al estudio anterior; por sexo se observa estabilidad en hombres y una variación significativa en mujeres; por edad se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y una variación significativa entre 35 y 64 años. A su vez, la diferencia observada por sexo no es una brecha estadísticamente significativa, y la variación por tramos de edad tampoco es significativa para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población muestra que un 18,7% de la población total de la Región de Arica y Parinacota, entre 12 y 64 años, tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días; este resultado se traduce en un descenso significativo respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población no muestra por sexo y edad diferencias estadísticamente significativas.

TABLA 66
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes,
según sexo y edad.
Región de Arica y Parinacota, 2012–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes (%)					
2012	54,5	59,5	46,5	65,4	39,4
2014	56,5	65,0	47,6	64,3	49,2
2016	54,4	55,7	52,8	54,5	54,3
2018	63,0	63,5	62,3	66,5	59,1
2020	46,7	49,5	42,3	51,2	41,4
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2012	13,1	18,9	8,1	15,6	9,6
2014	19,5	25,0	14,9	20,7	18,2
2016	13,2	16,4	10,5	14,1	12,3
2018	26,2	33,0	20,4	28,1	24,1
2020	18,7	23,9	13,4	23,0	14,7

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

A nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.

En la Región de Arica y Parinacota, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana no varía respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 7,7 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana no presenta variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018, con una diferencia de 3,5 puntos porcentuales: pasa de 8,7% a 5,2% en el estudio actual.

TABLA 67
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región de Arica y Parinacota, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	15,9	3,8	0,5
1996	13,0	1,5	0,4
1998	12,8	2,9	0,9
2000	20,2	4,3	2,5
2002	19,1	6,1	2,7
2004	21,1	4,1	1,4
2006	19,0	3,4	1,5
2008	22,4	4,0	0,9
2010	13,2	4,9	2,6
2012	16,6	4,4	3,2
2014	24,4	8,9	4,5
2016	22,8	7,1	3,1
2018	37,2	13,6	8,7
2020	29,5	7,7	5,2

La prevalencia de último año de marihuana muestra una variación estadísticamente significativa, pasando de 13,6% en el estudio 2018 a 7,7% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Arica y Parinacota bajo el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 19
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año. Región de Arica y Parinacota, 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; así, en hombres se observa una variación de 9,5 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 7,6% en 2018 a 4,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años respecto al estudio anterior. De esta manera,

en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 23,5% en 2018 a 12,7% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,2 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 7,1 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 68
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad.
Región de Arica y Parinacota, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	3,8	6,6	1,1	6,3	0,4
1996	1,5	1,7	1,3	2,5	0,3
1998	2,9	4,9	0,8	4,5	0,9
2000	4,3	8,1	1,0	6,5	1,5
2002	6,1	8,1	4,4	9,2	2,8
2004	4,1	8,3	0,4	6,5	1,3
2006	3,4	6,1	0,9	4,4	2,0
2008	4,0	5,1	2,9	7,2	0,6
2010	4,9	8,6	1,5	6,9	2,1
2012	4,4	6,4	2,6	5,8	2,4
2014	8,9	12,3	6,0	15,5	1,8
2016	7,1	8,6	5,8	12,5	2,0
2018	13,6	20,7	7,6	23,5	3,3
2020	7,7	11,2	4,1	12,7	3,1

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.

En la Región de Arica y Parinacota, se observa una variación de 1,1 puntos porcentuales en la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total, diferencia que no es estadísticamente significativamente respecto al estudio anterior.

TABLA 69
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región de Arica y Parinacota, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
1994	11,0	3,6
1996	7,5	2,4
1998	10,2	2,0
2000	10,7	2,9
2002	9,0	2,7
2004	7,9	2,3
2006	11,1	1,9
2008	10,3	1,6
2010	3,7	2,0
2012	4,4	0,2
2014	5,6	0,3
2016	4,3	0,7
2018	7,3	0,8
2020	8,4	0,7

La prevalencia de último año de cocaína total no varía significativamente respecto a la medición anterior, pasando de 0,8% en el estudio 2018 a 0,7% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Arica y Parinacota en el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 20
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año. Región de Arica y Parinacota, 1994-2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo muestra estabilidad en ambos sexos respecto al estudio anterior; así, en hombres se observa una variación de 0,5 puntos porcentuales y en mujeres llega a 0,3% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 0,7% en 2018 a 0,8% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,1 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 0,9 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 70
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año, según sexo y edad.
Región de Arica y Parinacota, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	3,6	5,0	2,2	5,6	0,8
1996	2,4	3,4	1,3	3,9	0,7
1998	2,0	2,9	1,1	2,4	1,5
2000	2,9	6,0	0,1	4,0	1,4
2002	2,7	4,5	1,1	2,8	2,6
2004	2,3	4,9	-	3,1	1,4
2006	1,9	3,0	0,9	2,7	0,8
2008	1,6	2,5	0,8	1,9	1,4
2010	2,0	4,3	-	3,5	-
2012	0,2	0,4	-	-	0,5
2014	0,3	0,7	-	0,5	0,2
2016	0,7	-	1,4	1,5	-
2018	0,8	1,7	-	0,7	0,8
2020	0,7	1,2	0,3	0,8	0,7

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región de Arica y Parinacota, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas registra un descenso estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 18,3 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año desciende significativamente, con una diferencia de 12,0 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía, pasando de 16,2% a 14,3%.

TABLA 71
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región de Arica y Parinacota, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	15,7	10,0	3,3
2008			
2010	17,1	14,9	6,0
2012	20,9	15,4	5,9
2014	42,9	31,9	12,6
2016	44,6	27,1	11,4
2018	55,3	34,4	16,2
2020	37,0	22,4	14,3

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio se observa un descenso estadísticamente significativo en la prevalencia de último año: pasa de 13,9% en 2018 a 5,2% en 2020. En la actual medición, la prevalencia alguna vez en la vida cae significativamente (10,3% en 2020) y la medida de último mes no presenta cambios, variando 2,0 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 72
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región de Arica y Parinacota, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2012	6,8	2,9	1,6
2014	11,6	8,1	2,7
2016	9,9	6,3	1,5
2018	24,2	13,9	5,2
2020	10,3	5,2	3,2

La desagregación del uso por sexo muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y una variación significativa a la baja en mujeres respecto a 2018; así, en hombres se observa una variación de 10,8 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 9,5% en 2018 a 1,9% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años, la prevalencia pasa de 20,8% en 2018 a 7,5% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 3,7 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 73
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Arica y Parinacota, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	2,9	4,6	1,4	4,9	0,1
2014	8,1	11,0	5,6	9,8	6,3
2016	6,3	6,9	5,8	9,1	3,7
2018	13,9	19,2	9,5	20,8	6,8
2020	5,2	8,4	1,9	7,5	3,1

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región de Arica y Parinacota, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra estabilidad en el caso de tabaco, que pasa de 11,7% en 2018 a 8,0% en 2020; en alcohol se registra una baja significativa con una brecha de 11,3 puntos porcentuales, y para marihuana llega a 1,2% tras no mostrar cambios significativos, con una diferencia de 1,9 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

TABLA 74
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región de Arica y Parinacota, 1994-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	22,7	38,2	1,6
1996	2,0	10,8	0,9
1998	5,1	16,7	0,2
2000	7,1	24,8	0,4
2002	8,2	24,7	0,8
2004	3,8	13,6	0,3
2006	4,1	19,4	0,2
2008	3,3	20,7	1,6
2010	7,0	14,0	1,3
2012	13,5	21,1	2,2
2014	10,9	18,7	2,4
2016	10,6	18,9	3,2
2018	11,7	26,4	3,1
2020	8,0	15,1	1,2

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente se mantiene estable en la Región de Arica y Parinacota, pasando de 89,3% en 2018 a 79,5% en 2020, y se ubica bajo el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 39,4% en 2020, con una diferencia de 11,0 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (descenso estadísticamente significativo), lo que ubica a la región sobre la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco no ha mostrado cambios respecto a 2018, estableciéndose bajo el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) se mantiene estable, pasando de 30,1% en 2018 a 37,5% en 2020, y ubica a la Región de Arica y Parinacota sobre el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 68,1% en 2020, con una diferencia de 0,3 puntos porcentuales respecto a 2018 (se ha mantenido estable); este resultado ubica a la región sobre la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) se ha mantenido estable en esta versión del estudio: de 72,5% en 2018 a 73,9% en 2020; así, la región queda por sobre el promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base no ha mostrado cambios (de un 82,3% en 2018 a 82,2% en 2020), ubicándose sobre el promedio nacional (80,0%).

TABLA 75
Evolución de percepción de riesgo. Región de Arica y Parinacota, 2000-2020. Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	Diario
2000							85,0		84,8
2002							84,3		90,3
2004							82,2		80,6
2006	58,0	93,7	73,5	96,7	73,7	97,7	83,2		84,1
2008	60,8	91,6	81,5	98,8	83,4	99,6	88,0		87,7
2010	57,0	90,3	78,8	93,7	82,1	96,6	88,4		89,0
2012	57,1	78,4	78,2	95,1	83,5	97,2	88,2		86,2
2014	36,8	73,9	78,1	92,6	82,2	92,9	80,1		82,5
2016	42,3	71,5	79,6	91,7	85,2	90,8	86,1	42	83,2
2018	30,1	67,8	72,5	94,6	82,3	96,0	89,3	50,4	80,0
2020	37,5	68,1	73,9	87,7	82,2	90,0	79,5	39,4	75,1
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año desciende significativamente respecto a 2018, pasando de 26,5% a 12,0% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 6,8 puntos porcentuales, lo que se traduce en una variación significativa a la baja respecto al estudio pasado, y para pasta base desciende significativamente, pasando de 4,7% en el estudio 2018 a 1,2% en el estudio actual.

TABLA 76

Exposición a ofertas de drogas en el último año. Región de Arica y Parinacota, 2002-2020.

Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año


Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	12,5	1,5	4,7
2004	12,8	3,6	5,8
2006	11,7	3,9	6,7
2008	10,4	3,9	6,4
2010	14,7	4,7	4,1
2012	12,9	3,0	3,4
2014	10,8	1,6	0,9
2016	14,0	4,1	3,4
2018	26,5	10,0	4,7
2020	12,0	3,2	1,2

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana una variación significativa a la baja, con una diferencia de 14,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (44,2% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 31,3% en 2018 a 27,3% en 2020, lo que significa mantenerse sin cambios respecto a 2018; para pasta base se mantiene estable con una variación de 3,0 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 21

Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región de Arica y Parinacota, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS EN EL BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "consumo de drogas en lugares públicos como en la calle o plazas" y el menor es "venta clandestina de alcohol".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región de Arica y Parinacota muestra estabilidad, pasando de 31,4% en 2018 a 25,9% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" registra un descenso estadísticamente significativo, con una diferencia de 5,0 puntos porcentuales respecto a 2018. Respecto a las otras categorías descritas, se observan variaciones estadísticamente significativas en "rayado en las paredes, daños al alumbrado o cosas similares", consumo de drogas en lugares públicos como en la calle o plazas" y "jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas".

GRÁFICO 22

Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Región de Arica y Parinacota, 2016-2020.



Región de Tarapacá

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región de Tarapacá la muestra efectiva fue de 936 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 364 son hombres y 572 mujeres, 358 tienen entre 12 y 34 años y 578 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 253.759 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

Las comunas incluidas en esta versión del estudio fueron Iquique y Alto Hospicio.

TABLA 77
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región de Tarapacá.

	Sexo		Tramos de edad		Total
	Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64	
Porcentaje	38,9	61,1	38,2	61,8	100
Muestra (N)	364	572	358	578	936
Población	126.512	127.247	112.694	141.065	253.759

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.


En la Región de Tarapacá, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 0,7 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 4,2 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía, pasando de 25,8% en 2018 a 25,1% en 2020.

TABLA 78
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región de Tarapacá, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	61,2	40,7	32,9	
1996	62,2	43,3	36,4	
1998	72,8	45,6	40,1	
2000	75,6	52,0	45,5	
2002	70,3	48,1	42,1	25,9
2004	70,5	48,6	39,4	26,6
2006	64,8	47,0	41,2	27,4
2008	62,6	42,5	34,3	19,5
2010	42,6	31,1	28,8	19,6
2012	39,1	24,9	20,9	12,2
2014	62,9	42,4	36,1	19,4
2016	53,4	32,4	27,5	16,7
2018	58,9	32,6	25,8	14,9
2020	58,2	28,4	25,1	17,4

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) se ha mantenido estable respecto a la medición anterior, pasando de 14,9% en el estudio 2018 a 17,4% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Tarapacá bajo el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 23
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región de Tarapacá, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en hombres y mujeres respecto al estudio anterior; así, en hombres se observa una variación de 3,3 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 15,4% en 2018 a 17,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 11,5% en 2018 a 10,0% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 4,4 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 0,6 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 79
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región de Tarapacá, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	25,9	27,5	24,0	23,8	28,4
2004	26,6	31,0	21,8	25,7	27,6
2006	27,4	27,0	27,8	23,0	31,5
2008	19,5	20,3	18,8	14,9	24,7
2010	19,6	23,0	16,3	18,4	20,9
2012	12,2	9,7	14,8	10,3	14,4
2014	19,4	22,5	16,4	16,0	22,7
2016	16,7	16,9	16,6	13,9	19,8
2018	14,9	14,4	15,4	11,5	18,9
2020	17,4	17,7	17,1	10,0	23,3

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.


En la Región de Tarapacá, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 1,0 punto porcentual. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 5,4 puntos porcentuales respecto a 2018, pasando de 63,1% a 57,7%.

TABLA 80
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región de Tarapacá, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	64,6	50,9	38,4
1996	78,8	66,2	46,1
1998	81,3	64,9	45,0
2000	88,1	78,1	57,2
2002	84,8	70,3	58,6
2004	87,4	77,1	56,8
2006	81,0	68,5	51,8
2008	77,9	63,5	43,3
2010	50,3	41,9	31,1
2012	55,2	45,7	24,8
2014	76,6	65,1	52,3
2016	69,2	55,3	37,3
2018	79,2	63,1	41,2
2020	80,2	57,7	41,4

La prevalencia de último mes de alcohol no varía significativamente: pasa de 41,2% en el estudio 2018 a 41,4% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Tarapacá bajo el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 24
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes. Región de Tarapacá, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; así, en hombres se observa una variación de 0,7 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 33,9% en 2018 a 32,5% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a la medición anterior. Así, en el tramo de 12 a 34 años, la prevalencia pasa de 39,0% en 2018 a 38,7% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,2 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 17,7 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 81
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes, según sexo y edad.
Región de Tarapacá, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	38,4	48,6	26,5	40,8	35,0
1996	46,1	63,5	29,2	41,3	53,4
1998	45,0	55,1	34,4	44,4	45,7
2000	57,2	65,3	47,4	52,0	63,3
2002	58,6	69,4	46,1	56,4	61,4
2004	56,8	67,1	45,5	51,5	62,6
2006	51,8	57,8	45,5	52,4	51,3
2008	43,3	54,2	32,5	37,5	49,6
2010	31,1	40,5	21,8	32,5	29,6
2012	24,8	29,5	19,9	29,2	20,1
2014	52,3	61,6	43,2	54,1	50,6
2016	37,3	47,2	28,7	32,7	42,4
2018	41,2	49,5	33,9	39,0	43,7
2020	41,4	50,2	32,5	38,7	43,5

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región de Tarapacá, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, no mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 12,2% en 2018 a 10,0% en 2020. La diferencia observada de 7,9 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio 2018, no se observan cambios por sexo, y no se aprecian variaciones por edad.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia una estabilización: pasa de 7,7% en 2018 a 5,8% en 2020 en el uso de riesgo de alcohol. En la desagregación por sexo respecto a 2018 no se observan cambios, y por tramos de edad no se aprecian variaciones.

TABLA 82
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol, según sexo y edad. Región de Tarapacá, 2008–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2008	7,9	10,1	5,5	9,0	6,9
2010	10,0	11,6	7,5	11,1	8,8
2012	5,3	6,2	4,1	7,2	3,0
2014	8,1	11,9	3,4	8,0	8,3
2016	7,0	7,2	6,8	5,9	8,1
2018	12,2	18,6	5,4	14,3	10,2
2020	10,0	13,4	5,5	11,1	9,1
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2008	5,0	6,9	3,3	5,3	4,8
2010	4,2	6,0	2,4	4,8	3,6
2012	2,4	3,3	1,6	3,5	1,3
2014	5,3	8,8	1,9	5,2	5,4
2016	3,9	4,6	3,2	3,2	4,6
2018	7,7	13,0	3,1	8,4	6,9
2020	5,8	8,8	2,7	6,1	5,4

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran un descenso significativo respecto al estudio anterior; por sexo se observa estabilidad en hombres y una variación significativa en mujeres; por edad se aprecia una variación estadísticamente significativa a la baja entre 12 y 34 años, y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. A su vez, la diferencia observada por sexo es una brecha estadísticamente significativa, mientras que la variación por tramos de edad no es significativa para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población muestra que un 21,0% de la población total de la Región de Tarapacá, entre 12 y 64 años, tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días; este resultado se traduce en un descenso significativo respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población muestra una diferencia estadísticamente significativa por sexo, no así por tramos de edad.

TABLA 83
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes, según sexo y edad. Región de Tarapacá, 2012–2020

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes (%)					
2012	75,9	82,5	65,7	81,7	66,6
2014	47,0	60,0	28,9	51,9	41,9
2016	53,4	58,3	46,4	58,4	49,2
2018	62,7	67,0	57,4	69,7	55,8
2020	50,9	58,5	39,1	53,6	48,9
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2012	18,8	24,4	13,1	23,8	13,4
2014	24,6	37,0	12,5	28,1	21,2
2016	19,9	27,5	13,3	19,1	20,8
2018	25,8	33,1	19,5	27,2	24,4
2020	21,0	29,4	12,7	20,7	21,3

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

A nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.

En la Región de Tarapacá, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana no varía significativamente respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 1,1 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana no presenta variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018, con una diferencia de 0,8 puntos porcentuales: pasa de 6,2% a 5,4% en el estudio actual.

TABLA 84
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región de Tarapacá, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	12,1	3,3	1,7
1996	21,1	3,6	2,0
1998	14,1	4,1	2,0
2000	25,3	6,2	2,5
2002	25,0	4,6	2,4
2004	26,7	8,8	5,8
2006	25,2	6,9	2,3
2008	22,0	7,4	3,2
2010	15,2	5,3	4,4
2012	9,7	3,7	2,5
2014	28,8	12,3	6,7
2016	19,7	7,9	4,1
2018	32,3	8,6	6,2
2020	31,2	7,7	5,4

La prevalencia de último año de marihuana no varía respecto al estudio anterior, pasando de 8,6% en el estudio 2018 a 7,7% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Tarapacá bajo el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 25
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año. Región de Tarapacá, 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo muestra estabilidad en ambos sexos respecto al estudio anterior; así, en hombres se observa una variación de 1,3 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 4,8% en 2018 a 3,8% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 13,7% en 2018 a 10,5% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 2,5 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 7,9 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 85
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad.
Región de Tarapacá, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	3,3	6,2	-	5,1	0,8
1996	3,6	6,4	0,9	5,6	0,5
1998	4,1	4,0	4,3	7,1	0,3
2000	6,2	8,8	3,1	10,0	1,8
2002	4,6	6,7	2,1	8,1	0,1
2004	8,8	13,5	3,6	14,0	3,0
2006	6,9	9,2	4,4	12,9	1,1
2008	7,4	9,3	5,5	11,5	2,8
2010	5,3	6,5	4,1	8,8	1,6
2012	3,7	6,2	1,1	4,4	2,8
2014	12,3	17,3	7,4	17,5	7,2
2016	7,9	12,1	4,3	12,0	3,4
2018	8,6	13,0	4,8	13,7	3,0
2020	7,7	11,7	3,8	10,5	5,5

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.


En la Región de Tarapacá, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 0,3 puntos porcentuales.

TABLA 86
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región de Tarapacá, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
1994	9,7	2,3
1996	7,3	1,2
1998	3,4	0,6
2000	11,7	2,0
2002	10,1	3,1
2004	11,6	3,8
2006	11,4	1,6
2008	8,1	2,6
2010	3,0	1,1
2012	1,9	0,4
2014	5,2	1,1
2016	3,1	0,4
2018	5,9	0,8
2020	5,6	0,9

La prevalencia de último año de cocaína total no varía significativamente respecto a la medición anterior, pasando de 0,8% en el estudio 2018 a 0,9% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Tarapacá sobre el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 26
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total en el último año. Región de Tarapacá, 1994-2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo muestra estabilidad en ambos sexos respecto al estudio anterior; así, en hombres se observa una variación de 0,4 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 0,2% en 2018 a un valor menor a 0,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 0,6% en 2018 a 0,8% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años se mantuvo en 1,0%.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 1,8 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 87
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total en el último año, según sexo y edad.
Región de Tarapacá, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	2,3	4,3	-	4,0	-
1996	1,2	2,4	-	1,6	0,6
1998	0,6	1,1	-	0,8	0,2
2000	2,0	3,0	0,8	2,8	1,1
2002	3,1	5,3	0,6	5,0	0,8
2004	3,8	4,4	3,2	6,6	0,7
2006	1,6	3,1	-	1,8	1,4
2008	2,6	4,4	0,8	3,5	1,7
2010	1,1	1,4	0,8	1,8	0,4
2012	0,4	0,7	-	0,2	0,5
2014	1,1	2,2	-	0,7	1,4
2016	0,4	0,8	-	0,5	0,3
2018	0,8	1,4	0,2	0,6	1,0
2020	0,9	1,8	<0,1	0,8	1,0

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región de Tarapacá, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas registra un descenso estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 15,5 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año desciende significativamente, con una diferencia de 9,8 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía, pasando de 18,0% a 15,3%.

TABLA 88
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región de Tarapacá, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	15,5	12,0	2,9
2008			
2010	3,2	3,0	1,6
2012	8,1	5,3	3,0
2014	36,3	27,3	14,2
2016	33,4	21,5	9,4
2018	55,0	37,0	18,0
2020	39,5	27,2	15,3

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio se observa un descenso estadísticamente significativo en la prevalencia de último año: pasa de 9,5% en 2018 a 2,2% en 2020. En la actual medición, la prevalencia alguna vez en la vida desciende significativamente (4,6% en 2020) y la medida de último mes no presenta cambios, variando 1,6 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 89
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región de Tarapacá, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2012	3,0	2,1	1,1
2014	10,7	8,2	2,4
2016	6,8	4,5	1,3
2018	16,5	9,5	3,2
2020	4,6	2,2	1,6

La desagregación del uso por sexo muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y una variación significativa a la baja en mujeres respecto a 2018; así, en hombres se observa una variación de 7,4 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 8,4% en 2018 a 1,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 14,7% en 2018 a 2,1% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 1,4 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 90
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Tarapacá, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	2,1	3,8	0,4	2,6	1,7
2014	8,2	14,4	2,2	15,7	0,9
2016	4,5	7,0	2,4	6,8	2,0
2018	9,5	10,7	8,4	14,7	3,6
2020	2,2	3,3	1,1	2,1	2,2

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región de Tarapacá, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra un descenso estadísticamente significativo en el caso de tabaco, que pasa de 8,8% en 2018 a 4,5% en 2020; en alcohol se registra una baja significativa con una brecha de 14,1 puntos porcentuales, y para marihuana llega a 1,1% tras no mostrar cambios significativos, con una diferencia de 0,4 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

TABLA 91
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región de Tarapacá, 1994-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	15,3	26,2	1,7
1996	5,5	21,8	0,9
1998	5,6	10,8	0,9
2000	5,5	19,3	0,3
2002	9,6	20,5	0,1
2004	5,6	20,7	1,1
2006	12,3	21,9	1,7
2008	12,0	20,3	1,5
2010	13,6	16,5	2,9
2012	9,1	24,2	0,9
2014	7,5	22,1	4,3
2016	7,5	15,0	2,1
2018	8,8	26,9	1,5
2020	4,5	12,8	1,1

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente se mantiene estable en la Región de Tarapacá, pasando de 89,3% en 2018 a 89,8% en 2020, y se ubica sobre el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 43,0% en 2020, con una diferencia de 8,5 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (aumento estadísticamente significativo), lo que ubica a la región sobre la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco no ha mostrado cambios respecto a 2018, estableciéndose sobre el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) se mantiene estable, pasando de 44,5% en 2018 a 43,1% en 2020, y ubica a la Región de Tarapacá sobre el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 72,2% en 2020, con una diferencia de 1,2 puntos porcentuales respecto a 2018 (se ha mantenido estable); este resultado ubica a la región sobre la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) muestra un descenso estadísticamente significativo en esta versión del estudio: de 83,2% en 2018 a 78,1% en 2020; así, la región queda por sobre el promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base varía significativamente respecto a 2018 de 89,2% a 82,5% en 2020, ubicándose sobre el promedio nacional (80,0%).

TABLA 92
Evolución de percepción de riesgo. Región de Tarapacá, 2000-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	Diario
2000							84,5		81,4
2002							83,0		82,9
2004							86,1		83,8
2006	49,9	88,1	72,9	97,9	73,5	98,2	85,5		84,4
2008	52,0	89,8	75,4	95,3	79,1	96,7	81,6		82,1
2010	44,2	65,1	55,2	77,6	59,8	81,4	71,8		65,0
2012	80,5	86,2	88,0	93,4	91,3	93,0	88,7		88,6
2014	44,7	70,0	77,4	92,7	82,4	94,0	87,9		89,6
2016	52,4	75,4	83,5	91,4	87,6	92,1	86,8	41,6	85,0
2018	44,5	73,4	83,2	96,2	89,2	96,4	89,3	34,5	83,0
2020	43,1	72,2	78,1	94,8	82,5	94,7	89,8	43,0	84,1
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la región desciende significativamente respecto a 2018, pasando de 18,7% a 11,4% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 2,4 puntos porcentuales, lo que se traduce en estabilidad respecto al estudio pasado, y para pasta base no se observan variaciones estadísticamente significativas, pasando de 4,0% en el estudio 2018 a 1,8% en el estudio actual.

TABLA 93

Exposición a ofertas de drogas en el último año. Región de Tarapacá, 2002-2020.

Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año


Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	16,5	2,8	9,6
2004	20,0	5,9	11,7
2006	18,6	4,2	10,5
2008	14,7	2,7	6,0
2010	10,1	3,8	3,5
2012	9,7	4,7	4,3
2014	16,8	6,3	5,9
2016	12,9	4,4	1,9
2018	18,7	5,4	4,0
2020	11,4	3,0	1,8

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana estabilidad, con una diferencia de 1,9 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (54,1% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 29,4% en 2018 a 36,0% en 2020, lo que representa un aumento estadísticamente significativo respecto a 2018; para pasta base se mantiene estable con una variación de 3,5 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 27

Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región de Tarapacá, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS EN EL BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "consumo de drogas en lugares públicos como en la calle o plazas" y el menor es "venta clandestina de alcohol".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región de Tarapacá muestra un descenso estadísticamente significativo, pasando de 31,2% en 2018 a 21,4% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" no registra variaciones significativas, con una diferencia de 3,0 puntos porcentuales respecto a 2018. Respecto a las otras categorías descritas, se observan variaciones significativas en todas las categorías restantes con excepción de "balaceras y acciones violentas con arma de fuego".

GRÁFICO 28

Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Región de Tarapacá, 2016-2020.



Región de Antofagasta

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región de Antofagasta la muestra efectiva fue de 665 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 303 son hombres y 362 mujeres, 298 tienen entre 12 y 34 años y 367 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 449.930 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

Las comunas incluidas en esta versión del estudio fueron Antofagasta y Calama.

TABLA 94
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región de Antofagasta.

	Sexo		Tramos de edad		Total
	Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64	
Porcentaje	45,6	54,4	44,8	55,2	100
Muestra (N)	303	362	298	367	665
Población	223.900	226.029	219.356	230.573	449.930

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.

En la Región de Antofagasta, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos sube significativamente respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 8,9 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año desciende significativamente con una diferencia de 6,9 puntos porcentuales respecto a 2018, mientras que el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 33,2% a 26,6%.

TABLA 95
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región de Antofagasta, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	65,7	46,2	40,3	
1996	63,9	42,8	37,5	
1998	70,2	45,7	39,0	
2000	69,0	47,4	41,6	
2002	67,8	47,3	42,0	28,3
2004	69,3	48,5	42,1	29,3
2006	66,0	46,4	39,5	25,5
2008	62,7	42,8	37,1	24,4
2010	54,3	38,0	33,5	23,3
2012	67,0	44,2	40,1	21,9
2014	51,0	29,9	26,9	14,6
2016	52,3	33,3	29,2	19,4
2018	53,3	38,3	33,2	18,7
2020	62,2	31,4	26,6	15,5

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) se ha mantenido estable respecto a la medición anterior, pasando de 18,7% en el estudio 2018 a 15,5% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Antofagasta bajo el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 29
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región de Antofagasta, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; así, en hombres se observa una variación de 3,4 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 14,8% en 2018 a 12,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto al estudio anterior. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 13% en 2018 a 10,3% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 3,7 puntos porcentuales respecto al estudio 2018.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 6,8 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada sí es significativa para 2020.

TABLA 96
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región de Antofagasta, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	28,3	33,5	22,6	29,2	27,3
2004	29,3	29,8	28,7	30,4	27,9
2006	25,5	32,5	17,7	21,4	30,2
2008	24,4	29,6	18,6	21,0	28,2
2010	23,3	25,4	20,9	18,1	27,6
2012	21,9	25,6	17,9	18,3	26,0
2014	14,6	13,0	16,4	10,5	19,2
2016	19,4	19,5	19,3	18,2	20,5
2018	18,7	22,3	14,8	13,0	24,1
2020	15,5	18,9	12,1	10,3	20,4

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.


En la Región de Antofagasta, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol sube significativamente respecto al estudio anterior, observándose una variación de 12,8 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año se mantuvo sin variaciones respecto a 2018, manteniéndose en 55,4%.

TABLA 97
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región de Antofagasta, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	75,9	63,9	39,0
1996	81,9	63,4	42,2
1998	83,6	70,2	51,2
2000	86,1	74,7	56,1
2002	78,6	67,4	53,1
2004	80,5	69,7	52,4
2006	77,9	63,6	48,5
2008	75,3	60,6	42,7
2010	61,4	49,4	31,8
2012	80,9	62,5	45,1
2014	62,6	48,4	33,4
2016	62,9	50,3	35,6
2018	72,1	55,4	40,4
2020	84,9	55,4	41,9

La prevalencia de último mes de alcohol no varía significativamente: pasa de 40,4% en el estudio 2018 a 41,9% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Antofagasta bajo el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 30
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes. Región de Antofagasta, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 3,1 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 33,5% en 2018 a 34% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y aumento estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años, la prevalencia pasa de 39,3% en 2018 a

32,1% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 9,8 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 15,8 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 98
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes, según sexo y edad.
Región de Antofagasta, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	39,0	51,7	25,5	38,1	40,4
1996	42,2	53,8	29,7	42,9	41,3
1998	51,2	63,0	38,3	47,2	56,5
2000	56,1	65,9	45,3	51,1	62,5
2002	53,1	62,0	43,1	50,9	55,7
2004	52,4	63,2	40,5	48,8	56,7
2006	48,5	60,7	35,0	43,8	54,0
2008	42,7	55,6	28,4	43,9	41,5
2010	31,8	41,6	21,1	30,7	32,8
2012	45,1	53,9	35,4	45,3	44,9
2014	33,4	36,1	30,5	27,7	39,9
2016	35,6	42,7	27,9	37,5	33,9
2018	40,4	46,7	33,5	39,3	41,4
2020	41,9	49,8	34,0	32,1	51,2

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región de Antofagasta, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, mostró una variación estadísticamente significativa a la baja respecto al estudio anterior, pasando de 13,7% en 2018 a 6,3% en 2020. La diferencia observada de 1,7 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa; de igual forma, la brecha observada entre ambos tramos de edad no es significativa para 2020. Respecto al estudio 2018, se observa una variación estadísticamente significativa en hombres y estabilidad en mujeres, mientras que por edad se observa una variación estadísticamente significativa en el tramo de 12 a 34 años y se aprecia estabilidad entre 35 y 64 años.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia un descenso significativo: pasa de 7,6% en 2018 a 3,5% en 2020 en el uso de riesgo de alcohol. La desagregación por sexo, respecto a 2018, muestra una variación estadísticamente significativa en hombres y estabilidad en mujeres; por otro lado, por tramos de

edad se aprecia una variación estadísticamente significativa en el tramo de 12 a 34 años y se aprecia estabilidad en el tramo de 35 a 64 años.

TABLA 99
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol, según sexo y edad. Región de Antofagasta, 2008–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2008	10,0	13,3	5,0	13,3	6,7
2010	3,7	5,5	0,4	3,3	3,9
2012	10,0	15,4	3,3	13,1	6,8
2014	10,4	12,1	8,1	10,1	10,6
2016	7,3	7,3	7,2	12,5	2,8
2018	13,7	15,6	11,1	18,2	9,7
2020	6,3	7,0	5,3	7,9	5,1
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2008	6,1	9,2	2,6	7,7	4,2
2010	1,8	3,3	0,2	1,5	2,1
2012	6,3	10,2	1,9	8,0	4,3
2014	5,0	6,3	3,6	4,2	6,0
2016	3,7	4,3	2,9	6,0	1,5
2018	7,6	9,8	5,3	10,0	5,4
2020	3,5	4,6	2,4	3,8	3,2

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran un descenso significativo respecto al estudio anterior; por sexo se aprecian variaciones significativas en hombres y mujeres, y por edad se observa una variación estadísticamente significativa en ambos tramos de edad. A su vez, la diferencia observada por sexo es una brecha estadísticamente significativa, al igual que por tramos de edad.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población muestra que un 14,7% de la población total de la Región de Antofagasta, entre 12 y 64 años, tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días; lo anterior se traduce en un descenso significativo respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población muestra una diferencia estadísticamente significativa por sexo, no así por tramos de edad.

TABLA 100
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes, según sexo y edad. Región de Antofagasta, 2012–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes (%)					
2012	43,4	53,1	27,1	50,5	35,4
2014	62,0	68,3	53,8	69,4	56,2
2016	42,6	42,5	42,9	51,6	33,5
2018	69,9	73,9	63,8	74,2	66,1
2020	35,0	40,7	26,8	43,5	29,9
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2012	19,6	28,6	9,6	22,9	15,9
2014	20,7	24,6	16,4	19,2	22,4
2016	15,2	18,1	12,0	19,3	11,3
2018	28,2	34,5	21,4	29,1	27,3
2020	14,7	20,2	9,1	14,0	15,3

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

Anivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.

En la Región de Antofagasta, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana no varía respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 6,8 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana no presenta variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018, con una diferencia de 1,4 puntos porcentuales: pasa de 7,2% a 5,8% en el estudio actual.


TABLA 101
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región de Antofagasta, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	8,7	1,5	0,6
1996	4,1	0,8	0,5
1998	13,9	3,1	1,1
2000	19,3	5,3	1,7
2002	18,8	2,6	1,2
2004	18,1	2,6	1,1
2006	22,7	4,3	2,0
2008	22,7	4,7	2,3
2010	13,8	2,5	1,1
2012	21,7	7,4	4,8
2014	18,9	5,5	3,0
2016	20,0	5,7	2,4
2018	26,2	9,2	7,2
2020	33,0	8,5	5,8

La prevalencia de último año de marihuana no varía, pasando de 9,2% en el estudio 2018 a 8,5% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Antofagasta bajo el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 31

Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año. Región de Antofagasta, 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo muestra estabilidad en ambos sexos respecto al estudio anterior; así, en hombres se observa una variación de 0,6 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 5,6% en 2018 a 4,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 13,7% en 2018 a 14,1% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 1,7 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 8,9 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 102
Evolución de prevalencias (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad.
Región de Antofagasta, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	1,5	2,0	1,0	2,6	0,0
1996	0,8	1,6	0,0	1,4	0,0
1998	3,1	5,4	0,5	5,4	0,0
2000	5,3	7,0	3,4	8,3	1,5
2002	2,6	4,6	0,4	4,1	0,7
2004	2,6	3,0	2,2	4,6	0,2
2006	4,3	6,0	2,5	6,7	1,6
2008	4,7	6,2	3,1	8,0	1,1
2010	2,5	4,2	0,6	5,2	0,2
2012	7,4	10,4	4,0	13,9	0,1
2014	5,5	5,3	5,7	8,2	2,5
2016	5,7	4,5	6,9	8,3	3,2
2018	9,2	12,4	5,6	13,7	4,9
2020	8,5	13,0	4,1	14,1	3,2

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.

En la Región de Antofagasta, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total no varía respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 1,1 puntos porcentuales.

TABLA 103
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región de Antofagasta, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
1994	4,2	0,8
1996	1,9	0,4
1998	4,7	1,5
2000	6,0	0,9
2002	4,4	0,9
2004	4,8	0,7
2006	7,4	1,7
2008	7,4	1,6
2010	4,2	0,7
2012	4,8	1,2
2014	3,7	0,8
2016	2,6	0,1
2018	6,6	1,2
2020	5,5	0,5

La prevalencia de último año de cocaína total no varía significativamente respecto a la medición anterior, pasando de 1,2% en el estudio 2018 a 0,5% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Antofagasta bajo el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 32
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año. Región de Antofagasta, 1994-2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo muestra estabilidad en ambos sexos respecto al estudio anterior; así, en hombres se observa una variación de 0,2 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 1,6% en 2018 a 0,5% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 1,2% en 2018 a 0,1% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,1 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 0,1 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa.

A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 104
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año, según sexo y edad.
Región de Antofagasta, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	0,8	0,7	0,8	0,3	1,4
1996	0,4	0,6	0,2	0,7	-
1998	1,5	2,8	-	2,6	-
2000	0,9	1,6	0,1	1,5	0,1
2002	0,9	1,4	0,2	1,4	0,2
2004	0,7	0,8	0,6	1,3	-
2006	1,7	2,7	0,5	2,1	1,1
2008	1,6	2,5	0,6	1,9	1,2
2010	0,7	1,2	-	0,5	0,8
2012	1,2	1,7	0,7	2,3	-
2014	0,8	1,1	0,4	0,9	0,7
2016	0,1	0,2	-	0,2	-
2018	1,2	0,8	1,6	1,2	1,1
2020	0,5	0,6	0,5	0,1	1,0

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región de Antofagasta, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas registra un aumento estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 19,9 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año aumenta significativamente, con una diferencia de 11,9 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes muestra una variación significativa al alza, pasando de 14,1% a 23,2%.

TABLA 105
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región de Antofagasta, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	17,3	12,3	3,3
2008	0,0	0,0	0,0
2010	13,3	9,6	5,6
2012	38,5	31,0	16,8
2014	36,5	25,4	14,1
2016	33,4	24,8	12,6
2018	40,1	29,6	14,1
2020	60,0	41,5	23,2

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio no se observan variaciones en la prevalencia de último año: pasa de 8,0% en 2018 a 6,2% en 2020. En la actual medición, la prevalencia alguna vez en la vida se mantiene (11,7% en 2020) y la medida de último mes no presenta cambios, variando 1,8 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 106
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región de Antofagasta, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2012	7,7	6,5	3,4
2014	8,0	4,7	2,1
2016	9,3	5,1	2,9
2018	12,1	8,0	4,1
2020	11,7	6,2	2,3

La desagregación del uso por sexo muestra estabilidad en hombres y una variación significativa a la baja en mujeres respecto a 2018; así, en hombres se observa una variación de 0,5 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 6,6% en 2018 a 2,7% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones respecto al estudio anterior. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 7,6% en 2018 a 8,9% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 4,7 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 107
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Antofagasta, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	6,5	7,9	4,9	11,7	0,7
2014	4,7	4,3	5,2	7,2	1,9
2016	5,1	7,0	3,1	9,3	1,3
2018	8,0	9,2	6,6	7,6	8,3
2020	6,2	9,7	2,7	8,9	3,6

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región de Antofagasta, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra un descenso estadísticamente significativo en el caso de tabaco, que pasa de 20,1% en 2018 a 1,1% en 2020; en alcohol se registra una baja significativa con una brecha de 28,6 puntos porcentuales, y para marihuana llega a 0,4% tras mostrar un descenso estadísticamente significativo de 2,3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

TABLA 108
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región de Antofagasta, 1994-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	16,8	32,9	0,7
1996	11,3	22,9	0,4
1998	3,6	11,1	0,7
2000	11,3	32,8	1,1
2002	13,1	32,7	0,7
2004	4,3	13,5	0,7
2006	16,7	30,0	1,4
2008	15,0	27,5	1,6
2010	10,6	18,6	0,4
2012	7,7	16,7	1,0
2014	9,8	17,9	2,2
2016	13,2	17,2	2,5
2018	20,1	33,1	2,7
2020	1,1	4,5	0,4

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente aumenta significativamente en la Región de Antofagasta, pasando de 76,5% en 2018 a 95,4% en 2020, y se ubica sobre el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 31,0% en 2020, con una diferencia de 22,3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (descenso estadísticamente significativo), lo que ubica a la región debajo de la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco varía significativamente al alza respecto a 2018, estableciéndose sobre el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) desciende significativamente, pasando de 48,8% en 2018 a 35,1% en 2020, y ubica a la Región de Antofagasta sobre el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 77,6% en 2020, con una diferencia de 8,0 puntos porcentuales respecto a 2018 (aumento estadísticamente significativo); este resultado ubica a la región sobre la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) se ha mantenido estable respecto a 2018: de 76,1% a 76,9% en 2020; así, la región queda por sobre el promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base varía significativamente de 83,4% en 2018 a 88,6% en 2020, ubicándose sobre el promedio nacional (80,0%).

TABLA 109
Evolución de percepción de riesgo. Región de Antofagasta, 2000-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	Diario
2000							90,1		88,7
2002							90,9		89,9
2004							86,8		85,2
2006	53,6	91,1	74,9	98,1	78,8	98,2	85,2		85,1
2008	52,2	86,9	76,6	97,8	80,0	97,9	84,7		80,8
2010	65,7	85,0	80,5	88,3	83,6	91,6	83,2		81,9
2012	54,3	82,9	82,9	95,0	88,8	94,8	85,9		87,4
2014	55,7	75,8	80,4	93,2	85,6	93,3	84,4		82,3
2016	36,3	67,2	66,6	86,8	73,2	88,0	79,1	32,0	74,4
2018	48,8	69,6	76,1	85,7	83,4	88,1	76,5	53,3	71,3
2020	35,1	77,6	76,9	98,2	88,6	99,0	95,4	31,0	89,4
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la región se mantiene estable respecto a 2018, pasando de 16,4% a 14,7% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 2,6 puntos porcentuales, lo que se traduce en estabilidad respecto al estudio pasado, y para pasta base desciende significativamente, pasando de 6,1% en el estudio 2018 a 1,7% en el estudio actual.

TABLA 110
Exposición a ofertas de drogas en el último año.
Región de Antofagasta, 2002-2020.

Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año


Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	12,2	2,5	3,9
2004	12,7	3,3	5,2
2006	15,6	3,8	6,3
2008	15,4	4,0	3,1
2010	10,8	3,0	3,7
2012	16,0	7,0	4,6
2014	13,9	4,0	2,9
2016	12,4	5,4	2,9
2018	16,4	6,1	6,1
2020	14,7	3,5	1,7

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana estabilidad, con una diferencia de 7,9 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (49,0% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 25,8% en 2018 a 26,8% en 2020, lo que significa mantenerse sin cambios respecto a 2018; para pasta base se mantiene estable con una variación de 1,9 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 33

Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región de Antofagasta, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS EN EL BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "consumo de drogas en lugares públicos como en la calle o plazas" y el menor es "venta clandestina de alcohol".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región de Antofagasta muestra estabilidad, pasando de 26,6% en 2018 a 21,1% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" registra un descenso estadísticamente significativo, con una diferencia de 9,2 puntos porcentuales respecto a 2018. Respecto a las otras categorías descritas, no se observan variaciones significativas en ninguno de los otros indicadores.

GRÁFICO 34

Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Región de Antofagasta, 2016-2020.



Región de Atacama

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región de Atacama la muestra efectiva fue de 819 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 346 son hombres y 473 mujeres, 346 tienen entre 12 y 34 años y 473 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 156.741 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

Las comunas incluidas en esta versión del estudio fueron Copiapó y Vallenar.

TABLA 111
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región de Atacama.

	Sexo		Tramos de edad		Total
	Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64	
Porcentaje	42,2	57,8	42,2	57,8	100
Muestra (N)	346	473	346	473	819
Población	80.066	76.675	77.872	78.869	156.741

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.


En la Región de Atacama, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 6,2 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año desciende significativamente, con una diferencia de 7,1 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 32,0% a 26,4%.

TABLA 112
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región de Atacama, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	60,7	47,8	39,8	
1996	65,2	44,8	38,5	
1998	66,4	44,7	37,1	
2000	71,7	50,9	45,0	
2002	68,7	49,3	44,0	29,3
2004	71,0	46,5	41,6	28,5
2006	70,6	50,5	43,2	27,0
2008	72,2	50,8	43,5	26,5
2010	55,7	36,9	34,4	22,6
2012	52,8	34,3	30,9	18,7
2014	55,4	38,5	31,7	20,0
2016	52,5	35,3	32,2	18,3
2018	62,7	38,1	32,0	20,5
2020	56,5	31,0	26,4	13,4

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) desciende significativamente respecto a la medición anterior, pasando de 20,5% en el estudio 2018 a 13,4% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Atacama bajo el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 35
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región de Atacama, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; así, en hombres se observa una variación de 11,0 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 18,4% en 2018 a 15,2% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y un descenso estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 11,0% en 2018 a 8,9% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 10,4 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 3,6 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 113
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región de Atacama, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	29,3	35,4	23,2	27,7	31,2
2004	28,5	32,6	24,4	31,5	25,3
2006	27,0	30,5	23,4	22,8	31,5
2008	26,5	29,3	23,6	24,4	28,6
2010	22,6	27,0	18,1	24,4	20,7
2012	18,7	19,9	17,6	16,0	20,8
2014	20,0	24,4	15,7	14,3	24,5
2016	18,3	16,9	19,7	10,5	26,0
2018	20,5	22,6	18,4	11,0	28,2
2020	13,4	11,6	15,2	8,9	17,8

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.

En la Región de Atacama, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 4,0 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 5,1 puntos porcentuales respecto a 2018: pasa de 59,2% a 64,3%.

TABLA 114
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región de Atacama, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	70,7	60,7	35,3
1996	82,9	69,1	38,7
1998	85,0	70,8	45,6
2000	83,9	71,3	50,4
2002	81,9	70,3	52,1
2004	81,0	69,1	51,6
2006	80,2	67,7	44,7
2008	79,9	67,0	48,8
2010	66,2	56,3	35,6
2012	71,2	50,5	36,2
2014	69,4	56,3	43,6
2016	69,2	51,5	35,7
2018	76,2	59,2	42,7
2020	80,2	64,3	47,2

La prevalencia de último mes de alcohol no varía significativamente, pasando de 42,7% en el estudio 2018 a 47,2% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Atacama sobre el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 36
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el
último mes. Región de Atacama, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 6,8 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 34,3% en 2018 a 35,9% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa

de 39,6% en 2018 a 47,4% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 1,7 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 22,1 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 115
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el
último mes, según sexo y edad.
Región de Atacama, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	35,3	53,3	17,0	32,6	39,1
1996	38,7	49,5	27,7	40,1	36,8
1998	45,6	57,1	33,9	43,0	48,8
2000	50,4	63,1	37,5	47,7	53,5
2002	52,1	62,6	41,5	51,7	52,5
2004	51,6	61,4	41,7	46,8	56,9
2006	44,7	59,4	29,7	44,7	44,6
2008	48,8	60,0	37,5	52,7	44,7
2010	35,6	49,1	21,7	32,4	38,9
2012	36,2	50,9	21,3	32,7	39,0
2014	43,6	53,5	33,9	38,5	47,7
2016	35,7	41,7	29,8	32,4	39,0
2018	42,7	51,2	34,3	39,6	45,3
2020	47,2	58,0	35,9	47,4	47,0

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región de Atacama, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, no mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 13,6% en 2018 a 9,7% en 2020. La diferencia observada de 11,1 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio 2018, no se observan cambios por sexo, mientras que por edad se aprecia una variación estadísticamente significativa en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia una estabilización en el uso de riesgo de alcohol: pasa de 8,1% en 2018 a 6,2% en 2020. En la desagregación por sexo y edad, no se aprecian variaciones respecto a 2018.

TABLA 116
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol, según sexo y edad. Región de Atacama, 2008–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2008	15,7	21,9	7,9	19,3	11,7
2010	8,0	9,0	6,5	10,4	5,9
2012	8,1	12,8	0,3	16,0	3,1
2014	12,2	16,4	6,2	11,6	12,7
2016	13,0	17,4	7,4	15,9	10,5
2018	13,6	19,4	5,9	21,2	8,0
2020	9,7	14,4	3,3	11,2	8,3
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2008	10,5	16,3	4,7	13,4	7,5
2010	4,5	6,1	2,9	5,5	3,5
2012	4,1	8,0	0,1	7,1	1,7
2014	6,9	11,0	2,8	6,0	7,6
2016	6,7	10,0	3,4	7,5	5,9
2018	8,1	13,1	3,0	11,9	4,9
2020	6,2	10,4	1,9	7,1	5,4

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran una estabilización respecto al estudio anterior; por sexo se observa una variación estadísticamente significativa en hombres y estabilidad en mujeres; por edad no se aprecian cambios. A su vez, las brechas observadas por sexo y edad no son estadísticamente significativas para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población significa que un 30,4% de la población total de la Región de Atacama entre 12 y 64 años tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días, lo que se traduce en una estabilización respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población muestra una diferencia estadísticamente significativa por sexo y no se aprecian diferencias por tramos de edad.

TABLA 117
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes, según sexo y edad. Región de Atacama, 2012–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes (%)					
2012	36,0	43,2	18,3	50,9	26,1
2014	56,5	64,2	44,4	65,2	51,0
2016	42,0	47,3	34,7	53,6	32,4
2018	69,3	76,4	58,7	75,5	65,0
2020	64,4	65,5	62,5	66,5	62,4
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2012	13,0	22,0	3,9	16,6	10,2
2014	24,7	34,4	15,1	25,1	24,3
2016	15,0	19,7	10,3	17,4	12,6
2018	29,6	39,1	20,1	29,9	29,4
2020	30,4	38,0	22,5	31,5	29,3

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

A nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.

En la Región de Atacama, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 2,4 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana no presenta variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018, con una diferencia de 1,5 puntos porcentuales: pasa de 6,3% a 4,8% en el estudio actual.

TABLA 118
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región de Atacama, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	9,5	2,8	0,0
1996	13,3	3,8	1,5
1998	16,4	6,5	3,5
2000	17,3	3,7	1,7
2002	18,2	3,9	2,0
2004	19,2	4,0	1,3
2006	20,8	6,4	1,8
2008	26,1	4,9	3,4
2010	16,8	2,2	0,2
2012	15,7	4,4	3,5
2014	27,3	10,0	5,4
2016	22,3	8,0	3,7
2018	31,4	9,3	6,3
2020	29,0	7,2	4,8

La prevalencia de último año de marihuana no varía respecto a la medición anterior, pasando de 9,3% en el estudio 2018 a 7,2% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Atacama bajo el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 37
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año. Región de Atacama, 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 5,8 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 4,3% en 2018 a 6,0% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto al estudio anterior. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa

de 15,3% en 2018 a 11,9% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 1,8 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 2,4 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 119
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad.
Región de Atacama, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	2,8	5,5	-	4,8	-
1996	3,8	5,4	2,2	6,6	0,2
1998	6,5	11,4	1,6	9,1	3,4
2000	3,7	6,2	1,1	6,1	0,8
2002	3,9	6,7	1,1	6,2	1,3
2004	4,0	6,4	1,7	7,0	0,8
2006	6,4	7,3	5,4	11,8	0,7
2008	4,9	6,1	3,7	9,1	0,6
2010	2,2	1,6	2,9	3,4	1,1
2012	4,4	6,9	1,9	8,5	1,2
2014	10,0	9,8	10,2	18,0	3,8
2016	8,0	11,5	4,4	12,3	3,6
2018	9,3	14,2	4,3	15,3	4,4
2020	7,2	8,4	6,0	11,9	2,6

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.

En la Región de Atacama, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 1,7 puntos porcentuales.

TABLA 120
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región de Atacama, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
1994	2,3	0,5
1996	4,2	0,6
1998	4,6	1,8
2000	4,6	0,5
2002	4,2	0,6
2004	4,4	0,2
2006	5,3	1,6
2008	7,5	1,1
2010	2,6	<0,1
2012	2,9	1,8
2014	4,6	1,8
2016	2,8	0,4
2018	4,9	2,1
2020	3,2	<0,1

La prevalencia de último año de cocaína total muestra una disminución estadísticamente significativa, pasando de 2,1% en el estudio 2018 a un valor menor a 0,1% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Atacama bajo el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 38
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año. Región de Atacama, 1994-2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y sin cambios en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 4,0 puntos porcentuales y en mujeres no se reportan casos en 2020 (0,1% en 2018). Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 1,9% en 2018 a no presentar casos en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 2,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 0,1 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 121
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año, según sexo y edad.
Región de Atacama, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	0,5	0,9	-	0,8	-
1996	0,6	1,0	0,3	1,1	0,1
1998	1,8	3,2	0,3	1,9	1,6
2000	0,5	0,7	0,2	0,9	-
2002	0,6	1,1	-	0,9	0,1
2004	0,2	0,4	-	0,4	-
2006	1,6	1,4	1,7	3,0	0,1
2008	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7
2010	<0,1	-	0,1	0,1	-
2012	1,8	3,6	-	4,1	-
2014	1,8	0,3	3,2	2,6	1,1
2016	0,4	0,7	-	0,7	-
2018	2,1	4,1	0,1	1,9	2,3
2020	<0,1	0,1	-	-	0,1

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región de Atacama, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 4,6 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 2,4 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía, pasando de 17,7% a 18,6% en el estudio actual.

TABLA 122
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región de Atacama, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	15,4	11,8	5,1
2008			
2010	15,7	10,4	6,6
2012	20,0	14,9	6,3
2014	37,5	28,1	14,5
2016	41,7	30,3	13,1
2018	50,0	32,4	17,7
2020	45,4	30,0	18,6

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio se observa un descenso estadísticamente significativo en la prevalencia de último año: pasa de 8,3% en 2018 a 4,5% en 2020. En la actual medición, la prevalencia alguna vez en la vida baja significativamente (7,4% en 2020) y la medida de último mes desciende significativamente 3,2 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 123
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región de Atacama, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2012	5,1	3,4	0,6
2014	11,4	7,9	4,4
2016	7,1	3,7	1,5
2018	12,3	8,3	4,4
2020	7,4	4,5	1,2

La desagregación del uso por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; así, en hombres se observa una variación de 6,2 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 3,2% en 2018 a 1,7% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 15,7% en 2018 a 7,4% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 0,6 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 124
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Atacama, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	3,4	5,6	1,2	6,6	0,9
2014	7,9	11,0	4,7	13,4	3,5
2016	3,7	3,2	4,2	6,0	1,4
2018	8,3	13,5	3,2	15,7	2,4
2020	4,5	7,3	1,7	7,4	1,8

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región de Atacama, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra estabilidad en el caso de tabaco, que pasa de 14,0% en 2018 a 9,7% en 2020; en alcohol se registra estabilidad respecto al estudio anterior (30,7% para ambos periodos), y para marihuana llega a 1,8% tras no mostrar cambios significativos, con una diferencia de 0,9 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

TABLA 125
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región de Atacama, 1994-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	13,5	23,7	0,7
1996	4,0	8,4	0,9
1998	3,9	16,0	2,4
2000	2,9	9,8	0,3
2002	3,2	15,5	0,7
2004	2,5	6,3	1,8
2006	5,7	15,6	2,1
2008	8,7	16,6	0,3
2010	11,0	25,8	1,4
2012	3,4	7,2	0,2
2014	18,8	26,9	5,3
2016	16,1	30,2	3,6
2018	14,0	30,7	2,7
2020	9,7	30,7	1,8

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente desciende significativamente en la Región de Atacama, pasando de 91,7% en 2018 a 85,8% en 2020, y se ubica sobre el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 33,7% en 2020, con una variación significativa a la baja de 11,6 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, lo que ubica a la región bajo la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco no ha mostrado cambios respecto a 2018, estableciéndose sobre el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) se mantiene estable, pasando de 44,6% en 2018 a 35,7% en 2020, y ubica a la Región de Atacama sobre el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 68,8% en 2020, con una diferencia de 7,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (se ha mantenido estable); este resultado ubica a la región sobre la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) se ha mantenido estable en esta versión del estudio: de 84,6% en 2018 a 80,8% en 2020; así, la región queda por sobre el promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base baja significativamente de 91,6% en 2018 a 84,8% en 2020, ubicándose sobre el promedio nacional (80,0%).

TABLA 126
Evolución de percepción de riesgo. Región de Atacama, 2000-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	
2000							86,8		87,5
2002							85,6		89,6
2004							85,5		85,8
2006	60,0	93,8	78,7	99,0	81,2	98,5	87,4		84,7
2008	50,8	89,5	75,7	96,8	78,4	96,3	88,7		84,6
2010	59,0	91,2	81,8	95,6	85,2	97,0	89,5		82,0
2012	53,5	79,4	84,9	97,4	88,6	97,2	90,2		88,1
2014	44,8	75,0	74,4	93,9	84,5	93,8	84,7		86,5
2016	39,8	80,5	70,3	95,8	77,9	95,9	94,3	32,4	90,1
2018	44,6	76,0	84,6	97,1	91,6	97,0	91,7	45,3	86,3
2020	35,7	68,8	80,8	92,7	84,8	93,2	85,8	33,7	81,4
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la Región de Atacama desciende significativamente respecto a 2018, pasando de 18,2% a 11,0% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 3,0 puntos porcentuales, lo que se traduce en una variación significativa a la baja respecto al estudio pasado, y para pasta base desciende significativamente, pasando de 4,0% en el estudio 2018 a 1,4% en el estudio actual.

TABLA 127
Exposición a ofertas de drogas en el último año.
Región de Atacama, 2002-2020.

Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año


Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	14,5	1,7	1,9
2004	9,5	1,1	2,5
2006	15,6	1,1	5,9
2008	15,6	2,6	4,3
2010	9,4	0,7	2,0
2012	10,8	4,0	4,0
2014	13,3	1,9	4,3
2016	13,5	2,2	2,5
2018	18,2	5,3	4,0
2020	11,0	2,3	1,4

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana una variación significativa a la baja, con una diferencia de 12,1 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (36,2% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 21,4% en 2018 a 15,5% en 2020, lo que significa mantenerse sin cambios respecto a 2018; para pasta base, este indicador desciende significativamente con una variación de 9,9 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 39

Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región de Atacama, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE SITUACIÓN EN BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "consumo de drogas en lugares públicos como en la calle o plazas" y el menor es "venta clandestina de alcohol".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región de Atacama muestra un descenso estadísticamente significativo, pasando de 33,1% en 2018 a 20,4% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" no registra variaciones significativas, con una diferencia de 1,4 puntos porcentuales respecto a 2018. En las otras categorías descritas, se observan variaciones estadísticamente significativas en "robos en las casas", "consumo de drogas en lugares públicos como en la calle o plazas" y "jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas".

GRÁFICO 40

Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Región de Atacama, 2016-2020.



Región de Coquimbo

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región de Coquimbo la muestra efectiva fue de 565 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 223 son hombres y 342 mujeres, 229 tienen entre 12 y 34 años y 336 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 399.840 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

Las comunas incluidas en esta versión del estudio fueron La Serena, Coquimbo y Ovalle.

TABLA 128
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región de Coquimbo.

	Sexo		Tramos de edad		Total
	Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64	
Porcentaje	39,5	60,5	40,5	59,5	100
Muestra (N)	223	342	229	336	565
Población	194.354	205.486	191.154	208.686	399.840

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.


En la Región de Coquimbo, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 1,1 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 4,4 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 28,9% a 25,0%.

TABLA 129
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región de Coquimbo, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	56,4	42,2	36,1	
1996	67,4	44,8	35,9	
1998	64,9	43,4	35,0	
2000	68,1	49,4	43,2	
2002	69,2	47,6	41,7	27,5
2004	71,1	49,2	43,9	29,1
2006	62,3	45,3	42,5	26,4
2008	72,3	49,3	39,9	27,6
2010	57,8	38,9	34,1	22,6
2012	67,4	38,1	31,9	16,1
2014	49,8	27,9	24,1	14,4
2016	47,8	28,9	25,2	18,3
2018	55,5	33,6	28,9	18,2
2020	56,6	29,2	25,0	15,7

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) se ha mantenido estable respecto a la medición anterior, pasando de 18,2% en el estudio 2018 a 15,7% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Coquimbo bajo el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 41
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región de Coquimbo, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos respecto al estudio anterior; así, en hombres se observa una variación de 5,9 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 16,8% en 2018 a 17,4% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 13,1% en 2018 a 8,2% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 1,7 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 3,6 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 130
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región de Coquimbo, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	27,5	34,8	20,6	27,6	27,5
2004	29,1	31,1	27,3	30,6	27,5
2006	26,4	29,7	23,3	24,9	28,1
2008	27,6	30,6	24,8	19,7	36,1
2010	22,6	22,8	22,4	19,7	25,6
2012	16,1	17,7	14,6	14,5	17,7
2014	14,4	14,4	14,4	12,2	16,3
2016	18,3	22,7	14,2	16,9	19,6
2018	18,2	19,7	16,8	13,1	24,2
2020	15,7	13,8	17,4	8,2	22,5

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.


En la Región de Coquimbo, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol sube significativamente respecto al estudio anterior, observándose una variación de 11,2 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 4,6 puntos porcentuales respecto a 2018: pasa de 53,4% a 58,0%.

TABLA 131
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región de Coquimbo, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	64,4	53,4	33,1
1996	78,0	65,5	41,8
1998	75,2	64,2	41,9
2000	85,1	74,4	54,9
2002	85,2	74,5	63,9
2004	82,0	68,8	52,1
2006	77,2	68,2	52,4
2008	84,7	74,7	51,1
2010	71,0	61,4	46,1
2012	77,3	60,9	44,1
2014	55,3	42,9	33,9
2016	61,6	43,6	22,2
2018	66,7	53,4	36,9
2020	77,9	58,0	41,1

La prevalencia de último mes de alcohol no varía significativamente, pasando de 36,9% en el estudio 2018 a 41,1% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Coquimbo bajo el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 42
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes. Región de Coquimbo, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 6,7 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 29,7% en 2018 a 31,6% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa al alza en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa

de 29,8% en 2018 a 38,8% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 1,9 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 19,5 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 132
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes, según sexo y edad.
Región de Coquimbo, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	33,1	47,8	19,1	31,6	35,3
1996	41,8	54,7	29,6	45,9	36,2
1998	41,9	57,4	27,2	39,2	45,5
2000	54,9	66,2	44,1	52,1	58,3
2002	63,9	74,5	53,8	63,4	64,5
2004	52,1	64,5	40,3	50,9	53,5
2006	52,4	55,7	49,3	49,8	55,4
2008	51,1	62,5	40,0	49,7	52,5
2010	46,1	52,9	39,7	42,0	50,7
2012	44,1	51,5	37,0	40,4	48,0
2014	33,9	42,0	26,1	31,4	36,0
2016	22,2	27,0	17,6	24,6	20,0
2018	36,9	44,4	29,7	29,8	45,0
2020	41,1	51,1	31,6	38,8	43,1

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región de Coquimbo, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, no mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 10,2% en 2018 a 7,0% en 2020. La diferencia observada de 7,5 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio 2018, no se observan cambios por sexo y edad.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia una estabilización en el uso de riesgo de alcohol: pasa de 5,5% en 2018 a 4,0% en 2020. En la desagregación por sexo y edad, no se aprecian variaciones respecto a 2018.

TABLA 133
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol,
según sexo y edad. Región de Coquimbo, 2008–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2008	12,3	19,9	3,6	14,2	10,4
2010	14,3	22,3	4,5	20,7	8,4
2012	9,6	16,4	1,8	11,8	7,7
2014	5,8	7,1	4,0	7,2	4,8
2016	8,7	12,7	3,6	13,4	4,8
2018	10,2	13,8	5,8	10,3	10,2
2020	7,0	10,4	2,9	7,6	6,4
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2008	9,2	16,2	2,4	10,1	8,2
2010	8,8	15,4	2,4	11,8	5,6
2012	5,9	10,9	1,0	6,5	5,2
2014	2,5	3,6	1,4	2,8	2,2
2016	3,8	6,4	1,3	5,5	2,2
2018	5,5	8,3	2,7	4,8	6,2
2020	4,0	6,7	1,5	4,1	3,9

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran un descenso significativo respecto al estudio anterior; por sexo se observan variaciones significativas en ambos sexos, y por edad se aprecia una variación estadísticamente significativa en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. A su vez, la diferencia observada por sexo no es estadísticamente significativa, y la brecha por tramos de edad tampoco es significativa para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población, significa que un 20,3% de la población total de la Región de Coquimbo entre 12 y 64 años tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días, lo que se traduce en una estabilización respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población muestra una diferencia estadísticamente significativa por sexo y no se observan diferencias significativas por tramos de edad.

TABLA 134
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes,
según sexo y edad. Región de Coquimbo, 2012–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes (%)					
2012	60,1	65,7	52,5	65,5	55,3
2014	49,4	56,2	39,1	64,2	38,5
2016	74,0	78,7	67,1	79,5	67,8
2018	69,7	72,7	65,4	73,4	66,9
2020	49,5	52,1	45,4	49,6	49,4
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2012	26,5	33,9	19,4	26,5	26,6
2014	16,7	23,6	10,2	20,1	13,9
2016	16,4	21,2	11,8	19,5	13,6
2018	25,7	32,3	19,4	21,9	30,1
2020	20,3	26,6	14,4	19,3	21,3

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

A nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.


En la Región de Coquimbo, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana sube significativamente respecto al estudio anterior, observándose una variación de 5,7 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana no presenta variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018, con una diferencia de 2,2 puntos porcentuales: pasa de 7,6% a 5,4% en el estudio actual.

TABLA 135
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región de Coquimbo, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	9,1	3,2	0,8
1996	14,7	2,5	0,4
1998	13,0	4,1	1,1
2000	19,3	4,6	1,9
2002	18,5	4,0	1,4
2004	17,8	2,7	1,7
2006	22,7	6,9	5,8
2008	27,0	5,9	3,1
2010	23,5	7,5	4,1
2012	28,2	7,9	3,9
2014	16,9	4,5	2,9
2016	17,3	6,8	4,5
2018	27,9	11,1	7,6
2020	33,6	8,1	5,4

La prevalencia de último año de marihuana no varía respecto a la medición anterior, pasando de 11,1% en el estudio 2018 a 8,1% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Coquimbo bajo el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 43
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año. Región de Coquimbo, 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; así, en hombres se observa una variación de 6,4 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 6,0% en 2018 a 6,4% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia

pasa de 15,7% en 2018 a 11,5% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,7 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 3,6 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 136
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad. Región de Coquimbo, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	3,2	4,2	2,3	4,0	2,1
1996	2,5	3,5	1,6	4,2	0,1
1998	4,1	6,3	2,0	7,2	0,1
2000	4,6	7,0	2,4	7,4	1,3
2002	4,0	7,9	0,3	7,1	0,3
2004	2,7	4,9	0,6	4,7	0,3
2006	6,9	4,8	9,0	12,6	0,6
2008	5,9	9,6	2,4	9,2	2,3
2010	7,5	10,9	4,1	13,6	0,8
2012	7,9	9,4	6,3	14,4	1,1
2014	4,5	4,6	4,4	7,5	1,9
2016	6,8	10,8	3,1	11,4	2,6
2018	11,1	16,4	6,0	15,7	5,7
2020	8,1	10,0	6,4	11,5	5,0

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran descensos estadísticamente significativos. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.


En la Región de Coquimbo, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 0,2 puntos porcentuales.

TABLA 137
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región de Coquimbo, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
1994	4,5	1,8
1996	5,8	0,7
1998	3,0	0,7
2000	5,6	1,0
2002	5,3	0,2
2004	5,4	0,4
2006	6,7	0,7
2008	7,9	1,0
2010	5,5	1,8
2012	6,5	1,6
2014	3,4	0,9
2016	2,4	0,3
2018	5,0	1,8
2020	4,8	0,1

La prevalencia de último año de cocaína total muestra una disminución estadísticamente significativa, pasando de 1,8% en el estudio 2018 a 0,1% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Coquimbo bajo el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 44
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año. Región de Coquimbo, 1994-2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 2,8 puntos porcentuales por no presentar casos en el 2020 y en mujeres pasa de 0,7% en 2018 a 0,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y un descenso estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 1,2% en 2018 a 0,1% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 2,4 puntos porcentuales al no reportar casos en 2020.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 0,1 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 138
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año, según sexo y edad.
Región de Coquimbo, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	1,8	2,6	1,0	1,6	2,1
1996	0,7	1,2	0,3	1,2	0,1
1998	0,7	1,3	<0,1	1,2	<0,1
2000	1,0	1,5	0,6	1,5	0,5
2002	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
2004	0,4	0,8	-	0,7	0,1
2006	0,7	1,5	-	0,9	0,5
2008	1,0	1,7	0,3	1,6	0,3
2010	1,8	3,3	0,4	3,4	0,1
2012	1,6	2,8	0,5	2,2	1,0
2014	0,9	1,4	0,5	1,0	0,8
2016	0,3	0,5	-	0,5	0,1
2018	1,8	2,8	0,7	1,2	2,4
2020	0,1	-	0,1	0,1	-

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región de Coquimbo, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 1,7 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 2,9 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía, pasando de 13,6% a 13,5% en el estudio actual.

TABLA 139
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región de Coquimbo, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	11,3	8,6	3,1
2008			
2010	14,1	11,3	3,8
2012	34,0	23,2	9,9
2014	24,3	14,1	4,0
2016	21,6	12,3	4,9
2018	41,9	26,8	13,6
2020	43,6	29,7	13,5

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio se observa un descenso estadísticamente significativo en la prevalencia de último año: pasa de 6,9% en 2018 a 3,5% en 2020. En la actual medición, la prevalencia alguna vez en la vida no varía (9,2% en 2020) y la medida de último mes desciende significativamente 3,1 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 140
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región de Coquimbo, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2012	6,2	2,8	0,9
2014	5,4	3,1	0,9
2016	4,4	3,6	0,6
2018	11,9	6,9	3,9
2020	9,2	3,5	0,8

La desagregación del uso por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; así, en hombres se observa una variación de 4,7 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 5,2% en 2018 a 3,0% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y un descenso estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. De esta manera, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 9,0% en 2018 a 5,8% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 3,2 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 141
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Coquimbo, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	2,8	4,7	0,9	5,3	0,2
2014	3,1	4,1	2,1	6,4	0,2
2016	3,6	5,6	1,6	5,1	2,2
2018	6,9	8,7	5,2	9,0	4,5
2020	3,5	4,0	3,0	5,8	1,3

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región de Coquimbo, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra un descenso estadísticamente significativo en el caso de tabaco, que pasa de 16,5% en 2018 a 2,7% en 2020; en alcohol se registra una baja significativa con una brecha de 18,9 puntos porcentuales, y para marihuana llega a 1,2%, tras mostrar un descenso estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, con una diferencia de 3,6 puntos porcentuales.

TABLA 142
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región de Coquimbo, 1994-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	23,2	31,6	1,7
1996	7,9	20,3	0,5
1998	3,9	10,1	2,5
2000	5,0	10,6	0,9
2002	13,9	37,7	0,9
2004	3,0	7,1	0,5
2006	10,0	25,2	3,8
2008	11,1	33,2	1,5
2010	7,3	18,0	1,3
2012	7,5	19,9	2,8
2014	8,3	8,8	0,5
2016	10,9	18,8	2,4
2018	16,5	30,2	4,8
2020	2,7	11,3	1,2

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente aumenta significativamente en la Región de Coquimbo, pasando de 79,1% en 2018 a 93,4% en 2020, y se ubica sobre el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 34,7% en 2020, con una diferencia de 6,8 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (descenso estadísticamente significativo), lo que ubica a la región debajo de la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco varía significativamente al alza respecto a 2018, estableciéndose sobre el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) se mantiene estable, pasando de 36,2% en 2018 a 37,6% en 2020, y ubica a la Región de Coquimbo sobre el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 69,8% en 2020, con una diferencia significativa de 13,3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior), lo que ubica a la región sobre la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) muestra un aumento estadísticamente significativo en esta versión del estudio: de 72,4% en 2018 a 79,8% en 2020; así, la región queda por sobre el promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base aumenta significativamente de 79,9% en 2018 a 87,2% en 2020, ubicándose sobre el promedio nacional (80,0%).

TABLA 143
Evolución de percepción de riesgo. Región de Coquimbo, 2000-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	Diario
2000							83,2		86,3
2002							85,7		86,4
2004							87,1		85,9
2006	62,8	92,0	80,8	97,9	85,8	97,2	88,9		86,3
2008	58,5	84,7	80,8	96,8	86,1	98,6	89,4		84,4
2010	58,3	84,5	81,0	93,6	84,9	95,8	86,8		86,6
2012	38,8	77,9	73,9	96,5	77,0	96,1	89,3		86,1
2014	33,4	67,4	72,8	89,7	83,0	94,0	70,2		76,2
2016	43,6	81,6	79,2	92,7	83,3	93,5	84,3	39,4	80,6
2018	36,2	56,5	72,4	88,8	79,9	89,5	79,1	41,5	72,2
2020	37,6	69,8	79,8	97,0	87,2	96,8	93,4	34,7	88,9
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la Región de Coquimbo se mantiene estable respecto a 2018, pasando de 20,6% a 16,9% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 3,5 puntos porcentuales, lo que se traduce en una variación significativa a la baja respecto al estudio pasado, y para pasta base no se observan variaciones estadísticamente significativas, pasando de 4,2% en el estudio 2018 a 1,7% en el estudio actual.

TABLA 144
Exposición a oferta de drogas en el último año.
Región de Coquimbo, 2002-2020.

Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año


Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	12,2	2,3	3,8
2004	9,3	2,7	3,1
2006	13,9	5,2	6,2
2008	16,6	4,8	5,0
2010	11,6	1,7	5,0
2012	16,9	3,2	2,5
2014	10,8	2,6	1,7
2016	9,2	2,3	0,8
2018	20,6	6,7	4,2
2020	16,9	3,2	1,7

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana una variación significativa al alza, con una diferencia de 8,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (51,8% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 22,1% en 2018 a 24,4% en 2020, lo que significa mantenerse sin cambios respecto a 2018, y para pasta base se mantiene estable con una variación de 5,9 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 45

Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región de Coquimbo, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE SITUACIÓN EN BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "consumo de drogas en lugares públicos como en la calle o plazas" y el menor es "venta clandestina de alcohol".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región de Coquimbo muestra un aumento estadísticamente significativo, pasando de 21,5% en 2018 a 29,6% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" no registra variaciones significativas, con una diferencia de 0,3 puntos porcentuales respecto a 2018. En las otras categorías descritas, se observan variaciones estadísticamente significativas en "asaltos o robos en las calles" y "balaceras y acciones violentas con armas de fuego".

GRÁFICO 46

Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Región de Coquimbo, 2016-2020.



Región de Valparaíso

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región de Valparaíso la muestra efectiva fue de 1.447 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 566 son hombres y 881 mujeres, 549 tienen entre 12 y 34 años y 898 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 1.011.750 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

Las comunas incluidas en esta versión del estudio fueron Los Andes, San Felipe, Quillota, Calera, Limache, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, San Antonio y Concón.

TABLA 145
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región de Valparaíso.

	Sexo		Tramos de edad		Total
	Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64	
Porcentaje	39,1	60,9	37,9	62,1	100
Muestra (N)	566	881	549	898	1.447
Población	497.775	513.975	439.957	571.793	1.011.750

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.

En la Región de Valparaíso, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 0,4 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 3,2 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 32,9% a 30,6%.

TABLA 146
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región de Valparaíso, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	65,7	47,1	42,0	
1996	71,4	51,2	41,8	
1998	68,0	49,1	44,0	
2000	70,3	50,6	44,7	
2002	73,5	50,7	46,5	31,2
2004	75,0	51,3	46,0	31,7
2006	70,6	50,3	44,0	30,5
2008	69,5	46,1	40,0	27,0
2010	53,8	38,2	35,7	21,4
2012	68,5	46,3	41,2	24,6
2014	61,2	37,8	33,5	22,4
2016	66,6	39,9	35,0	22,1
2018	62,8	37,9	32,9	20,3
2020	62,4	34,7	30,6	22,5

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) se ha mantenido estable respecto a la medición anterior, pasando de 20,3% en el estudio 2018 a 22,5% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Valparaíso sobre el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 47
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región de Valparaíso, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 0,9 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 16,9% en 2018 a 20,4% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 13,7% en 2018 a 14,8% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 2,9 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 4,3 puntos porcentuales

entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 147
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región de Valparaíso, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	31,2	31,6	30,7	31,6	30,7
2004	31,7	34,4	29,0	29,4	34,0
2006	30,5	34,8	26,3	25,8	35,3
2008	27,0	30,2	23,9	24,6	29,6
2010	21,4	24,7	18,1	21,0	21,8
2012	24,6	26,5	22,8	17,5	30,4
2014	22,4	20,6	24,2	20,9	23,6
2016	22,1	22,8	21,4	15,4	28,3
2018	20,3	23,8	16,9	13,7	25,6
2020	22,5	24,7	20,4	14,8	28,5

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.

En la Región de Valparaíso, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 1,2 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 3,4 puntos porcentuales respecto a 2018: pasa de 61,8% a 58,4%.

TABLA 148
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región de Valparaíso, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	77,1	66,1	42,9
1996	83,3	72,8	48,3
1998	76,8	66,6	49,2
2000	85,4	75,1	57,5
2002	87,8	76,6	61,1
2004	88,7	78,2	61,7
2006	85,3	74,2	59,0
2008	81,6	66,8	47,1
2010	75,2	66,4	50,3
2012	79,9	64,5	48,8
2014	75,8	61,3	44,8
2016	79,7	65,5	47,1
2018	80,3	61,8	44,8
2020	79,1	58,4	42,4

La prevalencia de último mes de alcohol no varía significativamente, pasando de 44,8% en el estudio 2018 a 42,4% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Valparaíso bajo el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 48
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes. Región de Valparaíso, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 6,4 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 36,5% en 2018 a 38,3% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa

de 41,4% en 2018 a 39,0% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 2,4 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 8,3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 149
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes, según sexo y edad.
Región de Valparaíso, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	42,9	56,1	30,4	43,7	41,9
1996	48,3	57,2	39,8	46,0	50,9
1998	49,2	59,8	39,0	48,3	50,3
2000	57,5	65,3	49,9	53,8	61,6
2002	61,1	67,8	54,6	59,9	62,4
2004	61,7	70,2	53,5	57,5	66,2
2006	59,0	66,8	51,4	57,2	60,9
2008	47,1	57,6	36,8	45,1	49,2
2010	50,3	59,1	41,5	51,3	49,4
2012	48,8	54,0	43,7	44,6	52,2
2014	44,8	53,0	36,8	40,9	47,8
2016	47,1	55,5	38,8	45,7	48,4
2018	44,8	53,0	36,5	41,4	47,4
2020	42,4	46,6	38,3	39,0	45,0

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región de Valparaíso, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, no mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 7,5% en 2018 a 8,6% en 2020. La diferencia observada de 13,0 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio 2018, no se observan cambios por sexo y edad.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia una estabilización en el uso de riesgo de alcohol: pasa de 4,6% en 2018 a 5,1% en 2020. En la desagregación por sexo y edad, no se aprecian variaciones respecto a 2018.

TABLA 150
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol, según sexo y edad. Región de Valparaíso, 2008–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2008	9,6	15,3	2,5	13,6	5,9
2010	6,6	10,8	1,5	10,1	3,6
2012	8,5	15,2	0,7	6,2	10,3
2014	10,2	15,3	4,7	15,7	6,2
2016	10,9	14,4	6,8	16,2	6,4
2018	7,5	11,3	2,3	7,5	7,4
2020	8,6	14,7	1,7	8,5	8,8
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2008	6,4	11,5	1,5	8,8	4,1
2010	4,4	7,9	0,9	6,6	2,4
2012	5,5	10,6	0,4	3,9	6,7
2014	6,3	10,0	2,7	9,2	4,0
2016	7,1	10,3	4,1	10,2	4,3
2018	4,6	8,0	1,2	4,5	4,7
2020	5,1	9,3	0,9	4,6	5,4

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran un descenso significativo respecto al estudio anterior pasando de 60,5% en 2018 a 51,5% en 2020. Respecto a 2018, por sexo no se observan variaciones y por edad no se aprecian cambios. A su vez, las diferencias observadas por sexo y edad no son estadísticamente significativas para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población muestra que un 21,8% de la población total de la Región de Valparaíso entre 12 y 64 años tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días, lo que se traduce en un descenso significativo respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población no muestra por sexo y edad diferencias estadísticamente significativas.

TABLA 151
Evolución de prevalencia de embriaguez, según sexo y edad. Región de Valparaíso, 2012–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes (%)					
2012	47,0	57,0	34,8	56,5	40,3
2014	49,9	56,1	41,2	60,2	42,8
2016	51,2	54,2	47,0	59,9	43,6
2018	60,5	66,4	51,7	67,9	55,3
2020	51,5	56,0	46,1	56,2	48,3
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2012	22,9	30,8	15,2	25,2	21,1
2014	22,3	29,7	15,2	24,6	20,5
2016	24,1	30,1	18,2	27,4	21,1
2018	27,1	35,2	18,9	28,1	26,2
2020	21,8	26,1	17,7	21,9	21,7

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

Al nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.

En la Región de Valparaíso, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 0,9 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana desciende significativamente respecto a 2018, con una diferencia de 3,2 puntos porcentuales: pasa de 10,4% a 7,2%.

TABLA 152
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región de Valparaíso, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	16,8	6,8	3,6
1996	17,7	3,4	1,5
1998	13,4	4,5	2,1
2000	21,7	6,6	3,6
2002	27,4	6,9	4,6
2004	26,0	5,7	3,8
2006	28,8	8,8	5,3
2008	28,3	6,2	3,4
2010	18,9	5,5	3,0
2012	31,3	8,1	4,8
2014	32,1	13,5	6,5
2016	40,1	18,6	12,5
2018	40,3	15,1	10,4
2020	39,4	10,5	7,2

La prevalencia de último año de marihuana muestra una variación estadísticamente significativa, pasando de 15,1% en el estudio 2018 a 10,5% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Valparaíso bajo el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 49
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año. Región de Valparaíso. 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 6,9 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 8,4% en 2018 a 6,4% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 24,9% en 2018 a 17,8% en

2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 2,4 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 8,4 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 153
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad. Región de Valparaíso, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	6,8	12,0	1,9	11,7	0,8
1996	3,4	4,8	2,1	5,7	0,6
1998	4,5	7,0	2,1	6,8	1,8
2000	6,6	10,5	2,9	10,9	1,8
2002	6,9	10,1	3,8	12,2	1,1
2004	5,7	8,5	3,1	9,4	1,8
2006	8,8	10,7	6,9	14,7	2,6
2008	6,2	8,5	3,9	9,9	2,3
2010	5,5	8,7	2,3	8,8	2,5
2012	8,1	11,7	4,5	15,3	2,2
2014	13,5	17,8	9,5	20,5	8,0
2016	18,6	23,2	14,2	29,2	8,9
2018	15,1	21,7	8,4	24,9	7,3
2020	10,5	14,8	6,4	17,8	4,9

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.

En la Región de Valparaíso, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 1,1 puntos porcentuales.

TABLA 154
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región de Valparaíso. 1994-2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
1994	5,0	1,8
1996	2,3	1,3
1998	4,4	2,2
2000	6,4	2,3
2002	5,9	2,0
2004	7,6	2,6
2006	8,7	2,4
2008	8,3	2,3
2010	3,5	0,9
2012	7,1	1,2
2014	5,4	1,6
2016	6,8	1,4
2018	6,8	1,6
2020	7,9	1,0

La prevalencia de último año de cocaína total no varía significativamente, pasando de 1,6% en el estudio 2018 a 1,0% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Valparaíso sobre el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 50
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año. Región de Valparaíso, 1994-2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 1,4 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 0,1% en 2018 a 0,2% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 2,2% en 2018 a 1,4% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,5 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 1,5 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 155
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año, según sexo y edad.
Región de Valparaíso, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	1,8	2,9	0,7	3,0	0,2
1996	1,3	1,3	1,3	2,1	0,4
1998	2,2	3,5	0,9	3,6	0,6
2000	2,3	3,8	0,8	3,6	0,7
2002	2,0	3,6	0,5	3,7	0,2
2004	2,6	4,4	0,9	4,4	0,7
2006	2,4	4,2	0,6	3,2	1,5
2008	2,3	3,9	0,8	3,7	1,0
2010	0,9	1,7	0,0	1,0	0,7
2012	1,2	2,0	0,3	1,9	0,5
2014	1,6	2,7	0,6	2,1	1,3
2016	1,4	2,0	0,8	2,3	0,6
2018	1,6	3,1	0,1	2,2	1,2
2020	1,0	1,7	0,2	1,4	0,7

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región de Valparaíso, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas muestra un descenso estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 7,4 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 0,1 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía, pasando de 13,2% a 12,2% en el estudio actual.

TABLA 156
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región de Valparaíso, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	16,6	11,7	4,9
2008			
2010	19,9	12,2	4,9
2012	34,9	23,5	8,6
2014	44,5	29,1	12,5
2016	48,4	28,4	14,5
2018	47,6	26,4	13,2
2020	40,2	26,3	12,2

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio se observa un descenso estadísticamente significativo en la prevalencia de último año: pasa de 7,4% en 2018 a 4,4% en 2020. En la actual medición, la prevalencia alguna vez en la vida cae significativamente (9,1% en 2020) y la medida de último mes no presenta cambios, variando 1,2 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 157
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región de Valparaíso, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2012	12,3	7,8	3,0
2014	13,6	8,5	2,4
2016	15,6	8,5	4,0
2018	13,5	7,4	2,5
2020	9,1	4,4	1,3

La desagregación del uso por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 4,5 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 3,6% en 2018 a 2,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y un descenso estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 14,0% en 2018 a 9,2% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 1,5 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 158
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Valparaíso, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	7,8	10,7	5,0	15,2	1,8
2014	8,5	12,5	4,6	12,8	5,1
2016	8,5	10,2	6,9	14,7	2,8
2018	7,4	11,2	3,6	14,0	2,2
2020	4,4	6,7	2,1	9,2	0,7

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región de Valparaíso, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra un descenso estadísticamente significativo en el caso de tabaco, que pasa de 12,9% en 2018 a 6,8% en 2020; en alcohol se registra una baja significativa con una brecha de 13,5 puntos porcentuales, y para marihuana llega a 1,3%, tras mostrar un descenso estadísticamente significativo de 3,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

TABLA 159
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región de Valparaíso, 1994-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	15,9	34,0	2,5
1996	4,5	11,2	0,7
1998	4,5	9,9	0,8
2000	5,8	22,4	1,0
2002	8,3	28,6	1,6
2004	3,4	14,1	0,8
2006	5,0	15,2	2,0
2008	11,5	24,4	0,9
2010	7,8	22,1	0,9
2012	14,5	19,1	1,5
2014	5,3	15,9	1,6
2016	9,3	24,6	5,0
2018	12,9	26,6	4,5
2020	6,8	13,1	1,3

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente se mantiene estable en la Región de Valparaíso, pasando de 84,9% en 2018 a 85,5% en 2020, y se ubica bajo el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 34,0% en 2020, con una diferencia significativa a la baja de 5,7 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, lo que ubica a la región bajo la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco no ha mostrado cambios respecto a 2018, estableciéndose sobre el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) se mantiene estable, pasando de 30,7% en 2018 a 26,6% en 2020, y ubica a la Región de Valparaíso bajo el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 61,7% en 2020, con una diferencia de 1,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (se ha mantenido estable); este resultado ubica a la región bajo la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) se ha mantenido estable en esta versión del estudio: de 69,5% en 2018 a 71,9% en 2020; así, la región queda por sobre el promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base no ha mostrado cambios en la medición actual (de 84,0% en 2018 a 81,0% en 2020), ubicándose sobre el promedio nacional (80,0%).

TABLA 160
Evolución de percepción de riesgo. Región de Valparaíso, 2000-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	Diario
2000							82,7		82,8
2002							84,3		86,2
2004							85,0		82,4
2006	42,2	86,9	68,4	96,2	74,7	96,6	81,7		82,9
2008	51,7	84,6	76,5	97,4	85,2	98,3	89,0		88,1
2010	38,8	68,0	67,9	93,9	81,2	95,6	81,2		79,3
2012	41,6	75,9	74,4	95,7	86,5	96,0	88,5		88,9
2014	30,8	62,4	69,3	94,7	81,7	95,3	85,7		83,6
2016	27,4	52,4	75,5	95,0	86,6	95,8	89,4	34,7	84,8
2018	30,7	60,5	69,5	94,8	84,0	95,8	84,9	39,7	80,5
2020	26,6	61,7	71,9	96,8	81,0	96,2	85,5	34,0	82,0
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la Región de Valparaíso descende significativamente respecto a 2018, pasando de 23,4% a 18,5% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 1,2 puntos porcentuales, lo que se traduce en estabilidad respecto al estudio pasado, y para pasta base no se observan variaciones estadísticamente significativas, pasando de 1,8% en el estudio 2018 a 1,5% en el estudio actual.

TABLA 161
Exposición a ofertas de drogas en el último año.
Región de Valparaíso, 2002-2020.

Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año


Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	16,9	4,7	2,0
2004	17,5	6,2	3,4
2006	18,5	6,7	5,0
2008	12,0	5,5	2,8
2010	12,4	2,9	2,0
2012	18,2	5,2	2,4
2014	22,8	4,3	2,8
2016	28,7	7,0	2,3
2018	23,4	5,1	1,8
2020	18,5	3,9	1,5

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana estabilidad, con una diferencia de 2,1 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (50,3% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 23,7% en 2018 a 25,9% en 2020, lo que significa mantenerse sin cambios respecto a 2018; para pasta base, este indicador se mantiene estable con una variación de 2,9 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 51

Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región de Valparaíso, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS EN EL BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "tráfico de drogas" y el menor es "venta clandestina de alcohol".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región de Valparaíso muestra estabilidad, pasando de 24,4% en 2018 a 24,2% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" no registra variaciones significativas, con una diferencia de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2018. En las otras categorías descritas, solo se observa una variación estadísticamente significativa en "robos en las casas".

GRÁFICO 52

Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Región de Valparaíso, 2016-2020.



Región Metropolitana de Santiago

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región Metropolitana la muestra efectiva fue de 2.531 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 1.094 son hombres y 1.437 mujeres, 1.047 tienen entre 12 y 34 años y 1.484 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 5.642.144 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

Las comunas incluidas en esta versión del estudio fueron Santiago, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Recoleta, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Macul, Peñalolén, La Florida, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, San Miguel, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Estación Central, Cerrillos, Maipú, Quinta Normal, Lo Prado, Pudahuel, Cerro Navia, Renca, Quilicura, Colina, Puente Alto, San Bernardo, Buin, Melipilla, Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, Paine y Lampa.

TABLA 162
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región Metropolitana.

	Sexo		Tramos de edad		Total
	Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64	
Porcentaje	43,2	56,8	41,4	58,6	100
Muestra (N)	1.094	1.437	1.047	1.484	2.531
Población	2.841.165	2.800.979	2.646.735	2.995.409	5.642.144

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.

En la Región Metropolitana, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 0,8 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año

no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 3,8 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes registra una variación estadísticamente significativa, pasando de 34,3% a 29,7%.

TABLA 163
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región Metropolitana, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	63,2	46,6	41,7	
1996	75,0	50,5	44,3	
1998	74,9	49,4	43,6	
2000	70,5	50,8	45,8	
2002	72,0	50,9	45,6	33,1
2004	74,7	51,1	44,9	32,0
2006	72,1	49,6	44,0	30,4
2008	70,3	50,3	44,1	31,0
2010	62,3	42,1	38,7	28,0
2012	54,7	37,3	33,6	23,3
2014	70,2	42,6	38,6	26,1
2016	70,1	40,9	36,2	23,5
2018	63,7	37,1	34,3	22,4
2020	62,9	33,3	29,7	21,0

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) se ha mantenido estable respecto a la medición anterior, pasando de 22,4% en el estudio 2018 a 21,0% en el actual. Este resultado ubica a la Región Metropolitana sobre el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 53
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región Metropolitana, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 1,2 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 22,6% en 2018 a 21,0% en 2020. Al analizar los resultados

por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 17,4% en 2018 a 15,3% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 0,1 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 164
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región Metropolitana, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	33,1	35,6	30,8	29,3	37,4
2004	32,0	32,1	32,0	31,2	33,0
2006	30,4	32,9	28,0	27,3	33,7
2008	31,0	31,7	30,3	29,0	33,0
2010	28,0	29,2	26,8	25,0	30,8
2012	23,3	25,1	21,6	18,8	27,8
2014	26,1	26,2	26,0	20,3	30,2
2016	23,5	25,6	21,4	17,7	28,1
2018	22,4	22,1	22,6	17,4	26,3
2020	21,0	20,9	21,0	15,3	26,0

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.


En la Región Metropolitana, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 1,2 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 3,7 puntos porcentuales respecto a 2018: pasa de 65,4% a 61,7%.

TABLA 165
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región Metropolitana, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	75,4	62,5	42,2
1996	87,6	75,3	52,3
1998	87,2	74,0	55,7
2000	85,7	75,3	56,7
2002	88,6	77,5	61,1
2004	89,1	78,7	60,7
2006	87,7	76,2	62,0
2008	83,3	70,2	52,6
2010	71,9	57,3	39,3
2012	62,1	51,4	38,7
2014	84,6	67,3	53,3
2016	85,8	70,1	52,3
2018	81,9	65,4	47,8
2020	83,1	61,7	48,2

La prevalencia de último mes de alcohol no varía significativamente, pasando de 47,8% en el estudio 2018 a 48,2% en el actual. Este resultado ubica a la Región Metropolitana sobre el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 54
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el
último mes. Región Metropolitana, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 4,1 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 36,2% en 2018 a 40,7% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y un

aumento estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 50,3% en 2018 a 44,6% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 5,4 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 14,9 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 166
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el
último mes, según sexo y edad.
Región Metropolitana, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	42,2	51,3	33,9	42,6	41,6
1996	52,3	59,6	45,5	51,9	52,7
1998	55,7	66,7	45,7	53,1	58,9
2000	56,7	65,9	48,1	53,0	60,9
2002	61,1	68,4	54,3	57,5	65,2
2004	60,7	69,3	52,6	57,4	64,3
2006	62,0	69,6	54,7	57,4	66,8
2008	52,6	62,2	43,4	53,7	51,3
2010	39,3	48,3	30,6	40,2	38,5
2012	38,7	47,6	30,0	38,9	38,4
2014	53,3	59,4	47,2	50,9	54,9
2016	52,3	58,7	46,1	52,2	52,3
2018	47,8	59,7	36,2	50,3	45,9
2020	48,2	55,6	40,7	44,6	51,3

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región Metropolitana, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, no mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 9,3% en 2018 a 10,6% en 2020. La diferencia observada de 12,0 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio anterior, no se observan diferencias por sexo y edad.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia una estabilización en el uso de riesgo de alcohol: pasa de 6,1% en 2018 a 6,6% en 2020. En la desagregación por sexo y edad, no se observan variaciones respecto a 2018.

TABLA 167
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en el último año, según sexo y edad. Región Metropolitana 2008-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2008	8,6	13,0	3,5	11,1	6,0
2010	8,7	14,2	2,3	11,6	6,2
2012	10,2	15,4	3,9	11,7	8,8
2014	8,1	10,4	5,3	9,2	7,3
2016	8,9	14,5	2,8	10,8	7,5
2018	9,3	13,3	4,4	12,0	7,2
2020	10,6	16,0	4,0	12,3	9,3
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2008	6,0	10,0	2,2	7,8	4,2
2010	5,0	8,8	1,2	6,4	3,6
2012	5,3	8,8	1,8	6,1	4,5
2014	5,4	7,6	3,3	6,0	5,0
2016	6,3	10,8	1,8	7,4	5,3
2018	6,1	9,7	2,5	7,7	4,8
2020	6,6	10,9	2,2	7,3	5,9

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran una estabilización respecto al estudio anterior; por sexo no se observan variaciones y por edad no se aprecian cambios. A su vez, las diferencias observadas por sexo y por tramos de edad son brechas estadísticamente significativas para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población significa que un 25,6% de la población total de la Región Metropolitana entre 12 y 64 años tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días, lo que se traduce en una estabilización respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población muestra una diferencia estadísticamente significativa por sexo y no se aprecian diferencias por tramos de edad.

TABLA 168
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes, según sexo y edad. Región Metropolitana, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes					
2012	55,4	60,6	47,5	63,2	47,7
2014	38,4	45,7	29,5	45,1	34,0
2016	50,2	54,6	44,8	57,7	44,2
2018	53,1	55,5	49,3	56,7	49,9
2020	53,0	58,2	45,9	61,2	46,8
Prevalencia respecto al total de la población					
2012	21,4	28,8	14,3	24,6	18,3
2014	20,5	27,1	13,9	23,0	18,7
2016	26,3	32,0	20,6	30,1	23,2
2018	25,4	33,1	17,8	28,5	22,9
2020	25,6	32,3	18,7	27,3	24,0

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

A nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.

En la Región Metropolitana, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 2,4 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana no presenta variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018, manteniéndose en 9,9% en el estudio actual.

TABLA 169
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región Metropolitana, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	15,0	4,4	2,2
1996	22,1	5,4	1,5
1998	21,9	5,9	2,5
2000	24,1	6,6	3,3
2002	27,3	5,8	3,4
2004	28,8	6,6	3,3
2006	30,9	8,7	5,1
2008	29,9	7,9	4,4
2010	23,0	5,2	3,5
2012	24,8	8,3	5,7
2014	38,2	13,4	8,8
2016	44,6	18,3	11,2
2018	40,8	15,1	9,9
2020	43,2	13,7	9,9

La prevalencia de último año de marihuana no varía respecto a la medición anterior, pasando de 15,1% en el estudio 2018 a 13,7% en el actual. Este resultado ubica a la Región Metropolitana sobre el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 55
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año. Región Metropolitana, 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo muestra estabilidad en ambos sexos respecto al estudio anterior; de esta manera, en hombres se observa una variación de 2,9 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 8,3% en 2018 a 8,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la

prevalencia pasa de 25,2% en 2018 a 20,3% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,8 puntos porcentuales en la actual medición.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 11,1 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 170
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad.
Región Metropolitana, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	4,4	6,1	2,8	6,7	1,1
1996	5,4	7,8	3,2	9,1	0,8
1998	5,9	8,8	3,1	9,8	1,1
2000	6,6	9,6	3,8	11,1	1,5
2002	5,8	9,4	2,5	9,7	1,6
2004	6,6	8,8	4,5	10,9	2,0
2006	8,7	12,1	5,4	14,0	3,2
2008	7,9	10,5	5,4	13,6	2,0
2010	5,2	7,8	2,6	9,2	1,4
2012	8,3	11,3	5,3	12,7	3,8
2014	13,4	17,3	9,6	22,4	6,9
2016	18,3	23,2	13,6	29,4	9,3
2018	15,1	22,1	8,3	25,2	7,0
2020	13,7	19,2	8,1	20,3	7,8

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.

En la Región Metropolitana, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 0,9 puntos porcentuales.

TABLA 171
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región Metropolitana, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
1994	3,6	2,0
1996	5,0	1,4
1998	7,2	2,6
2000	7,5	2,5
2002	8,9	2,4
2004	9,3	2,3
2006	9,0	1,8
2008	9,7	3,0
2010	6,5	1,2
2012	6,0	1,5
2014	8,9	2,2
2016	9,0	1,5
2018	7,9	1,7
2020	8,8	0,7

La prevalencia de último año de cocaína total muestra una variación estadísticamente significativa, pasando de 1,7% en el estudio 2018 a 0,7% en el actual. Este resultado ubica a la Región Metropolitana en el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 56
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año. Región Metropolitana, 1994-2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 1,4 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 0,5% en 2018 a 0,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 2,0% en 2018 a 0,6% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,6 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 1,3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 172
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año, según sexo y edad.
Región Metropolitana, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	2,0	3,5	0,5	3,1	0,3
1996	1,4	2,2	0,7	2,4	0,1
1998	2,6	4,3	0,9	3,9	1,0
2000	2,5	4,3	0,9	3,9	0,9
2002	2,4	4,2	0,8	4,0	0,7
2004	2,3	3,8	0,8	3,3	1,1
2006	1,8	2,8	0,9	2,5	1,2
2008	3,0	5,2	1,0	3,8	2,2
2010	1,2	2,2	0,2	1,8	0,6
2012	1,5	2,4	0,7	2,0	1,1
2014	2,2	3,8	0,7	3,6	1,3
2016	1,5	2,5	0,5	1,7	1,3
2018	1,7	2,8	0,5	2,0	1,4
2020	0,7	1,4	0,1	0,6	0,8

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región Metropolitana, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas muestra un descenso estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 10,8 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año descende significativamente, con una diferencia de 4,3 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía en la medición actual, pasando de 15,9% en 2018 a 18,0% en 2020.

TABLA 173
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región Metropolitana, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	23,9	15,6	4,8
2008			
2010	14,5	10,6	3,5
2012	29,7	20,9	9,6
2014	50,1	31,8	13,9
2016	55,0	35,0	15,2
2018	54,2	32,5	15,9
2020	43,4	28,2	18,0

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio se observa un descenso estadísticamente significativo en la prevalencia de último año: pasa de 7,9% en 2018 a 5,6% en 2020. La prevalencia alguna vez en la vida varía significativamente a la baja (13,2% en 2020) y la medida de último mes no presenta cambios, variando 0,6 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 174
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región Metropolitana, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2012	9,4	6,1	2,2
2014	15,3	10,5	3,8
2016	16,9	9,5	3,3
2018	17,4	7,9	2,5
2020	13,2	5,6	1,9

La desagregación del uso por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 5,0 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 3,3% en 2018 a 3,6% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 13,9% en 2018 a 8,7% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 0,2 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 175
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región Metropolitana, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	6,1	8,9	3,5	10,6	1,7
2014	10,5	12,9	8,1	16,5	6,2
2016	9,5	11,2	7,8	17,4	3,1
2018	7,9	12,6	3,3	13,9	3,1
2020	5,6	7,6	3,6	8,7	2,9

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región Metropolitana, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra un descenso estadísticamente significativo en el caso de tabaco, que pasa de 12,5% en 2018 a 2,1% en 2020; en alcohol se registra una baja significativa con una brecha de 22,7 puntos porcentuales, y para marihuana llega a 0,9%, tras mostrar un descenso estadísticamente significativo de 3,4 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

TABLA 176
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región Metropolitana, 1994-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	15,9	25,9	2,2
1996	3,9	11,1	1,9
1998	4,4	12,2	1,7
2000	7,1	22,9	1,4
2002	9,7	32,9	0,9
2004	4,1	17,6	1,2
2006	7,7	26,9	1,8
2008	14,3	29,6	1,7
2010	10,8	18,5	0,8
2012	9,2	16,9	1,7
2014	10,3	23,8	3,6
2016	5,3	19,5	3,4
2018	12,5	31,0	4,3
2020	2,1	8,3	0,9

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente desciende significativamente en la Región Metropolitana, pasando de 87,9% en 2018 a 83,2% en 2020, y se ubica bajo el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 37,0% en 2020, con una diferencia de 4,6 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (se ha mantenido estable), lo que ubica a la región debajo de la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco no ha mostrado cambios respecto a 2018, estableciéndose bajo el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) desciende significativamente, pasando de 33,9% en 2018 a 28,2% en 2020, y ubica a la Región Metropolitana bajo el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 58,9% en 2020, con una diferencia significativa de 6,3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, lo que ubica a la región debajo de la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) muestra un descenso estadísticamente significativo en esta versión del estudio: de 73,9% en 2018 a 68,5% en 2020; así, la región queda por debajo del promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base baja significativamente de 84,2% en 2018 a 77,8% en 2020, ubicándose bajo el promedio nacional (80,0%).

TABLA 177
Evolución de percepción de riesgo. Región Metropolitana, 2000-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	Diario
2000							87,3		85,9
2002							86,1		83,8
2004							85,0		81,8
2006	40,7	85,4	66,6	96,9	77,1	97,8	80,8		80,3
2008	48,6	80,5	72,4	93,5	79,8	94,6	84,2		81,9
2010	45,0	76,2	66,6	95,4	77,6	96,8	85,5		84,0
2012	46,2	76,7	73,6	94,3	81,8	95,0	87,4		86,7
2014	30,8	64,6	74,9	95,5	85,1	96,6	89,0		88,2
2016	23,3	58,6	68,0	94,8	83,2	95,6	88,9	36,3	83,8
2018	33,9	65,2	73,9	94,7	84,2	95,3	87,9	41,6	82,8
2020	28,2	58,9	68,5	88,0	77,8	88,8	83,2	37,0	79,8
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la Región Metropolitana desciende significativamente respecto a 2018, pasando de 24,0% a 19,4% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 4,1 puntos porcentuales, lo que se traduce en una variación significativa a la baja respecto al estudio pasado, y para pasta base desciende significativamente, pasando de 3,0% en 2018 a 1,3% en el estudio actual.

TABLA 178
Exposición a ofertas de drogas en el último año.
Región Metropolitana, 2002-2020.

Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año


Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	15,4	6,1	3,3
2004	17,2	7,1	4,7
2006	17,5	6,1	3,8
2008	18,7	8,7	4,9
2010	11,6	4,0	3,1
2012	17,9	6,1	3,3
2014	20,8	7,0	3,3
2016	27,6	7,9	3,9
2018	24,0	7,8	3,0
2020	19,4	3,7	1,3

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana estabilidad, con una diferencia de 2,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (56,8% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 36,1% en 2018 a 35,6% en 2020, lo que significa mantenerse sin cambios respecto a 2018; para pasta base, este indicador se mantiene estable con una variación de 1,9 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 57

Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región Metropolitana, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS EN EL BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquisa por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "consumo de drogas en lugares públicos como en la calle o plazas" y el menor es "venta clandestina de alcohol".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región Metropolitana muestra estabilidad, pasando de 36,5% en 2018 a 40,0% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" no registra variaciones significativas, con una diferencia de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2018. En las otras categorías descritas, solo se observa una variación estadísticamente significativa en "asaltos o robos en las calles".

GRÁFICO 58

Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Región Metropolitana, 2016-2020.



Región del Libertador Bernardo O'Higgins

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región de O'Higgins la muestra efectiva fue de 912 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 405 son hombres y 507 mujeres, 339 tienen entre 12 y 34 años y 573 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 376.496 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

Las comunas incluidas en esta versión del estudio fueron Rancagua, Rengo, San Fernando, Graneros, Machalí, San Vicente y Chimbarongo.

TABLA 179
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región de O'Higgins.

	Sexo		Tramos de edad		Total
	Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64	
Porcentaje	44,4	55,6	37,2	62,8	100
Muestra (N)	405	507	339	573	912
Población	186.181	190.315	171.859	204.637	376.496

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.

En la Región de O'Higgins, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 1,5 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 0,4 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 29,2% a 30,1%.

TABLA 180
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región de O'Higgins, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	62,0	45,2	38,1	
1996	81,2	49,9	43,3	
1998	78,8	46,8	37,7	
2000	68,8	48,7	42,4	
2002	74,0	53,4	45,6	34,9
2004	71,4	47,4	43,5	30,7
2006	68,2	47,8	40,8	26,8
2008	68,9	44,0	39,6	27,7
2010	52,8	36,3	32,9	20,5
2012	61,8	39,0	36,2	23,1
2014	60,0	38,3	33,3	22,6
2016	64,1	35,3	32,4	22,4
2018	56,9	33,3	29,2	19,9
2020	55,4	32,9	30,1	22,8

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) se ha mantenido estable respecto a la medición anterior, pasando de 19,9% en el estudio 2018 a 22,8% en el actual. Este resultado ubica a la Región de O'Higgins sobre el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 59
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región de O'Higgins, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 6,6 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 20,8% en 2018 a 20,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 15,3% en 2018 a 16,8% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 4,0 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 5,5 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 181
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región de O'Higgins, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	34,9	42,0	28,0	31,9	38,2
2004	30,7	33,9	27,6	27,6	33,9
2006	26,8	28,1	25,5	24,7	29,0
2008	27,7	27,2	28,1	25,6	29,7
2010	20,5	19,9	21,0	20,9	20,2
2012	23,1	21,1	25,1	14,5	30,7
2014	22,6	26,4	18,7	18,1	26,4
2016	22,4	24,8	20,0	16,4	27,4
2018	19,9	19,0	20,8	15,3	23,9
2020	22,8	25,6	20,1	16,8	27,9

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.

En la Región de O'Higgins, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol cae significativamente respecto al estudio anterior, observándose una variación de 11,7 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año descende significativamente, con una diferencia de 20,2 puntos porcentuales respecto a 2018: pasa de 61,4% a 41,2%.

TABLA 182
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región de O'Higgins, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	76,3	61,4	43,0
1996	91,0	73,6	54,7
1998	88,1	69,6	45,8
2000	85,2	73,2	53,2
2002	86,3	73,8	58,6
2004	84,5	71,9	56,4
2006	85,8	73,9	52,1
2008	84,1	67,3	43,7
2010	67,3	54,8	36,0
2012	76,9	62,5	43,4
2014	79,1	65,2	46,4
2016	82,2	61,6	42,5
2018	77,9	61,4	41,2
2020	66,2	41,2	30,5

La prevalencia de último mes de alcohol muestra una variación estadísticamente significativa, pasando de 41,2% en el estudio 2018 a 30,5% en el actual. Este resultado ubica a la Región de O'Higgins bajo el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 60
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el
último mes. Región de O'Higgins, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en hombres y una variación significativa a la baja en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una diferencia de 8,9 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 35,7% en 2018 a 23,5% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34

años y un descenso estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 43,7% en 2018 a 30,1% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 8,1 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 14,2 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 183
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el
último mes, según sexo y edad.
Región de O'Higgins, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	43,0	54,5	32,1	40,6	46,3
1996	54,7	66,3	43,5	47,6	63,9
1998	45,8	53,5	38,5	45,7	46,0
2000	53,2	61,6	45,0	50,7	56,1
2002	58,6	66,9	50,4	52,2	65,6
2004	56,4	67,7	45,2	50,5	62,5
2006	52,1	62,1	42,2	48,1	56,2
2008	43,7	54,0	33,4	42,0	45,3
2010	36,0	46,0	25,9	33,8	37,5
2012	43,4	54,0	32,9	35,0	50,9
2014	46,4	56,3	36,3	44,6	48,0
2016	42,5	53,8	31,3	41,3	43,6
2018	41,2	46,6	35,7	43,7	39,0
2020	30,5	37,7	23,5	30,1	30,9

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región de O'Higgins, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) 'entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 8,9% en 2018 a 17,9% en 2020. La diferencia observada de 22,1 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio 2018, se observa una variación estadísticamente significativa en hombres y estabilidad en mujeres, mientras que por edad se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y una variación significativa en el tramo de 35 a 64 años.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia una estabilización en el uso de riesgo de alcohol: pasa de

5,5% en 2018 a 7,4% en 2020. En la desagregación por sexo respecto a 2018 no se observan cambios, y por tramos de edad se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y una variación significativa en el tramo de 35 a 64 años.

TABLA 184
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de O’Higgins, 2008–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2008	10,1	16,3	3,0	10,2	10,1
2010	9,1	13,7	2,5	7,8	10,0
2012	5,7	9,6	1,3	6,2	5,4
2014	9,8	13,2	5,5	12,6	7,6
2016	9,8	13,6	5,1	13,6	6,6
2018	8,9	13,0	4,2	12,6	5,5
2020	17,9	27,8	5,7	12,5	21,9
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2008	6,8	11,8	1,8	6,4	7,2
2010	5,0	8,8	1,1	4,1	5,6
2012	3,6	6,4	0,7	3,2	3,9
2014	6,4	9,6	3,2	8,0	5,1
2016	6,1	9,4	2,7	8,5	4,0
2018	5,5	8,6	2,4	8,0	3,3
2020	7,4	12,8	2,1	4,8	9,6

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran una estabilización respecto al estudio anterior; por sexo no se observan variaciones y por edad se aprecian variaciones estadísticamente significativas en ambos tramos de edad. A su vez, la diferencia observada por sexo es una brecha estadísticamente significativa, mientras que la diferencia por tramos de edad no es significativa para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población muestra que un 15,9% de la población total de la Región de O’Higgins entre 12 y 64 años tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días, lo que se traduce en un descenso significativo respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población muestra una diferencia estadísticamente significativa por sexo y no se aprecian diferencias por tramos de edad.

TABLA 185
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes, según sexo y edad. Región de O’Higgins, 2012–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes (%)					
2012	40,1	43,8	34,0	46,6	36,2
2014	48,0	55,2	36,6	57,3	40,6
2016	44,1	50,0	34,1	55,8	34,9
2018	51,9	52,4	51,3	61,9	42,2
2020	52,0	59,5	40,2	47,5	55,6
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2012	17,4	23,7	11,2	16,3	18,4
2014	22,3	31,0	13,3	25,6	19,5
2016	18,8	26,9	10,7	23,0	15,2
2018	21,4	24,4	18,3	27,1	16,5
2020	15,9	22,4	9,4	14,3	17,2

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

A nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.

En la Región de O’Higgins, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 2,1 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana desciende significativamente respecto a 2018, con una diferencia de 3,0 puntos porcentuales: pasa de 7,5% a 4,5% en el estudio actual.

TABLA 186
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región de O'Higgins, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	16,6	6,0	3,3
1996	14,2	2,8	0,5
1998	11,3	2,4	1,6
2000	17,8	4,4	2,2
2002	23,4	5,0	3,0
2004	21,1	5,3	3,5
2006	23,9	6,7	3,0
2008	24,1	4,8	1,5
2010	15,8	3,3	2,1
2012	21,5	4,0	1,8
2014	33,7	12,1	5,8
2016	31,7	11,4	7,6
2018	32,0	13,4	7,5
2020	34,1	7,5	4,5

La prevalencia de último año de marihuana muestra una variación estadísticamente significativa, pasando de 13,4% en el estudio 2018 a 7,5% en el actual. Este resultado ubica a la Región de O'Higgins bajo el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 61
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año. Región de O'Higgins, 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y una variación significativa a la baja en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una diferencia de 7,6 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 7,6% en 2018 a 3,6% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64

años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 24,5% en 2018 a 13,4% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 1,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 7,9 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 187
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad.
Región de O'Higgins, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	6,0	9,6	2,6	9,1	1,9
1996	2,8	4,7	1,1	5,0	0,1
1998	2,4	3,6	1,4	4,1	0,5
2000	4,4	6,8	2,1	7,2	1,3
2002	5,0	8,9	1,1	8,7	1,0
2004	5,3	8,7	2,0	9,2	1,4
2006	6,7	9,4	4,1	12,7	0,8
2008	4,8	4,8	4,8	8,3	1,4
2010	3,3	6,3	0,3	5,3	1,9
2012	4,0	4,9	3,2	6,4	1,9
2014	12,1	16,4	7,8	20,9	4,7
2016	11,4	16,1	6,6	19,7	4,4
2018	13,4	19,1	7,6	24,5	3,8
2020	7,5	11,5	3,6	13,4	2,6

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.

En la Región de O'Higgins, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 2,7 puntos porcentuales.

TABLA 188
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región de O'Higgins, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
1994	5,4	4,6
1996	3,1	0,8
1998	4,6	1,5
2000	5,4	1,7
2002	7,6	1,9
2004	6,8	1,6
2006	6,0	1,8
2008	6,7	1,7
2010	2,0	0,4
2012	5,9	0,2
2014	4,8	0,5
2016	5,7	2,1
2018	4,2	0,9
2020	6,9	0,4

La prevalencia de último año de cocaína total no varía significativamente respecto a la medición anterior, pasando de 0,9% en el estudio 2018 a 0,4% en el actual. Este resultado ubica a la Región de O'Higgins bajo el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 62
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año. Región de O'Higgins, 1994-2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 1,5 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 0,1% en 2018 a 0,8% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 1,8% en 2018 a 0,1% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,7 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 0,7 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 189
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año, según sexo y edad.
Región de O'Higgins, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	4,6	6,0	3,3	4,7	4,5
1996	0,8	1,7	-	1,5	-
1998	1,5	2,8	0,2	2,6	0,1
2000	1,7	2,9	0,6	2,7	0,6
2002	1,9	3,7	0,1	3,1	0,6
2004	1,6	2,9	0,4	2,8	0,5
2006	1,8	2,4	1,2	3,6	-
2008	1,7	2,5	0,9	2,9	0,5
2010	0,4	0,8	-	1,0	-
2012	0,2	0,4	-	0,3	<0,1
2014	0,5	0,8	0,2	0,8	0,3
2016	2,1	2,8	1,3	2,5	1,7
2018	0,9	1,6	0,1	1,8	<0,1
2020	0,4	0,1	0,8	0,1	0,7

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región de O'Higgins, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas muestra un descenso estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 14,0 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 8,6 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía, pasando de 18,2% a 19,9% en el estudio actual.

TABLA 190
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región de O'Higgins, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	16,7	10,9	4,5
2008			
2010	16,0	10,7	5,3
2012	39,1	25,7	6,9
2014	45,7	32,3	14,0
2016	47,6	28,4	13,7
2018	57,8	37,1	18,2
2020	43,8	28,5	19,9

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio se observa un descenso estadísticamente significativo en la prevalencia de último año: pasa de 9,5% en 2018 a 3,9% en 2020. En la actual medición, la prevalencia alguna vez en la vida baja significativamente (10,0% en 2020) y la medida de último mes no presenta cambios, variando 0,8 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 191
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región de O'Higgins, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2012	9,8	6,7	2,1
2014	16,1	9,5	3,3
2016	12,4	8,1	2,5
2018	17,5	9,5	2,3
2020	10,0	3,9	1,5

La desagregación del uso por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en hombres y una variación significativa a la baja en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 5,9 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 6,9% en 2018 a 1,7% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 15% en 2018 a 4,8% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años de edad se observa una diferencia de 1,5 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 192
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de O'Higgins, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	6,7	8,5	5,0	10,2	3,7
2014	9,5	13,4	5,4	16,9	3,1
2016	8,1	10,3	5,9	15,6	1,8
2018	9,5	12,1	6,9	15,0	4,7
2020	3,9	6,2	1,7	4,8	3,2

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región de O'Higgins, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra estabilidad en el caso de tabaco, que pasa de 6,9% en 2018 a 8,5% en 2020; en alcohol se registra una baja significativa con una brecha de 10,5 puntos porcentuales, y para marihuana llega a 0,7%, tras mostrar un descenso estadísticamente significativo de 2,6 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

TABLA 193
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región de O’Higgins, 1994–2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	10,1	21,1	-
1996	2,4	18,0	0,9
1998	6,8	12,2	0,4
2000	9,3	23,5	1,2
2002	3,7	14,4	0,5
2004	3,8	16,4	0,3
2006	10,2	22,7	1,8
2008	5,2	8,7	0,7
2010	12,7	23,7	0,6
2012	6,8	16,4	1,6
2014	10,3	24,3	3,2
2016	6,4	17,8	1,7
2018	6,9	23,2	3,3
2020	8,5	12,7	0,7

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente desciende significativamente en la Región de O’Higgins, pasando de 92,4% en 2018 a 86,8% en 2020, y se ubica sobre el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 55,6% en 2020, con una variación significativa al alza de 13,6 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, lo que ubica a la región sobre la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco no ha mostrado cambios respecto a 2018, estableciéndose sobre el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) aumenta significativamente, pasando de 32,7% en 2018 a 48,1% en 2020, y ubica a la Región de O’Higgins sobre el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 76,5% en 2020, esto es un aumento significativo de 9,3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, lo que ubica a la región sobre la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) se ha mantenido estable en esta versión del estudio: de 77,7% en 2018 a 81,9% en 2020; así, la región queda por sobre el promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base no ha mostrado cambios en la medición actual (de 85,2% en 2018 a 84,6% en 2020), ubicándose sobre el promedio nacional (80,0%).

TABLA 194
Evolución de percepción de riesgo. Región de O’Higgins, 2000–2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	Diario
2000							84,7		84,3
2002							84,1		85,8
2004							88,5		78,7
2006	41,8	90,8	59,2	97,9	69,4	97,4	89,1		82,2
2008	46,1	90,5	72,8	98,6	78,2	99,3	87,6		85,2
2010	68,3	89,1	85,0	94,1	90,0	92,6	91,9		86,3
2012	39,4	82,2	66,7	97,5	74,5	97,6	91,4		84,8
2014	30,8	62,0	73,5	89,3	80,8	90,3	85,0		82,2
2016	28,7	65,3	74,5	94,7	85,2	96,0	92,6	33,7	88,6
2018	32,7	67,2	77,7	96,2	85,2	96,8	92,4	42,0	79,8
2020	48,1	76,5	81,9	92,3	84,6	90,7	86,8	55,6	81,9
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la Región de O’Higgins desciende significativamente respecto a 2018, pasando de 19,8% a 14,6% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 2,3 puntos porcentuales, lo que se traduce en estabilidad respecto al estudio pasado, y para pasta base no se observan variaciones estadísticamente significativas, pasando de 2,2% en el estudio 2018 a 1,4% en el estudio actual.

TABLA 195
Exposición a ofertas de drogas en el último año.
Región de O'Higgins, 2002-2020.


Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año

Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	13,4	4,9	3,8
2004	11,6	2,8	3,1
2006	16,9	4,6	4,5
2008	14,7	4,4	3,5
2010	9,1	2,8	3,7
2012	13,3	2,9	2,7
2014	18,5	3,5	2,8
2016	18,0	4,2	3,5
2018	19,8	5,4	2,2
2020	14,6	3,1	1,4

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana estabilidad, con una diferencia de 3,9 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (47,2% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 22,3% en 2018 a 21,4% en 2020, lo que significa mantenerse sin cambios respecto a 2018; para pasta base, este indicador se mantiene estable con una variación de 0,2 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 63
Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región de O'Higgins, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS EN EL BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "consumo de drogas en lugares públicos como en la calle o plazas" y el menor es "venta clandestina de alcohol".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región de O'Higgins muestra estabilidad, pasando de 24,5% en 2018 a 22,6% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" no registra variaciones significativas, con una diferencia de 1,0 punto porcentual respecto a 2018. En las otras categorías descritas, se observan variaciones estadísticamente significativas en "rayado en las paredes daños al alumbrado o cosas similares", "jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas" y "balaceras y acciones violentas con armas de fuego".

GRÁFICO 64
Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Región de O'Higgins, 2016-2020.



Región del Maule

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región del Maule la muestra efectiva fue de 1.074 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 444 son hombres y 630 mujeres, 351 tienen entre 12 y 34 años y 723 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 397.478 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

Las comunas incluidas en esta versión del estudio fueron Talca, Constitución, Curicó, Linares, Cauquenes y Parral.

TABLA 196
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región del Maule.

	Sexo		Tramos de edad		Total
	Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64	
Porcentaje	41,3	58,7	32,7	67,3	100
Muestra (N)	444	630	351	723	1.074
Población	194.799	202.679	159.528	237.950	397.478

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.

En la Región del Maule, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 6,4 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año descende significativamente, con una diferencia de 6,5 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes muestra una variación estadísticamente significativa, pasando de 28,6% a 22,9%.

TABLA 197
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región del Maule, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	65,9	47,7	41,2	
1996	59,3	40,0	33,6	
1998	63,6	40,8	34,6	
2000	68,5	47,9	41,5	
2002	65,3	45,8	39,3	27,4
2004	58,6	42,5	39,4	28,7
2006	59,5	41,0	36,5	24,5
2008	62,7	40,0	35,3	23,5
2010	51,1	35,5	32,2	22,6
2012	57,7	35,4	32,2	21,4
2014	51,9	33,2	27,5	18,9
2016	46,6	30,2	27,9	15,3
2018	53,5	33,1	28,6	17,5
2020	47,1	26,6	22,9	16,8

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) se ha mantenido estable respecto a la medición anterior, pasando de 17,5% en el estudio 2018 a 16,8% en el actual. Este resultado ubica a la Región del Maule bajo el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 65
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región del Maule, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo muestra estabilidad en ambos sexos respecto al estudio anterior; de esta manera, en hombres se observa una variación de 2,8 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 13,7% en 2018 a 15,0% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 14,9% en 2018 a 12,0% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 3,6 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 198
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región del Maule, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	27,4	28,7	26,1	25,9	29,1
2004	28,7	34,1	23,5	27,1	30,5
2006	24,5	31,5	17,7	22,9	26,2
2008	23,5	27,2	19,9	24,7	22,2
2010	22,6	25,4	20,0	21,5	23,8
2012	21,4	26,3	16,7	15,0	27,5
2014	18,9	18,9	18,9	15,8	21,8
2016	15,3	16,2	13,5	12,3	17,4
2018	17,5	21,4	13,7	14,9	19,8
2020	16,8	18,6	15,0	12,0	20,0

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.


En la Región del Maule, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 0,4 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 2,0 puntos porcentuales respecto a 2018: pasa de 48,0% a 50,0%.

TABLA 199
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región del Maule, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	72,4	58,7	40,3
1996	79,6	66,5	39,7
1998	82,8	69,3	51,1
2000	82,1	70,1	49,9
2002	85,3	72,6	58,3
2004	77,4	67,9	49,2
2006	74,8	63,1	52,2
2008	76,1	61,5	42,3
2010	65,9	52,5	33,0
2012	75,4	58,6	41,6
2014	68,8	55,6	36,8
2016	68,0	51,9	34,4
2018	65,3	48,0	35,1
2020	64,9	50,0	39,3

La prevalencia de último mes de alcohol no varía significativamente, pasando de 35,1% en el estudio 2018 a 39,3% en el actual. Este resultado ubica a la Región del Maule bajo el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 66
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el
último mes. Región del Maule, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo muestra estabilidad en ambos sexos respecto al estudio anterior; de esta manera, en hombres se observa una variación de 0,6 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 27,8% en 2018 a 36,6% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 36,3% en 2018 a 37,6% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 6,4 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 5,5 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 200
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el
último mes, según sexo y edad.
Región del Maule, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	40,3	49,2	32,0	36,4	45,9
1996	39,7	49,7	30,2	37,6	42,4
1998	51,1	61,9	40,9	47,9	55,1
2000	49,9	59,8	40,4	47,2	52,9
2002	58,3	62,5	54,3	55,5	61,5
2004	49,2	57,3	41,4	46,8	51,8
2006	52,2	64,0	40,7	49,7	54,7
2008	42,3	55,8	29,2	40,1	44,5
2010	33,0	36,0	30,0	31,9	34,1
2012	41,6	50,3	33,4	39,9	43,3
2014	36,8	41,1	32,7	37,9	35,8
2016	34,4	39,5	24,3	36,1	33,3
2018	35,1	42,7	27,8	36,3	34,1
2020	39,3	42,1	36,6	37,6	40,5

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región del Maule, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, no mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 9,7% en 2018 a 8,6% en 2020. La diferencia observada de 10,0 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio anterior, no se observan cambios por sexo y edad.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia una estabilización en el uso de riesgo de alcohol: pasa de 4,7% en 2018 a 4,3% en 2020. En la desagregación por sexo y edad, no se observan variaciones respecto a 2018.

TABLA 201
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en el último año, según sexo y edad. Región del Maule, 2008-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año					
2008	7,1	10,8	2,2	9,3	5,2
2010	11,5	20,1	2,4	13,3	9,7
2012	8,4	13,2	2,9	14,8	3,1
2014	12,9	18,0	7,0	11,0	14,7
2016	12,3	13,3	9,2	18,1	8,6
2018	9,7	13,4	5,5	10,7	8,8
2020	8,6	13,5	3,5	13,7	5,4
Prevalencia respecto al total de la población					
2008	4,4	7,7	1,2	5,5	3,3
2010	6,0	11,1	1,2	6,6	5,4
2012	4,9	8,6	1,5	8,0	2,0
2014	7,2	10,9	3,6	6,3	8,0
2016	6,4	7,7	3,6	8,7	4,7
2018	4,7	7,0	2,4	5,6	3,9
2020	4,3	7,0	1,7	6,7	2,7

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran un descenso significativo respecto al estudio anterior; por sexo se observa estabilidad en hombres y una variación significativa en mujeres, y por edad se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y una variación significativa en el tramo de 35 a 64 años. A su vez, las brechas observadas por sexo y edad son estadísticamente significativas para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población significa que un 19,1% de la población total de la Región del Maule entre 12 y 64 años tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días, lo que se traduce en una estabilización respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población muestra diferencias estadísticamente significativas por sexo y edad.

TABLA 202
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes, según sexo y edad. Región del Maule, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes					
2012	55,6	64,8	42,6	65,9	46,4
2014	51,4	65,9	33,8	52,9	49,9
2016	68,2	70,4	60,9	80,2	58,8
2018	61,1	62,5	59,0	66,0	56,7
2020	48,5	55,9	40,3	60,9	40,8
Prevalencia respecto al total de la población					
2012	23,1	32,6	14,2	26,3	20,1
2014	18,9	27,1	11,1	20,1	17,9
2016	23,5	27,9	14,8	28,9	19,6
2018	21,4	26,7	16,4	24,0	19,4
2020	19,1	23,6	14,7	22,9	16,5

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

A nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.

En la Región del Maule, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 2,7 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana no presenta variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018, con una diferencia de 1,5 puntos porcentuales: pasa de 6,8% a 5,3%.

TABLA 203
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región del Maule, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	7,3	1,4	0,9
1996	7,8	0,7	0,2
1998	8,2	2,8	1,1
2000	12,4	3,5	1,4
2002	13,8	3,1	1,9
2004	14,4	2,7	1,6
2006	14,3	1,6	1,2
2008	12,1	2,4	1,1
2010	15,6	2,4	1,6
2012	16,5	2,7	1,6
2014	15,7	5,3	2,8
2016	14,6	8,0	5,0
2018	26,6	9,9	6,8
2020	29,3	7,7	5,3

La prevalencia de último año de marihuana no varía respecto a la medición anterior, pasando de 9,9% en el estudio 2018 a 7,7% en el actual. Este resultado ubica a la Región del Maule bajo el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 67
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año. Región del Maule, 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo muestra estabilidad en ambos sexos respecto al estudio anterior; de esta manera, en hombres se observa una variación de 0,7 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 8,2% en 2018 a 4,6% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la

prevalencia pasa de 17,9% en 2018 a 12,2% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 1,4 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 6,3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 204
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad. Región del Maule, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	1,4	2,9	-	2,4	-
1996	0,7	0,9	0,5	1,2	-
1998	2,8	4,8	0,9	4,6	0,5
2000	3,5	5,4	1,7	6,0	0,6
2002	3,1	4,1	2,2	5,1	0,9
2004	2,7	4,1	1,5	5,1	0,1
2006	1,6	3,0	0,3	2,7	0,5
2008	2,4	4,3	0,7	4,5	0,4
2010	2,4	4,8	-	4,6	-
2012	2,7	3,6	2,0	4,9	0,7
2014	5,3	5,2	5,3	8,7	2,1
2016	8,0	10,4	3,2	15,4	2,7
2018	9,9	11,6	8,2	17,9	3,2
2020	7,7	10,9	4,6	12,2	4,6

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.


En la Región del Maule, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 0,6 puntos porcentuales.

TABLA 205
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región del Maule, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
1994	1,4	0,6
1996	1,8	0,2
1998	1,4	0,4
2000	1,8	0,2
2002	2,2	0,8
2004	2,5	0,1
2006	3,3	0,9
2008	2,9	0,5
2010	2,1	0,2
2012	2,5	0,6
2014	2,4	0,7
2016	2,5	0,1
2018	2,5	1,0
2020	3,1	<0,1

La prevalencia de último año de cocaína total muestra una variación estadísticamente significativa, pasando de 1,0% en el estudio 2018 a un valor menor a 0,1% en el actual. Este resultado ubica a la Región del Maule bajo el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 68
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año. Región del Maule, 1994-2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 1,3 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 0,7% en 2018 a no reportar casos en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 1,8% en 2018 a no mostrar casos en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las categorías descritas en la tabla, no se observan brechas significativas por sexo y edad en 2020.

TABLA 206
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año, según sexo y edad.
Región del Maule, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	0,6	1,2	-	1,0	-
1996	0,2	0,2	0,2	0,3	-
1998	0,4	0,7	-	0,7	-
2000	0,2	0,3	0,1	0,3	<0,1
2002	0,8	0,7	0,8	1,2	0,2
2004	0,1	0,3	-	0,2	<0,1
2006	0,9	1,7	-	1,1	0,6
2008	0,5	1,0	-	1,0	-
2010	0,2	0,5	-	0,4	-
2012	0,6	1,0	0,2	1,0	0,3
2014	0,7	1,0	0,4	0,6	0,7
2016	0,1	0,2	-	0,2	-
2018	1,0	1,3	0,7	1,8	0,3
2020	<0,1	<0,1	-	-	<0,1

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región del Maule, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 3,1 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía, pasando de 7,8% a 11,5% en el estudio actual.

TABLA 207
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región del Maule, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	9,3	6,3	2,0
2008			
2010	15,3	10,7	4,0
2012	29,2	18,8	6,7
2014	39,9	25,0	12,6
2016	32,6	19,6	7,8
2018	31,4	18,6	7,8
2020	28,3	19,1	11,5

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio se observa sin variaciones en la prevalencia de último año: pasa de 5,1% en 2018 a 3,2% en 2020. En la actual medición, la prevalencia alguna vez en la vida se mantiene estable (7,0% en 2020) y la medida de último mes no presenta cambios, variando 0,8 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 208
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región del Maule, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2012	8,7	5,1	1,3
2014	9,2	4,7	1,5
2016	7,2	4,1	1,0
2018	9,8	5,1	1,5
2020	7,0	3,2	0,7

La desagregación del uso por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 2,3 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 3,1% en 2018 a 1,6% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 9,9% en 2018 a 5,7% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 0,5 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 209
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región del Maule, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	5,1	7,8	2,6	9,1	1,2
2014	4,7	5,7	3,8	6,1	3,5
2016	4,1	5,4	1,5	8,5	0,9
2018	5,1	7,2	3,1	9,9	1,1
2020	3,2	4,9	1,6	5,7	1,6

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región del Maule, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra un descenso estadísticamente significativo en el caso de tabaco, que pasa de 10,4% en 2018 a 6,1% en 2020; en alcohol se registra estabilidad respecto al estudio anterior con una brecha de 5,0 puntos porcentuales y para marihuana llega a 3,1%, tras no mostrar cambios significativos, con una diferencia de 1,0 punto porcentual respecto a la medición pasada.

TABLA 210
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región del Maule, 1994-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	27,9	34,8	0,6
1996	8,3	27,7	0,6
1998	3,1	13,1	1,0
2000	6,2	18,8	0,9
2002	6,5	20,2	0,6
2004	2,8	8,4	0,2
2006	7,7	23,3	0,5
2008	2,2	11,4	0,3
2010	6,1	13,5	0,4
2012	6,6	9,7	0,5
2014	10,0	21,6	1,6
2016	18,7	31,5	3,5
2018	10,4	16,4	2,1
2020	6,1	11,4	3,1

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente se mantiene estable en la Región del Maule, pasando de 90,7% en 2018 a 86,3% en 2020, y se ubica sobre el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 38,7% en 2020, con una diferencia de 5,7 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (se ha mantenido estable), lo que ubica a la región sobre la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco no ha mostrado cambios respecto a 2018, estableciéndose bajo el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) se mantiene estable, pasando de 43,7% en 2018 a 40,6% en 2020, y ubica a la Región del Maule sobre el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 70,7% en 2020, con una diferencia de 2,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (se ha mantenido estable); este resultado ubica a la región encima de la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) se ha mantenido estable en esta versión del estudio: de 73,8% en 2018 a 79,9% en 2020; así, la región queda por sobre el promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base no ha mostrado cambios en la medición actual (de 84,6% en 2018 a 83,8% en 2020), ubicándose sobre el promedio nacional (80,0%).

TABLA 211
Evolución de percepción de riesgo. Región del Maule, 2000-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	Diario
2000							85,4		85,7
2002							87,8		87,3
2004							85,4		85,1
2006	63,8	95,5	81,6	96,2	83,2	95,9	88,6		90,6
2008	62,8	90,9	79,6	95,9	85,1	97,2	86,2		87,0
2010	39,0	90,8	56,2	95,9	63,1	95,5	88,6		85,3
2012	39,0	85,0	67,1	96,7	72,4	97,1	92,4		89,9
2014	41,5	76,6	70,2	95,1	74,8	94,9	84,5		81,2
2016	49,7	77,2	78,8	95,1	83,2	94,4	92,4	52	92,8
2018	43,7	72,9	73,8	93,9	84,6	94,5	90,7	44,4	82,3
2020	40,6	70,7	79,9	91,4	83,8	91,8	86,3	38,7	76,7
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la Región del Maule descende significativamente respecto a 2018, pasando de 19,9% a 13,8% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 2,3 puntos porcentuales, lo que se traduce en una variación significativa a la baja respecto al estudio pasado, y para pasta base descende significativamente, pasando de 3,7% en el estudio 2018 a 1,2% en el estudio actual.

TABLA 212
Exposición a ofertas de drogas en el último año.
Región del Maule, 2002-2020.

Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año


Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	10,9	2,6	1,7
2004	9,9	2,1	1,8
2006	9,7	2,5	1,9
2008	9,2	4,2	2,0
2010	6,9	0,3	0,4
2012	12,1	2,3	1,5
2014	11,6	2,8	0,3
2016	13,3	3,1	1,5
2018	19,9	4,9	3,7
2020	13,8	2,6	1,2

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana estabilidad, con una diferencia de 7,4 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (42,5% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 17,5% en 2018 a 20,9% en 2020, lo que significa mantenerse sin cambios respecto a 2018; para pasta

base, este indicador se mantiene estable con una variación de 0,6 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 69
Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región del Maule, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE SITUACIÓN EN BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "consumo de drogas en lugares públicos como en la calle o plazas" y el menor es "venta clandestina de alcohol".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región del Maule muestra estabilidad, pasando de 19,0% en 2018 a 16,8% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" no registra variaciones significativas, con una diferencia de 1,4 puntos porcentuales respecto a 2018. No se observan variaciones significativas en las otras categorías descritas.

GRÁFICO 70
Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia.
Región del Maule, 2016-2020.



Región de Ñuble

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región de Ñuble la muestra efectiva fue de 939 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 380 son hombres y 559 mujeres, 341 tienen entre 12 y 34 años y 598 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 151.417 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

Las comunas incluidas en esta versión del estudio fueron Chillán y Chillán Viejo.

TABLA 213
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región de Ñuble.

	Sexo		Tramos de edad		Total
	Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64	
Porcentaje	40,5	59,5	36,3	63,7	100
Muestra (N)	380	559	341	598	939
Población	71.648	79.769	62.205	89.212	151.417

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.


En la Región de Ñuble, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 0,8 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 2,6 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 25,0% a 27,7%.

TABLA 214
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región de Ñuble, 2018-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
2018	59,7	30,2	25,0	14,6
2020	60,5	32,8	27,7	15,6

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) se ha mantenido estable respecto a la medición anterior, pasando de 14,6% en el estudio 2018 a 15,6% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Ñuble bajo el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 71
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región de Ñuble, 2018-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 0,9 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 12,5% en 2018 a 13,7% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 12,1% en 2018 a 11,8% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 2,0 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 3,9 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 215
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región de Ñuble, 2018-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2018	14,6	16,7	12,5	12,1	16,2
2020	15,6	17,6	13,7	11,8	18,2

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.


En la Región de Ñuble, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol cae significativamente respecto al estudio anterior, observándose una variación de 10,0 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año desciende significativamente, con una diferencia de 15,3 puntos porcentuales respecto a 2018: pasa de 69,6% a 54,3%.

TABLA 216
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región de Ñuble, 2018-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2018	86,0	69,6	51,7
2020	76,0	54,3	39,2

La prevalencia de último mes de alcohol muestra una variación estadísticamente significativa, pasando de 51,7% en el estudio 2018 a 39,2% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Ñuble bajo el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 72
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes. Región de Ñuble, 2018-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y variación significativa a la baja en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 11,3 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 47,2% en 2018 a 33,8% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y un descenso estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 51,5% en 2018 a 39,9% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 13,3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 11,3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 217
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes, según sexo y edad. Región de Ñuble, 2018-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2018	51,7	56,4	47,2	51,5	51,9
2020	39,2	45,1	33,8	39,9	38,6

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región de Ñuble, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, no mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 11,5% en 2018 a 12,3% en 2020. La diferencia observada de 11,0 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio anterior, no se observan cambios por sexo y edad.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia una estabilización en el uso de riesgo de alcohol: pasa de 8,0% en 2018 a 6,7% en 2020. En la desagregación por sexo y edad, no se observan variaciones respecto a 2018.

TABLA 218
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Ñuble, 2018-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2018	11,5	16,4	6,5	12,3	11,0
2020	12,3	17,5	6,5	12,3	12,3
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2018	8,0	11,7	4,4	8,8	7,5
2020	6,7	10,7	3,1	6,5	6,9

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran un descenso significativo respecto al estudio anterior; por sexo se

observa una variación estadísticamente significativa en hombres y estabilidad en mujeres, y por edad se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y una variación significativa en el tramo de 35 a 64 años. A su vez, la diferencia observada por sexo no es una brecha estadísticamente significativa, mientras que la variación por tramos de edad es significativa para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población muestra que un 15,1% de la población total de la Región de Ñuble entre 12 y 64 años tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días, lo que se traduce en un descenso significativo respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población no muestra una diferencia significativa por sexo, mientras que por tramos de edad se aprecian diferencias estadísticamente significativas.

TABLA 219
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes, según sexo y edad. Región de Ñuble, 2018-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes (%)					
2018	55,7	61,6	48,8	64,3	50,3
2020	38,5	41,3	35,1	48,5	31,3
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2018	28,8	34,8	23,1	33,1	26,1
2020	15,1	18,6	11,9	19,4	12,1

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA


Al nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.

En la Región de Ñuble, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 5,0 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 1,7 puntos porcentuales respecto a 2018, pasando de 6,7% a 5,0% en el estudio actual.

TABLA 220
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana. Región de Ñuble, 2018-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2018	34,8	11,7	6,7
2020	29,8	8,5	5,0

La prevalencia de último año de marihuana no varía respecto a la medición anterior, pasando de 11,7% en el estudio 2018 a 8,5% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Ñuble bajo el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.



La desagregación del uso de marihuana por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 2,5 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 9,6% en 2018 a 5,8% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 24,4% en 2018 a 14,4% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,9 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 5,7 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 221
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad. Región de Ñuble, 2018-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2018	11,7	14,0	9,6	24,4	3,5
2020	8,5	11,5	5,8	14,4	4,4

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)


A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.

En la Región de Ñuble, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 0,6 puntos porcentuales.

TABLA 222
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total. Región de Ñuble, 2018-2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
2018	5,3	0,9
2020	5,9	1,4

La prevalencia de último año de cocaína total no varía significativamente respecto a la medición anterior, pasando de 0,9% en el estudio 2018 a 1,4% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Ñuble sobre el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.



La desagregación del uso de esta droga por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 0,6 puntos porcentuales y en mujeres pasa de no reportar casos en 2018 a 0,6% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 0,9% en 2018 a 1,3% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,6 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 1,7 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 223
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año, según sexo y edad.
Región de Ñuble, 2018-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2018	0,9	1,7	-	0,9	0,9
2020	1,4	2,3	0,6	1,3	1,5

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región de Ñuble, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas muestra un descenso estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 14,7 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 4,1 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía en la medición actual, pasando de 11,6% en 2018 a 15,1% en 2020.

TABLA 224
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas
energéticas. Región de Ñuble, 2018-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2018	51,7	26,3	11,6
2020	37,0	22,2	15,1

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio se observa un descenso estadísticamente significativo en la prevalencia de último año: pasa de 12,4% en 2018 a 4,0% en 2020. La prevalencia alguna vez en la vida varía significativamente a la baja (10,4% en 2020) en el último estudio y la medida de último mes no presenta cambios, variando 3,4 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 225
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas
energéticas combinadas con alcohol.
Región de Ñuble, 2018-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2018	22,7	12,4	4,5
2020	10,4	4,0	1,1

La desagregación del uso por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y una variación significativa a la baja en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 10,3 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 8,0% en 2018 a 1,7% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa a la baja en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 23,9% en 2018 a 7,6% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 3,4 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 226
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas
energéticas combinadas con alcohol en el último año,
según sexo y edad. Región de Ñuble, 2018-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2018	12,4	16,9	8,0	23,9	4,9
2020	4,0	6,6	1,7	7,6	1,5

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región de Ñuble, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra estabilidad en el caso de tabaco, que pasa de 2,5% en 2018 a 2,9% en 2020; en alcohol se registra una baja significativa con una brecha de 21,3 puntos porcentuales, y para marihuana llega a 0,7%, tras mostrar un descenso estadísticamente significativo de 2,5 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

TABLA 227
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias
principales en el último año.
Región de Ñuble, 2018-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
2018	2,5	27,2	3,2
2020	2,9	5,9	0,7

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente se mantiene estable en la Región de Ñuble, pasando de 89,5% en 2018 a 91,2% en 2020, y se ubica sobre el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 53,1% en 2020, con una diferencia de 10,7 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (se ha mantenido estable), lo que ubica a la región encima de la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco no ha mostrado cambios respecto a 2018, estableciéndose sobre el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) se mantiene estable, pasando de 27,6% en 2018 a 38,4% en 2020, y ubica a la Región de Ñuble sobre el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 69,6% en 2020, con una diferencia de 6,3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (se ha mantenido estable), lo que ubica a la región encima de la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) muestra un aumento estadísticamente significativo en esta versión del estudio: de 69,7% en 2018 a 80,1% en 2020; así, la región queda por sobre el promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base no ha mostrado cambios en la medición actual (de 82,9% en 2018 a 85,7% en 2020), ubicándose sobre el promedio nacional (80,0%).

TABLA 228
Evolución de percepción de riesgo.
Región de Ñuble, 2018-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	
2018	27,6	63,3	69,7	97,5	82,9	96,3	89,5	42,4	82,5
2020	38,4	69,6	80,1	94,8	85,7	95,4	91,2	53,1	85,3
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD


La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la Región de Ñuble se mantiene estable respecto a 2018, pasando de 18,7% a 13,0% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 0,9 puntos porcentuales, lo que se traduce en estabilidad respecto al estudio pasado, y para pasta base no se observan variaciones estadísticamente significativas, pasando de 1,9% en 2018 a 0,8% en el estudio actual.

TABLA 229
Exposición a ofertas de drogas en el último año.
Región de Ñuble, 2018-2020.
Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año (%)

Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2018	18,7	4,1	1,9
2020	13,0	3,2	0,8

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana estabilidad, con una diferencia de 3,0 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (43,5% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 19,3% en 2018 a 20,4% en 2020, lo que significa mantenerse sin cambios respecto a 2018; para pasta base, este indicador se mantiene estable con una variación de 0,6 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 75
Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región de Ñuble, 2018-2020.
Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE SITUACIÓN EN BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas" y el menor es "venta clandestina de alcohol".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región de Ñuble muestra estabilidad, pasando de 17,8% en 2018 a 18,8% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" no registra variaciones significativas, con una diferencia de 0,8 puntos porcentuales respecto a 2018. En las otras categorías descritas, no se observan variaciones significativas en ninguno de los otros indicadores.

GRÁFICO 76
Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia.
Región de Ñuble, 2018-2020.



Región del Biobío

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región del Biobío la muestra efectiva fue de 1.223 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 518 son hombres y 705 mujeres, 522 tienen entre 12 y 34 años y 701 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 865.448 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

Las comunas incluidas en esta versión del estudio fueron Concepción, Los Ángeles, Talcahuano, Penco, Tomé, Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Curanilahue, Chiguayante y Hualpén.

TABLA 230
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región del Biobío.

	Sexo		Tramos de edad		Total
	Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64	
Porcentaje	42,4	57,6	42,7	57,3	100
Muestra (N)	518	705	522	701	1.223
Población	426.402	439.046	405.802	459.646	865.448

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.

En la Región del Biobío, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos sube significativamente respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 8,3 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 2,9 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 26,7% a 31,4%.

TABLA 231
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región del Biobío, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	60,6	44,7	38,6	
1996	61,4	40,9	33,0	
1998	70,7	43,6	37,4	
2000	64,2	43,9	38,6	
2002	65,2	43,3	38,1	25,9
2004	73,9	46,8	41,9	28,8
2006	68,8	46,9	39,5	27,3
2008	65,5	40,3	34,6	23,0
2010	58,4	37,9	33,5	19,2
2012	58,3	35,7	30,4	19,1
2014	61,9	35,3	30,7	20,7
2016	58,7	35,2	30,7	19,0
2018	57,8	33,7	26,7	16,2
2020	66,1	36,6	31,4	19,9

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) se ha mantenido estable respecto a la medición anterior, pasando de 16,2% en el estudio 2018 a 19,9% en el actual. Este resultado ubica a la Región del Biobío sobre el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 77
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región del Biobío, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 4,5 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 15,3% en 2018 a 18,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y un aumento estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 13,2% en 2018 a 12,3% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 8,1 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 3,6 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 232
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región del Biobío, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	25,9	30,0	21,8	23,9	28,1
2004	28,8	32,2	25,5	28,9	28,6
2006	27,3	30,0	24,8	25,4	29,4
2008	23,0	27,1	19,1	22,0	24,2
2010	19,2	21,6	16,9	17,3	21,1
2012	19,1	23,1	15,2	14,1	23,5
2014	20,7	22,5	19,1	16,3	24,2
2016	19,0	20,0	18,2	17,5	20,3
2018	16,2	17,2	15,3	13,2	18,5
2020	19,9	21,7	18,1	12,3	26,6

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.


En la Región del Biobío, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 6,1 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 1,5 puntos porcentuales respecto a 2018: pasa de 58,3% a 59,8%.

TABLA 233
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región del Biobío. 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	68,9	56,0	35,4
1996	77,3	61,7	36,9
1998	85,1	68,8	51,1
2000	78,4	65,9	45,2
2002	86,4	74,0	59,5
2004	88,1	74,4	55,5
2006	86,0	72,8	53,4
2008	79,2	64,9	46,5
2010	72,6	58,2	43,1
2012	72,9	56,8	40,1
2014	79,9	63,5	48,7
2016	73,9	57,1	40,1
2018	75,3	58,3	37,0
2020	81,4	59,8	43,8

La prevalencia de último mes de alcohol no varía significativamente respecto al estudio anterior, pasando de 37,0% en el estudio 2018 a 43,8% en el actual. Este resultado ubica a la Región del Biobío bajo el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 78
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el
último mes. Región del Biobío, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 7,6 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 29,6% en 2018 a 35,4% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas

respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 35,2% en 2018 a 43,3% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 5,7 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 17,0 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 234
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el
último mes, según sexo y edad.
Región del Biobío, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	35,4	42,8	28,5	36,0	34,6
1996	36,9	46,4	27,8	36,4	37,6
1998	51,1	62,0	40,7	48,6	54,3
2000	45,2	53,4	37,3	42,7	48,0
2002	59,5	63,7	55,5	54,0	65,7
2004	55,5	62,9	48,5	49,9	61,7
2006	53,4	60,4	46,7	48,6	58,4
2008	46,5	57,4	36,1	45,2	47,8
2010	43,1	46,9	39,5	38,4	47,8
2012	40,1	49,6	31,0	39,2	40,9
2014	48,7	57,0	40,8	46,1	50,7
2016	40,1	47,4	33,9	41,8	38,6
2018	37,0	44,8	29,6	35,2	38,4
2020	43,8	52,4	35,4	43,3	44,1

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región del Biobío, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, no mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 9,2% en 2018 a 9,4% en 2020. La diferencia observada de 11,7 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio anterior, no se observan cambios por sexo y edad.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia una estabilización en el uso de riesgo de alcohol: pasa de 5,4% en 2018 a 5,6% en 2020. En la desagregación por sexo y edad, no se observan variaciones respecto a 2018.

TABLA 235
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en el último año, según sexo y edad. Región del Biobío, 2008–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2008	10,4	16,8	3,1	11,8	9,1
2010	10,0	15,9	3,5	13,0	7,2
2012	6,4	9,3	2,8	6,5	6,2
2014	7,9	12,5	2,5	11,5	5,2
2016	10,1	13,8	6,5	16,3	4,6
2018	9,2	15,1	2,7	10,3	8,5
2020	9,4	14,5	2,8	12,6	6,4
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2008	6,8	12,0	1,8	7,5	6,0
2010	5,8	9,9	1,9	7,1	4,5
2012	3,6	5,9	1,4	3,7	3,5
2014	5,0	8,7	1,5	7,1	3,4
2016	5,7	8,4	3,5	9,5	2,6
2018	5,4	9,5	1,5	5,5	5,2
2020	5,6	9,9	1,4	7,6	3,8

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran un descenso significativo respecto al estudio anterior; por sexo se observa estabilidad en hombres y una variación significativa en mujeres, y por edad se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y una variación significativa en el tramo de 35 a 64 años. A su vez, la diferencia observada por sexo es una brecha estadísticamente significativa, mientras que la diferencia por tramos de edad no es significativa para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población significa que un 19,9% de la población total de la Región del Biobío entre 12 y 64 años tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días, lo que se traduce en una estabilización respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población muestra una diferencia estadísticamente significativa por sexo y no se aprecian diferencias por tramos de edad.

TABLA 236
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes, según sexo y edad. Región del Biobío, 2012–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes (%)					
2012	48,2	57,2	34,4	56,8	40,8
2014	43,1	49,5	34,5	49,9	38,2
2016	46,9	52,1	40,9	59,5	35,6
2018	57,1	62,0	50,3	62,7	53,3
2020	45,5	53,3	34,3	52,5	39,4
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2012	19,3	28,4	10,7	22,3	16,7
2014	21,0	28,2	14,0	23,0	19,4
2016	18,8	24,7	13,9	24,9	13,8
2018	21,2	27,8	14,9	22,1	20,5
2020	19,9	27,9	12,1	22,8	17,4

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

A nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.


En la Región del Biobío, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana sube significativamente respecto al estudio anterior, observándose una variación de 11,8 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana no presenta variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018, con una diferencia de 1,4 puntos porcentuales: pasa de 5,2% a 6,6% en el estudio actual.

TABLA 237
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región del Biobío, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	9,4	2,5	1,0
1996	10,4	2,1	1,0
1998	12,2	3,4	1,1
2000	14,3	4,0	1,7
2002	15,9	3,5	1,2
2004	17,5	3,8	1,4
2006	18,3	3,9	1,7
2008	18,6	4,2	2,8
2010	16,4	3,3	2,0
2012	17,5	5,4	2,1
2014	24,0	8,4	4,6
2016	28,8	10,0	4,9
2018	25,1	8,3	5,2
2020	36,9	11,1	6,6

La prevalencia de último año de marihuana no varía respecto a la medición anterior, pasando de 8,3% en el estudio 2018 a 11,1% en el actual. Este resultado ubica a la Región del Biobío bajo el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 79
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en
el último año. Región del Biobío, 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 4,5 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 6,1% en 2018 a 7,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa

de 15,2% en 2018 a 17,7% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 2,1 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 8,0 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 238
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en
el último año, según sexo y edad.
Región del Biobío, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	2,5	4,4	0,7	4,0	0,4
1996	2,1	4,0	0,3	3,3	0,5
1998	3,4	5,0	1,9	5,8	0,4
2000	4,0	5,6	2,3	6,6	0,9
2002	3,5	5,1	2,0	5,9	0,8
2004	3,8	5,9	1,7	6,3	1,0
2006	3,9	5,5	2,3	6,7	0,8
2008	4,2	6,8	1,7	7,2	1,0
2010	3,3	5,7	1,1	6,5	0,1
2012	5,4	8,1	2,9	8,8	2,4
2014	8,4	13,4	3,7	13,5	4,5
2016	10,0	13,9	6,7	19,4	2,1
2018	8,3	10,6	6,1	15,2	3,1
2020	11,1	15,1	7,1	17,7	5,2

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.


En la Región del Biobío, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total sube significativamente respecto al estudio anterior, observándose una variación de 3,5 puntos porcentuales.

TABLA 239
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región del Biobío, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
1994	1,7	0,4
1996	1,7	0,4
1998	2,1	0,8
2000	2,6	0,9
2002	2,3	0,6
2004	3,0	0,7
2006	3,3	1,1
2008	3,7	1,0
2010	2,6	0,4
2012	3,2	0,4
2014	4,5	1,4
2016	3,8	1,2
2018	4,0	0,6
2020	7,5	1,3

La prevalencia de último año de cocaína total no varía significativamente respecto a la medición anterior, pasando de 0,6% en el estudio 2018 a 1,3% en el actual. Este resultado ubica a la Región del Biobío sobre el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 80
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total en el último año. Región del Biobío. 1994-2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 1,1 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 0,2% en 2018 a 0,3% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 1,0% en 2018 a 1,4% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,8 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 1,9 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 240
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total en el último año, según sexo y edad.
Región del Biobío, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	0,4	0,9	-	0,7	-
1996	0,4	0,7	0,1	0,7	-
1998	0,8	1,5	0,1	1,4	0,1
2000	0,9	1,5	0,4	1,5	0,3
2002	0,6	0,7	0,4	1,0	0,1
2004	0,7	1,2	0,3	1,1	0,3
2006	1,1	1,7	0,5	1,9	0,3
2008	1,0	1,5	0,5	1,8	0,2
2010	0,4	0,7	0,1	0,6	0,1
2012	0,4	0,8	0,1	0,8	0,2
2014	1,4	2,6	0,2	1,6	1,2
2016	1,2	2,0	0,6	2,1	0,5
2018	0,6	1,1	0,2	1,0	0,3
2020	1,3	2,2	0,3	1,4	1,1

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región del Biobío, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 3,7 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 1,7 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes muestra una variación significativa al alza, pasando de 12,7% a 17,4% en el estudio actual.

TABLA 241
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región del Biobío, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	13,8	9,0	2,6
2008			
2010	19,9	15,1	5,4
2012	26,7	17,1	6,6
2014	46,2	30,7	12,7
2016	45,2	25,3	11,2
2018	42,3	27,5	12,7
2020	46,0	29,2	17,4

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio se observa un descenso estadísticamente significativo en la prevalencia de último año: pasa de 10,1% en 2018 a 5,6% en 2020. En la actual medición, la prevalencia alguna vez en la vida se mantiene estable (12,9% en 2020) y la medida de último mes no presenta cambios, variando 1,4 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 242
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región del Biobío, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2012	7,8	5,0	1,5
2014	13,8	8,4	3,6
2016	11,7	6,6	1,6
2018	14,1	10,1	3,7
2020	12,9	5,6	2,3

La desagregación del uso por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 6,5 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 5,8% en 2018 a 3,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y un descenso estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 14,0% en 2018 a 9,4% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 5,0 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 243
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región del Biobío, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	5,0	5,8	4,2	9,0	1,4
2014	8,4	12,4	4,6	15,0	3,2
2016	6,6	9,8	3,8	12,2	1,8
2018	10,1	14,7	5,8	14,0	7,2
2020	5,6	8,2	3,1	9,4	2,2

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región del Biobío, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra un descenso estadísticamente significativo en el caso de tabaco, que pasa de 12,9% en 2018 a 2,4% en 2020; en alcohol se registra una baja significativa con una brecha de 20,6 puntos porcentuales, y para marihuana llega a 1,0%, tras mostrar un descenso estadísticamente significativo de 2,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

TABLA 244
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región del Biobío, 1994-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	19,7	33,4	1,4
1996	5,0	13,7	1,2
1998	4,8	12,5	0,9
2000	5,2	19,2	0,9
2002	3,0	16,0	0,7
2004	3,9	14,5	0,7
2006	5,9	17,4	0,8
2008	5,5	15,9	0,3
2010	8,9	17,2	0,6
2012	13,7	27,0	1,5
2014	9,6	25,5	1,9
2016	12,6	24,8	4,0
2018	12,9	27,1	3,2
2020	2,4	6,5	1,0

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente aumenta significativamente en la Región del Biobío, pasando de 82,1% en 2018 a 88,5% en 2020, y se ubica sobre el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 39,1% en 2020, con una diferencia de 3,1 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (se ha mantenido estable), lo que ubica a la región encima de la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco varía significativamente al alza respecto a 2018, estableciéndose sobre el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) desciende significativamente, pasando de 36,1% en 2018 a 29,5% en 2020, y ubica a la Región del Biobío bajo el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 66,7% en 2020, con una variación significativa a la baja de 6,1 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, lo que ubica a la región sobre la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) se ha mantenido estable en esta versión del estudio: de 71,9% en 2018 a 72,9% en 2020; así, la región queda por sobre el promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base no ha mostrado cambios en la medición actual (de 78,8% en 2018 a 79,0% en 2020), ubicándose bajo el promedio nacional (80,0%).

TABLA 245
Evolución de percepción de riesgo. Región del Biobío, 2000-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	Diario
2000							87,1		87,3
2002							84,7		83,8
2004							85,6		82,3
2006	55,9	93,1	72,9	98,6	79,0	98,6	87,8		83,7
2008	59,6	88,8	78,4	98,1	83,9	98,4	86,7		83,1
2010	48,7	84,4	74,0	92,8	77,9	93,7	88,3		83,2
2012	52,1	82,6	77,8	93,5	83,3	94,1	86,1		76,5
2014	38,1	74,8	73,4	95,7	80,4	95,7	89,1		86,3
2016	27,6	64,6	75,0	91,4	82,0	92,2	85,6	29,1	81,6
2018	36,1	72,8	71,9	92,5	78,8	94,5	82,1	36,0	69,8
2020	29,5	66,7	72,9	91,3	79,0	93,0	88,5	39,1	81,8
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la Región del Biobío se mantiene estable respecto a 2018, pasando de 18,6% a 19,5% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 0,7 puntos porcentuales, lo que se traduce en estabilidad respecto al estudio pasado, y para pasta base no se observan variaciones estadísticamente significativas, pasando de 3,1% en el estudio 2018 a 2,5% en el estudio actual.

TABLA 246
Exposición a ofertas de drogas en el último año.
Región del Biobío, 2002-2020.


Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año

Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	9,9	1,9	1,5
2004	12,8	2,3	1,9
2006	11,2	2,5	2,7
2008	12,1	3,2	2,7
2010	5,8	1,4	2,1
2012	9,4	1,9	1,5
2014	15,4	3,0	1,9
2016	19,5	3,3	1,2
2018	18,6	4,9	3,1
2020	19,5	4,2	2,5

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana una variación significativa al alza, con una diferencia de 8,7 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (51,0% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 18,1% en 2018 a 21,3% en 2020, lo que significa mantenerse sin cambios respecto a 2018; para pasta base, este indicador aumenta significativamente con una variación de 5,8 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 81
Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región del Biobío, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS EN EL BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "tráfico de drogas" y el menor es "venta clandestina de alcohol".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región del Biobío muestra estabilidad, pasando de 22,0% en 2018 a 27,6% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" no registra variaciones significativas, con una diferencia de 0,6 puntos porcentuales respecto a 2018. En las otras categorías descritas, se observan variaciones estadísticamente significativas en "robos en las casas", "asaltos o robos en las calles" y "balaceras y acciones violentas con armas de fuego".

GRÁFICO 82
Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Región del Biobío, 2016-2020.



Región de La Araucanía

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región de La Araucanía la muestra efectiva fue de 1.172 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 517 son hombres y 655 mujeres, 452 tienen entre 12 y 34 años y 720 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 369.032 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

Las comunas incluidas en esta versión del estudio fueron Temuco, Angol, Padre Las Casas, Villarrica, Lautaro, Nueva Imperial, Pitrufquén y Victoria.

TABLA 247
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región de La Araucanía.

	Sexo		Tramos de edad		Total
	Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64	
Porcentaje	44,1	55,9	38,6	61,4	100
Muestra (N)	517	655	452	720	1172
Población	178.506	190.526	171.196	197.836	369.032

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.


En la Región de La Araucanía, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 4,7 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 0,3 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 24,1% a 26,7%.

TABLA 248
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región de La Araucanía, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	62,4	40,7	37,3	
1996	71,9	47,9	39,0	
1998	72,0	46,2	37,3	
2000	70,4	49,5	41,7	
2002	63,9	41,6	37,4	23,6
2004	70,4	43,1	37,9	24,3
2006	66,6	45,6	39,9	25,0
2008	69,9	47,5	41,6	25,4
2010	55,8	34,9	30,5	21,8
2012	58,4	37,4	33,9	19,6
2014	61,9	33,8	28,5	16,2
2016	63,6	33,7	27,9	16,2
2018	56,9	30,2	24,1	14,0
2020	61,6	30,5	26,7	17,3

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) aumenta significativamente respecto a la medición anterior, pasando de 14,0% en el estudio 2018 a 17,3% en el actual. Este resultado ubica a la Región de La Araucanía bajo el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 83
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región de La Araucanía, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 2,4 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 11,6% en 2018 a 15,9% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y un aumento estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 10,9% en 2018 a 9,4% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 7,4 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 3,0 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 249
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región de La Araucanía, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	23,6	27,2	20,2	23,1	24,3
2004	24,3	26,7	22,1	24,2	24,5
2006	25,0	25,9	24,2	24,2	25,9
2008	25,4	24,6	26,2	22,2	29,0
2010	21,8	26,3	17,6	21,2	22,4
2012	19,6	19,3	19,8	19,4	19,7
2014	16,2	19,9	12,8	12,9	18,8
2016	16,2	17,7	14,8	13,5	19,1
2018	14,0	16,5	11,6	10,9	16,8
2020	17,3	18,9	15,9	9,4	24,2

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.


En la Región de La Araucanía, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 0,1 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año desciende significativamente, con una diferencia de 8,7 puntos porcentuales respecto a 2018; pasa de 63,5% a 54,8%.

TABLA 250
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región de La Araucanía, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último Año	Último Mes
1994	73,9	61,3	37,3
1996	85,2	69,1	47,6
1998	87,0	75,0	54,4
2000	89,9	78,5	54,5
2002	83,7	74,0	59,0
2004	84,1	73,4	53,7
2006	85,4	74,4	55,3
2008	85,8	74,1	55,2
2010	76,8	63,2	48,7
2012	81,2	67,9	52,2
2014	83,0	72,5	56,0
2016	87,4	68,4	48,9
2018	79,4	63,5	40,1
2020	79,5	54,8	38,1

La prevalencia de último mes de alcohol no varía significativamente, pasando de 40,1% en el estudio 2018 a 38,1% en el actual. Este resultado ubica a la Región de La Araucanía bajo el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 84
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes. Región de La Araucanía, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 1,9 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 33,1% en 2018 a 31,2% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa

de 36,2% en 2018 a 33,6% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 1,5 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 14,2 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 251
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes, según sexo y edad.
Región de La Araucanía, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	37,3	46,9	28,2	43,7	27,2
1996	47,6	58,9	36,9	48,7	46,0
1998	54,4	64,6	44,9	51,3	58,9
2000	54,5	61,7	47,7	52,8	56,8
2002	59,0	69,2	49,4	55,0	64,1
2004	53,7	58,4	49,3	51,3	56,6
2006	55,3	60,2	50,6	53,1	57,9
2008	55,2	61,7	49,0	54,6	55,9
2010	48,7	60,3	37,8	47,5	49,8
2012	52,2	58,4	46,4	46,7	58,2
2014	56,0	62,6	50,0	54,9	56,9
2016	48,9	55,2	42,9	48,8	49,1
2018	40,1	47,3	33,1	36,2	43,5
2020	38,1	45,4	31,2	33,6	42,0

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región de La Araucanía, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, no mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 5,2% en 2018 a 5,5% en 2020. La diferencia observada de 7,3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio anterior, no se observan cambios por sexo y edad.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia una estabilización en el uso de riesgo de alcohol: pasa de 3,3% en 2018 a 3,0% en 2020. En la desagregación por sexo y edad, no se aprecian variaciones respecto a 2018.

TABLA 252
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de La Araucanía, 2008–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2008	10,0	16,7	3,0	13,4	6,3
2010	6,9	11,9	0,8	7,8	6,1
2012	8,4	12,3	3,9	12,4	4,7
2014	9,1	15,1	2,5	8,4	9,7
2016	9,5	17,0	2,0	15,1	3,5
2018	5,2	9,1	0,8	4,6	5,7
2020	5,5	8,9	1,6	6,6	4,7
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2008	7,4	12,9	2,1	9,7	4,8
2010	4,4	8,6	0,4	4,9	3,9
2012	5,7	9,3	2,4	7,8	3,5
2014	6,6	12,0	1,7	6,1	7,0
2016	6,5	11,9	1,3	10,3	2,4
2018	3,3	6,2	0,4	2,7	3,8
2020	3,0	5,4	0,8	3,1	2,9

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran un descenso significativo respecto al estudio anterior; por sexo se observa una variación estadísticamente significativa en hombres y estabilidad en mujeres, y por edad se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y una disminución significativa en el tramo de 35 a 64 años. A su vez, la diferencia observada por sexo no es una brecha estadísticamente significativa, y la diferencia por tramos de edad tampoco es significativa para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población significa que un 13,0% de la población total de la Región de La Araucanía entre 12 y 64 años tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días, lo que se traduce en un descenso significativo respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población muestra una diferencia estadísticamente significativa por sexo y no se observan diferencias por tramos de edad.

TABLA 253
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes, según sexo y edad. Región de La Araucanía, 2012–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes (%)					
2012	48,1	56,6	38,3	55,5	41,7
2014	53,6	67,0	38,3	60,9	48,3
2016	44,0	53,9	31,9	55,1	32,3
2018	49,4	54,6	42,1	48,3	50,1
2020	34,1	37,5	29,4	36,4	32,4
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2012	25,1	33,0	17,8	25,9	24,3
2014	30,0	41,9	19,1	33,4	27,5
2016	21,5	29,7	13,7	26,9	15,8
2018	19,8	25,8	13,9	17,5	21,8
2020	13,0	17,0	9,2	12,3	13,6

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

A nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.


En la Región de La Araucanía, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 2,9 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana no presenta variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018, con una diferencia de 0,2 puntos porcentuales: pasa de 5,6% a 5,4%.

TABLA 254
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región de La Araucanía, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	8,5	2,4	0,8
1996	11,6	1,8	1,1
1998	11,8	2,7	0,6
2000	14,8	4,3	1,3
2002	12,7	2,4	1,7
2004	14,4	2,8	1,1
2006	16,7	4,3	1,7
2008	19,2	4,2	2,8
2010	13,3	2,9	0,9
2012	17,6	6,2	2,3
2014	25,5	9,7	3,6
2016	27,5	11,8	7,9
2018	28,6	9,5	5,6
2020	31,5	7,9	5,4

La prevalencia de último año de marihuana no varía respecto a la medición anterior, pasando de 9,5% en el estudio 2018 a 7,9% en el actual. Este resultado ubica a la Región de La Araucanía bajo el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 85
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año. Región de La Araucanía, 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 1,0 punto porcentual y en mujeres pasa de 5,3% en 2018 a 3,4% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a

2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 15,0% en 2018 a 12,6% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,7 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 9,4 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 255
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad.
Región de La Araucanía, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	2,4	3,4	1,4	3,9	-
1996	1,8	1,9	1,7	3,1	-
1998	2,7	4,1	1,3	4,4	0,2
2000	4,3	7,7	1,0	6,7	1,0
2002	2,4	4,5	0,4	3,9	0,6
2004	2,8	3,4	2,3	4,9	0,4
2006	4,3	6,4	2,3	7,4	0,6
2008	4,2	5,3	3,2	7,5	0,5
2010	2,9	5,4	0,7	4,1	1,9
2012	6,2	8,2	4,4	9,2	2,9
2014	9,7	11,2	8,4	16,6	4,5
2016	11,8	16,6	7,3	18,6	4,6
2018	9,5	13,8	5,3	15,0	4,6
2020	7,9	12,8	3,4	12,6	3,9

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.


En la Región de La Araucanía, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 1,0 punto porcentual.

TABLA 256
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región de La Araucanía, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último Año
1994	2,3	0,6
1996	2,6	0,4
1998	1,8	0,3
2000	2,4	0,9
2002	2,4	0,9
2004	2,3	0,7
2006	1,8	1,0
2008	3,0	0,9
2010	1,7	0,3
2012	4,0	0,5
2014	2,8	0,7
2016	7,0	4,1
2018	4,0	0,4
2020	5,0	0,8

La prevalencia de último año de cocaína total no varía significativamente, pasando de 0,4% en el estudio 2018 a 0,8% en el actual. Este resultado ubica a la Región de La Araucanía sobre el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 86
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total en el último año. Región de La Araucanía, 1994-2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 0,7 puntos porcentuales y en mujeres pasa de no reportar casos en 2018 a 0,2% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 0,7% en 2018 a 1,3% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 1,3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 257
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total en el último año, según sexo y edad.
Región de La Araucanía, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	0,6	-	1,2	1,0	-
1996	0,4	0,8	-	0,6	-
1998	0,3	0,7	-	0,4	0,2
2000	0,9	1,8	<0,1	1,6	-
2002	0,9	1,8	-	1,6	-
2004	0,7	0,8	0,7	1,3	-
2006	1,0	0,9	1,0	1,8	-
2008	0,9	1,3	0,4	1,6	0,1
2010	0,3	0,6	-	0,6	-
2012	0,5	0,1	0,9	0,4	0,7
2014	0,7	0,7	0,7	0,8	0,6
2016	4,1	7,0	1,3	7,5	0,4
2018	0,4	0,8	-	0,7	0,2
2020	0,8	1,5	0,2	1,3	0,4

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región de La Araucanía, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas muestra un descenso estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 11,0 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año desciende significativamente, con una diferencia de 4,6 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes muestra una variación significativa al alza, pasando de 8,8% a 13,3% en el estudio actual.

TABLA 258
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región de La Araucanía, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	15,0	9,4	3,1
2008			
2010	18,6	13,1	4,4
2012	30,0	19,5	7,2
2014	37,3	23,1	8,3
2016	45,5	29,4	12,1
2018	51,3	28,9	8,8
2020	40,3	24,3	13,3

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio se observa un descenso estadísticamente significativo en la prevalencia de último año: pasa de 4,4% en 2018 a 1,8% en 2020. En la actual medición, la prevalencia alguna vez en la vida varía significativamente (5,8% en 2020) y la medida de último mes no presenta cambios, manteniéndose en 0,4%.

TABLA 259
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región de La Araucanía, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2012	5,9	4,0	1,6
2014	9,0	5,5	1,8
2016	11,9	8,7	2,5
2018	8,4	4,4	0,4
2020	5,8	1,8	0,4

La desagregación del uso por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en hombres y una variación significativa a la baja en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 3,2 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 2,3% en 2018 a 0,5% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y un descenso estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 6,0% en 2018 a 3,6% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 2,6 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 260
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de La Araucanía, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	4,0	5,8	2,3	6,8	0,9
2014	5,5	7,6	3,5	8,5	3,1
2016	8,7	11,3	6,2	15,3	1,6
2018	4,4	6,5	2,3	6,0	2,9
2020	1,8	3,3	0,5	3,6	0,3

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región de La Araucanía, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra un descenso estadísticamente significativo en el caso de tabaco, que pasa de 10,1% en 2018 a 3,7% en 2020; en alcohol se registra una baja significativa respecto a 2018 con una brecha de 21,2 puntos porcentuales y para marihuana llega a 1,2%, tras mostrar un descenso estadísticamente significativo de 2,4 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

TABLA 261
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región de La Araucanía, 1994-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	4,8	22,1	1,6
1996	3,1	12,8	0,5
1998	5,6	11,7	0,9
2000	3,8	19,7	0,9
2002	6,0	22,1	0,4
2004	2,4	14,1	0,7
2006	5,3	29,8	1,8
2008	8,6	26,4	0,7
2010	10,8	28,5	0,4
2012	15,2	34,7	2,0
2014	9,8	30,5	2,9
2016	3,5	17,6	1,5
2018	10,1	27,0	3,6
2020	3,7	5,8	1,2

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente se mantiene estable en la Región de La Araucanía, pasando de 90,5% en 2018 a 91,1% en 2020, y se ubica sobre el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 41,6% en 2020, con una diferencia de 2,4 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (se ha mantenido estable), lo que ubica a la región sobre la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco no ha mostrado cambios respecto a 2018, estableciéndose sobre el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) se mantiene estable, pasando de 36,3% en 2018 a 34,8% en 2020, y ubica a la Región de La Araucanía sobre el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 78,5% en 2020, con una variación significativa al alza de 9,4 puntos porcentuales respecto al estudio anterior; este resultado ubica a la región encima de la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) muestra un descenso estadísticamente significativo en esta versión del estudio: de 77,4% en 2018 a 71,5% en 2020; así, la región queda por debajo del promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base varía significativamente de 86,4% en 2018 a 79,5% en 2020, ubicándose bajo el promedio nacional de 80,0%.

TABLA 262
Evolución de percepción de riesgo. Región de La Araucanía, 2000-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	
2000							87,0		84,5
2002							87,6		87,2
2004							84,5		78,9
2006	62,3	95,1	76,6	98,3	79,2	97,6	84,2		83,1
2008	49,2	87,3	72,2	96,3	76,7	95,5	85,7		79,8
2010	63,2	88,1	79,4	95,7	84,9	96,9	87,1		81,4
2012	50,0	84,8	70,3	95,6	74,5	95,2	87,6		83,5
2014	34,0	70,4	70,5	93,3	78,3	92,3	87,4		81,1
2016	38,2	73,1	75,7	95,5	82,9	96,0	89,8	33,7	86,9
2018	36,3	69,1	77,4	94,0	86,4	94,5	90,5	39,2	82,5
2020	34,8	78,5	71,5	95,6	79,5	95,1	91,1	41,6	85,8
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la Región de La Araucanía desciende significativamente respecto a 2018, pasando de 17,1% a 12,5% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 0,9 puntos porcentuales, lo que se traduce en estabilidad respecto al estudio pasado, y para pasta base no se observan variaciones estadísticamente significativas, pasando de 1,7% en el estudio 2018 a 2,6% en el estudio actual.

TABLA 263
Exposición a ofertas de drogas en el último año.
Región de La Araucanía, 2002-2020.

Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año


Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	10,3	1,3	1,2
2004	12,3	3,0	1,7
2006	15,4	2,8	2,0
2008	12,2	3,6	0,7
2010	8,4	1,3	0,8
2012	12,6	3,2	1,2
2014	16,7	2,4	0,3
2016	21,2	5,6	1,0
2018	17,1	3,5	1,7
2020	12,5	4,4	2,6

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana estabilidad, con una diferencia de 2,6 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (35,6% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 12,7% en 2018 a 14,1% en 2020, lo que significa mantenerse sin cambios respecto a 2018; para pasta base, este indicador se mantiene estable con una variación de 0,6 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 87

Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región de La Araucanía, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS EN EL BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas" y el menor es "venta clandestina de alcohol".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región de La Araucanía muestra estabilidad, pasando de 16,9% en 2018 a 17,1% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" registra un descenso estadísticamente significativo, con una diferencia de 3,1 puntos porcentuales respecto a 2018. En las otras categorías descritas, solo se observa una variación estadísticamente significativa en "balaceras y acciones violentas con armas de fuego".

GRÁFICO 88

Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Región de La Araucanía, 2016-2020.



Región de Los Ríos

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región de Los Ríos la muestra efectiva fue de 803 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 346 son hombres y 457 mujeres, 334 tienen entre 12 y 34 años y 469 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 164.758 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

Las comunas incluidas en esta versión del estudio fueron Valdivia, Panguipulli, La Unión y Río Bueno.

TABLA 264
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región de Los Ríos.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Porcentaje	43,1	56,9	41,6	58,4	100
Muestra (N)	346	457	334	469	803
Población	80.797	83.961	79.490	85.268	164.758

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.

En la Región de Los Ríos, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 4,3 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 1,1 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 24,2% a 24,0%.

TABLA 265
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región de Los Ríos, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	65,4	46,8	44,9	
1996	78,8	59,9	52,6	
1998	77,3	51,0	46,7	
2000	69,8	48,6	43,0	
2002	63,8	42,9	35,1	24,7
2004	72,6	48,4	44,7	33,6
2006	68,6	54,0	46,3	31,6
2008	73,9	46,0	38,8	26,9
2010	58,4	40,2	37,4	29,1
2012	57,7	35,4	30,0	15,4
2014	60,3	38,5	31,4	16,8
2016	70,9	39,6	33,8	20,2
2018	53,7	27,5	24,2	13,0
2020	58,0	28,6	24,0	12,1

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) se ha mantenido estable respecto a la medición anterior, pasando de 13,0% en el estudio 2018 a 12,1% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Los Ríos bajo el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 89
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región de Los Ríos, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 0,1 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 13,0% en 2018 a 11,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 9,8% en 2018 a 10,5% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 2,1 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 1,9 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 266
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región de Los Ríos, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	24,7	24,5	25,0	23,0	26,5
2004	33,6	41,6	25,3	32,2	35,0
2006	31,6	34,8	27,6	29,5	33,8
2008	26,9	24,0	29,8	29,1	24,5
2010	29,1	28,5	29,6	29,0	29,2
2012	15,4	16,2	14,7	13,2	17,7
2014	16,8	16,9	16,7	13,8	19,2
2016	20,2	24,7	15,8	15,3	24,3
2018	13,0	12,9	13,0	9,8	15,7
2020	12,1	13,0	11,1	10,5	13,6

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.

En la Región de Los Ríos, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol sube significativamente respecto al estudio anterior, observándose una variación de 7,7 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 4,4 puntos porcentuales respecto a 2018: pasa de 54,0% a 58,4%.

TABLA 267
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región de Los Ríos, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	63,8	53,0	37,8
1996	89,4	73,8	54,2
1998	87,7	74,1	59,7
2000	85,7	74,5	54,7
2002	80,5	71,0	54,4
2004	87,4	71,6	52,3
2006	83,2	76,4	64,0
2008	86,8	73,4	51,0
2010	73,0	62,5	55,5
2012	82,6	69,0	50,2
2014	75,7	63,5	51,3
2016	86,2	68,8	48,5
2018	70,6	54,0	39,9
2020	78,3	58,4	43,8

La prevalencia de último mes de alcohol no varía significativamente, pasando de 39,9% en el estudio 2018 a 43,8% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Los Ríos bajo el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 90
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el
último mes. Región de Los Ríos, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 4,4 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 34,1% en 2018 a 37,8% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa al alza en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. Así, en

el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 38,6% en 2018 a 49,6% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 2,5 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 12,3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 268
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el
último mes, según sexo y edad.
Región de Los Ríos, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	37,8	56,1	27,1	45,3	29,7
1996	54,2	64,9	42,8	60,0	47,4
1998	59,7	70,8	48,1	57,3	63,0
2000	54,7	66,7	43,7	54,6	54,8
2002	54,4	58,4	50,4	47,9	61,2
2004	52,3	61,7	42,5	50,8	53,7
2006	64,0	70,2	56,5	60,9	67,4
2008	51,0	60,8	41,3	52,3	49,5
2010	55,5	71,1	40,6	51,6	58,9
2012	50,2	61,7	39,1	48,4	51,9
2014	51,3	59,0	43,8	50,0	52,4
2016	48,5	59,4	37,9	46,3	50,4
2018	39,9	45,7	34,1	38,6	41,0
2020	43,8	50,1	37,8	49,6	38,5

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región de Los Ríos, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, no mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 8,3% en 2018 a 9,2% en 2020. La diferencia observada de 12,9 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio anterior, no se observan variaciones por sexo y edad.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia una estabilización en el uso de riesgo de alcohol: pasa de 4,5% en 2018 a 5,4% en 2020. En la desagregación por sexo respecto a 2018 no se observan cambios, y por tramos de edad no se aprecian variaciones.

TABLA 269
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Los Ríos, 2008–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2008	8,2	11,7	3,8	12,5	3,7
2010	12,1	16,4	6,2	14,0	10,6
2012	12,3	21,6	1,5	11,5	13,0
2014	10,3	16,8	2,7	15,3	6,5
2016	6,5	7,1	5,8	9,4	4,1
2018	8,3	13,4	2,5	13,4	4,4
2020	9,2	15,3	2,4	11,3	7,1
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2008	6,0	9,6	2,5	8,9	2,8
2010	7,5	12,1	3,2	8,3	6,9
2012	8,5	16,3	1,0	7,5	9,4
2014	6,5	11,7	1,5	9,3	4,3
2016	4,5	5,3	3,6	6,4	2,8
2018	4,5	7,7	1,3	6,8	2,5
2020	5,4	9,6	1,3	6,9	4,0

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran un descenso significativo respecto al estudio anterior; por sexo se observan variaciones significativas en ambos sexos y por edad se aprecian variaciones estadísticamente significativas en ambos tramos de edad. A su vez, las diferencias observadas por sexo y edad no son estadísticamente significativas para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población muestra que un 17,6% de la población total de la Región de Los Ríos entre 12 y 64 años tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días, lo que se traduce en un descenso significativo respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población no muestra por sexo y edad diferencias estadísticamente significativas.

TABLA 270
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes, según sexo y edad. Región de Los Ríos, 2012–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes (%)					
2012	44,1	65,9	10,9	49,8	38,9
2014	53,3	58,5	46,6	60,5	47,8
2016	48,9	49,0	48,8	58,0	41,8
2018	58,8	60,3	56,7	63,6	54,7
2020	40,3	42,6	37,3	39,9	40,7
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2012	22,1	40,7	4,2	24,1	20,2
2014	27,4	34,5	20,4	30,2	25,0
2016	23,7	29,1	18,5	26,8	21,1
2018	23,4	27,5	19,3	24,5	22,5
2020	17,6	21,3	14,1	19,8	15,7

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

A nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.

En la Región de Los Ríos, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana sube significativamente respecto al estudio anterior, observándose una variación de 7,4 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana no presenta variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018, con una diferencia de 2,4 puntos porcentuales: pasa de 4,8% a 7,2%.

TABLA 271
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región de Los Ríos, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	11,2	3,9	0,7
1996	21,6	5,7	2,2
1998	12,5	2,1	0,4
2000	15,4	4,6	1,4
2002	13,7	1,7	0,6
2004	19,4	4,1	2,0
2006	25,1	8,4	2,4
2008	25,1	6,6	1,2
2010	16,8	3,9	3,5
2012	21,0	6,9	4,7
2014	24,9	9,6	6,2
2016	31,3	12,3	5,5
2018	21,4	7,6	4,8
2020	28,8	12,0	7,2

La prevalencia de último año de marihuana muestra una variación estadísticamente significativa, pasando de 7,6% en el estudio 2018 a 12,0% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Los Ríos sobre el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 91
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año. Región de Los Ríos, 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 6,9 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 6,7% en 2018 a 8,8% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas

respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 12,4% en 2018 a 19,6% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 1,7 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 6,5 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 272
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad.
Región de Los Ríos, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	3,9	9,8	0,4	7,4	-
1996	5,7	11,1	-	10,4	0,2
1998	2,1	3,1	1,0	3,7	-
2000	4,6	8,2	1,3	8,5	-
2002	1,7	2,8	0,7	3,4	-
2004	4,1	5,6	2,5	8,4	-
2006	8,4	8,7	8,1	14,4	1,9
2008	6,6	11,4	1,9	12,1	0,6
2010	3,9	6,3	1,7	7,1	1,1
2012	6,9	11,0	2,9	12,1	1,8
2014	9,6	14,7	4,7	18,4	2,4
2016	12,3	15,0	9,8	22,5	3,7
2018	7,6	8,4	6,7	12,4	3,2
2020	12,0	15,3	8,8	19,6	4,9

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.

En la Región de Los Ríos, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 0,7 puntos porcentuales.

TABLA 273
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región de Los Ríos, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
1994	1,6	0,2
1996	10,1	5,8
1998	1,8	0,2
2000	0,9	0,3
2002	2,8	0,6
2004	1,5	0,3
2006	4,5	1,1
2008	1,8	0,5
2010	2,5	1,4
2012	4,3	<0,1
2014	3,1	<0,1
2016	4,7	0,7
2018	2,7	1,1
2020	3,4	0,3

La prevalencia de último año de cocaína total no varía significativamente respecto a la medición anterior, pasando de 1,1% en el estudio 2018 a 0,3% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Los Ríos bajo el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 92
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total en el último año. Región de Los Ríos. 1994-2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 0,9 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 0,7% en 2018 a no reportar casos en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la

prevalencia pasa de 2,1% en 2018 a 0,5% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,1 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 0,6 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 274
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total en el último año, según sexo y edad.
Región de Los Ríos, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	0,2	0,6	-	0,4	-
1996	5,8	11,3	-	10,6	0,2
1998	0,2	0,4	-	0,4	-
2000	0,3	0,5	0,1	0,5	-
2002	0,6	1,2	-	1,2	-
2004	0,3	0,6	-	0,7	-
2006	1,1	0,5	1,9	2,2	-
2008	0,5	0,7	0,3	0,6	0,3
2010	1,4	2,2	0,6	2,0	0,8
2012	<0,1	-	0,1	0,1	-
2014	<0,1	<0,1	-	<0,1	-
2016	0,7	1,1	0,4	0,5	0,9
2018	1,1	1,5	0,7	2,1	0,2
2020	0,3	0,6	-	0,5	0,1

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región de Los Ríos, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 2,4 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 3,1 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 7,8% a 11,4% en el estudio actual.

TABLA 275
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región de Los Ríos, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	15,5	9,9	0,7
2008			
2010	6,2	5,2	3,7
2012	26,2	20,5	8,0
2014	39,9	25,7	9,8
2016	42,7	24,9	8,5
2018	33,8	17,1	7,8
2020	36,2	20,2	11,4

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio se observa sin variaciones en la prevalencia de último año: pasa de 3,1% en 2018 a 2,7% en 2020. En la actual medición, la prevalencia alguna vez en la vida se mantiene estable (7,8% en 2020) y la medida de último mes no presenta cambios, variando 0,1 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 276
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región de Los Ríos, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2012	10,0	2,7	2,1
2014	12,6	7,3	1,2
2016	11,9	7,1	1,6
2018	9,9	3,1	0,8
2020	7,8	2,7	0,7

La desagregación del uso por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 0,4 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 2,5% en 2018 a 2,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 5,7% en 2018 a 5,2% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 0,5 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 277
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Los Ríos, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	2,7	5,2	0,3	5,4	0,0
2014	7,3	10,9	3,7	13,7	2,1
2016	7,1	9,5	4,8	14,7	0,7
2018	3,1	3,6	2,5	5,7	0,8
2020	2,7	3,2	2,1	5,2	0,3

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región de Los Ríos, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra un descenso estadísticamente significativo en el caso de tabaco, que pasa de 12,9% en 2018 a 6,2% en 2020; en alcohol se registra una baja significativa con una brecha de 16,3 puntos porcentuales y para marihuana llega a 1,5%, tras no mostrar cambios significativos, con una diferencia de 1,0 punto porcentual respecto al estudio anterior.

TABLA 278
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región de Los Ríos, 1994-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	17,0	24,9	3,2
1996	3,3	10,9	-
1998	6,9	11,3	1,0
2000	4,6	18,0	0,4
2002	3,6	11,4	0,2
2004	0,5	0,6	0,6
2006	9,0	20,7	3,1
2008	10,1	31,0	1,3
2010	5,5	14,0	0,7
2012	9,9	26,3	1,3
2014	5,7	11,3	1,7
2016	9,8	25,9	3,5
2018	12,9	30,3	2,5
2020	6,2	14,0	1,5

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente aumenta significativamente en la Región de Los Ríos, pasando de 78,7% en 2018 a 88,1% en 2020, y se ubica sobre el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 46,5% en 2020, con una variación significativa al alza de 13,3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, lo que ubica a la región sobre la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco aumenta significativamente respecto a 2018, estableciéndose sobre el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) se mantiene estable, pasando de 38,2% en 2018 a 39,8% en 2020, y ubica a la Región de Los Ríos sobre el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 69,3% en 2020, con una diferencia de 4,9 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (se ha mantenido estable); este resultado ubica a la región encima de la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) se ha mantenido estable en esta versión del estudio: de 76,7% en 2018 a 78,5% en 2020; así, la región queda por sobre el promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base no ha mostrado cambios en la medición actual (de 88,0% en 2018 a 83,2% en 2020), ubicándose sobre el promedio nacional (80,0%).

TABLA 279
Evolución de percepción de riesgo. Región de Los Ríos, 2000-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	Diario
2000							89,5		86,5
2002							78,7		81,1
2004							86,0		79,5
2006	56,6	93,1	73,1	98,0	73,6	98,4	87,3		80,1
2008	55,2	89,0	72,7	95,9	81,2	97,3	82,3		84,7
2010	49,3	86,3	73,2	97,8	79,1	98,0	76,9		85,9
2012	36,2	80,7	75,2	94,9	82,7	97,3	91,4		78,7
2014	42,0	67,3	80,5	97,6	86,1	98,5	88,3		85,1
2016	30,0	70,2	78,6	94,2	83,1	94,8	91,2	29,9	88,3
2018	38,2	64,4	76,7	90,8	88,0	94,4	78,7	33,2	70,6
2020	39,8	69,3	78,5	91,4	83,2	92,1	88,1	46,5	83,2
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la Región de Los Ríos se mantiene estable respecto a 2018, pasando de 16,0% a 16,6% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 3,9 puntos porcentuales, lo que se traduce en una variación significativa a la baja respecto al estudio pasado, y para pasta base desciende significativamente, pasando de 3,8% en el estudio 2018 a 0,5% en el estudio actual.

TABLA 280
Exposición a oferta de drogas en el último año.
Región de Los Ríos, 2002-2020.

Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año


Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	10,3	1,8	1,4
2004	12,8	1,5	3,0
2006	15,3	2,0	4,2
2008	14,8	3,0	1,5
2010	8,3	1,1	2,1
2012	11,9	1,9	1,1
2014	16,0	0,6	0,5
2016	19,4	2,5	1,7
2018	16,0	6,0	3,8
2020	16,6	2,1	0,5

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana estabilidad, con una diferencia de 3,5 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (39,8% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 13,3% en 2018 a 11,5% en 2020, lo que significa mantenerse sin cambios respecto a 2018; para pasta base, este indicador se mantiene estable con una variación de 0,1 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 93

Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región de Los Ríos, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS EN EL BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la actual versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas" y el menor es "asaltos o robos en las calles".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región de Los Ríos muestra estabilidad, pasando de 11,9% en 2018 a 12,2% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" no registra variaciones significativas, con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales respecto a 2018. No se observan variaciones significativas en las otras categorías descritas.

GRÁFICO 94

Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Región de Los Ríos, 2016-2020.



Región de Los Lagos

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región de Los Lagos la muestra efectiva fue de 909 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 272 son hombres y 637 mujeres, 373 tienen entre 12 y 34 años y 536 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 342.447 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

Las comunas incluidas en esta versión del estudio fueron Puerto Montt, Osorno, Ancud y Castro.

TABLA 281
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región de Los Lagos.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Porcentaje	29,9	70,1	41	59	100
Muestra (N)	272	637	373	536	909
Población	170.250	172.197	137.147	205.300	342.447

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.

En la Región de Los Lagos, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 3,8 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 0,3 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 19,8% a 21,0%.

TABLA 282
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región de Los Lagos, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	59,8	45,2	35,6	
1996	70,7	47,1	34,1	
1998	73,5	48,0	41,5	
2000	69,7	49,0	43,4	
2002	62,6	47,0	40,3	27,1
2004	70,0	47,4	41,5	24,4
2006	67,3	48,2	41,2	25,3
2008	64,9	46,0	41,6	27,3
2010	49,8	33,4	30,4	20,5
2012	61,3	42,6	36,7	21,4
2014	59,5	36,1	32,3	18,7
2016	64,1	39,7	35,1	19,3
2018	40,9	23,5	19,8	10,8
2020	44,7	23,2	21,0	13,6

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) se ha mantenido estable respecto a la medición anterior, pasando de 10,8% en el estudio 2018 a 13,6% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Los Lagos bajo el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 95
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región de Los Lagos, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 3,9 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 12,5% en 2018 a 14,2% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 8,5% en 2018 a 13,1% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 1,5 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 1,2 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 283
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región de Los Lagos, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	27,1	24,9	29,3	29,1	24,6
2004	24,4	29,1	19,7	23,8	25,1
2006	25,3	28,9	22,0	24,3	26,4
2008	27,3	30,8	23,8	28,4	26,1
2010	20,5	24,6	16,4	17,7	23,2
2012	21,4	22,0	20,8	20,6	22,2
2014	18,7	20,9	16,3	17,1	20,1
2016	19,3	18,6	20,1	14,8	23,4
2018	10,8	9,1	12,5	8,5	12,5
2020	13,6	13,0	14,2	13,1	14,0

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.


En la Región de Los Lagos, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 6,3 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 3,5 puntos porcentuales respecto a 2018: pasa de 39,1% a 42,6%.

TABLA 284
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región de Los Lagos, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	70,2	55,6	37,6
1996	84,1	68,3	41,4
1998	85,1	69,7	49,0
2000	84,6	72,2	48,3
2002	79,0	66,7	50,4
2004	82,0	73,8	50,0
2006	82,4	71,2	54,2
2008	76,9	67,2	48,3
2010	61,9	51,4	38,4
2012	75,9	55,6	35,6
2014	72,8	56,4	44,1
2016	81,6	63,8	47,8
2018	54,0	39,1	25,5
2020	60,3	42,6	29,2

La prevalencia de último mes de alcohol no varía significativamente, pasando de 25,5% en el estudio 2018 a 29,2% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Los Lagos bajo el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 96
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el
último mes. Región de Los Lagos, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 7,9 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 23,9% en 2018 a 23,3% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa

de 27,8% en 2018 a 27,9% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 6,2 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 11,7 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 285
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el
último mes, según sexo y edad.
Región de Los Lagos, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	37,6	50,1	27,6	34,8	41,8
1996	41,4	51,8	31,6	39,9	43,6
1998	49,0	63,6	35,0	48,2	50,0
2000	48,3	56,6	39,9	44,4	53,4
2002	50,4	59,5	41,5	48,6	52,8
2004	50,0	59,6	40,5	45,6	55,4
2006	54,2	61,3	47,6	49,1	59,9
2008	48,3	61,4	35,1	46,4	50,4
2010	38,4	49,1	27,6	36,8	39,9
2012	35,6	42,7	28,6	32,5	38,6
2014	44,1	44,8	43,5	41,0	46,9
2016	47,8	54,3	41,2	44,0	51,2
2018	25,5	27,1	23,9	27,8	23,8
2020	29,2	35,0	23,3	27,9	30,0

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región de Los Lagos, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, no mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 7,8% en 2018 a 6,9% en 2020. La diferencia observada de 6,1 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio 2018, no se observan cambios por sexo y edad.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia una estabilización en el uso de riesgo de alcohol: pasa de 3,0% en 2018 a 2,9% en 2020. En la desagregación por sexo y edad, no se aprecian variaciones respecto a 2018.

TABLA 286
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Los Lagos, 2008–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2008	8,3	12,4	2,7	10,2	6,4
2010	8,5	13,8	0,9	9,3	7,8
2012	11,2	15,5	6,1	17,1	6,2
2014	9,8	16,6	2,1	12,8	7,0
2016	8,9	13,3	4,2	6,7	10,7
2018	7,8	9,4	5,5	6,5	8,8
2020	6,9	9,5	3,4	8,4	5,9
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2008	5,6	9,5	1,6	6,5	4,6
2010	4,4	8,3	0,4	4,6	4,1
2012	6,2	9,5	3,1	8,9	3,6
2014	5,5	9,8	1,2	7,1	4,0
2016	5,7	8,7	2,6	4,0	7,2
2018	3,0	4,1	1,9	2,8	3,2
2020	2,9	4,7	1,2	3,7	2,5

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran una estabilización respecto al estudio anterior; por sexo se observa una variación estadísticamente significativa en hombres y estabilidad en mujeres, y por edad no se aprecian cambios. A su vez, la diferencia observada por sexo no es una brecha estadísticamente significativa, y la diferencia por en tramos de edad tampoco es significativa para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población significa que un 13,7% de la población total de la Región de Los Lagos entre 12 y 64 años tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días, lo que se traduce en una estabilización respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población no muestra diferencias estadísticamente significativas por sexo y edad.

TABLA 287
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes, según sexo y edad. Región de Los Lagos, 2012–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes (%)					
2012	56,1	68,3	38,1	60,3	52,7
2014	51,4	54,7	47,8	54,9	48,5
2016	65,7	65,5	66,1	70,2	62,2
2018	61,8	69,1	53,3	63,0	60,8
2020	46,8	40,6	56,1	59,1	39,3
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2012	20,0	29,1	10,9	19,6	20,3
2014	22,7	24,5	20,8	22,5	22,7
2016	31,4	35,5	27,2	30,9	31,9
2018	15,8	18,7	12,7	17,5	14,5
2020	13,7	14,2	13,1	16,5	11,8

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

A nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.

En la Región de Los Lagos, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana no cambia significativamente respecto al estudio anterior, observándose una variación de 2,2 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana no presenta variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018, con una diferencia de 0,3 puntos porcentuales: pasa de 3,7% a 3,4%.

TABLA 288
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región de Los Lagos, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	7,4	0,9	0,4
1996	8,7	0,8	0,5
1998	8,0	1,7	0,6
2000	12,6	3,3	1,6
2002	10,6	2,7	1,0
2004	11,3	2,6	1,0
2006	15,1	4,2	1,7
2008	17,3	4,4	2,6
2010	11,6	2,8	1,4
2012	17,9	4,6	2,2
2014	19,4	7,4	4,8
2016	26,9	9,1	3,9
2018	15,5	6,6	3,7
2020	17,7	6,0	3,4

La prevalencia de último año de marihuana no varía respecto al estudio anterior, pasando de 6,6% en el estudio 2018 a 6,0% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Los Lagos bajo el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 97
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año. Región de Los Lagos, 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 0,3 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 5,2% en 2018 a 4,4% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa

de 11,7% en 2018 a 12,3% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,8 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 3,2 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 289
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad. Región de Los Lagos, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	0,9	2,1	-	1,5	-
1996	0,8	1,7	-	1,4	-
1998	1,7	3,1	0,4	2,7	0,4
2000	3,3	4,4	2,2	5,5	0,5
2002	2,7	3,2	2,2	4,3	0,7
2004	2,6	5,0	0,3	4,3	0,6
2006	4,2	7,5	1,1	6,2	2,0
2008	4,4	5,8	3,0	7,8	0,8
2010	2,8	4,3	1,3	5,1	0,6
2012	4,6	8,2	1,1	8,3	1,1
2014	7,4	6,6	8,3	13,3	2,1
2016	9,1	10,7	7,4	15,1	3,6
2018	6,6	7,9	5,2	11,7	2,6
2020	6,0	7,6	4,4	12,3	1,8

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.

En la Región de Los Lagos, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 0,5 puntos porcentuales.

TABLA 290
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región de Los Lagos, 1994–2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
1994	0,6	0,2
1996	0,9	0,5
1998	1,6	0,3
2000	1,9	0,4
2002	1,6	0,1
2004	0,9	0,2
2006	3,0	0,5
2008	2,0	0,1
2010	1,1	0,1
2012	3,5	0,5
2014	3,1	1,4
2016	3,8	1,1
2018	2,0	0,6
2020	2,5	0,7

La prevalencia de último año de cocaína total no varía significativamente, pasando de 0,6% en el estudio 2018 a 0,7% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Los Lagos en el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 98
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total en el último año. Región de Los Lagos, 1994–2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 0,4 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 0,3% en 2018 a no reportar casos en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 1,2% en 2018 a 1,5% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,1 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 1,3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 291
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total en el último año, según sexo y edad.
Región de Los Lagos, 1994–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	0,2	0,4	-	0,3	-
1996	0,5	1,0	-	0,8	-
1998	0,3	0,6	-	0,5	-
2000	0,4	0,6	0,1	0,6	-
2002	0,1	0,2	0,1	-	0,3
2004	0,2	0,4	-	0,3	-
2006	0,5	1,1	-	0,9	0,1
2008	0,1	0,2	-	0,2	-
2010	0,1	-	0,3	0,3	-
2012	0,5	1,1	-	0,5	0,6
2014	1,4	1,0	1,9	2,7	0,2
2016	1,1	1,7	0,4	1,9	0,3
2018	0,6	0,9	0,3	1,2	0,2
2020	0,7	1,3	-	1,5	0,1

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región de Los Lagos, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas muestra un descenso estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 9,7 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año desciende significativamente, con una diferencia de 6,7 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía, pasando de 7,3% a 6,0% en el estudio actual.

TABLA 292
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región de Los Lagos, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	11,0	7,3	1,8
2008			
2010	11,3	9,8	3,0
2012	29,6	18,3	9,6
2014	39,4	23,6	9,6
2016	44,7	26,2	9,7
2018	28,9	18,3	7,3
2020	19,2	11,6	6,0

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio se observa un descenso estadísticamente significativo en la prevalencia de último año: pasa de 4,6% en 2018 a 1,9% en 2020. En la actual medición, la prevalencia alguna vez en la vida cae significativamente (3,7% en 2020) y la medida de último mes no presenta cambios, variando 0,5 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 293
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región de Los Lagos, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2012	7,2	5,3	2,2
2014	10,7	6,0	2,1
2016	12,5	6,6	1,6
2018	8,0	4,6	0,9
2020	3,7	1,9	0,4

La desagregación del uso por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en hombres y una variación significativa a la baja en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 3,1 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 3,3% en 2018 a 1,0% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y un descenso estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años, la prevalencia pasa de 8,3% en 2018 a 4,5% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 1,6 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 294
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Los Lagos, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	5,3	7,7	2,9	9,2	1,5
2014	6,0	8,0	3,8	11,3	1,0
2016	6,6	7,6	5,5	9,7	3,7
2018	4,6	5,9	3,3	8,3	1,8
2020	1,9	2,8	1,0	4,5	0,2

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región de Los Lagos, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra estabilidad en el caso de tabaco, que pasa de 12,6% en 2018 a 6,2% en 2020; en alcohol se registra estabilidad respecto al estudio anterior con una brecha de 6,8 puntos porcentuales y para marihuana llega a 2,1%, tras no mostrar cambios significativos, con una diferencia de 1,5 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

TABLA 295
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región de Los Lagos, 1994-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	29,6	41,3	0,7
1996	5,2	10,9	0,2
1998	5,4	11,8	0,8
2000	5,2	18,0	0,7
2002	7,1	22,3	0,2
2004	4,6	17,2	0,3
2006	13,8	30,7	1,0
2008	2,6	13,3	1,5
2010	8,4	16,9	1,0
2012	14,0	22,3	1,5
2014	8,7	13,7	0,8
2016	15,3	29,8	3,3
2018	12,6	22,0	3,6
2020	6,2	15,2	2,1

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente aumenta significativamente en la Región de Los Lagos, pasando de 68,5% en 2018 a 82,7% en 2020, y se ubica bajo el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 31,1% en 2020, con una diferencia de 1,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (se ha mantenido estable), lo que ubica a la región debajo de la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco no ha mostrado cambios respecto a 2018, estableciéndose bajo el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) aumenta significativamente, pasando de 33,4% en 2018 a 39,7% en 2020, y ubica a la Región de Los Lagos sobre el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 71,3% en 2020, con un aumento significativo de 16,0 puntos porcentuales respecto al estudio anterior; este resultado ubica a la región encima de la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) muestra un aumento estadísticamente significativo en esta versión del estudio: de 58,2% en 2018 a 70,4% en 2020; así, la región queda por debajo del promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base varía significativamente de 65,5% en 2018 a 79,1% en 2020, ubicándose bajo el promedio nacional (80,0%).

TABLA 296
Evolución de percepción de riesgo. Región de Los Lagos, 2000-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	Diario
2000							83,1		83,9
2002							87,1		84,6
2004							78,0		82,1
2006	48,3	90,6	66,0	96,3	73,3	96,7	80,5		81,6
2008	55,1	94,3	73,7	97,7	78,9	97,5	86,5		82,7
2010	53,5	79,7	67,9	90,8	71,4	91,8	84,5		80,7
2012	42,2	83,2	65,5	95,6	73,2	96,9	87,2		83,6
2014	40,2	68,7	64,9	91,3	69,9	92,0	80,4		78,9
2016	32,0	62,8	69,5	86,4	75,3	88,1	79,4	36	79,3
2018	33,4	55,3	58,2	78,2	65,5	80,6	68,5	32,3	61,6
2020	39,7	71,3	70,4	90,7	79,1	93,1	82,7	31,1	64,8
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la Región de Los Lagos se mantiene estable respecto a 2018, pasando de 12,9% a 13,1% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 0,5 puntos porcentuales, lo que se traduce en estabilidad respecto al estudio pasado, y para pasta base no se observan variaciones estadísticamente significativas, pasando de 3,0% en el estudio 2018 a 2,4% en el estudio actual.

TABLA 297
Exposición a ofertas de drogas en el último año.
Región de Los Lagos, 2002-2020.


Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año

Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	9,6	0,8	0,4
2004	8,1	0,8	1,0
2006	12,2	1,6	1,4
2008	10,4	2,1	0,7
2010	4,4	1,1	0,4
2012	11,8	2,1	1,3
2014	19,9	3,7	1,4
2016	16,9	4,0	1,6
2018	12,9	3,6	3,0
2020	13,1	4,1	2,4

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana estabilidad, con una diferencia de 2,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (30,6% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 12,2% en 2018 a 17,3% en 2020, lo que representa un aumento estadísticamente significativo respecto a 2018; para pasta base, este indicador se mantiene estable con una variación de 1,1 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 99
Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región de Los Lagos, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE SITUACIÓN EN BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas" y el menor es "balaceras y acciones violentas con armas de fuego".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región de Los Lagos muestra estabilidad, pasando de 9,8% en 2018 a 14,1% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" no registra variaciones significativas, con una diferencia de 5,6 puntos porcentuales respecto a 2018. Respecto a las otras categorías descritas, se observan variaciones estadísticamente significativas en "rayado en las paredes, daños al alumbrado o cosas similares", "asaltos o robos en las calles" y "jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas".

GRÁFICO 100
Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Región de Los Lagos, 2016-2020.



Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región de Aysén la muestra efectiva fue de 637 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 286 son hombres y 351 mujeres, 266 tienen entre 12 y 34 años y 371 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 54.019 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

TABLA 298
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región de Aysén.

	Sexo		Tramos de edad		Total
	Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64	
Porcentaje	44,9	55,1	41,8	58,2	100
Muestra (N)	286	351	266	371	637
Población	26.568	27.451	25.316	28.703	54.019

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.

En la Región de Aysén, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos sube significativamente respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 12,6 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 3,2 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 24,3% a 29,8%.

TABLA 299
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región de Aysén, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	50,4	34,1	29,8	
1996	69,6	47,0	41,4	
1998	73,0	44,2	39,1	
2000	71,7	48,3	43,2	
2002	70,4	47,9	41,5	26,1
2004	73,1	46,4	40,5	26,9
2006	67,1	46,5	40,0	26,1
2008	65,8	48,7	43,6	26,6
2010	55,7	37,8	33,0	22,4
2012	64,3	40,4	34,6	24,8
2014	67,0	40,6	35,5	21,1
2016	47,7	31,3	27,2	14,7
2018	54,7	29,5	24,3	13,8
2020	67,3	32,7	29,8	21,5

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) aumenta significativamente respecto a la medición anterior, pasando de 13,8% en el estudio 2018 a 21,5% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Aysén sobre el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 101
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región de Aysén, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en hombres e incremento significativo en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 7,0 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 14,2% en 2018 a 22,7% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia una variación significativa al alza en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 7,6% en 2018 a 17,9% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 5,9 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 2,3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 300
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región de Aysén, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	26,1	27,5	24,6	24,3	28,3
2004	26,9	30,3	23,2	28,2	25,4
2006	26,1	31,1	20,6	27,6	24,4
2008	26,6	29,7	23,3	22,8	30,8
2010	22,4	24,4	20,3	17,3	27,9
2012	24,8	29,0	20,4	21,0	28,6
2014	21,1	22,6	19,5	19,7	22,2
2016	14,7	14,7	14,7	11,6	18,2
2018	13,8	13,4	14,2	7,6	18,8
2020	21,5	20,4	22,7	17,9	24,7

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.

En la Región de Aysén, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol sube significativamente respecto al estudio anterior, observándose una variación de 11,3 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año aumenta significativamente, con una diferencia de 14,2 puntos porcentuales respecto a 2018: pasa de 50,9% a 65,1%.

TABLA 301
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región de Aysén, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	42,4	24,8	14,6
1996	79,5	66,1	43,6
1998	87,1	70,7	51,6
2000	85,7	74,1	46,1
2002	85,4	73,7	59,4
2004	86,0	72,6	54,8
2006	78,8	67,4	52,6
2008	77,1	63,7	43,0
2010	74,4	62,3	46,7
2012	78,7	59,8	41,2
2014	83,2	70,1	55,2
2016	54,6	40,1	29,4
2018	71,2	50,9	36,2
2020	82,5	65,1	49,2

La prevalencia de último mes de alcohol muestra una variación estadísticamente significativa, pasando de 36,2% en el estudio 2018 a 49,2% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Aysén sobre el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 102
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes. Región de Aysén, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra un aumento estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 21,7 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 33,5% en 2018 a 38,4% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se

aprecia una variación significativa al alza en el tramo de 12 a 34 años y un aumento estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 33,8% en 2018 a 45,8% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 14,1 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 22,1 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 302
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes, según sexo y edad.
Región de Aysén, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	14,6	14,6	14,6	8,0	24,6
1996	43,6	53,9	32,3	41,6	46,3
1998	51,6	60,4	42,2	49,6	54,2
2000	46,1	54,1	37,5	42,5	50,6
2002	59,4	67,0	51,0	52,4	67,8
2004	54,8	64,6	44,0	48,7	61,8
2006	52,6	62,1	42,0	46,5	59,3
2008	43,0	54,1	30,8	41,9	44,2
2010	46,7	53,0	40,2	44,7	48,9
2012	41,2	51,1	30,8	44,4	38,1
2014	55,2	62,5	47,4	52,9	57,0
2016	29,4	32,2	26,5	32,4	26,1
2018	36,2	38,8	33,5	33,8	38,1
2020	49,2	60,5	38,4	45,8	52,2

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región de Aysén, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 9,4% en 2018 a 16,2% en 2020. La diferencia observada de 24,7 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio anterior, por sexo se observa una variación estadísticamente significativa en hombres y estabilidad en mujeres, mientras que por edad no se aprecian variaciones.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia un aumento significativo en el uso de riesgo de alcohol: pasa de 4,8% en 2018 a 10,5% en 2020. La desagregación por sexo

respecto a 2018 muestra una variación estadísticamente significativa en hombres y estabilidad en mujeres; por tramos de edad, se aprecia variación estadísticamente significativa en los tramos de 12 a 34 años y de 35 a 64 años.

TABLA 303
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Aysén, 2008-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2008	9,0	12,7	3,6	11,2	6,9
2010	4,5	7,9	0,0	7,1	2,2
2012	10,8	19,5	0,6	16,9	4,8
2014	8,8	12,9	3,6	12,0	6,3
2016	10,4	16,8	2,7	15,5	4,2
2018	9,4	12,6	5,3	14,8	5,4
2020	16,2	27,5	2,8	21,3	12,1
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2008	5,8	9,2	2,0	6,9	4,5
2010	2,8	5,5	0,0	4,0	1,5
2012	6,5	12,3	0,4	10,1	2,9
2014	6,1	9,8	2,3	8,2	4,5
2016	4,2	7,1	1,0	6,4	1,6
2018	4,8	6,8	2,6	7,2	2,8
2020	10,5	19,7	1,7	13,0	8,3

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran un descenso significativo respecto al estudio anterior; por sexo se observa estabilidad en hombres y una variación significativa en mujeres, y por edad se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y una variación significativa en el tramo de 35 a 64 años. A su vez, la diferencia observada por sexo es una brecha estadísticamente significativa, y la diferencia por tramos de edad también es significativa para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población significa que un 20,6% de la población total de la Región de Aysén entre 12 y 64 años tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días, lo que se traduce en una estabilización respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población muestra una diferencia estadísticamente significativa por sexo y no se observan diferencias por tramos de edad.

TABLA 304
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes, según sexo y edad. Región de Aysén, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes (%)					
2012	61,5	62,8	59,2	65,4	57,1
2014	70,1	73,9	65,0	68,4	71,4
2016	46,1	49,8	41,3	44,1	48,7
2018	52,2	59,3	43,3	43,6	58,4
2020	41,9	53,1	24,7	51,2	34,7
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2012	25,3	32,1	18,2	29,0	21,7
2014	38,7	46,2	30,8	36,2	40,7
2016	13,5	16,1	10,9	14,3	12,7
2018	18,9	23,0	14,5	14,7	22,3
2020	20,6	32,1	9,5	23,4	18,1

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

A nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.


En la Región de Aysén, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana sube significativamente respecto al estudio anterior, observándose una variación de 7,4 puntos porcentuales. A su vez, la prevalencia de último año de marihuana muestra un aumento estadísticamente significativo respecto a 2018 y el uso de último mes aumenta significativamente, con una diferencia de 2,2 puntos porcentuales: pasa de 3,9% a 6,1%.

TABLA 305
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región de Aysén, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	4,6	-	-
1996	5,6	0,9	0,2
1998	7,8	1,7	-
2000	7,6	2,4	1,2
2002	10,5	2,2	0,8
2004	10,0	2,1	0,7
2006	12,2	2,4	0,9
2008	9,9	2,7	1,0
2010	10,9	4,5	2,5
2012	15,3	6,1	3,2
2014	21,0	8,3	4,9
2016	15,3	3,6	2,0
2018	23,6	7,3	3,9
2020	31,0	10,7	6,1

La prevalencia de último año de marihuana muestra una variación estadísticamente significativa, pasando de 7,3% en el estudio 2018 a 10,7% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Aysén bajo el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 103
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año. Región de Aysén, 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo respecto a 2018 muestra un aumento estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 7,4 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 7,2% en 2018 a 6,8% en 2020. Al analizar los resultados por edad,

se aprecia una variación significativa al alza en el tramo de 12 a 34 años y estabilidad en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 11,7% en 2018 a 19,6% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,9 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 7,9 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 306
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad.
Región de Aysén, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	-	-	-	-	-
1996	0,9	1,5	0,2	1,3	0,2
1998	1,7	2,3	1,1	2,6	0,4
2000	2,4	3,7	1,1	2,6	2,3
2002	2,2	3,1	1,1	3,5	0,6
2004	2,1	2,8	1,5	3,9	0,2
2006	2,4	3,2	1,6	4,2	0,4
2008	2,7	5,0	0,2	5,2	-
2010	4,5	6,7	2,1	8,3	0,3
2012	6,1	9,2	2,8	12,0	0,3
2014	8,3	8,1	8,5	13,4	4,2
2016	3,6	4,0	3,2	6,1	0,9
2018	7,3	7,3	7,2	11,7	3,7
2020	10,7	14,7	6,8	19,6	2,8

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.


En la Región de Aysén, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total no varía respecto al estudio anterior, llegando a 3,6%.

TABLA 307
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región de Aysén, 1994–2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
1994	0,9	-
1996	0,4	0,1
1998	0,4	-
2000	1,3	-
2002	2,1	0,3
2004	1,8	0,4
2006	2,8	0,2
2008	2,0	-
2010	1,1	0,4
2012	2,5	0,3
2014	1,6	0,7
2016	0,8	0,4
2018	3,6	1,0
2020	3,6	0,9

La prevalencia de último año de cocaína total no varía significativamente, pasando de 1,0% en el estudio 2018 a 0,9% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Aysén sobre el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 104
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total en el último año. Región de Aysén, 1994–2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 0,9 puntos porcentuales y en mujeres no se observan casos en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 2,3% en 2018 a 1,8% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas de edad, la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 308
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total en el último año, según sexo y edad.
Región de Aysén, 1994–2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	-	-	-	-	-
1996	0,1	0,3	-	0,3	-
1998	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-
2002	0,3	0,3	0,4	0,6	-
2004	0,4	0,8	-	0,8	-
2006	0,2	0,3	-	0,3	-
2008	-	-	-	-	-
2010	0,4	0,7	-	0,7	-
2012	0,3	0,6	-	0,6	-
2014	0,7	1,0	0,3	0,3	0,9
2016	0,4	0,8	-	0,8	-
2018	1,0	1,0	1,0	2,3	-
2020	0,9	1,9	-	1,8	0,2

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región de Aysén, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 5,4 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 2,2 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía, pasando de 14,9% a 14,1% en el estudio actual.

TABLA 309
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región de Aysén, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	13,8	9,2	2,4
2008	-	-	-
2010	14,7	11,1	2,1
2012	30,1	17,5	6,3
2014	36,0	23,7	10,7
2016	30,4	18,3	6,7
2018	42,6	25,7	14,9
2020	48,0	27,9	14,1

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio se observa sin variaciones en la prevalencia de último año: pasa de 4,2% en 2018 a 3,2% en 2020. En la actual medición, la prevalencia alguna vez en la vida no varía (7,7% en 2020) y la medida de último mes desciende significativamente 1,9 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 310
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región de Aysén, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2012	8,3	5,0	1,9
2014	10,7	6,7	1,9
2016	5,6	2,1	0,7
2018	11,5	4,2	2,4
2020	7,7	3,2	0,5

La desagregación del uso por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 0,5 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 2,8% en 2018 a 1,3% en 2020. Al analizar los resultados por edad, se aprecia estabilidad en el tramo de 12 a 34 años y un descenso estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 64 años. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 5,6% en 2018 a 6,2% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 2,6 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 311
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Aysén, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	5,0	7,0	2,9	9,3	0,6
2014	6,7	7,5	5,9	9,3	4,6
2016	2,1	3,2	0,9	3,1	0,9
2018	4,2	5,6	2,8	5,6	3,1
2020	3,2	5,1	1,3	6,2	0,5

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región de Aysén, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra un descenso estadísticamente significativo en el caso de tabaco, que pasa de 6,7% en 2018 a no registrar casos en 2020; en alcohol se registra una baja significativa con una diferencia de 13,3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, y para marihuana llega a 0,3%, tras mostrar un descenso estadísticamente significativo de 2,4 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 312
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región de Aysén, 1994-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	22,4	20,2	-
1996	5,8	19,2	0,4
1998	6,8	13,4	0,7
2000	9,0	32,8	0,4
2002	3,8	27,9	0,7
2004	2,6	10,5	0,8
2006	9,9	22,0	0,7
2008	21,1	38,2	1,7
2010	6,1	22,6	1,6
2012	14,0	24,2	0,4
2014	8,3	27,8	2,0
2016	8,3	11,7	1,3
2018	6,7	17,5	2,7
2020	-	4,2	0,3

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente aumenta significativamente en la Región de Aysén, pasando de 84,0% en 2018 a 91,4% en 2020, y se ubica sobre el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 21,7% en 2020, esto es una variación estadísticamente significativa a la baja de 29,6 puntos porcentuales respecto al estudio anterior lo que ubica a la región debajo de la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco varía significativamente al alza respecto a 2018, estableciéndose sobre el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) desciende significativamente, pasando de 46,1% en 2018 a 23,0% en 2020, y ubica a la Región de Aysén bajo el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 54,7% en 2020, con una variación significativa a la baja de 16,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior; este resultado ubica a la región debajo de la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) se ha mantenido estable en esta versión del estudio: de 71,3% en 2018 a 70,2% en 2020; así, la región queda por debajo del promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base no ha mostrado cambios en la medición actual (de 78,2% en 2018 a 81,1% en 2020), ubicándose sobre el promedio nacional (80,0%).

TABLA 313
Evolución de percepción de riesgo. Región de Aysén, 2000-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más	Tres tragos o más	Diario
2000							79,2		84,3
2002							79,3		81,2
2004							77,3		76,9
2006	58,4	93,9	66,7	95,5	70,0	95,2	74,0		78,4
2008	65,0	89,6	77,3	93,9	80,9	93,6	77,8		81,4
2010	59,6	90,1	77,4	95,5	81,2	98,4	86,8		78,9
2012	45,8	81,0	73,5	93,5	78,6	94,7	87,2		77,0
2014	49,3	84,4	71,8	93,7	78,5	92,1	84,9		86,3
2016	43,6	76,8	71,1	84,9	73,4	84,9	84,0	30,4	78,9
2018	46,1	70,9	71,3	88,1	78,2	89,1	84,0	51,3	78,5
2020	23,0	54,7	70,2	93,5	81,1	94,6	91,4	21,7	87,4
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la Región de Aysén aumenta significativamente respecto a 2018, pasando de 12,7% a 19,5% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 0,3 puntos porcentuales, lo que se traduce en estabilidad respecto al estudio pasado, y para pasta base no se observan variaciones estadísticamente significativas, pasando de 0,2% en el estudio 2018 a 0,4% en el estudio actual.

TABLA 314
Exposición a ofertas de drogas en el último año.
Región de Aysén, 2002-2020.


Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año

Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	5,8	0,6	0,1
2004	7,2	0,9	0,4
2006	6,7	1,6	1,0
2008	5,4	1,6	0,4
2010	6,5	0,5	0,0
2012	10,3	0,3	0,3
2014	10,7	2,7	0,6
2016	9,1	1,8	0,4
2018	12,7	2,6	0,2
2020	19,5	2,9	0,4

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana una variación significativa al alza, con una diferencia de 18,3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (37,1% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 7,6% en 2018 a 12,3% en 2020, lo que representa un aumento estadísticamente significativo respecto a 2018; para pasta base, este indicador se mantiene estable con una variación de 1,2 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 105
Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región de Aysén, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE SITUACIÓN EN BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas" y el menor es "asaltos o robos en las calles".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región de Aysén muestra un descenso estadísticamente significativo, pasando de 3,3% en 2018 a 0,8% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" registra un descenso estadísticamente significativo, con una diferencia de 1,5 puntos porcentuales respecto a 2018. En las otras categorías descritas, todas muestran variaciones significativas a la baja con excepción de "balaceras y acciones violentas con armas de fuego" que se mantuvo estable en 0,4%.

GRÁFICO 106
Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Región de Aysén, 2016-2020.



Región de Magallanes y La Antártica Chilena

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la Región de Magallanes la muestra efectiva fue de 712 entrevistados entre 12 y 64 años, de los cuales 297 son hombres y 415 mujeres, 231 tienen entre 12 y 34 años y 481 tienen entre 35 y 64 años. La población representada es de 97.608 personas. Los resultados de este estudio son representativos de la región, no de sus comunas.

La comuna incluida en esta versión del estudio fue Punta Arenas.

TABLA 315
Distribución de la muestra según sexo y edad.
Región de Magallanes.

	Sexo		Tramos de edad		Total
	Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64	
Porcentaje	41,7	58,3	32,4	67,6	100
Muestra (N)	297	415	231	481	712
Población	49.203	48.405	36.940	60.668	97.608

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO

Respecto al estudio anterior, a nivel nacional se observan descensos estadísticamente significativos en las medidas de último año y último mes en el consumo de tabaco, y una estabilización en el uso alguna vez en la vida y diario de esta droga.

En la Región de Magallanes, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cigarrillos cae significativamente respecto a la medición pasada, observándose una diferencia de 7,0 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 4,9 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 33,7% a 29,2%.

TABLA 316
Evolución de prevalencias de consumo de tabaco.
Región de Magallanes, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de tabaco (%)				
Serie	Vida	Último año	Último mes	Diario
1994	73,4	51,9	41,6	
1996	62,1	45,3	40,5	
1998	59,9	43,3	38,5	
2000	75,6	50,5	43,2	
2002	71,2	48,5	44,0	31,1
2004	68,7	48,2	42,1	31,0
2006	57,9	42,3	37,3	25,4
2008	66,9	46,9	41,7	30,6
2010	49,8	37,8	32,6	22,9
2012	67,6	40,7	36,0	20,8
2014	72,6	48,5	39,8	23,0
2016	61,2	37,1	33,6	24,2
2018	57,6	38,2	33,7	20,1
2020	50,6	33,3	29,2	18,3

La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días en el último mes) se ha mantenido estable respecto a la medición anterior, pasando de 20,1% en el estudio 2018 a 18,3% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Magallanes bajo el promedio nacional (19,5%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 107
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco.
Región de Magallanes, 2002-2020.



La desagregación del uso de tabaco por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 8,4 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 16,5% en 2018 a 21,4% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 12,4% en 2018 a 14,4% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 4,8 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 6,3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 317
Evolución de prevalencia (%) de consumo diario de tabaco,
según sexo y edad. Región de Magallanes, 2002-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2002	31,1	35,4	26,5	35,9	26,2
2004	31,0	34,8	26,8	29,7	32,3
2006	25,4	27,9	22,7	23,5	27,2
2008	30,6	33,4	27,5	30,7	30,4
2010	22,9	27,6	17,9	17,6	26,6
2012	20,8	19,1	22,6	19,5	22,0
2014	23,0	24,0	21,9	20,0	25,6
2016	24,2	26,9	21,4	22,1	25,8
2018	20,1	23,5	16,5	12,4	25,4
2020	18,3	15,1	21,4	14,4	20,6

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

A nivel nacional, el uso de bebidas alcohólicas muestra una estabilización en las medidas de uso de último año y último mes junto a un aumento estadísticamente significativo en el uso alguna vez en la vida de esta droga.


En la Región de Magallanes, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de alcohol cae significativamente respecto al estudio anterior, observándose una variación de 11,1 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año no presenta variaciones estadísticamente significativas, con una diferencia de 1,9 puntos porcentuales respecto a 2018: pasa de 48,4% a 46,5%.

TABLA 318
Evolución de prevalencias de consumo de alcohol.
Región de Magallanes, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de alcohol (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
1994	76,0	66,6	43,6
1996	73,3	59,5	34,9
1998	72,2	62,6	42,1
2000	87,8	72,4	48,7
2002	84,4	69,9	48,5
2004	78,2	68,0	50,1
2006	74,5	62,8	44,3
2008	81,0	66,6	46,5
2010	59,3	46,9	29,0
2012	81,0	67,9	50,6
2014	79,5	62,0	44,4
2016	68,9	56,0	28,7
2018	67,1	48,4	32,6
2020	56,0	46,5	35,5

La prevalencia de último mes de alcohol no varía significativamente respecto al estudio anterior, pasando de 32,6% en el estudio 2018 a 35,5% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Magallanes bajo el promedio nacional (44,3%) respecto al uso de esta sustancia en el país.

GRÁFICO 108
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes. Región de Magallanes, 1994-2020.



La desagregación del uso de alcohol por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 2,2 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 25,4% en 2018 a 29,5% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas

respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 28,9% en 2018 a 35,2% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,5 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 11,9 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 319
Evolución de prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes, según sexo y edad.
Región de Magallanes, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	43,6	60,4	25,4	38,5	49,7
1996	34,9	43,9	25,2	31,5	38,8
1998	42,1	51,3	32,1	37,7	46,9
2000	48,7	55,9	41,0	44,0	53,7
2002	48,5	58,3	37,8	43,9	53,3
2004	50,1	57,8	41,8	44,9	55,5
2006	44,3	54,3	33,5	40,4	48,1
2008	46,5	54,8	37,7	47,6	45,4
2010	29,0	36,8	20,8	26,2	31,0
2012	50,6	55,8	45,1	45,7	55,0
2014	44,4	50,0	38,7	36,0	51,7
2016	28,7	35,6	21,7	31,8	26,3
2018	32,6	39,2	25,4	28,9	35,1
2020	35,5	41,4	29,5	35,2	35,6

Consumo de riesgo de alcohol y embriaguez

En la Región de Magallanes, la prevalencia de uso de riesgo de alcohol (8 o más puntos en la escala AUDIT) entre quienes declaran haber consumido alcohol al menos una vez en el último año, no mostró una variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior, pasando de 6,9% en 2018 a 6,1% en 2020. La diferencia observada de 4,0 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es una brecha estadísticamente significativa, mientras que en ambos tramos de edad la brecha observada no es significativa para 2020. Respecto al estudio anterior, no se observan variaciones estadísticamente significativas por sexo y edad.

Al observar este mismo indicador respecto al total de la población, se aprecia una estabilización en el uso de riesgo de alcohol: pasa de 3,3% en 2018 a 2,8% en 2020. En la desagregación por sexo y edad, no se aprecian variaciones respecto a 2018.

TABLA 320
Evolución de prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Magallanes, 2008-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último año (%)					
2008	8,2	10,8	4,9	11,2	5,2
2010	4,3	7,2	0,3	6,6	2,9
2012	4,8	9,0	0,0	5,2	4,6
2014	9,6	14,6	2,6	14,7	5,1
2016	5,6	8,9	0,9	9,7	2,7
2018	6,9	10,1	2,3	7,0	6,8
2020	6,1	7,8	3,8	6,3	6,0
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2008	5,5	7,8	3,0	7,5	3,4
2010	2,0	3,8	0,1	2,9	1,4
2012	3,3	6,4	0,0	3,2	3,3
2014	6,0	10,3	1,4	9,2	3,1
2016	3,2	5,8	0,4	5,3	1,5
2018	3,3	5,5	0,9	3,1	3,4
2020	2,8	4,1	1,5	2,8	2,8

Otro indicador utilizado para evaluar el riesgo y la severidad del uso de alcohol es la ocurrencia de episodios de embriaguez (a lo menos un episodio de consumo de 5 o más tragos en los últimos 30 días en hombres y 4 o más en el caso de mujeres) entre quienes han usado alcohol en el último mes. Los resultados para 2020 muestran una estabilización respecto al estudio anterior; por sexo se observa una variación estadísticamente significativa en hombres y estabilidad en mujeres, y por edad no se aprecian cambios. A su vez, las diferencias observadas por sexo y edad no son estadísticamente significativas para 2020.

Ahora bien, este indicador respecto al total de la población significa que un 17,1% de la población total de la Región de Magallanes entre 12 y 64 años tuvo a lo menos un episodio de embriaguez durante los últimos 30 días, lo que se traduce en una estabilización respecto a 2018. En 2020, el análisis de brechas en el total de la población no muestra por sexo y edad diferencias estadísticamente significativas.

TABLA 321
Evolución de prevalencia de embriaguez en el último mes, según sexo y edad. Región de Magallanes, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Prevalencia respecto a los prevalentes de último mes (%)					
2012	40,2	55,2	20,6	52,5	31,0
2014	40,8	48,5	30,4	65,2	26,2
2016	55,3	61,2	45,4	61,5	49,5
2018	54,8	64,6	38,4	63,3	49,9
2020	48,3	49,4	46,7	48,9	47,9
Prevalencia respecto al total de la población (%)					
2012	20,3	30,8	9,3	24,0	17,1
2014	18,1	24,3	11,8	23,5	13,6
2016	15,9	21,8	9,8	19,6	13,0
2018	17,8	25,4	9,8	18,3	17,5
2020	17,1	20,4	13,8	17,2	17,1

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE MARIHUANA

A nivel nacional el uso de marihuana confirma la relativa estabilización reportada en el estudio anterior, no observándose cambios en las medidas de uso de último año y último mes, sin embargo, se aprecia un aumento significativo en el uso alguna vez en la vida respecto a 2018.

En la Región de Magallanes, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de marihuana no varía significativamente respecto al estudio anterior, observándose una diferencia de 1,2 puntos porcentuales. Por su parte, el uso de último mes de marihuana no presenta variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018, con una diferencia de 1,0 punto porcentual: pasa de 4,0% a 3,0%.

TABLA 322
Evolución de prevalencias de consumo de marihuana.
Región de Magallanes, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de marihuana (%)			
Serie	Vida	Último Año	Último Mes
1994	3,7	1,7	-
1996	5,2	0,5	0,1
1998	5,8	1,2	0,1
2000	12,7	2,7	1,8
2002	11,7	1,9	0,3
2004	13,5	3,5	1,7
2006	12,9	4,4	1,5
2008	18,5	6,4	1,9
2010	7,9	2,5	0,6
2012	16,3	6,0	2,8
2014	30,0	14,5	5,7
2016	27,4	8,2	4,3
2018	21,2	7,5	4,0
2020	22,4	6,1	3,0

La prevalencia de último año de marihuana no varía respecto a la medición anterior, pasando de 7,5% en el estudio 2018 a 6,1% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Magallanes bajo el promedio nacional (11,4%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 109
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año. Región de Magallanes, 1994-2020.



La desagregación del uso de marihuana por sexo respecto a 2018 muestra un descenso estadísticamente significativo en hombres y estabilidad en mujeres; de esta manera, en hombres se observa una variación de 6,0 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 3,3% en 2018 a 6,7% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 12,2%

en 2018 a 10,2% en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,7 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia de 1,3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada es significativa para 2020.

TABLA 323
Evolución de prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo y edad.
Región de Magallanes, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	1,7	3,2	-	3,0	-
1996	0,5	0,7	0,2	0,7	0,3
1998	1,2	1,8	0,6	2,1	0,3
2000	2,7	3,3	2,0	5,2	-
2002	1,9	2,5	1,2	3,4	0,3
2004	3,5	5,4	1,4	6,8	0,1
2006	4,4	5,1	3,6	7,2	1,5
2008	6,4	9,4	3,3	12,8	0,1
2010	2,5	3,5	1,5	6,0	-
2012	6,0	7,2	4,8	12,8	-
2014	14,5	20,6	8,1	29,3	1,6
2016	8,2	9,3	7,1	14,6	3,2
2018	7,5	11,4	3,3	12,2	4,3
2020	6,1	5,4	6,7	10,2	3,6

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA Y/O PASTA BASE)

A nivel nacional, el uso de cocaína total (cocaína y/o pasta base) muestra un descenso respecto al estudio pasado; así, tanto la prevalencia de último año como la de último mes registran disminuciones estadísticamente significativas. No obstante, se aprecia un aumento en las declaraciones de uso alguna vez en la vida.


En la Región de Magallanes, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de cocaína total no muestra un cambio estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 0,8 puntos porcentuales.

TABLA 324
Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total.
Región de Magallanes, 1994-2020.

Prevalencias de consumo de cocaína total (%)		
Serie	Vida	Último año
1994	-	-
1996	1,2	0,5
1998	1,1	-
2000	2,0	0,6
2002	1,6	0,3
2004	2,0	0,2
2006	1,7	0,4
2008	2,4	0,1
2010	2,6	-
2012	1,9	0,1
2014	4,4	0,3
2016	2,4	1,4
2018	2,1	0,5
2020	1,3	0,1

La prevalencia de último año de cocaína total no varía significativamente respecto a la medición anterior, pasando de 0,5% en el estudio 2018 a 0,1% en el actual. Este resultado ubica a la Región de Magallanes bajo el promedio nacional (0,7%) respecto al uso de esta sustancia.

GRÁFICO 110
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año. Región de Magallanes, 1994-2020.



La desagregación del uso de esta droga por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 0,9 puntos porcentuales y en mujeres pasa de no reportar casos en 2018 a 0,1% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 1,3% en 2018 a no reportar casos en 2020, mientras que en el tramo de 35 a 64 años varía 0,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Respecto a las brechas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual no se observan diferencias. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 325
Evolución de prevalencia (%) de consumo de cocaína total
en el último año, según sexo y edad.
Región de Magallanes, 1994-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
1994	-	-	-	-	-
1996	0,5	1,0	-	0,9	-
1998	-	-	-	-	-
2000	0,6	0,2	1,0	1,2	-
2002	0,3	-	0,6	0,5	-
2004	0,2	0,3	0,1	0,4	-
2006	0,4	0,6	0,3	0,5	0,4
2008	0,1	-	0,1	-	0,1
2010	-	-	-	-	-
2012	0,1	0,2	-	0,3	-
2014	0,3	0,6	-	-	0,6
2016	1,4	2,4	0,3	3,1	-
2018	0,5	1,0	-	1,3	-
2020	0,1	0,1	0,1	-	0,2

MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

El uso de bebidas energéticas en Chile muestra descensos en dos de las tres medidas de consumo —esto es, uso alguna vez en la vida y último año—, mientras que se registra un aumento en la medida de consumo de último mes.

En la Región de Magallanes, la prevalencia de uso alguna vez en la vida de bebidas energéticas muestra un descenso estadísticamente significativo respecto al estudio anterior, observándose una variación de 20,2 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de último año desciende significativamente, con una diferencia de 10,0 puntos porcentuales respecto a 2018, y el uso de último mes no varía respecto al estudio anterior, pasando de 11,4% a 8,6%.

TABLA 326
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas. Región de Magallanes, 2006-2020.

Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			
Serie	Vida	Último año	Último mes
2006	19,4	13,0	3,5
2008			
2010	12,3	9,5	2,5
2012	37,2	23,1	10,2
2014	44,6	29,4	15,3
2016	28,6	19,2	8,3
2018	43,3	25,5	11,4
2020	23,1	15,5	8,6

Respecto al uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol, en el presente estudio no se observan diferencias en la prevalencia de último año: pasa de 3,7% en 2018 a 2,4% en 2020. En la actual medición, la prevalencia alguna vez en la vida se mantiene estable (6,0% en 2020) y la medida de último mes no presenta cambios, variando 0,3 puntos porcentuales respecto a 2018.

TABLA 327
Evolución de prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol. Región de Magallanes, 2012-2020.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)			
Serie	Vida	Último Año	Último mes
2012	9,5	6,2	2,7
2014	15,3	12,9	7,8
2016	9,7	6,5	2,1
2018	9,2	3,7	1,6
2020	6,0	2,4	1,3

La desagregación del uso por sexo respecto a 2018 muestra estabilidad en ambos sexos; de esta manera, en hombres se observa una variación de 2,1 puntos porcentuales y en mujeres pasa de 2,1% en 2018 a 1,8% en 2020. Al analizar los resultados por edad, no se aprecian variaciones respecto a 2018. Así, en el tramo de 12 a 34 años la prevalencia pasa de 6,2% en 2018 a 3,7% en 2020, y en el tramo de 35 a 64 años se observa una diferencia de 0,5 puntos porcentuales.

Respecto a las brechas observadas en las categorías descritas en la tabla, en el estudio actual la diferencia entre hombres y mujeres no es estadísticamente significativa. A su vez, en ambos tramos de edad la diferencia observada no es significativa para 2020.

TABLA 328
Evolución de prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo y edad. Región de Magallanes, 2012-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
2012	6,2	9,2	3,1	11,7	1,3
2014	12,9	19,8	5,6	25,0	2,4
2016	6,5	9,9	2,9	11,5	2,5
2018	3,7	5,2	2,1	6,2	2,1
2020	2,4	3,1	1,8	3,7	1,6

INCIDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Un indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile tiene relación con la tasa de incidencia de último año, entendida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado consumo alguna vez en la vida.

En la Región de Magallanes, el análisis de la tasa de incidencia del último año para las drogas principales muestra un descenso estadísticamente significativo en el caso de tabaco, que pasa de 19,7% en 2018 a 12,1% en 2020; en alcohol se registra una baja significativa de 9,9 puntos porcentuales, y para marihuana llega a 1,2%, tras mostrar un descenso estadísticamente significativo de 2,7 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

TABLA 329
Evolución de tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Región de Magallanes, 1994-2020.

Incidencias de consumo en el último año (%)			
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana
1994	26,2	46,4	1,7
1996	1,9	6,9	0,2
1998	3,3	6,5	0,8
2000	5,3	15,9	1,0
2002	3,6	6,7	0,5
2004	2,7	5,6	0,7
2006	4,9	15,2	0,3
2008	5,4	14,3	1,9
2010	9,6	10,3	0,6
2012	3,5	15,9	1,5
2014	10,0	25,4	7,0
2016	11,2	18,5	3,3
2018	19,7	22,8	3,9
2020	12,1	12,9	1,2

PERCEPCIÓN DE RIESGO

La percepción de riesgo de consumir cinco o más tragos de alcohol diariamente se mantiene estable en la Región de Magallanes en 86,8%, y se ubica sobre el promedio nacional (85,6%). La percepción de riesgo de consumir tres o más tragos por ocasión es de 35,7% en 2020, con una diferencia de 8,3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (se ha mantenido estable), lo que ubica a la región debajo de la media nacional (37,6%). Por su parte, la percepción de riesgo de uso diario de tabaco no ha mostrado cambios respecto a 2018, estableciéndose bajo el promedio nacional (80,8%).

La percepción de riesgo del uso experimental de marihuana (consumir una o dos veces) desciende significativamente, pasando de 39,5% en 2018 a 34,5% en 2020, y ubica a la Región de Magallanes sobre el promedio nacional (31,4%). La percepción de riesgo de uso frecuente es de 68,6% en 2020, con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (se ha mantenido estable), lo que ubica a la región encima de la media nacional (64,0%).

La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (probar una o dos veces) se ha mantenido estable en esta versión del estudio: de 69,8% en 2018 a 75,4% en 2020; así, la región queda por sobre el promedio nacional de 71,8%. Por su parte, la percepción de riesgo frente al uso experimental de pasta base no ha mostrado cambios en la medición actual (de 76,9% en 2018 a 78,7% en 2020), ubicándose bajo el promedio nacional (80,0%).

TABLA 330
Evolución de percepción de riesgo. Región de Magallanes, 2000-2020.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Marihuana		Cocaína		Pasta base		Alcohol		Tabaco
	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Uso experimental	Uso frecuente	Cinco tragos o más diarios	Tres tragos o más por ocasión	Diario
2000							83,4		76,7
2002							80,7		78,1
2004							74,0		67,8
2006	58,2	92,2	69,1	97,2	73,4	96,7	83,2		76,5
2008	57,9	87,5	74,5	97,8	82,6	97,4	87,0		80,7
2010	44,9	76,5	64,2	86,1	68,1	84,9	79,1		81,3
2012	57,2	84,0	83,9	97,6	86,2	94,4	92,2		84,8
2014	34,9	57,7	71,6	93,4	80,7	94,2	91,8		88,5
2016	26,2	56,6	72,3	92,7	81,1	93,3	81,1	20,2	88,5
2018	39,5	66,8	69,8	88,4	76,9	89,6	86,8	44,0	79,9
2020	34,5	68,6	75,4	85,7	78,7	86,6	86,8	35,7	77,1
2020 Nacional	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4	85,6	37,6	80,8

OFERTA Y DISPONIBILIDAD

La proporción de individuos que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana en el último año en la Región de Magallanes se mantiene estable respecto a 2018, pasando de 11,3% a 8,1% en 2020. A su vez, para cocaína se observa una diferencia de 0,8 puntos porcentuales, lo que se traduce en estabilidad respecto al estudio pasado, y para pasta base no se observan variaciones estadísticamente significativas, manteniéndose en 0,1% en el estudio actual.

TABLA 331
Exposición a ofertas de drogas en el último año.
Región de Magallanes, 2002-2020.


Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de la droga en el último año

Oferta en el último año (%)			
Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
2002	7,2	1,1	1,5
2004	9,8	0,7	0,4
2006	8,2	1,0	0,8
2008	11,8	1,5	0,7
2010	4,0	0,7	0,2
2012	14,3	1,2	1,1
2014	13,4	2,5	2,2
2016	13,1	3,5	1,1
2018	11,3	2,3	0,1
2020	8,1	1,5	0,1

Por otra parte, la proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir droga (facilidad de acceso) muestra para marihuana estabilidad con una diferencia de 0,1 puntos porcentuales respecto al estudio anterior (23,9% en 2020). En el caso de cocaína, el indicador de facilidad de acceso pasa de 8,1% en 2018 a 6,6% en 2020, es decir, no muestra una variación estadísticamente significativa respecto a 2018; para pasta base, este indicador se mantiene estable con una variación de 1,3 puntos porcentuales respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 111
Evolución de facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base. Región de Magallanes, 1994-2020.

Proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga (%)




PERCEPCIÓN DE SITUACIÓN EN BARRIO DE RESIDENCIA

El instrumento de este estudio pesquiza por distintos problemas asociados a los barrios de residencia de los encuestados. En la presente versión del estudio, el problema con una mayor frecuencia de reporte es "rayado en las paredes, daños al alumbrado o cosas similares" y el menor es "asaltos o robos en las calles".

La percepción de "tráfico de drogas" en la Región de Magallanes muestra estabilidad, pasando de 4,1% en 2018 a 6,1% en el estudio actual. Por su parte, la "venta clandestina de alcohol" no muestra variaciones significativas, con una diferencia de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2018. En las otras categorías descritas, solo se observa un descenso estadísticamente significativo en "jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas".

GRÁFICO 112
Evolución de percepción (%) de problemas en el barrio de residencia. Región de Magallanes, 2016-2020.





ANEXO I

Cuadros

Estadísticos con

Información Nacional

Complementaria

Serie SENDA 1994-2020

Anexo I

Cuadros estadísticos con información nacional complementaria serie SENDA 1994-2020

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ALCOHOL

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2020.

ALCOHOL VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	73,6	80,4	67,4	51,9	78,8	82,2	77,8	74,5	71,9	73,0	77,5
	(72,1 - 75,2)	(78,3 - 82,6)	(65,2 - 69,6)	(47,6 - 56,1)	(75,4 - 82,1)	(79,6 - 84,7)	(73,9 - 81,7)	(71,3 - 77,6)	(69,6 - 74,3)	(69,8 - 76,3)	(74,9 - 80,1)
1996	84,8	89,3	80,6	65,2	89,3	90,2	90,7	85,3			
	(83,6 - 86,1)	(87,7 - 90,9)	(78,7 - 82,5)	(61,1 - 69,2)	(87,2 - 91,5)	(87,8 - 92,6)	(88,8 - 92,6)	(82,4 - 88,2)			
1998	84,9	90,4	79,8	63,2	90,1	89,7	89,6	88,3	83,6	84,9	85,7
	(84,4 - 85,4)	(89,7 - 91,0)	(78,9 - 80,6)	(61,4 - 65,0)	(89,1 - 91,2)	(88,7 - 90,7)	(88,7 - 90,6)	(87,4 - 89,2)	(82,6 - 84,6)	(83,8 - 86,1)	(85,0 - 86,4)
2000	84,9	88,7	81,2	63,4	91,1	89,9	90,0	87,4	84,4	83,6	86,9
	(84,4 - 85,3)	(88,1 - 89,3)	(80,5 - 82,0)	(61,8 - 65,0)	(90,2 - 92,0)	(89,0 - 90,9)	(89,1 - 90,8)	(86,5 - 88,2)	(83,7 - 85,1)	(82,7 - 84,5)	(85,9 - 87,9)
2002	86,7	89,8	83,8	65,0	91,7	92,8	91,2	90,0	86,5	86,5	87,3
	(85,9 - 87,5)	(88,9 - 90,7)	(82,5 - 85,0)	(62,2 - 67,7)	(89,9 - 93,5)	(91,6 - 94,0)	(89,9 - 92,6)	(88,8 - 91,1)	(85,4 - 87,6)	(85,1 - 87,9)	(85,8 - 88,8)
2004	86,9	89,4	84,6	63,7	93,5	92,5	90,9	91,0	85,9	86,5	89,3
	(86,2 - 87,7)	(88,5 - 90,3)	(83,4 - 85,8)	(61,1 - 66,4)	(91,8 - 95,3)	(91,2 - 93,9)	(89,5 - 92,3)	(89,9 - 92,0)	(84,7 - 87,0)	(85,1 - 87,8)	(87,9 - 90,7)
2006	85,2	87,5	82,9	58,0	91,9	93,0	89,2	89,8	84,7	85,5	85,3
	(84,2 - 86,2)	(86,2 - 88,8)	(81,4 - 84,5)	(54,2 - 61,9)	(90,2 - 93,6)	(91,7 - 94,4)	(87,0 - 91,5)	(88,3 - 91,2)	(83,5 - 86,0)	(83,7 - 87,4)	(82,9 - 87,7)
2008	81,9	86,2	77,7	54,5	87,2	89,9	85,9	86,8	82,2	81,0	82,9
	(80,8 - 83,0)	(84,6 - 87,8)	(76,1 - 79,3)	(50,6 - 58,5)	(84,3 - 90,2)	(88,3 - 91,5)	(84,0 - 87,8)	(85,2 - 88,5)	(80,3 - 84,1)	(79,3 - 82,8)	(80,6 - 85,2)
2010	70,6	75,5	65,7	37,9	81,2	79,5	76,4	74,7	74,2	67,8	71,6
	(69,1 - 72,1)	(73,4 - 77,5)	(63,9 - 67,6)	(34,3 - 41,6)	(78,6 - 83,7)	(75,9 - 83,2)	(73,6 - 79,2)	(72,2 - 77,1)	(71,7 - 76,6)	(65,4 - 70,2)	(69,2 - 74,1)
2012	69,1	73,3	64,9	41,4	75,7	79,5	75,7	71,6	71,8	66,7	69,7
	(67,5 - 70,6)	(71,4 - 75,3)	(62,8 - 67,0)	(37,7 - 45,1)	(72,4 - 79,1)	(76,5 - 82,5)	(72,5 - 79,0)	(69,1 - 74,0)	(69,1 - 74,4)	(64,2 - 69,1)	(67,1 - 72,3)
2014	79,1	82,0	76,2	47,3	83,9	86,4	84,6	82,3	79,4	79,6	78,5
	(78,0 - 80,3)	(80,5 - 83,6)	(74,6 - 77,9)	(43,5 - 51,0)	(81,1 - 86,6)	(84,1 - 88,7)	(82,5 - 86,7)	(80,6 - 84,0)	(77,1 - 81,7)	(77,8 - 81,4)	(76,5 - 80,5)
2016	79,9	82,9	77,0	47,1	86,2	87,3	86,0	83,4	78,4	78,3	82,1
	(78,7 - 81,1)	(81,4 - 84,5)	(75,1 - 78,8)	(42,6 - 51,6)	(83,9 - 88,5)	(85,2 - 89,4)	(83,8 - 88,2)	(81,8 - 85,1)	(75,8 - 81,0)	(75,9 - 80,6)	(80,5 - 83,7)
2018	77,7	81,9	73,5	42,2	83,5	85,8	83,0	80,9	76,6	78,3	77,7
	(76,4 - 78,9)	(80,5 - 83,3)	(71,7 - 75,3)	(38,2 - 46,2)	(81,0 - 85,9)	(84,0 - 87,6)	(80,6 - 85,4)	(79,0 - 82,7)	(74,3 - 79,0)	(76,6 - 80,1)	(75,3 - 80,1)
2020	79,8*	82,1	77,6*	40,0	87,0*	88,0	85,3	84,2*	78,2	81,1	79,6
	(78,2 - 81,5)	(79,7 - 84,4)	(75,7 - 79,5)	(34,0 - 46,0)	(84,6 - 89,4)	(85,8 - 90,2)	(82,2 - 88,4)	(82,3 - 86,1)	(75,0 - 81,4)	(78,4 - 83,8)	(77,4 - 81,8)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ALCOHOL AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	60,9	69,0	53,5	43,3	69,7	69,1	63,2	57,7	57,0	61,7	67,9
	(59,2 - 62,7)	(66,5 - 71,5)	(51,2 - 55,9)	(39,1 - 47,6)	(66,1 - 73,4)	(65,6 - 72,5)	(58,8 - 67,5)	(54,2 - 61,2)	(54,4 - 59,7)	(58,3 - 65,1)	(65,0 - 70,8)
1996	71,5	77,9	65,4	56,0	78,0	78,1	76,0	67,5			
	(69,9 - 73,0)	(76,0 - 79,9)	(63,1 - 67,7)	(51,6 - 60,3)	(74,9 - 81,1)	(75,2 - 80,9)	(72,3 - 79,6)	(64,1 - 70,9)			
1998	71,6	79,9	63,7	52,4	79,1	77,2	76,5	70,7	68,1	70,7	74,0
	(70,9 - 72,3)	(79,0 - 80,8)	(62,7 - 64,7)	(50,5 - 54,3)	(77,5 - 80,7)	(75,9 - 78,5)	(75,1 - 77,9)	(69,3 - 72,0)	(66,8 - 69,4)	(69,2 - 72,2)	(73,1 - 75,0)
2000	73,9	79,4	68,7	53,8	81,7	80,2	79,0	73,4	71,7	73,0	78,4
	(73,3 - 74,5)	(78,6 - 80,2)	(67,8 - 69,5)	(52,1 - 55,5)	(80,5 - 83,0)	(79,1 - 81,4)	(77,8 - 80,1)	(72,3 - 74,5)	(70,8 - 72,5)	(71,9 - 74,0)	(77,3 - 79,5)
2002	75,3	79,6	71,2	55,8	83,1	81,8	79,8	75,0	73,5	75,1	78,4
	(74,3 - 76,3)	(78,3 - 80,9)	(69,7 - 72,6)	(52,9 - 58,7)	(80,9 - 85,4)	(79,8 - 83,7)	(77,8 - 81,7)	(73,0 - 76,9)	(72,1 - 75,0)	(73,2 - 77,0)	(76,5 - 80,3)
2004	76,0	80,9	71,2	55,5	83,7	82,2	80,1	77,0	73,8	75,4	80,3
	(75,0 - 76,9)	(79,7 - 82,1)	(69,8 - 72,7)	(52,6 - 58,3)	(81,4 - 86,0)	(80,2 - 84,2)	(78,1 - 82,0)	(75,3 - 78,7)	(72,3 - 75,3)	(73,7 - 77,0)	(78,5 - 82,2)
2006	73,6	78,4	68,8	48,0	80,0	82,4	79,3	75,3	70,2	74,3	77,5
	(72,2 - 74,9)	(76,7 - 80,1)	(66,8 - 70,8)	(44,1 - 51,9)	(76,8 - 83,2)	(79,8 - 85,0)	(76,7 - 81,9)	(73,1 - 77,6)	(68,5 - 72,0)	(71,9 - 76,7)	(74,6 - 80,4)
2008	68,5	75,6	61,6	46,2	77,9	78,1	71,5	68,0	65,7	69,7	70,8
	(67,1 - 69,9)	(73,7 - 77,5)	(59,6 - 63,5)	(42,2 - 50,2)	(74,6 - 81,2)	(75,6 - 80,6)	(68,9 - 74,0)	(65,4 - 70,6)	(63,3 - 68,0)	(67,6 - 71,7)	(67,9 - 73,7)
2010	57,5	63,7	51,4	31,1	71,5	65,6	62,0	58,0	58,8	54,3	60,5
	(56,0 - 59,0)	(61,6 - 65,8)	(49,5 - 53,3)	(27,7 - 34,5)	(68,4 - 74,6)	(61,9 - 69,3)	(58,7 - 65,3)	(55,5 - 60,6)	(55,9 - 61,6)	(52,0 - 56,7)	(58,1 - 62,8)
2012	55,8	61,8	50,0	32,1	65,4	67,8	61,3	54,7	55,6	52,8	58,5
	(54,2 - 57,4)	(59,6 - 63,9)	(47,8 - 52,1)	(28,4 - 35,8)	(61,8 - 68,9)	(64,7 - 71,0)	(58,0 - 64,6)	(52,2 - 57,2)	(53,0 - 58,2)	(50,3 - 55,3)	(55,9 - 61,1)
2014	63,4	68,9	58,0	36,8	69,2	73,3	70,3	62,8	62,0	61,3	66,1
	(61,9 - 65,0)	(67,0 - 70,9)	(55,9 - 60,1)	(33,2 - 40,3)	(65,1 - 73,3)	(70,3 - 76,4)	(67,5 - 73,2)	(60,2 - 65,3)	(59,4 - 64,7)	(59,1 - 63,4)	(63,2 - 68,9)
2016	63,9	68,7	59,1	34,8	73,7	74,3	71,8	62,2	58,8	60,8	69,0
	(62,5 - 65,3)	(67,0 - 70,4)	(57,1 - 61,1)	(30,4 - 39,2)	(70,6 - 76,7)	(71,4 - 77,2)	(68,9 - 74,8)	(59,9 - 64,5)	(55,9 - 61,6)	(58,2 - 63,4)	(66,7 - 71,4)
2018	61,0	67,6	54,5	31,9	69,7	71,1	67,2	59,4	58,3	60,4	63,8
	(59,5 - 62,5)	(65,6 - 69,5)	(52,4 - 56,6)	(28,1 - 35,6)	(66,5 - 72,9)	(68,5 - 73,7)	(63,8 - 70,6)	(57,0 - 61,8)	(55,2 - 61,3)	(58,3 - 62,5)	(61,0 - 66,5)
2020	58,5	64,9	52,1	24,2*	70,0	67,2	65,9	57,9	53,0*	59,8	61,4
	(56,2 - 60,8)	(61,9 - 67,9)	(49,6 - 54,5)	(19,3 - 29,2)	(66,4 - 73,6)	(63,9 - 70,5)	(61,3 - 70,5)	(54,4 - 61,3)	(49,4 - 56,6)	(56,2 - 63,5)	(58,4 - 64,4)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ALCOHOL MES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	40,4	50,6	31,0	24,4	49,4	46,7	43,7	36,5	38,1	38,1	47,0
	(38,6 - 42,1)	(48,0 - 53,3)	(28,7 - 33,2)	(20,5 - 28,3)	(45,4 - 53,4)	(42,8 - 50,6)	(39,7 - 47,8)	(33,0 - 39,9)	(35,5 - 40,7)	(34,6 - 41,5)	(43,8 - 50,2)
1996	48,1	56,9	39,8	31,4	56,7	52,3	51,5	46,6			
	(46,3 - 49,8)	(54,4 - 59,4)	(37,3 - 42,2)	(26,6 - 36,2)	(52,8 - 60,6)	(48,9 - 55,8)	(47,3 - 55,7)	(43,0 - 50,2)			
1998	53,0	64,0	42,5	30,9	60,3	58,3	57,9	54,4	49,1	52,8	55,3
	(52,2 - 53,7)	(62,9 - 65,1)	(41,5 - 43,5)	(29,2 - 32,6)	(58,4 - 62,3)	(56,7 - 60,0)	(56,2 - 59,6)	(52,9 - 55,9)	(47,7 - 50,4)	(51,1 - 54,4)	(54,2 - 56,4)
2000	54,4	63,4	45,8	30,6	61,1	60,5	59,8	57,2	51,6	53,2	60,2
	(53,8 - 55,1)	(62,5 - 64,3)	(44,9 - 46,7)	(29,0 - 32,1)	(59,5 - 62,8)	(59,1 - 61,9)	(58,4 - 61,2)	(56,0 - 58,5)	(50,6 - 52,6)	(51,9 - 54,4)	(58,8 - 61,5)
2002	59,6	66,8	52,8	35,5	65,8	66,6	65,9	61,7	58,2	59,3	62,5
	(58,5 - 60,8)	(65,2 - 68,3)	(51,1 - 54,4)	(32,6 - 38,4)	(62,9 - 68,8)	(64,2 - 69,0)	(63,6 - 68,2)	(59,5 - 63,8)	(56,5 - 59,8)	(57,2 - 61,5)	(60,2 - 64,9)
2004	57,9	66,6	49,4	31,5	65,4	65,3	63,0	61,2	55,3	57,1	63,2
	(56,7 - 59,0)	(65,1 - 68,1)	(47,7 - 51,1)	(28,8 - 34,3)	(62,3 - 68,5)	(62,6 - 67,9)	(60,5 - 65,5)	(59,2 - 63,2)	(53,5 - 57,1)	(55,1 - 59,0)	(60,8 - 65,7)
2006	58,1	65,9	50,5	32,3	64,0	65,9	63,9	61,0	53,9	58,1	64,2
	(56,6 - 59,6)	(63,9 - 67,9)	(48,2 - 52,7)	(28,3 - 36,2)	(60,1 - 67,8)	(62,6 - 69,2)	(60,8 - 67,1)	(58,2 - 63,8)	(52,0 - 55,8)	(55,3 - 60,9)	(60,8 - 67,6)
2008	49,8	60,0	39,9	27,2	60,8	60,8	53,7	47,1	46,2	49,3	55,9
	(48,3 - 51,4)	(57,8 - 62,2)	(37,7 - 42,1)	(23,6 - 30,8)	(56,8 - 64,8)	(57,7 - 63,9)	(50,7 - 56,7)	(44,1 - 50,1)	(43,7 - 48,8)	(46,8 - 51,8)	(52,7 - 59,1)
2010	40,5	48,9	32,2	18,4	55,4	47,7	44,4	39,0	35,2	37,3	47,1
	(39,0 - 41,9)	(46,8 - 51,0)	(30,3 - 34,0)	(15,6 - 21,1)	(51,8 - 59,0)	(44,3 - 51,2)	(41,2 - 47,6)	(36,6 - 41,4)	(32,5 - 37,9)	(35,1 - 39,6)	(44,6 - 49,6)
2012	40,8	49,2	32,5	18,1	50,2	51,8	45,0	40,4	39,9	37,7	44,0
	(39,3 - 42,2)	(47,1 - 51,3)	(30,8 - 34,3)	(14,8 - 21,4)	(46,4 - 54,0)	(48,6 - 54,9)	(41,8 - 48,2)	(37,9 - 42,8)	(37,6 - 42,3)	(35,5 - 39,9)	(41,5 - 46,4)
2014	48,9	55,3	42,5	22,9	53,8	57,3	54,4	49,5	46,5	46,1	52,5
	(47,2 - 50,5)	(53,2 - 57,5)	(40,5 - 44,6)	(19,8 - 26,0)	(49,8 - 57,8)	(53,8 - 60,9)	(51,2 - 57,5)	(46,8 - 52,2)	(43,5 - 49,4)	(43,9 - 48,4)	(49,6 - 55,5)
2016	46,0	52,6	39,3	18,7	56,7	58,1	50,2	44,1	41,0	42,5	51,3
	(44,5 - 47,5)	(50,4 - 54,8)	(37,4 - 41,2)	(14,7 - 22,8)	(53,0 - 60,5)	(54,7 - 61,6)	(46,5 - 53,9)	(41,8 - 46,5)	(38,0 - 44,1)	(39,8 - 45,2)	(48,8 - 53,8)
2018	43,3	52,5	34,2	18,7	53,2	52,7	48,5	40,5	39,7	42,7	46,7
	(41,8 - 44,8)	(50,5 - 54,6)	(32,2 - 36,2)	(15,4 - 21,9)	(49,7 - 56,7)	(49,5 - 55,9)	(45,2 - 51,8)	(38,2 - 42,8)	(36,5 - 42,9)	(40,6 - 44,8)	(44,0 - 49,4)
2020	44,3	51,5	37,2	13,6	54,8	50,4	52,6	43,8	40,5	45,3	46,3
	(42,1 - 46,6)	(48,4 - 54,7)	(34,7 - 39,6)	(9,1 - 18,1)	(50,6 - 59,1)	(46,5 - 54,3)	(48,3 - 56,9)	(41,0 - 46,5)	(36,9 - 44,2)	(41,7 - 48,9)	(43,2 - 49,3)

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS
Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2006-2020.

BEBIDAS ENERGÉTICAS VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	19,4	25,7	13,4	21,2	38,3	28,5	12,6	6,5	12,8	16,7	32,1
	(17,9 - 21,0)	(23,3 - 28,0)	(11,4 - 15,3)	(17,7 - 24,7)	(34,0 - 42,5)	(24,5 - 32,6)	(10,3 - 14,9)	(3,6 - 9,5)	(11,5 - 14,2)	(14,4 - 18,9)	(28,0 - 36,3)
2010	15,3	19,3	11,5	19,7	30,9	20,0	12,5	5,1	11,0	14,5	18,9
	(14,3 - 16,4)	(17,6 - 20,9)	(10,1 - 12,8)	(16,6 - 22,8)	(27,2 - 34,5)	(17,5 - 22,6)	(10,5 - 14,6)	(4,1 - 6,2)	(8,8 - 13,1)	(12,9 - 16,1)	(17,1 - 20,8)
2012	30,1	36,6	23,8	35,1	47,6	41,4	26,8	15,2	25,7	29,5	33,0
	(28,7 - 31,4)	(34,5 - 38,6)	(22,1 - 25,4)	(31,4 - 38,7)	(43,9 - 51,4)	(38,3 - 44,4)	(24,0 - 29,7)	(13,3 - 17,1)	(23,5 - 28,0)	(27,2 - 31,7)	(30,6 - 35,3)
2014	45,3	52,4	38,4	52,6	65,8	58,0	45,7	29,4	42,3	44,9	47,3
	(43,9 - 46,7)	(50,4 - 54,5)	(36,5 - 40,4)	(49,0 - 56,1)	(61,8 - 69,7)	(54,6 - 61,4)	(42,1 - 49,2)	(26,9 - 31,9)	(39,5 - 45,1)	(42,7 - 47,1)	(45,0 - 49,7)
2016	47,8	55,0	40,5	58,9	69,0	62,8	47,2	27,9	45,3	45,9	50,6
	(46,0 - 49,6)	(52,6 - 57,4)	(38,4 - 42,7)	(54,5 - 63,2)	(65,4 - 72,5)	(59,6 - 65,9)	(44,1 - 50,4)	(25,5 - 30,3)	(42,2 - 48,4)	(43,4 - 48,5)	(47,7 - 53,5)
2018	48,9	57,9	40,1	60,2	72,0	62,9	45,2	30,6	47,5	49,2	49,8
	(47,3 - 50,6)	(55,9 - 59,9)	(37,8 - 42,3)	(56,2 - 64,2)	(68,4 - 75,5)	(59,9 - 65,9)	(42,0 - 48,5)	(28,4 - 32,8)	(44,8 - 50,2)	(46,8 - 51,6)	(46,7 - 52,9)
2020	42,1*	48,8*	35,5*	51,4*	62,0*	52,1*	41,5	25,8*	43,7	39,7*	43,8*
	(40,1 - 44,1)	(46,0 - 51,5)	(33,1 - 37,8)	(46,0 - 56,7)	(58,0 - 66,0)	(47,5 - 56,7)	(37,3 - 45,8)	(23,5 - 28,2)	(40,2 - 47,3)	(36,4 - 43,1)	(40,8 - 46,8)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

BEBIDAS ENERGÉTICAS AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	12,9	17,5	8,5	16,4	26,1	17,7	6,8	4,6	8,2	10,4	22,8
	(11,5 - 14,4)	(15,2 - 19,7)	(6,8 - 10,2)	(13,1 - 19,7)	(22,2 - 30,1)	(13,8 - 21,6)	(5,2 - 8,4)	(1,7 - 7,4)	(7,0 - 9,3)	(8,6 - 12,2)	(18,7 - 26,9)
2010	11,1	14,6	7,6	15,2	23,9	15,1	7,4	3,1	7,1	10,8	13,7
	(10,2 - 12,0)	(13,2 - 16,0)	(6,5 - 8,7)	(12,7 - 17,7)	(20,5 - 27,2)	(12,9 - 17,3)	(5,8 - 9,0)	(2,3 - 3,9)	(5,7 - 8,5)	(9,5 - 12,2)	(12,0 - 15,3)
2012	20,7	27,1	14,4	26,1	36,3	27,6	15,6	9,7	17,6	20,4	22,6
	(19,5 - 21,9)	(25,3 - 29,0)	(13,1 - 15,8)	(22,7 - 29,4)	(32,7 - 39,9)	(24,9 - 30,3)	(13,5 - 17,7)	(8,0 - 11,3)	(15,7 - 19,5)	(18,4 - 22,4)	(20,7 - 24,6)
2014	29,3	36,0	22,7	38,1	45,5	35,0	28,2	17,9	25,2	29,3	31,4
	(28,0 - 30,6)	(34,0 - 38,0)	(20,9 - 24,5)	(34,4 - 41,8)	(41,6 - 49,4)	(31,9 - 38,2)	(24,9 - 31,6)	(15,6 - 20,2)	(22,9 - 27,4)	(27,3 - 31,3)	(29,1 - 33,7)
2016	29,7	37,4	22,0	39,8	45,9	38,3	28,3	15,8	28,0	29,5	30,8
	(28,3 - 31,2)	(35,1 - 39,7)	(20,3 - 23,8)	(36,1 - 43,5)	(42,3 - 49,4)	(35,0 - 41,5)	(25,4 - 31,2)	(13,8 - 17,8)	(25,5 - 30,6)	(27,3 - 31,7)	(28,6 - 32,9)
2018	29,7	38,3	21,2	41,8	48,7	38,1	26,2	15,4	28,8	29,8	30,1
	(28,1 - 31,3)	(36,2 - 40,5)	(19,4 - 22,9)	(37,1 - 46,4)	(44,9 - 52,6)	(34,9 - 41,3)	(23,1 - 29,2)	(13,5 - 17,3)	(26,1 - 31,5)	(27,5 - 32,1)	(27,2 - 33,1)
2020	27,3*	34,6*	20,1	37,7	44,7	33,7	25,4	14,1	29,6	25,9*	27,1
	(25,8 - 28,9)	(32,1 - 37,1)	(18,2 - 22,0)	(32,8 - 42,6)	(40,7 - 48,8)	(29,5 - 37,9)	(20,9 - 30,0)	(12,2 - 16,1)	(26,3 - 32,9)	(23,5 - 28,4)	(24,7 - 29,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

BEBIDAS ENERGÉTICAS MES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	4,1	5,2	3,0	5,9	9,0	5,3	1,9	0,9	2,4	3,8	6,9
	(3,4 - 4,7)	(4,2 - 6,1)	(2,1 - 4,0)	(3,7 - 8,2)	(6,5 - 11,5)	(3,6 - 7,0)	(1,2 - 2,6)	(0,5 - 1,3)	(1,9 - 2,9)	(2,6 - 5,0)	(5,1 - 8,7)
2010	4,0	5,8	2,3	4,5	9,9	6,4	2,6	0,7	2,7	4,0	4,9
	(3,5 - 4,6)	(4,8 - 6,8)	(1,8 - 2,8)	(3,3 - 5,6)	(7,3 - 12,4)	(4,9 - 8,0)	(1,9 - 3,4)	(0,4 - 1,1)	(1,9 - 3,6)	(3,1 - 4,9)	(3,9 - 5,8)
2012	8,9	12,4	5,5	9,3	18,2	13,3	6,4	3,4	8,9	8,5	9,3
	(8,2 - 9,6)	(11,1 - 13,7)	(4,7 - 6,3)	(7,4 - 11,1)	(15,5 - 20,9)	(11,2 - 15,4)	(5,2 - 7,6)	(2,5 - 4,3)	(7,6 - 10,2)	(7,3 - 9,8)	(8,0 - 10,5)
2014	12,8	17,3	8,4	16,2	22,5	16,6	12,3	6,4	10,9	13,5	13,1
	(11,8 - 13,8)	(15,5 - 19,1)	(7,4 - 9,3)	(13,3 - 19,2)	(19,2 - 25,8)	(14,1 - 19,0)	(10,0 - 14,5)	(5,0 - 7,9)	(9,2 - 12,5)	(11,9 - 15,2)	(11,5 - 14,8)
2016	13,1	18,0	8,2	16,2	22,1	18,4	12,5	6,0	13,1	12,6	13,6
	(12,1 - 14,1)	(16,4 - 19,7)	(7,1 - 9,3)	(13,6 - 18,7)	(18,8 - 25,3)	(15,7 - 21,0)	(9,9 - 15,2)	(5,0 - 7,0)	(11,3 - 14,9)	(10,9 - 14,3)	(12,0 - 15,2)
2018	14,1	18,8	9,5	19,6	26,8	17,9	11,8	6,3	12,7	14,5	14,6
	(13,0 - 15,3)	(17,0 - 20,5)	(8,2 - 10,9)	(15,9 - 23,2)	(22,8 - 30,8)	(15,7 - 20,2)	(9,2 - 14,4)	(5,2 - 7,4)	(11,0 - 14,5)	(12,7 - 16,2)	(12,3 - 17,0)
2020	16,4*	21,0	11,8*	20,9	28,3	22,3	16,0	7,2	18,4*	15,1	16,5
	(15,0 - 17,9)	(18,7 - 23,4)	(10,2 - 13,4)	(16,3 - 25,5)	(24,3 - 32,3)	(18,5 - 26,1)	(12,6 - 19,3)	(5,9 - 8,5)	(15,5 - 21,2)	(12,9 - 17,3)	(14,1 - 19,0)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ALCOHOL COMBINADO CON BEBIDAS ENERGÉTICAS

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012–2020.

ALCOHOL COMBINADO CON BEBIDAS ENERGÉTICAS VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	8,9	12,0	5,8	5,5	20,8	17,2	5,3	2,7	5,8	8,5	10,9
	(8,0 - 9,8)	(10,5 - 13,6)	(4,9 - 6,8)	(3,5 - 7,5)	(17,5 - 24,2)	(14,8 - 19,5)	(4,0 - 6,6)	(1,4 - 4,1)	(4,6 - 7,0)	(6,9 - 10,1)	(9,4 - 12,4)
2014	13,4	16,7	10,2	8,6	28,7	23,3	10,8	6,1	11,8	11,6	16,0
	(12,3 - 14,6)	(15,1 - 18,4)	(8,6 - 11,8)	(6,4 - 10,7)	(25,2 - 32,2)	(20,3 - 26,2)	(8,6 - 13,0)	(4,0 - 8,2)	(10,0 - 13,6)	(10,3 - 12,8)	(13,6 - 18,3)
2016	13,8	17,1	10,6	9,0	30,2	26,5	12,1	3,7	10,4	11,7	17,3
	(12,4 - 15,3)	(15,2 - 19,0)	(9,1 - 12,0)	(7,1 - 11,0)	(25,6 - 34,8)	(22,8 - 30,2)	(9,4 - 14,8)	(2,7 - 4,8)	(8,8 - 12,1)	(9,5 - 13,9)	(15,0 - 19,6)
2018	15,0	20,8	9,4	9,1	34,7	25,6	12,5	5,1	12,4	14,1	18,1
	(13,8 - 16,3)	(18,8 - 22,7)	(7,9 - 10,9)	(6,4 - 11,8)	(30,0 - 39,4)	(22,5 - 28,8)	(10,4 - 14,5)	(4,1 - 6,2)	(10,7 - 14,0)	(12,5 - 15,8)	(15,2 - 21,1)
2020	11,2*	15,5*	6,8*	5,3*	25,5*	16,7*	13,4	3,5*	11,3	9,4*	13,4*
	(9,9 - 12,4)	(13,5 - 17,6)	(5,7 - 7,9)	(2,9 - 7,8)	(21,2 - 29,9)	(13,9 - 19,5)	(9,8 - 16,9)	(2,4 - 4,5)	(8,9 - 13,7)	(7,8 - 10,9)	(10,5 - 16,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ALCOHOL COMBINADO CON BEBIDAS ENERGÉTICAS AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	5,7	8,1	3,4	3,9	15,6	10,9	2,4	1,1	4,4	5,2	7,0
	(5,1 - 6,4)	(6,8 - 9,4)	(2,7 - 4,2)	(2,2 - 5,5)	(12,4 - 18,8)	(9,0 - 12,7)	(1,6 - 3,2)	(0,4 - 1,8)	(3,3 - 5,4)	(4,1 - 6,2)	(5,7 - 8,2)
2014	8,8	11,5	6,2	6,7	19,9	14,3	6,6	3,8	7,6	7,7	10,4
	(7,8 - 9,8)	(10,0 - 13,0)	(4,7 - 7,6)	(4,7 - 8,6)	(16,9 - 23,0)	(11,8 - 16,7)	(4,6 - 8,6)	(1,8 - 5,7)	(6,0 - 9,1)	(6,5 - 8,9)	(8,3 - 12,5)
2016	7,9	9,7	6,1	7,0	21,6	13,5	4,9	1,3	6,1	6,6	9,9
	(6,9 - 8,9)	(8,3 - 11,1)	(5,1 - 7,2)	(5,4 - 8,6)	(17,6 - 25,5)	(10,4 - 16,6)	(3,5 - 6,4)	(0,9 - 1,8)	(4,8 - 7,4)	(5,3 - 8,0)	(8,4 - 11,3)
2018	7,7	11,4	4,1	5,6	19,1	12,4	5,8	2,4	6,3	7,8	8,6
	(6,9 - 8,5)	(10,0 - 12,7)	(3,4 - 4,7)	(3,9 - 7,4)	(15,7 - 22,4)	(10,4 - 14,4)	(4,5 - 7,1)	(1,6 - 3,1)	(5,2 - 7,4)	(6,6 - 9,1)	(7,1 - 10,2)
2020	4,9*	6,9*	2,9*	4,1	10,6*	8,2*	3,8*	1,6	5,7	4,2*	4,9*
	(4,1 - 5,6)	(5,6 - 8,1)	(2,1 - 3,6)	(1,9 - 6,4)	(7,8 - 13,4)	(6,0 - 10,5)	(2,3 - 5,2)	(0,7 - 2,5)	(4,0 - 7,5)	(3,2 - 5,2)	(3,6 - 6,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ALCOHOL COMBINADO CON BEBIDAS ENERGÉTICAS MES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	2,1	3,3	1,0	1,0	6,4	4,3	0,7	0,3	1,7	1,9	2,6
	(1,6 - 2,6)	(2,4 - 4,2)	(0,7 - 1,3)	(0,4 - 1,5)	(3,7 - 9,1)	(3,2 - 5,4)	(0,3 - 1,1)	(0,1 - 0,5)	(1,2 - 2,2)	(1,3 - 2,4)	(1,5 - 3,6)
2014	3,1	4,6	1,7	3,0	8,0	5,5	1,9	0,8	3,3	2,9	3,2
	(2,6 - 3,7)	(3,7 - 5,5)	(1,3 - 2,1)	(1,7 - 4,2)	(5,7 - 10,2)	(4,0 - 7,1)	(1,3 - 2,6)	(0,5 - 1,2)	(2,2 - 4,5)	(2,1 - 3,7)	(2,4 - 4,1)
2016	2,7	3,8	1,5	1,8	8,4	5,2	1,0	0,3	2,4	2,0	3,4
	(2,1 - 3,2)	(2,9 - 4,8)	(1,0 - 2,1)	(1,0 - 2,6)	(6,0 - 10,7)	(3,6 - 6,8)	(0,4 - 1,5)	(0,1 - 0,4)	(1,5 - 3,4)	(1,3 - 2,8)	(2,4 - 4,4)
2018	2,6	3,7	1,4	2,1	6,3	3,9	2,1	0,8	2,2	2,4	3,0
	(2,1 - 3,0)	(3,0 - 4,5)	(1,1 - 1,8)	(0,9 - 3,3)	(4,4 - 8,1)	(2,7 - 5,2)	(1,3 - 2,8)	(0,4 - 1,2)	(1,5 - 2,9)	(1,7 - 3,2)	(2,2 - 3,9)
2020	1,6*	2,5*	0,8*	1,6	3,7*	2,6	1,7	0,3*	2,3	1,4*	1,4*
	(1,2 - 2,1)	(1,7 - 3,3)	(0,4 - 1,1)	(0,0 - 3,3)	(2,2 - 5,2)	(1,6 - 3,7)	(0,5 - 2,8)	(0,1 - 0,6)	(1,2 - 3,5)	(0,8 - 2,0)	(0,8 - 1,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE TABACO
Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2020.

TABACO VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	63,2	69,2	57,8	42,9	70,6	70,7	74,7	55,7	61,3	65,0	65,5
	(61,5 - 64,9)	(66,7 - 71,6)	(55,5 - 60,1)	(38,7 - 47,1)	(67,0 - 74,2)	(67,4 - 74,0)	(70,9 - 78,5)	(52,2 - 59,3)	(58,8 - 63,8)	(61,6 - 68,3)	(62,5 - 68,5)
1996	71,5	75,6	67,5	50,0	78,5	76,1	80,6	69,2			
	(70,0 - 73,0)	(73,5 - 77,7)	(65,4 - 69,7)	(45,5 - 54,4)	(75,5 - 81,5)	(72,9 - 79,3)	(77,9 - 83,3)	(66,1 - 72,2)			
1998	72,5	78,0	67,3	47,3	78,5	77,9	82,5	72,7	72,8	72,5	72,4
	(71,9 - 73,2)	(77,1 - 78,9)	(66,4 - 68,3)	(45,4 - 49,2)	(76,9 - 80,1)	(76,5 - 79,3)	(81,3 - 83,7)	(71,5 - 73,9)	(71,6 - 74,0)	(71,1 - 73,9)	(71,4 - 73,4)
2000	69,7	73,9	65,6	49,7	76,6	73,8	77,4	69,2	70,4	68,4	69,8
	(69,1 - 70,3)	(73,0 - 74,8)	(64,8 - 66,5)	(48,1 - 51,4)	(75,1 - 78,0)	(72,5 - 75,1)	(76,2 - 78,6)	(68,0 - 70,3)	(69,5 - 71,3)	(67,3 - 69,6)	(68,5 - 71,1)
2002	70,1	74,8	65,6	47,7	77,5	72,9	79,1	71,2	70,9	70,2	68,8
	(69,1 - 71,2)	(73,4 - 76,2)	(64,0 - 67,2)	(44,7 - 50,7)	(74,9 - 80,1)	(70,4 - 75,5)	(77,3 - 80,9)	(69,3 - 73,1)	(69,4 - 72,4)	(68,3 - 72,1)	(66,5 - 71,1)
2004	73,0	76,4	69,7	49,6	80,8	79,2	78,6	74,8	72,9	72,1	74,3
	(72,0 - 74,0)	(75,0 - 77,8)	(68,2 - 71,3)	(46,7 - 52,5)	(78,3 - 83,3)	(77,0 - 81,4)	(76,4 - 80,7)	(73,0 - 76,6)	(71,3 - 74,5)	(70,4 - 73,8)	(72,2 - 76,5)
2006	69,7	73,0	66,5	45,4	76,5	77,3	72,9	73,2	69,8	71,7	66,9
	(68,2 - 71,2)	(70,8 - 75,1)	(64,4 - 68,5)	(41,4 - 49,3)	(73,2 - 79,8)	(74,6 - 80,1)	(69,9 - 75,8)	(70,2 - 76,2)	(68,1 - 71,5)	(69,4 - 74,1)	(63,1 - 70,7)
2008	68,8	73,7	64,0	48,4	77,2	75,4	68,7	71,7	69,3	68,9	67,9
	(67,4 - 70,2)	(71,7 - 75,6)	(62,0 - 66,0)	(44,5 - 52,4)	(73,8 - 80,6)	(72,6 - 78,2)	(65,9 - 71,5)	(69,1 - 74,3)	(67,0 - 71,6)	(66,8 - 71,0)	(64,7 - 71,0)
2010	58,2	62,1	54,3	31,8	67,1	67,2	61,6	61,2	64,2	56,6	56,5
	(56,7 - 59,6)	(60,1 - 64,1)	(52,4 - 56,3)	(28,3 - 35,4)	(63,8 - 70,4)	(64,3 - 70,0)	(58,6 - 64,6)	(58,8 - 63,6)	(61,7 - 66,6)	(54,2 - 58,9)	(54,2 - 58,8)
2012	57,9	61,0	54,9	29,2	60,0	69,7	64,3	62,9	61,1	57,3	56,8
	(56,5 - 59,3)	(59,1 - 63,0)	(53,0 - 56,8)	(25,8 - 32,6)	(55,9 - 64,0)	(66,7 - 72,7)	(61,0 - 67,5)	(60,4 - 65,3)	(58,5 - 63,7)	(54,9 - 59,6)	(54,6 - 59,1)
2014	64,4	66,5	62,4	33,1	67,1	71,9	68,3	69,1	68,8	64,9	61,8
	(63,0 - 65,9)	(64,5 - 68,5)	(60,5 - 64,4)	(29,6 - 36,5)	(63,6 - 70,6)	(69,0 - 74,7)	(65,1 - 71,4)	(66,7 - 71,4)	(66,3 - 71,3)	(62,7 - 67,0)	(59,1 - 64,5)
2016	64,1	66,2	62,0	31,9	63,1	73,5	73,1	68,1	65,5	63,7	63,8
	(62,7 - 65,6)	(64,3 - 68,1)	(60,1 - 64,0)	(28,2 - 35,6)	(59,5 - 66,6)	(70,8 - 76,2)	(70,2 - 76,1)	(65,5 - 70,7)	(62,2 - 68,8)	(61,3 - 66,1)	(61,5 - 66,1)
2018	60,0	63,9	56,2	23,8	64,4	67,4	66,3	63,9	59,0	61,2	59,1
	(58,4 - 61,6)	(61,7 - 66,1)	(54,2 - 58,1)	(20,1 - 27,5)	(60,6 - 68,2)	(64,7 - 70,2)	(62,4 - 70,1)	(61,7 - 66,0)	(56,0 - 62,1)	(59,0 - 63,4)	(56,1 - 62,1)
2020	60,9	64,0	57,9	16,2*	60,5	68,0	68,3	69,8*	59,2	62,6	60,1
	(59,3 - 62,6)	(61,3 - 66,7)	(55,8 - 59,9)	(12,3 - 20,1)	(55,7 - 65,3)	(64,6 - 71,5)	(65,2 - 71,3)	(67,3 - 72,3)	(55,3 - 63,1)	(60,4 - 64,8)	(57,0 - 63,2)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

TABACO AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	46,1	51,0	41,6	34,0	56,4	55,5	52,1	32,5	44,2	49,2	47,0
	(44,3 - 47,8)	(48,3 - 53,6)	(39,2 - 43,9)	(30,0 - 38,0)	(52,4 - 60,5)	(51,8 - 59,3)	(47,9 - 56,3)	(29,2 - 35,8)	(41,6 - 46,8)	(45,7 - 52,8)	(43,8 - 50,2)
1996	48,4	53,3	43,7	39,5	62,8	54,6	51,2	35,4			
	(46,6 - 50,1)	(50,7 - 55,8)	(41,3 - 46,1)	(35,0 - 44,1)	(59,0 - 66,6)	(51,1 - 58,1)	(47,0 - 55,4)	(32,0 - 38,8)			
1998	47,7	53,6	42,1	35,8	60,0	54,7	53,0	36,6	50,0	48,5	46,0
	(46,9 - 48,5)	(52,5 - 54,8)	(41,0 - 43,1)	(34,0 - 37,6)	(58,0 - 61,9)	(53,1 - 56,4)	(51,3 - 54,7)	(35,2 - 38,0)	(48,6 - 51,3)	(46,9 - 50,1)	(44,9 - 47,1)
2000	49,5	53,4	45,8	38,6	62,4	56,5	54,8	38,3	50,9	48,3	48,5
	(48,8 - 50,2)	(52,4 - 54,4)	(44,8 - 46,7)	(37,0 - 40,2)	(60,8 - 64,1)	(55,0 - 58,0)	(53,4 - 56,2)	(37,0 - 39,6)	(49,9 - 51,9)	(47,1 - 49,5)	(47,1 - 49,9)
2002	49,0	52,5	45,6	34,9	61,3	54,1	56,5	40,7	49,6	49,6	47,1
	(47,8 - 50,1)	(50,8 - 54,1)	(44,0 - 47,3)	(32,0 - 37,8)	(58,2 - 64,3)	(51,5 - 56,7)	(54,1 - 58,9)	(38,5 - 42,9)	(48,0 - 51,3)	(47,4 - 51,8)	(44,6 - 49,5)
2004	49,4	51,6	47,3	36,3	64,1	58,6	53,7	39,2	50,2	49,0	48,5
	(48,2 - 50,6)	(49,9 - 53,2)	(45,5 - 49,0)	(33,5 - 39,1)	(61,0 - 67,1)	(55,8 - 61,3)	(51,0 - 56,4)	(37,1 - 41,2)	(48,4 - 52,0)	(47,1 - 51,0)	(45,8 - 51,1)
2006	48,3	50,5	46,2	33,3	58,4	59,5	50,3	42,8	49,5	48,0	47,4
	(46,7 - 49,9)	(48,2 - 52,8)	(43,9 - 48,5)	(29,8 - 36,9)	(54,4 - 62,4)	(56,0 - 63,0)	(46,9 - 53,8)	(39,7 - 45,9)	(47,6 - 51,4)	(45,1 - 50,9)	(43,5 - 51,3)
2008	47,3	51,5	43,3	35,9	58,3	57,1	46,7	42,1	49,7	46,9	44,8
	(45,8 - 48,9)	(49,2 - 53,8)	(41,2 - 45,5)	(32,0 - 39,8)	(54,1 - 62,4)	(53,8 - 60,4)	(43,7 - 49,7)	(39,1 - 45,2)	(47,1 - 52,2)	(44,4 - 49,4)	(41,5 - 48,1)
2010	39,5	42,0	37,1	23,0	52,5	49,1	42,4	35,6	44,0	37,7	38,9
	(38,0 - 41,0)	(39,9 - 44,0)	(35,2 - 39,0)	(19,7 - 26,3)	(48,8 - 56,2)	(46,1 - 52,2)	(39,3 - 45,5)	(33,1 - 38,0)	(41,0 - 46,9)	(35,6 - 39,9)	(36,5 - 41,3)
2012	38,2	40,8	35,6	20,1	43,9	49,1	42,5	37,2	41,5	38,5	36,1
	(36,8 - 39,5)	(38,9 - 42,7)	(33,9 - 37,3)	(16,8 - 23,4)	(40,2 - 47,6)	(46,0 - 52,1)	(39,5 - 45,5)	(34,9 - 39,5)	(39,1 - 44,0)	(36,3 - 40,6)	(33,9 - 38,3)
2014	39,1	40,2	37,9	23,7	43,3	44,7	45,2	37,3	43,5	39,6	36,2
	(37,6 - 40,5)	(38,1 - 42,3)	(35,9 - 39,9)	(20,3 - 27,1)	(39,5 - 47,1)	(41,4 - 48,0)	(42,0 - 48,5)	(34,8 - 39,8)	(40,6 - 46,4)	(37,4 - 41,8)	(33,9 - 38,5)
2016	37,9	40,4	35,3	20,3	40,0	47,0	44,3	36,3	42,0	37,6	36,1
	(36,6 - 39,2)	(38,4 - 42,4)	(33,4 - 37,2)	(17,4 - 23,2)	(36,1 - 43,8)	(43,7 - 50,4)	(40,8 - 47,8)	(33,8 - 38,9)	(38,5 - 45,6)	(35,6 - 39,6)	(33,7 - 38,4)
2018	35,2	37,9	32,5	14,5	39,1	43,8	40,9	33,6	37,0	36,1	32,6
	(33,6 - 36,7)	(35,8 - 40,0)	(30,5 - 34,4)	(11,2 - 17,8)	(35,5 - 42,8)	(40,4 - 47,2)	(37,2 - 44,7)	(31,6 - 35,6)	(33,5 - 40,5)	(33,9 - 38,4)	(30,2 - 35,0)
2020	32,5*	34,3*	30,7	6,3*	35,7	37,6*	39,6	34,4	32,3	33,8	30,9
	(30,8 - 34,2)	(31,7 - 36,8)	(28,7 - 32,7)	(4,2 - 8,4)	(31,6 - 39,8)	(33,8 - 41,5)	(35,8 - 43,4)	(31,4 - 37,3)	(28,8 - 35,7)	(31,4 - 36,3)	(27,8 - 33,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

TABACO MES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	40,7	45,7	36,0	23,9	50,7	50,3	48,4	29,5	40,0	42,5	40,5
	(38,9 - 42,4)	(43,1 - 48,4)	(33,7 - 38,4)	(20,4 - 27,4)	(46,7 - 54,7)	(46,4 - 54,1)	(44,2 - 52,6)	(26,3 - 32,7)	(37,4 - 42,5)	(39,0 - 46,1)	(37,3 - 43,6)
1996	41,3	46,4	36,6	28,7	54,5	47,0	44,8	32,1			
	(39,6 - 43,0)	(43,9 - 48,8)	(34,2 - 38,9)	(24,1 - 33,4)	(50,5 - 58,4)	(43,6 - 50,5)	(40,7 - 48,8)	(28,8 - 35,4)			
1998	41,6	47,9	35,6	25,6	52,4	48,1	48,8	33,1	44,1	42,0	39,9
	(40,8 - 42,3)	(46,7 - 49,0)	(34,6 - 36,6)	(24,0 - 27,2)	(50,4 - 54,4)	(46,5 - 49,8)	(47,1 - 50,6)	(31,7 - 34,5)	(42,7 - 45,5)	(40,4 - 43,5)	(38,8 - 41,0)
2000	44,0	48,5	39,8	29,6	56,0	50,9	50,1	35,5	45,4	43,0	43,0
	(43,4 - 44,7)	(47,5 - 49,5)	(38,9 - 40,7)	(28,1 - 31,1)	(54,4 - 57,7)	(49,4 - 52,4)	(48,7 - 51,5)	(34,2 - 36,7)	(44,4 - 46,3)	(41,8 - 44,2)	(41,7 - 44,4)
2002	43,6	47,4	39,9	26,8	55,7	49,2	51,4	36,6	44,4	44,5	41,1
	(42,4 - 44,7)	(45,8 - 49,1)	(38,2 - 41,5)	(24,0 - 29,5)	(52,6 - 58,8)	(46,6 - 51,9)	(49,0 - 53,9)	(34,4 - 38,7)	(42,7 - 46,0)	(42,3 - 46,6)	(38,7 - 43,6)
2004	43,6	46,3	41,0	25,8	57,5	52,8	49,2	36,1	44,7	43,3	42,3
	(42,5 - 44,8)	(44,7 - 48,0)	(39,3 - 42,7)	(23,2 - 28,3)	(54,3 - 60,6)	(50,0 - 55,6)	(46,5 - 51,9)	(34,1 - 38,1)	(42,9 - 46,5)	(41,4 - 45,3)	(39,6 - 44,9)
2006	42,4	45,1	39,8	25,3	52,4	51,5	45,5	38,8	43,9	42,3	40,8
	(40,8 - 44,0)	(42,8 - 47,4)	(37,5 - 42,0)	(21,9 - 28,7)	(48,3 - 56,5)	(47,8 - 55,2)	(42,0 - 48,9)	(35,8 - 41,9)	(42,0 - 45,7)	(39,4 - 45,2)	(37,0 - 44,5)
2008	41,2	45,2	37,4	26,1	51,0	51,4	42,5	37,3	44,1	40,5	38,3
	(39,7 - 42,8)	(42,9 - 47,5)	(35,3 - 39,5)	(22,3 - 29,8)	(46,8 - 55,2)	(48,0 - 54,9)	(39,5 - 45,4)	(34,3 - 40,2)	(41,5 - 46,6)	(38,1 - 43,0)	(35,0 - 41,6)
2010	36,0	38,6	33,4	18,3	47,5	43,9	39,5	33,8	39,2	34,6	35,5
	(34,5 - 37,4)	(36,6 - 40,6)	(31,4 - 35,3)	(15,3 - 21,3)	(43,8 - 51,2)	(40,9 - 46,9)	(36,4 - 42,5)	(31,4 - 36,2)	(36,4 - 42,1)	(32,5 - 36,7)	(33,1 - 37,9)
2012	34,0	37,0	31,0	14,1	39,6	44,0	39,0	34,1	37,2	34,4	31,9
	(32,7 - 35,2)	(35,1 - 38,9)	(29,4 - 32,7)	(11,2 - 17,0)	(36,0 - 43,1)	(41,0 - 47,1)	(36,0 - 42,0)	(31,8 - 36,3)	(34,9 - 39,6)	(32,2 - 36,5)	(29,7 - 34,0)
2014	34,7	35,9	33,4	16,5	37,0	39,7	41,1	34,8	39,7	34,6	32,1
	(33,3 - 36,0)	(33,9 - 38,0)	(31,5 - 35,4)	(13,6 - 19,4)	(33,3 - 40,7)	(36,4 - 42,9)	(37,8 - 44,4)	(32,3 - 37,3)	(36,8 - 42,6)	(32,6 - 36,7)	(29,8 - 34,4)
2016	33,4	36,0	30,8	12,9	34,1	41,0	40,9	33,8	38,2	33,7	30,8
	(32,1 - 34,7)	(34,1 - 37,8)	(29,0 - 32,7)	(10,6 - 15,2)	(30,2 - 38,0)	(37,5 - 44,5)	(37,7 - 44,2)	(31,3 - 36,3)	(34,9 - 41,5)	(31,7 - 35,7)	(28,6 - 33,1)
2018	31,1	33,4	28,8	10,2	33,8	38,3	36,8	30,8	32,9	31,9	28,8
	(29,6 - 32,6)	(31,4 - 35,5)	(26,8 - 30,7)	(7,0 - 13,3)	(30,2 - 37,4)	(34,9 - 41,8)	(33,2 - 40,5)	(28,8 - 32,7)	(29,4 - 36,4)	(29,7 - 34,1)	(26,5 - 31,0)
2020	28,6*	30,0*	27,2	4,6*	29,4	32,3*	36,1	31,4	28,2	30,4	26,6
	(26,9 - 30,3)	(27,4 - 32,6)	(25,3 - 29,2)	(2,7 - 6,6)	(25,6 - 33,2)	(28,7 - 35,9)	(32,4 - 39,7)	(28,3 - 34,5)	(24,9 - 31,5)	(28,0 - 32,8)	(23,7 - 29,5)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

TABACO DIARIO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	30,6	33,3	28,0	14,1	36,9	34,0	38,9	28,4	32,1	29,7	28,9
	(29,5 - 31,7)	(31,7 - 34,9)	(26,5 - 29,5)	(12,0 - 16,2)	(33,9 - 39,9)	(31,6 - 36,4)	(36,5 - 41,4)	(26,3 - 30,4)	(30,5 - 33,7)	(27,7 - 31,6)	(26,6 - 31,2)
2004	30,5	32,1	28,9	14,8	38,6	35,7	35,5	28,1	31,8	30,1	28,7
	(29,4 - 31,6)	(30,5 - 33,6)	(27,3 - 30,4)	(12,7 - 17,0)	(35,4 - 41,8)	(33,0 - 38,3)	(33,0 - 38,0)	(26,2 - 30,0)	(30,2 - 33,5)	(28,2 - 32,0)	(26,3 - 31,0)
2006	28,8	31,8	25,8	12,7	30,1	34,2	31,4	32,3	29,6	29,5	26,9
	(27,3 - 30,2)	(29,6 - 34,0)	(23,9 - 27,7)	(10,3 - 15,1)	(26,2 - 34,0)	(30,7 - 37,7)	(28,3 - 34,5)	(29,3 - 35,3)	(27,8 - 31,3)	(26,9 - 32,2)	(23,5 - 30,3)
2008	28,2	29,9	26,5	12,7	31,8	33,2	30,9	30,0	30,3	28,3	25,0
	(26,7 - 29,6)	(27,8 - 32,0)	(24,4 - 28,6)	(10,0 - 15,4)	(27,7 - 35,9)	(29,7 - 36,8)	(28,1 - 33,7)	(27,0 - 32,9)	(27,8 - 32,8)	(25,9 - 30,6)	(22,0 - 27,9)
2010	24,5	26,4	22,8	11,1	27,4	29,0	27,4	26,4	27,4	22,9	24,8
	(23,3 - 25,8)	(24,6 - 28,1)	(21,1 - 24,4)	(8,8 - 13,3)	(24,1 - 30,6)	(26,1 - 32,0)	(24,4 - 30,3)	(24,1 - 28,6)	(24,9 - 29,8)	(21,0 - 24,8)	(22,6 - 27,0)
2012	21,9	23,8	20,1	6,4	21,0	25,6	26,7	26,1	24,2	21,5	21,0
	(20,8 - 23,0)	(22,1 - 25,5)	(18,7 - 21,5)	(4,5 - 8,3)	(18,3 - 23,7)	(22,9 - 28,3)	(23,9 - 29,4)	(24,1 - 28,0)	(22,2 - 26,2)	(19,8 - 23,2)	(19,1 - 22,9)
2014	22,7	23,2	22,2	8,4	18,9	25,3	26,5	26,3	27,4	22,5	20,5
	(21,5 - 23,9)	(21,3 - 25,0)	(20,7 - 23,7)	(6,0 - 10,7)	(16,1 - 21,7)	(22,4 - 28,1)	(23,9 - 29,0)	(24,1 - 28,4)	(24,8 - 30,0)	(20,7 - 24,3)	(18,5 - 22,4)
2016	21,2	22,7	19,7	5,5	16,5	25,6	27,2	24,3	26,5	20,6	19,2
	(20,1 - 22,4)	(21,2 - 24,3)	(18,0 - 21,4)	(3,9 - 7,1)	(13,8 - 19,3)	(22,0 - 29,2)	(24,4 - 30,0)	(22,6 - 26,0)	(23,4 - 29,6)	(18,9 - 22,3)	(17,6 - 20,8)
2018	19,6	20,4	18,8	3,5	16,6	21,6	25,4	22,5	22,0	20,6	16,8
	(18,2 - 20,9)	(18,6 - 22,2)	(17,1 - 20,5)	(2,2 - 4,7)	(13,4 - 19,8)	(18,6 - 24,6)	(21,7 - 29,0)	(20,7 - 24,3)	(19,1 - 25,0)	(18,7 - 22,5)	(14,7 - 18,9)
2020	19,5	20,1	19,0	2,4	15,1	20,5	25,4	24,2	21,3	20,3	17,0
	(18,1 - 21,0)	(18,1 - 22,2)	(17,1 - 20,8)	(0,7 - 4,1)	(12,0 - 18,2)	(17,2 - 23,8)	(22,1 - 28,6)	(21,5 - 26,8)	(18,2 - 24,4)	(18,5 - 22,2)	(14,5 - 19,4)

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2014–2020.

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2014	7,3	8,0	6,5	5,8	11,5	8,9	8,7	4,8	5,7	7,0	8,3
	(6,5 - 8,0)	(6,8 - 9,3)	(5,6 - 7,5)	(4,1 - 7,5)	(9,1 - 14,0)	(6,9 - 10,8)	(6,5 - 10,8)	(3,6 - 5,9)	(4,6 - 6,8)	(5,8 - 8,3)	(7,0 - 9,7)
2016	14,1	14,9	13,2	15,5	23,6	16,6	14,6	8,0	10,0	13,8	16,2
	(12,6 - 15,6)	(12,7 - 17,2)	(11,9 - 14,5)	(11,7 - 19,3)	(18,8 - 28,5)	(13,3 - 19,9)	(12,3 - 16,9)	(6,5 - 9,4)	(8,2 - 11,9)	(11,8 - 15,8)	(14,2 - 18,3)
2018	14,2	16,0	12,6	16,9	24,8	18,9	10,3	8,7	13,2	12,7	16,7
	(13,0 - 15,5)	(14,1 - 17,8)	(10,8 - 14,3)	(13,8 - 20,0)	(20,2 - 29,4)	(16,0 - 21,9)	(8,4 - 12,3)	(7,5 - 9,9)	(10,9 - 15,5)	(11,3 - 14,2)	(13,9 - 19,6)
2020	15,3	18,2	12,5	16,4	29,5	18,5	13,0	8,7	14,4	15,0	16,6
	(14,0 - 16,7)	(16,3 - 20,1)	(10,9 - 14,1)	(11,9 - 20,8)	(25,1 - 33,9)	(15,7 - 21,2)	(10,2 - 15,7)	(6,7 - 10,7)	(11,7 - 17,2)	(13,2 - 16,8)	(14,0 - 19,1)

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2014	3,6	3,9	3,3	3,6	5,4	4,1	3,9	2,5	3,1	2,7	4,6
	(3,0 - 4,1)	(3,0 - 4,7)	(2,5 - 4,0)	(2,1 - 5,1)	(4,1 - 6,7)	(3,0 - 5,1)	(2,2 - 5,6)	(1,6 - 3,4)	(2,2 - 3,9)	(2,1 - 3,3)	(3,4 - 5,7)
2016	6,5	7,0	6,0	8,3	12,0	7,6	5,3	3,6	4,9	6,7	7,2
	(5,4 - 7,6)	(5,5 - 8,5)	(4,9 - 7,2)	(5,2 - 11,4)	(8,0 - 16,1)	(5,4 - 9,8)	(3,6 - 7,1)	(2,4 - 4,8)	(3,4 - 6,4)	(5,2 - 8,2)	(5,6 - 8,8)
2018	5,3	6,1	4,4	8,5	9,8	6,7	4,0	2,2	5,1	5,1	5,7
	(4,5 - 6,0)	(5,0 - 7,2)	(3,5 - 5,3)	(6,3 - 10,6)	(7,3 - 12,4)	(4,5 - 8,8)	(2,6 - 5,3)	(1,6 - 2,9)	(3,8 - 6,4)	(4,0 - 6,1)	(4,4 - 7,0)
2020	2,8*	4,1*	1,4*	2,8*	6,5	3,6*	1,1*	1,5	1,6*	3,4	2,9*
	(2,0 - 3,5)	(2,7 - 5,4)	(1,0 - 1,9)	(0,5 - 5,1)	(3,4 - 9,7)	(2,0 - 5,2)	(0,6 - 1,7)	(0,4 - 2,7)	(0,7 - 2,5)	(1,9 - 4,9)	(1,4 - 4,4)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS MES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2014	0,9	0,9	1,0	0,5	1,9	1,1	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0
	(0,7 - 1,2)	(0,5 - 1,3)	(0,7 - 1,3)	(0,1 - 1,0)	(1,0 - 2,8)	(0,3 - 1,8)	(0,3 - 1,5)	(0,4 - 1,0)	(0,6 - 1,6)	(0,4 - 1,2)	(0,7 - 1,4)
2016	1,2	1,3	1,0	1,3	2,8	1,5	0,6	0,6	0,8	1,0	1,5
	(0,8 - 1,5)	(0,8 - 1,9)	(0,5 - 1,5)	(0,5 - 2,2)	(1,1 - 4,5)	(0,6 - 2,4)	(0,3 - 1,0)	(0,1 - 1,0)	(0,3 - 1,4)	(0,4 - 1,5)	(0,9 - 2,2)
2018	1,5	2,0	1,1	2,2	3,3	1,9	1,1	0,6	1,6	1,3	1,8
	(1,2 - 1,9)	(1,3 - 2,7)	(0,7 - 1,4)	(1,1 - 3,3)	(1,7 - 4,9)	(1,0 - 2,8)	(0,6 - 1,6)	(0,3 - 0,9)	(0,7 - 2,5)	(0,9 - 1,7)	(1,1 - 2,5)
2020	0,9*	1,3	0,5*	0,3*	2,1	1,2	0,2*	0,8	0,4*	1,2	1,0
	(0,4 - 1,4)	(0,4 - 2,2)	(0,1 - 0,9)	(0,0 - 0,9)	(0,7 - 3,5)	(0,1 - 2,2)	(<0,1 - 0,4)	(0,0 - 1,9)	(<0,1 - 0,8)	(0,2 - 2,2)	(0,2 - 1,7)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE MARIHUANA
Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2020.

MARIHUANA VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	13,1	20,2	6,6	9,3	21,5	21,0	11,6	2,8	12,3	12,4	15,3
	(11,8 - 14,4)	(17,8 - 22,5)	(5,5 - 7,8)	(6,8 - 11,8)	(18,5 - 24,6)	(17,3 - 24,7)	(8,7 - 14,5)	(1,4 - 4,3)	(10,3 - 14,4)	(10,1 - 14,8)	(13,0 - 17,6)
1996	17,5	24,2	11,2	10,4	33,8	24,9	15,1	5,6			
	(16,1 - 18,9)	(22,0 - 26,4)	(9,5 - 12,9)	(7,4 - 13,4)	(29,8 - 37,8)	(21,9 - 28,0)	(12,4 - 17,8)	(3,2 - 7,9)			
1998	17,5	25,5	9,9	10,9	31,3	26,2	17,3	4,9	18,2	18,3	16,7
	(16,9 - 18,1)	(24,5 - 26,5)	(9,3 - 10,5)	(9,9 - 12,0)	(29,5 - 33,1)	(24,7 - 27,7)	(16,1 - 18,6)	(4,3 - 5,5)	(17,1 - 19,2)	(17,1 - 19,6)	(15,8 - 17,5)
2000	20,8	28,9	13,1	12,0	34,6	31,9	22,8	7,2	20,5	19,5	22,7
	(20,3 - 21,4)	(28,0 - 29,8)	(12,5 - 13,8)	(10,9 - 13,1)	(32,9 - 36,2)	(30,5 - 33,3)	(21,5 - 24,0)	(6,5 - 7,9)	(19,7 - 21,3)	(18,5 - 20,5)	(21,5 - 23,9)
2002	23,1	32,5	14,1	12,1	38,4	33,8	26,7	9,8	23,6	22,1	23,1
	(22,1 - 24,1)	(30,9 - 34,0)	(12,9 - 15,3)	(10,2 - 14,1)	(35,4 - 41,4)	(31,3 - 36,2)	(24,3 - 29,1)	(8,3 - 11,3)	(22,2 - 25,1)	(20,3 - 23,9)	(20,9 - 25,2)
2004	24,1	31,9	16,6	12,3	38,9	36,6	25,4	12,8	24,5	22,9	24,8
	(23,0 - 25,1)	(30,3 - 33,5)	(15,3 - 17,8)	(10,4 - 14,3)	(35,8 - 42,0)	(33,9 - 39,3)	(23,1 - 27,8)	(11,2 - 14,4)	(22,9 - 26,1)	(21,2 - 24,6)	(22,5 - 27,1)
2006	26,3	34,6	18,2	14,0	42,2	39,3	27,1	15,3	24,5	25,4	29,8
	(24,8 - 27,8)	(32,3 - 36,8)	(16,2 - 20,1)	(10,3 - 17,6)	(38,1 - 46,3)	(35,7 - 42,9)	(24,0 - 30,2)	(12,9 - 17,8)	(22,8 - 26,3)	(22,7 - 28,1)	(26,3 - 33,3)
2008	26,0	34,8	17,5	16,4	43,0	37,8	26,1	14,5	25,9	25,8	26,5
	(24,6 - 27,5)	(32,6 - 37,0)	(15,7 - 19,2)	(13,3 - 19,6)	(38,8 - 47,2)	(34,4 - 41,2)	(23,2 - 29,0)	(12,1 - 17,0)	(23,6 - 28,2)	(23,4 - 28,2)	(23,5 - 29,5)
2010	19,6	26,5	12,9	9,4	33,6	30,8	20,1	12,7	19,8	18,1	21,2
	(18,3 - 20,9)	(24,5 - 28,5)	(11,5 - 14,3)	(7,0 - 11,9)	(29,7 - 37,5)	(27,5 - 34,0)	(17,8 - 22,4)	(10,8 - 14,5)	(17,1 - 22,6)	(16,1 - 20,1)	(19,0 - 23,5)
2012	23,0	30,0	16,1	10,1	34,8	35,4	24,1	17,4	22,4	22,4	23,8
	(21,8 - 24,2)	(28,1 - 31,9)	(14,9 - 17,4)	(8,1 - 12,1)	(31,2 - 38,3)	(32,6 - 38,2)	(21,5 - 26,7)	(15,4 - 19,4)	(20,4 - 24,5)	(20,5 - 24,3)	(21,7 - 25,8)
2014	31,5	37,5	25,7	22,2	45,7	44,1	33,6	22,8	32,2	31,1	31,5
	(30,1 - 32,9)	(35,3 - 39,6)	(23,8 - 27,5)	(18,9 - 25,5)	(41,8 - 49,6)	(40,7 - 47,5)	(30,4 - 36,7)	(20,4 - 25,2)	(29,6 - 34,9)	(29,1 - 33,1)	(29,0 - 34,0)
2016	35,7	42,5	28,9	20,2	55,5	52,2	37,2	24,9	35,2	33,6	37,8
	(34,2 - 37,3)	(40,3 - 44,7)	(26,9 - 30,9)	(17,2 - 23,2)	(51,7 - 59,4)	(48,7 - 55,7)	(34,0 - 40,3)	(22,3 - 27,6)	(32,5 - 38,0)	(31,0 - 36,1)	(35,1 - 40,4)
2018	34,8	43,3	26,4	18,6	53,8	48,6	37,3	24,5	35,0	33,5	35,9
	(33,1 - 36,5)	(40,8 - 45,7)	(24,4 - 28,3)	(15,1 - 22,1)	(49,4 - 58,3)	(45,3 - 52,0)	(33,0 - 41,7)	(22,5 - 26,4)	(32,0 - 38,1)	(31,2 - 35,7)	(32,7 - 39,1)
2020	38,2*	46,1	30,5*	12,5*	58,3	53,5*	43,9*	28,7*	36,0	39,1*	39,0
	(36,7 - 39,8)	(43,6 - 48,5)	(28,2 - 32,7)	(9,4 - 15,7)	(53,8 - 62,8)	(50,3 - 56,8)	(39,4 - 48,3)	(26,3 - 31,1)	(33,0 - 39,0)	(36,7 - 41,4)	(36,2 - 41,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

MARIHUANA AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	4,0	6,1	1,9	5,6	8,7	4,7	1,6	0,2	3,6	3,2	5,2
	(3,3 - 4,6)	(5,0 - 7,2)	(1,3 - 2,6)	(3,7 - 7,5)	(6,5 - 10,9)	(3,4 - 6,1)	(0,8 - 2,4)	(<0,1 - 0,3)	(2,8 - 4,5)	(2,0 - 4,5)	(3,8 - 6,6)
1996	4,0	5,9	2,2	6,7	10,6	3,5	1,1	0,2			
	(3,2 - 4,7)	(4,6 - 7,2)	(1,4 - 2,9)	(4,3 - 9,0)	(7,9 - 13,3)	(2,1 - 4,9)	(0,3 - 1,8)	(0,0 - 0,4)			
1998	4,8	7,2	2,4	7,6	12,1	4,8	1,7	0,3	5,4	5,0	4,2
	(4,4 - 5,1)	(6,6 - 7,8)	(2,1 - 2,8)	(6,7 - 8,5)	(10,8 - 13,4)	(4,0 - 5,5)	(1,3 - 2,1)	(0,2 - 0,5)	(4,8 - 6,0)	(4,3 - 5,7)	(3,8 - 4,7)
2000	5,7	8,5	3,1	8,1	14,7	6,7	2,4	0,4	5,7	4,9	6,6
	(5,4 - 6,1)	(7,9 - 9,0)	(2,8 - 3,5)	(7,1 - 9,0)	(13,4 - 15,9)	(5,9 - 7,5)	(2,0 - 2,8)	(0,2 - 0,6)	(5,2 - 6,1)	(4,4 - 5,5)	(5,9 - 7,3)
2002	5,0	7,9	2,3	6,2	13,0	6,7	2,0	0,5	5,5	4,3	5,0
	(4,5 - 5,5)	(7,0 - 8,8)	(1,8 - 2,8)	(4,7 - 7,6)	(11,0 - 15,0)	(5,3 - 8,0)	(1,4 - 2,7)	(0,2 - 0,8)	(4,7 - 6,3)	(3,4 - 5,2)	(3,9 - 6,0)
2004	5,4	7,6	3,2	6,2	14,7	6,5	2,4	0,7	5,0	4,5	7,0
	(4,8 - 5,9)	(6,6 - 8,5)	(2,6 - 3,9)	(4,7 - 7,7)	(12,5 - 17,0)	(5,2 - 7,8)	(1,4 - 3,4)	(0,3 - 1,1)	(4,2 - 5,8)	(3,7 - 5,4)	(5,6 - 8,5)
2006	7,2	9,7	4,7	7,4	18,5	9,8	3,8	1,3	5,8	6,0	10,3
	(6,2 - 8,2)	(8,1 - 11,2)	(3,5 - 5,9)	(5,5 - 9,4)	(14,6 - 22,4)	(7,4 - 12,3)	(2,3 - 5,2)	(0,2 - 2,3)	(5,0 - 6,7)	(4,5 - 7,5)	(7,6 - 13,1)
2008	6,4	8,8	4,2	9,1	17,9	6,7	2,8	0,9	7,4	5,6	6,4
	(5,6 - 7,3)	(7,6 - 10,0)	(3,0 - 5,3)	(6,7 - 11,6)	(14,4 - 21,3)	(5,1 - 8,3)	(1,7 - 3,9)	(0,5 - 1,2)	(6,0 - 8,9)	(4,2 - 7,0)	(5,0 - 7,8)
2010	4,6	7,1	2,1	5,3	12,3	6,7	2,6	0,5	6,1	3,3	5,1
	(3,9 - 5,3)	(6,0 - 8,2)	(1,5 - 2,7)	(3,6 - 7,1)	(9,2 - 15,5)	(5,2 - 8,3)	(1,7 - 3,5)	(0,3 - 0,8)	(4,4 - 7,8)	(2,6 - 4,1)	(4,0 - 6,2)
2012	7,1	9,8	4,4	6,7	17,5	10,3	4,4	1,9	7,4	6,9	7,1
	(6,3 - 7,8)	(8,6 - 11,1)	(3,7 - 5,1)	(5,0 - 8,4)	(14,6 - 20,5)	(8,4 - 12,2)	(3,2 - 5,7)	(1,2 - 2,7)	(6,1 - 8,7)	(5,9 - 7,8)	(5,7 - 8,5)
2014	11,3	14,6	8,1	13,5	24,0	17,1	9,0	4,2	10,6	10,4	12,5
	(10,3 - 12,3)	(12,9 - 16,3)	(7,0 - 9,2)	(10,7 - 16,3)	(20,6 - 27,4)	(14,3 - 19,9)	(6,7 - 11,2)	(2,8 - 5,6)	(9,0 - 12,2)	(9,0 - 11,9)	(10,7 - 14,4)
2016	14,5	18,4	10,6	12,6	33,8	23,4	9,4	5,5	14,4	12,1	16,6
	(13,1 - 15,9)	(16,4 - 20,4)	(9,1 - 12,1)	(10,2 - 15,0)	(29,2 - 38,3)	(20,1 - 26,7)	(7,2 - 11,6)	(4,0 - 7,0)	(12,4 - 16,4)	(10,1 - 14,0)	(14,5 - 18,8)
2018	12,7	18,1	7,4	10,1	32,1	20,0	9,3	3,9	12,4	12,3	13,3
	(11,7 - 13,8)	(16,3 - 19,9)	(6,4 - 8,5)	(7,0 - 13,2)	(28,6 - 35,5)	(17,0 - 23,0)	(7,3 - 11,2)	(3,1 - 4,7)	(10,2 - 14,5)	(10,7 - 13,9)	(11,3 - 15,4)
2020	11,4	16,0	6,8	5,8*	27,2	18,1	11,0	3,7	9,4*	12,6	11,5
	(10,2 - 12,6)	(14,1 - 17,9)	(5,5 - 8,2)	(3,6 - 7,9)	(23,2 - 31,2)	(14,9 - 21,3)	(8,1 - 14,0)	(2,7 - 4,6)	(7,5 - 11,3)	(10,9 - 14,3)	(9,3 - 13,7)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

MARIHUANA MES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	1,8	3,0	0,8	2,6	3,8	2,5	0,6	<0,1	1,8	1,5	2,2
	(1,4 - 2,3)	(2,2 - 3,8)	(0,3 - 1,2)	(1,1 - 4,1)	(2,2 - 5,4)	(1,6 - 3,5)	(0,1 - 1,1)	(0,0 - 0,1)	(1,2 - 2,4)	(0,5 - 2,6)	(1,2 - 3,2)
1996	1,3	2,1	0,5	1,3	3,6	1,8	0,1	<0,1			
	(0,9 - 1,6)	(1,4 - 2,7)	(0,1 - 0,9)	(0,4 - 2,2)	(2,0 - 5,1)	(0,8 - 2,8)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - <0,1)			
1998	2,0	3,3	0,7	2,7	4,9	2,3	0,9	0,1	2,5	2,0	1,6
	(1,8 - 2,2)	(2,9 - 3,7)	(0,6 - 0,9)	(2,2 - 3,3)	(4,2 - 5,7)	(1,7 - 2,9)	(0,6 - 1,2)	(<0,1 - 0,2)	(2,1 - 2,9)	(1,6 - 2,5)	(1,4 - 1,9)
2000	2,8	4,5	1,1	3,5	7,2	3,5	1,2	0,2	2,8	2,3	3,2
	(2,5 - 3,0)	(4,1 - 4,9)	(0,9 - 1,3)	(2,8 - 4,1)	(6,3 - 8,2)	(2,9 - 4,1)	(0,9 - 1,5)	(0,1 - 0,3)	(2,5 - 3,1)	(2,0 - 2,7)	(2,6 - 3,7)
2002	2,8	4,5	1,1	3,1	7,7	3,7	0,9	0,4	3,1	2,4	2,5
	(2,4 - 3,2)	(3,8 - 5,2)	(0,7 - 1,5)	(1,9 - 4,3)	(6,1 - 9,4)	(2,7 - 4,7)	(0,5 - 1,3)	(0,1 - 0,6)	(2,5 - 3,8)	(1,8 - 3,1)	(1,7 - 3,3)
2004	2,7	4,2	1,3	2,2	8,5	3,5	1,2	0,3	2,7	2,5	3,1
	(2,4 - 3,1)	(3,6 - 4,9)	(0,9 - 1,7)	(1,4 - 3,0)	(6,8 - 10,2)	(2,6 - 4,5)	(0,6 - 1,8)	(0,1 - 0,5)	(2,1 - 3,2)	(1,9 - 3,2)	(2,2 - 3,9)
2006	4,0	5,9	2,2	3,9	11,0	4,4	2,5	1,0	3,1	3,0	6,6
	(3,2 - 4,9)	(4,5 - 7,2)	(1,3 - 3,2)	(2,3 - 5,6)	(7,3 - 14,6)	(2,9 - 5,8)	(1,4 - 3,6)	(0,0 - 2,1)	(2,5 - 3,8)	(2,0 - 4,0)	(4,0 - 9,1)
2008	3,5	5,4	1,8	4,0	9,6	4,1	2,0	0,5	4,4	2,5	3,9
	(3,0 - 4,1)	(4,4 - 6,3)	(1,2 - 2,3)	(2,6 - 5,3)	(7,4 - 11,8)	(2,7 - 5,5)	(1,0 - 3,0)	(0,2 - 0,9)	(3,4 - 5,4)	(1,7 - 3,3)	(2,8 - 5,1)
2010	2,8	4,5	1,3	2,6	7,5	4,7	1,8	0,4	4,1	2,1	2,9
	(2,4 - 3,3)	(3,7 - 5,2)	(0,7 - 1,8)	(1,4 - 3,9)	(5,6 - 9,5)	(3,3 - 6,1)	(1,0 - 2,6)	(0,2 - 0,7)	(2,9 - 5,3)	(1,5 - 2,7)	(2,1 - 3,7)
2012	4,4	6,6	2,3	3,1	11,6	6,6	2,8	1,3	5,0	4,0	4,5
	(3,7 - 5,1)	(5,4 - 7,8)	(1,7 - 2,9)	(2,0 - 4,2)	(8,7 - 14,5)	(5,1 - 8,2)	(1,8 - 3,9)	(0,7 - 2,0)	(3,9 - 6,1)	(3,2 - 4,8)	(3,1 - 5,9)
2014	6,8	9,1	4,5	6,3	14,8	11,9	4,7	2,6	6,8	5,9	7,5
	(5,9 - 7,7)	(7,6 - 10,6)	(3,6 - 5,4)	(4,4 - 8,3)	(11,9 - 17,7)	(9,3 - 14,6)	(2,9 - 6,5)	(1,3 - 3,9)	(5,6 - 8,1)	(4,8 - 7,1)	(5,8 - 9,2)
2016	8,7	12,2	5,3	6,0	21,3	15,1	5,8	2,9	8,5	7,5	9,8
	(7,7 - 9,7)	(10,5 - 13,8)	(4,1 - 6,4)	(4,0 - 8,0)	(17,4 - 25,3)	(12,0 - 18,2)	(4,1 - 7,6)	(1,6 - 4,1)	(6,9 - 10,2)	(6,0 - 9,0)	(8,1 - 11,5)
2018	8,3	12,3	4,4	5,7	23,4	12,8	5,8	2,1	8,2	8,2	8,3
	(7,4 - 9,2)	(10,7 - 13,9)	(3,7 - 5,2)	(3,4 - 8,1)	(19,8 - 27,0)	(10,1 - 15,6)	(4,3 - 7,4)	(1,5 - 2,6)	(6,5 - 10,0)	(6,8 - 9,6)	(6,7 - 10,0)
2020	7,9	11,2	4,5	2,6*	20,0	12,7	7,8	2,3	6,7	8,4	8,2
	(6,9 - 8,9)	(9,5 - 13,0)	(3,3 - 5,8)	(0,9 - 4,4)	(15,8 - 24,3)	(10,3 - 15,2)	(5,2 - 10,5)	(1,6 - 3,1)	(5,0 - 8,4)	(6,9 - 9,9)	(6,3 - 10,1)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE COCAÍNA

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2020.

COCAÍNA VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	2,4	4,3	0,7	1,5	4,9	4,1	1,4	0,5	2,0	2,6	3,1
	(2,0 - 2,9)	(3,4 - 5,2)	(0,4 - 1,0)	(0,5 - 2,4)	(3,3 - 6,4)	(2,8 - 5,3)	(0,7 - 2,0)	(0,2 - 0,8)	(1,4 - 2,6)	(1,5 - 3,7)	(2,1 - 4,0)
1996	2,9	4,8	1,0	1,0	5,6	5,4	1,3	1,1			
	(2,3 - 3,5)	(3,6 - 6,0)	(0,6 - 1,5)	(0,1 - 1,8)	(3,9 - 7,4)	(3,4 - 7,4)	(0,6 - 2,0)	(0,2 - 2,0)			
1998	4,3	7,0	1,7	1,4	9,0	7,1	3,5	1,2	4,2	4,4	4,3
	(4,0 - 4,6)	(6,4 - 7,5)	(1,4 - 2,0)	(1,0 - 1,8)	(7,9 - 10,1)	(6,2 - 7,9)	(2,9 - 4,0)	(0,9 - 1,5)	(3,7 - 4,7)	(3,7 - 5,0)	(3,8 - 4,7)
2000	4,9	7,9	2,0	1,7	8,6	8,7	4,6	1,7	5,1	4,6	4,7
	(4,6 - 5,2)	(7,3 - 8,4)	(1,7 - 2,2)	(1,3 - 2,2)	(7,6 - 9,6)	(7,8 - 9,6)	(4,0 - 5,2)	(1,3 - 2,0)	(4,7 - 5,6)	(4,1 - 5,1)	(4,1 - 5,3)
2002	5,5	9,2	1,9	1,4	10,0	10,7	4,6	2,1	5,7	5,5	5,2
	(4,9 - 6,0)	(8,2 - 10,2)	(1,4 - 2,4)	(0,7 - 2,1)	(8,2 - 11,8)	(9,1 - 12,4)	(3,4 - 5,7)	(1,4 - 2,8)	(4,9 - 6,5)	(4,5 - 6,6)	(4,1 - 6,2)
2004	5,8	9,1	2,6	1,4	9,1	11,5	5,8	2,5	6,4	5,2	5,4
	(5,2 - 6,4)	(8,0 - 10,2)	(2,0 - 3,1)	(0,7 - 2,1)	(7,2 - 11,0)	(9,6 - 13,3)	(4,4 - 7,2)	(1,7 - 3,3)	(5,4 - 7,3)	(4,3 - 6,2)	(4,2 - 6,7)
2006	6,5	9,8	3,2	1,4	9,4	12,1	7,3	3,5	6,4	7,1	5,6
	(5,6 - 7,4)	(8,3 - 11,3)	(2,2 - 4,2)	(0,8 - 2,0)	(6,0 - 12,8)	(9,6 - 14,6)	(5,5 - 9,2)	(2,2 - 4,8)	(5,4 - 7,4)	(5,5 - 8,7)	(3,4 - 7,9)
2008	6,6	10,8	2,6	3,0	8,4	12,6	7,1	3,7	7,6	6,2	5,9
	(5,8 - 7,5)	(9,2 - 12,5)	(2,0 - 3,1)	(1,2 - 4,7)	(6,5 - 10,4)	(9,8 - 15,3)	(5,4 - 8,8)	(2,0 - 5,4)	(6,3 - 9,0)	(4,7 - 7,7)	(4,1 - 7,8)
2010	3,7	5,6	1,8	0,8	5,6	6,7	4,3	2,5	4,5	3,1	3,9
	(3,1 - 4,3)	(4,5 - 6,7)	(1,3 - 2,2)	(0,3 - 1,3)	(3,6 - 7,5)	(5,3 - 8,1)	(3,1 - 5,4)	(1,5 - 3,4)	(3,1 - 5,9)	(2,2 - 4,0)	(3,1 - 4,7)
2012	4,7	7,3	2,1	0,6	5,7	9,1	5,8	3,7	5,3	4,7	4,3
	(4,0 - 5,3)	(6,1 - 8,5)	(1,6 - 2,7)	(0,2 - 1,0)	(4,0 - 7,3)	(7,3 - 10,8)	(4,4 - 7,1)	(2,4 - 5,0)	(4,3 - 6,2)	(3,5 - 6,0)	(3,3 - 5,3)
2014	5,9	9,5	2,3	2,2	6,2	10,1	7,7	4,3	8,2	5,7	4,8
	(5,1 - 6,6)	(8,0 - 10,9)	(1,9 - 2,7)	(0,6 - 3,8)	(4,5 - 7,9)	(7,6 - 12,6)	(5,9 - 9,5)	(3,1 - 5,6)	(6,7 - 9,6)	(4,5 - 6,9)	(3,5 - 6,1)
2016	5,9	8,9	3,0	1,0	5,6	10,6	9,3	4,2	8,9	5,4	5,0
	(5,2 - 6,7)	(7,6 - 10,2)	(2,2 - 3,7)	(0,5 - 1,6)	(4,0 - 7,3)	(8,3 - 12,9)	(7,2 - 11,4)	(3,1 - 5,2)	(7,0 - 10,7)	(4,2 - 6,6)	(3,8 - 6,2)
2018	5,5	8,8	2,4	1,3	7,2	8,4	7,8	3,8	6,6	5,9	4,2
	(4,9 - 6,2)	(7,6 - 9,9)	(1,8 - 3,0)	(0,3 - 2,3)	(5,4 - 8,9)	(6,6 - 10,2)	(5,8 - 9,7)	(2,9 - 4,7)	(5,2 - 7,9)	(4,8 - 6,9)	(3,2 - 5,3)
2020	6,6*	10,8*	2,6	0,2*	5,9	8,9	10,2	6,4*	7,7	7,0	5,2
	(5,8 - 7,5)	(9,3 - 12,2)	(1,9 - 3,2)	(<0,1 - 0,4)	(3,6 - 8,1)	(6,8 - 11,0)	(7,9 - 12,5)	(5,0 - 7,8)	(6,1 - 9,4)	(5,5 - 8,5)	(3,7 - 6,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

COCAÍNA AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	0,9	1,5	0,3	0,8	1,7	1,5	0,6		0,8	0,9	1,2
	(0,6 - 1,2)	(0,9 - 2,1)	(0,1 - 0,6)	(0,1 - 1,5)	(0,7 - 2,8)	(0,6 - 2,4)	(0,1 - 1,0)		(0,3 - 1,2)	(0,2 - 1,5)	(0,6 - 1,7)
1996	0,9	1,4	0,4	0,9	2,4	1,2	0,1	<0,1			
	(0,5 - 1,2)	(0,8 - 2,0)	(0,1 - 0,7)	(<0,1 - 1,8)	(1,3 - 3,6)	(0,3 - 2,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - <0,1)			
1998	1,4	2,3	0,5	0,9	3,4	2,0	0,9	0,1	1,5	1,5	1,3
	(1,2 - 1,5)	(2,0 - 2,6)	(0,4 - 0,6)	(0,6 - 1,2)	(2,8 - 4,1)	(1,5 - 2,4)	(0,6 - 1,2)	(<0,1 - 0,2)	(1,2 - 1,8)	(1,1 - 1,8)	(1,0 - 1,5)
2000	1,5	2,5	0,5	1,1	3,6	2,3	1,0	0,1	1,6	1,6	1,3
	(1,3 - 1,7)	(2,2 - 2,8)	(0,4 - 0,6)	(0,8 - 1,5)	(2,9 - 4,2)	(1,8 - 2,8)	(0,7 - 1,3)	(<0,1 - 0,3)	(1,3 - 1,8)	(1,2 - 1,9)	(1,0 - 1,6)
2002	1,5	2,6	0,5	0,8	4,0	2,8	0,8	0,1	1,9	1,6	0,9
	(1,2 - 1,8)	(2,0 - 3,1)	(0,3 - 0,8)	(0,3 - 1,3)	(2,8 - 5,2)	(1,9 - 3,7)	(0,3 - 1,3)	(0,0 - 0,1)	(1,4 - 2,3)	(1,0 - 2,1)	(0,4 - 1,4)
2004	1,3	2,2	0,5	0,7	3,5	2,1	0,7	0,3	1,6	1,2	1,1
	(1,1 - 1,6)	(1,7 - 2,7)	(0,3 - 0,7)	(0,3 - 1,1)	(2,4 - 4,6)	(1,3 - 2,9)	(0,3 - 1,1)	(<0,1 - 0,6)	(1,1 - 2,0)	(0,7 - 1,6)	(0,6 - 1,5)
2006	1,3	2,0	0,6	0,7	2,8	1,8	1,5	0,3	1,6	1,3	0,7
	(1,0 - 1,6)	(1,5 - 2,5)	(0,2 - 1,0)	(0,3 - 1,0)	(1,8 - 3,8)	(1,1 - 2,6)	(0,5 - 2,6)	(0,1 - 0,5)	(1,2 - 2,1)	(0,6 - 2,1)	(0,4 - 1,0)
2008	1,8	3,2	0,6	1,0	3,8	2,4	1,7	0,9	2,4	1,6	1,5
	(1,3 - 2,4)	(2,1 - 4,2)	(0,3 - 0,8)	(0,4 - 1,6)	(2,4 - 5,3)	(0,9 - 3,9)	(0,7 - 2,8)	(0,0 - 2,1)	(1,6 - 3,2)	(0,4 - 2,7)	(0,7 - 2,2)
2010	0,7	1,2	0,1	0,4	1,3	1,3	0,7	0,2	1,0	0,3	0,8
	(0,5 - 0,9)	(0,8 - 1,6)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,8)	(0,6 - 1,9)	(0,6 - 2,0)	(0,2 - 1,2)	(0,0 - 0,4)	(0,6 - 1,5)	(0,1 - 0,5)	(0,4 - 1,2)
2012	0,9	1,3	0,5	0,3	2,0	1,6	0,7	0,3	1,5	0,6	0,7
	(0,5 - 1,2)	(0,8 - 1,7)	(0,1 - 0,8)	(0,0 - 0,7)	(1,0 - 3,0)	(0,9 - 2,3)	(0,2 - 1,2)	(0,0 - 0,8)	(1,0 - 2,0)	(0,4 - 0,9)	(0,1 - 1,4)
2014	1,4	2,2	0,6	1,6	1,9	2,7	1,5	0,6	2,1	1,3	1,1
	(1,0 - 1,8)	(1,4 - 3,0)	(0,4 - 0,8)	(0,1 - 3,2)	(0,9 - 2,8)	(0,8 - 4,5)	(0,8 - 2,2)	(0,3 - 0,8)	(1,3 - 3,0)	(0,7 - 2,0)	(0,4 - 1,8)
2016	1,1	1,6	0,5	0,3	1,8	2,1	1,4	0,3	2,0	0,9	0,7
	(0,8 - 1,3)	(1,2 - 2,1)	(0,2 - 0,7)	(0,1 - 0,6)	(0,8 - 2,8)	(1,3 - 3,0)	(0,6 - 2,2)	(0,1 - 0,5)	(1,2 - 2,7)	(0,6 - 1,3)	(0,3 - 1,1)
2018	1,0	1,8	0,3	0,1	2,0	1,9	1,3	0,4	1,6	1,0	0,7
	(0,8 - 1,3)	(1,3 - 2,2)	(0,1 - 0,6)	(0,0 - 0,3)	(1,1 - 2,8)	(1,1 - 2,8)	(0,6 - 2,1)	(0,2 - 0,6)	(1,0 - 2,2)	(0,6 - 1,3)	(0,3 - 1,1)
2020	0,5*	1,0*	0,1*	<0,1	0,9	0,8*	0,8	0,3	0,8*	0,4*	0,4
	(0,3 - 0,7)	(0,6 - 1,3)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,2 - 1,6)	(0,1 - 1,4)	(0,3 - 1,4)	(0,1 - 0,4)	(0,3 - 1,2)	(0,2 - 0,7)	(0,1 - 0,8)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

COCAÍNA MES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	0,3	0,6	0,1		0,7	0,5	0,3		0,3	0,4	0,3
	(0,1 - 0,5)	(0,2 - 1,0)	(0,0 - 0,1)		(0,0 - 1,6)	(0,1 - 1,0)	(<0,1 - 0,7)		(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,5)
1996	0,3	0,5	<0,1	0,1	0,8	0,5	<0,1				
	(0,1 - 0,4)	(0,2 - 0,9)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,3)	(0,1 - 1,4)	(0,0 - 1,1)	(0,0 - 0,1)				
1998	0,4	0,8	0,1	0,3	0,9	0,8	0,3	0,1	0,5	0,4	0,4
	(0,3 - 0,5)	(0,6 - 0,9)	(0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,4)	(0,6 - 1,2)	(0,4 - 1,1)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,1)	(0,3 - 0,6)	(0,2 - 0,6)	(0,3 - 0,6)
2000	0,6	1,0	0,2	0,3	1,5	0,9	0,4	0,1	0,7	0,6	0,4
	(0,5 - 0,7)	(0,8 - 1,2)	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,5)	(1,1 - 1,9)	(0,6 - 1,2)	(0,2 - 0,6)	(0,0 - 0,2)	(0,5 - 0,9)	(0,4 - 0,8)	(0,2 - 0,5)
2002	0,6	1,1	0,2	0,2	1,7	1,1	0,5	<0,1	0,9	0,5	0,3
	(0,4 - 0,8)	(0,7 - 1,4)	(<0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,4)	(0,9 - 2,5)	(0,5 - 1,7)	(0,1 - 0,8)	(0,0 - 0,1)	(0,5 - 1,2)	(0,2 - 0,9)	(<0,1 - 0,7)
2004	0,5	0,9	0,1	0,3	1,0	0,8	0,4	0,1	0,6	0,5	0,3
	(0,3 - 0,7)	(0,6 - 1,2)	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,5)	(0,4 - 1,7)	(0,3 - 1,4)	(0,1 - 0,7)	(0,0 - 0,3)	(0,3 - 0,9)	(0,2 - 0,7)	(0,1 - 0,6)
2006	0,6	1,0	0,3	0,2	1,3	0,8	1,1	0,1	0,9	0,6	0,2
	(0,4 - 0,9)	(0,6 - 1,3)	(0,0 - 0,7)	(<0,1 - 0,3)	(0,7 - 1,8)	(0,3 - 1,3)	(0,1 - 2,1)	(<0,1 - 0,3)	(0,5 - 1,2)	(<0,1 - 1,2)	(0,0 - 0,5)
2008	1,0	1,8	0,3	0,5	2,0	1,0	1,1	0,8	1,3	0,9	0,9
	(0,5 - 1,5)	(0,8 - 2,7)	(0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,9)	(0,8 - 3,2)	(0,1 - 1,8)	(0,1 - 2,0)	(0,0 - 2,0)	(0,6 - 2,0)	(0,0 - 1,8)	(0,2 - 1,5)
2010	0,3	0,6	0,1	0,1	0,5	1,0	0,3	0,1	0,7	0,1	0,3
	(0,2 - 0,5)	(0,3 - 0,8)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,2)	(0,1 - 0,8)	(0,3 - 1,7)	(0,0 - 0,5)	(0,0 - 0,2)	(0,3 - 1,1)	(0,0 - 0,2)	(0,1 - 0,6)
2012	0,4	0,5	0,3	0,3	1,1	0,4	0,1	0,3	0,7	0,2	0,5
	(0,2 - 0,6)	(0,2 - 0,8)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,7)	(0,2 - 2,0)	(0,2 - 0,7)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,7)	(0,3 - 1,0)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,9)
2014	0,5	0,7	0,3	0,3	0,7	1,0	0,6	0,2	0,7	0,6	0,3
	(0,3 - 0,7)	(0,4 - 1,0)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,6)	(0,1 - 1,3)	(0,3 - 1,8)	(0,2 - 1,1)	(<0,1 - 0,4)	(0,2 - 1,2)	(0,2 - 0,9)	(0,1 - 0,5)
2016	0,4	0,7	0,1	0,1	0,5	1,1	0,4	0,1	0,8	0,4	0,2
	(0,2 - 0,5)	(0,4 - 1,0)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,2)	(0,1 - 0,9)	(0,4 - 1,7)	(<0,1 - 0,9)	(<0,1 - 0,3)	(0,4 - 1,3)	(0,1 - 0,6)	(0,1 - 0,3)
2018	0,4	0,6	0,2	0,1	0,7	0,4	0,9	0,1	0,8	0,4	0,1
	(0,2 - 0,5)	(0,3 - 0,9)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,2)	(0,1 - 1,2)	(0,2 - 0,6)	(0,2 - 1,6)	(0,0 - 0,2)	(0,3 - 1,3)	(0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,2)
2020	0,2*	0,3	0,1		0,2	0,2	0,5	0,1	0,3	0,1	0,1
	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,1)		(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,3)	(0,1 - 1,0)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,6)	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE PASTA BASE
Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2020.

PASTA BASE VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	2,2	3,5	0,9	1,8	3,5	4,2	1,1	0,2	2,7	1,5	1,7
	(1,8 - 2,6)	(2,8 - 4,2)	(0,6 - 1,2)	(0,9 - 2,7)	(2,4 - 4,5)	(3,0 - 5,5)	(0,5 - 1,7)	(<0,1 - 0,4)	(2,1 - 3,3)	(0,7 - 2,2)	(1,0 - 2,4)
1996	2,1	3,6	0,6	1,5	4,5	3,7	1,0	0,2			
	(1,6 - 2,5)	(2,7 - 4,5)	(0,4 - 0,9)	(0,7 - 2,3)	(2,8 - 6,2)	(2,3 - 5,0)	(0,4 - 1,5)	(0,0 - 0,3)			
1998	2,4	4,1	0,8	1,6	5,0	3,9	1,7	0,4	3,7	3,0	1,4
	(2,2 - 2,6)	(3,7 - 4,5)	(0,6 - 1,0)	(1,2 - 1,9)	(4,3 - 5,8)	(3,3 - 4,6)	(1,3 - 2,1)	(0,3 - 0,6)	(3,2 - 4,2)	(2,4 - 3,5)	(1,1 - 1,6)
2000	2,8	4,7	1,1	1,4	5,1	5,8	2,2	0,4	3,8	2,6	1,5
	(2,6 - 3,1)	(4,2 - 5,1)	(0,9 - 1,3)	(1,0 - 1,9)	(4,4 - 5,8)	(5,1 - 6,6)	(1,8 - 2,6)	(0,3 - 0,6)	(3,5 - 4,2)	(2,2 - 3,0)	(1,2 - 1,8)
2002	2,9	4,8	1,0	1,2	4,7	6,5	2,4	0,5	4,0	2,6	1,2
	(2,5 - 3,3)	(4,1 - 5,5)	(0,6 - 1,4)	(0,6 - 1,8)	(3,6 - 5,8)	(5,1 - 8,0)	(1,7 - 3,0)	(0,2 - 0,7)	(3,3 - 4,8)	(1,9 - 3,2)	(0,7 - 1,6)
2004	3,0	5,1	1,1	1,6	4,0	6,1	3,4	1,0	4,4	2,4	1,5
	(2,6 - 3,5)	(4,3 - 5,9)	(0,8 - 1,4)	(0,8 - 2,3)	(2,9 - 5,0)	(4,5 - 7,6)	(2,5 - 4,3)	(0,6 - 1,4)	(3,7 - 5,2)	(1,8 - 3,0)	(0,7 - 2,4)
2006	3,0	4,9	1,1	1,2	4,1	6,0	3,7	0,8	4,4	2,8	1,1
	(2,5 - 3,4)	(4,0 - 5,8)	(0,7 - 1,5)	(0,7 - 1,8)	(2,7 - 5,5)	(4,3 - 7,7)	(2,5 - 4,9)	(0,5 - 1,1)	(3,6 - 5,2)	(1,8 - 3,9)	(0,7 - 1,5)
2008	3,1	4,9	1,4	1,0	4,7	5,9	3,8	1,3	4,1	2,6	2,4
	(2,6 - 3,6)	(4,0 - 5,8)	(1,0 - 1,8)	(0,4 - 1,6)	(3,3 - 6,1)	(4,0 - 7,8)	(2,8 - 4,8)	(0,8 - 1,8)	(3,4 - 4,9)	(2,0 - 3,3)	(1,1 - 3,7)
2010	2,1	3,3	0,9	1,7	3,9	3,6	2,0	0,8	5,0	1,4	1,1
	(1,6 - 2,6)	(2,5 - 4,0)	(0,4 - 1,5)	(<0,1 - 3,4)	(2,2 - 5,6)	(2,3 - 4,9)	(1,3 - 2,8)	(0,4 - 1,2)	(3,1 - 7,0)	(1,0 - 1,8)	(0,7 - 1,5)
2012	1,9	3,2	0,6	0,3	2,2	3,8	2,8	1,1	3,3	1,8	1,2
	(1,6 - 2,2)	(2,5 - 3,8)	(0,4 - 0,8)	(0,1 - 0,6)	(1,2 - 3,1)	(2,7 - 5,0)	(2,0 - 3,6)	(0,8 - 1,5)	(2,5 - 4,0)	(1,2 - 2,4)	(0,8 - 1,6)
2014	2,5	4,1	0,8	0,6	2,3	4,9	3,2	1,8	5,5	2,2	1,1
	(2,1 - 2,8)	(3,4 - 4,8)	(0,6 - 1,1)	(<0,1 - 1,1)	(1,2 - 3,4)	(3,4 - 6,4)	(2,3 - 4,0)	(1,3 - 2,3)	(4,2 - 6,8)	(1,7 - 2,8)	(0,7 - 1,4)
2016	2,2	3,8	0,6	0,5	1,4	3,7	3,4	1,8	4,4	2,4	0,9
	(1,6 - 2,7)	(2,7 - 4,8)	(0,4 - 0,8)	(0,1 - 0,9)	(0,8 - 2,0)	(2,1 - 5,3)	(1,9 - 4,9)	(0,7 - 2,9)	(2,9 - 6,0)	(1,5 - 3,3)	(0,6 - 1,2)
2018	2,4	3,8	1,0	0,5	2,4	2,6	3,8	2,1	3,5	2,4	1,3
	(2,0 - 2,7)	(3,1 - 4,4)	(0,7 - 1,2)	(0,0 - 1,2)	(1,5 - 3,4)	(1,9 - 3,3)	(2,5 - 5,1)	(1,6 - 2,6)	(2,7 - 4,3)	(1,8 - 3,1)	(0,8 - 1,7)
2020	2,6	4,3	1,0	<0,1	2,1	2,5	5,0	2,8	3,6	2,6	1,9
	(2,1 - 3,2)	(3,3 - 5,2)	(0,6 - 1,4)	(0,0 - 0,1)	(1,0 - 3,3)	(1,6 - 3,3)	(3,1 - 6,9)	(2,0 - 3,5)	(2,3 - 4,8)	(2,0 - 3,2)	(0,9 - 2,9)

PASTA BASE AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	0,9	1,6	0,3	1,2	1,2	1,7	0,5		1,2	0,7	0,5
	(0,7 - 1,2)	(1,1 - 2,1)	(0,1 - 0,4)	(0,4 - 1,9)	(0,6 - 1,8)	(0,9 - 2,5)	(0,1 - 0,9)		(0,8 - 1,7)	(0,2 - 1,2)	(0,1 - 0,8)
1996	0,7	1,0	0,3	0,8	1,5	1,1	0,1	<0,1			
	(0,4 - 0,9)	(0,6 - 1,5)	(0,1 - 0,5)	(0,2 - 1,4)	(0,5 - 2,5)	(0,4 - 1,8)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - <0,1)			
1998	0,8	1,4	0,3	1,0	1,8	1,1	0,5	0,1	1,5	1,0	0,4
	(0,7 - 1,0)	(1,2 - 1,7)	(0,1 - 0,4)	(0,6 - 1,3)	(1,4 - 2,3)	(0,8 - 1,4)	(0,2 - 0,7)	(<0,1 - 0,2)	(1,2 - 1,8)	(0,7 - 1,3)	(0,3 - 0,5)
2000	0,7	1,2	0,2	0,7	1,4	1,3	0,4	0,1	1,1	0,6	0,2
	(0,6 - 0,8)	(1,0 - 1,5)	(0,1 - 0,3)	(0,4 - 1,1)	(1,1 - 1,7)	(0,9 - 1,7)	(0,2 - 0,6)	(<0,1 - 0,1)	(0,8 - 1,3)	(0,4 - 0,9)	(0,1 - 0,3)
2002	0,5	0,9	0,1	0,2	1,3	0,8	0,4	<0,1	0,8	0,5	0,1
	(0,3 - 0,7)	(0,6 - 1,2)	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,4)	(0,7 - 2,0)	(0,4 - 1,2)	(0,1 - 0,8)	(0,0 - 0,1)	(0,5 - 1,1)	(0,2 - 0,8)	(0,0 - 0,1)
2004	0,6	1,1	0,2	0,7	1,3	1,0	0,5	0,1	1,3	0,3	0,1
	(0,5 - 0,8)	(0,8 - 1,5)	(0,1 - 0,3)	(0,3 - 1,1)	(0,7 - 2,0)	(0,4 - 1,6)	(0,1 - 0,9)	(0,0 - 0,2)	(0,9 - 1,7)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,1)
2006	0,6	1,1	0,2	0,6	1,1	1,2	0,5	0,1	1,1	0,4	0,1
	(0,4 - 0,8)	(0,7 - 1,4)	(0,1 - 0,3)	(0,3 - 1,0)	(0,4 - 1,8)	(0,5 - 1,9)	(0,2 - 0,8)	(0,0 - 0,2)	(0,7 - 1,6)	(0,1 - 0,7)	(<0,1 - 0,2)
2008	0,7	1,1	0,4	0,4	1,9	0,8	0,8	0,1	1,4	0,2	0,5
	(0,5 - 0,9)	(0,7 - 1,4)	(0,1 - 0,6)	(0,1 - 0,7)	(1,0 - 2,9)	(0,4 - 1,3)	(0,2 - 1,5)	(<0,1 - 0,1)	(0,9 - 1,9)	(0,1 - 0,3)	(0,0 - 1,0)
2010	0,4	0,7	0,1	0,3	0,9	0,8	0,3	0,1	1,1	0,2	0,2
	(0,3 - 0,5)	(0,5 - 1,0)	(<0,1 - 0,1)	(<0,1 - 0,5)	(0,4 - 1,3)	(0,3 - 1,3)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,2)	(0,6 - 1,6)	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,3)
2012	0,4	0,8	0,1	0,2	0,5	1,0	0,4	0,2	0,9	0,5	<0,1
	(0,3 - 0,6)	(0,5 - 1,1)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,4)	(0,2 - 0,9)	(0,2 - 1,8)	(0,1 - 0,7)	(0,1 - 0,4)	(0,5 - 1,3)	(0,2 - 0,9)	(0,0 - 0,1)
2014	0,5	0,8	0,1	0,3	0,5	1,0	0,6	0,2	1,4	0,3	0,1
	(0,3 - 0,6)	(0,5 - 1,2)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,8)	(<0,1 - 1,0)	(0,4 - 1,5)	(0,3 - 1,0)	(0,1 - 0,4)	(0,8 - 2,0)	(0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,2)
2016	0,4	0,7	0,1	0,3	0,6	0,7	0,6	0,1	0,7	0,4	0,2
	(0,3 - 0,5)	(0,4 - 0,9)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,6)	(0,2 - 0,9)	(0,3 - 1,0)	(0,2 - 1,0)	(<0,1 - 0,2)	(0,4 - 1,0)	(0,2 - 0,6)	(0,1 - 0,4)
2018	0,4	0,7	0,2	<0,1	0,4	0,8	0,7	0,3	0,9	0,4	0,2
	(0,3 - 0,6)	(0,5 - 0,9)	(0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,1)	(<0,1 - 0,7)	(0,3 - 1,2)	(0,3 - 1,1)	(0,1 - 0,5)	(0,5 - 1,3)	(0,2 - 0,6)	(<0,1 - 0,3)
2020	0,3	0,5	0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,8	0,2	0,5	0,3	0,2
	(0,2 - 0,5)	(0,2 - 0,8)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,1 - 0,7)	(0,2 - 1,5)	(<0,1 - 0,4)	(0,1 - 0,8)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,5)

PASTA BASE MES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	0,3	0,6	0,1	0,2	0,4	0,8	0,2		0,6	0,2	
	(0,2 - 0,5)	(0,3 - 0,9)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,4)	(0,1 - 0,7)	(0,3 - 1,4)	(0,0 - 0,5)		(0,3 - 0,9)	(0,0 - 0,4)	
1996	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	<0,1				
	(0,1 - 0,4)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,9)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 0,1)				
1998	0,4	0,6	0,1	0,4	0,7	0,6	0,2	0,1	0,7	0,5	0,1
	(0,3 - 0,5)	(0,5 - 0,8)	(<0,1 - 0,2)	(0,2 - 0,6)	(0,4 - 1,1)	(0,3 - 0,8)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,1)	(0,5 - 1,0)	(0,3 - 0,7)	(0,1 - 0,2)
2000	0,3	0,5	0,1	0,3	0,6	0,6	0,2	<0,1	0,5	0,3	0,1
	(0,2 - 0,4)	(0,4 - 0,7)	(0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,6)	(0,4 - 0,9)	(0,3 - 0,9)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,1)	(0,4 - 0,7)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,2)
2002	0,2	0,4	0,1	0,1	0,6	0,3	0,1	<0,1	0,3	0,3	<0,1
	(0,1 - 0,3)	(0,2 - 0,5)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,2)	(0,2 - 1,1)	(0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,1 - 0,4)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,1)
2004	0,3	0,5	0,1	0,2	0,7	0,6	0,2	<0,1	0,7	0,1	<0,1
	(0,2 - 0,4)	(0,3 - 0,8)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,4)	(0,2 - 1,1)	(0,1 - 1,1)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - <0,1)	(0,3 - 1,0)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - <0,1)
2006	0,3	0,6	<0,1	0,2	0,2	0,9	0,3	0,1	0,7	0,1	0,1
	(0,2 - 0,5)	(0,3 - 0,9)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,4)	(0,2 - 1,5)	(<0,1 - 0,6)	(0,0 - 0,2)	(0,3 - 1,1)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,1)
2008	0,4	0,5	0,2	0,2	1,1	0,3	0,5	<0,1	0,6	0,1	0,5
	(0,2 - 0,6)	(0,2 - 0,8)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,5)	(0,3 - 1,9)	(<0,1 - 0,6)	(0,0 - 1,1)	(<0,1 - 0,1)	(0,3 - 1,0)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 1,0)
2010	0,1	0,3	<0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	<0,1	0,5	0,1	<0,1
	(0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,3)	(<0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,1)	(0,2 - 0,8)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,1)
2012	0,2	0,4	<0,1		0,3	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	<0,1
	(0,1 - 0,3)	(0,2 - 0,6)	(0,0 - <0,1)		(<0,1 - 0,5)	(0,1 - 0,9)	(<0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,3)	(0,2 - 0,8)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,1)
2014	0,3	0,6	0,1	0,3	0,2	0,7	0,4	0,2	1,0	0,2	<0,1
	(0,2 - 0,4)	(0,3 - 0,8)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,8)	(<0,1 - 0,3)	(0,2 - 1,2)	(0,1 - 0,7)	(0,1 - 0,3)	(0,5 - 1,6)	(0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,1)
2016	0,2	0,3	<0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,4	0,2	<0,1
	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,2)	(<0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,8)	(<0,1 - 0,1)	(0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,1)
2018	0,3	0,5	0,1		0,1	0,4	0,5	0,2	0,6	0,2	0,1
	(0,2 - 0,4)	(0,3 - 0,6)	(<0,1 - 0,1)		(0,0 - 0,2)	(0,1 - 0,7)	(0,2 - 0,8)	(0,1 - 0,4)	(0,3 - 0,9)	(0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,1)
2020	0,2	0,3	<0,1		<0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1
	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,1)		(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,5)	(<0,1 - 1,0)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,5)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,3)

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2020.

COCAÍNA TOTAL VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	3,5	5,9	1,4	2,4	6,6	6,3	1,9	0,6	3,7	3,2	3,5
	(3,0 - 4,1)	(4,9 - 6,9)	(1,0 - 1,8)	(1,3 - 3,5)	(4,9 - 8,3)	(4,8 - 7,8)	(1,1 - 2,6)	(0,3 - 1,0)	(3,0 - 4,4)	(2,1 - 4,3)	(2,6 - 4,5)
1996	4,1	6,9	1,4	2,1	7,8	7,6	1,9	1,2			
	(3,4 - 4,8)	(5,5 - 8,2)	(0,9 - 1,9)	(1,0 - 3,3)	(5,7 - 9,9)	(5,4 - 9,7)	(1,1 - 2,7)	(0,3 - 2,2)			
1998	5,5	8,9	2,2	2,5	11,1	8,9	4,4	1,5	6,3	5,8	4,8
	(5,1 - 5,8)	(8,3 - 9,5)	(1,9 - 2,5)	(2,0 - 3,1)	(9,9 - 12,2)	(7,9 - 9,8)	(3,8 - 5,0)	(1,2 - 1,9)	(5,7 - 6,9)	(5,1 - 6,5)	(4,3 - 5,3)
2000	6,1	9,7	2,6	2,4	10,7	11,2	5,6	1,8	6,9	5,7	5,2
	(5,7 - 6,4)	(9,1 - 10,3)	(2,3 - 2,9)	(1,9 - 3,0)	(9,6 - 11,8)	(10,2 - 12,2)	(4,9 - 6,2)	(1,5 - 2,1)	(6,4 - 7,4)	(5,1 - 6,2)	(4,6 - 5,9)
2002	6,6	11,0	2,4	1,9	11,7	13,6	5,4	2,3	7,5	6,3	5,4
	(6,0 - 7,2)	(9,9 - 12,0)	(1,9 - 3,0)	(1,2 - 2,7)	(9,8 - 13,6)	(11,7 - 15,4)	(4,2 - 6,6)	(1,6 - 3,0)	(6,6 - 8,5)	(5,2 - 7,4)	(4,3 - 6,6)
2004	7,1	11,2	3,1	2,2	10,1	14,0	7,7	3,0	8,3	6,2	6,2
	(6,4 - 7,7)	(10,0 - 12,4)	(2,5 - 3,7)	(1,3 - 3,0)	(8,2 - 12,0)	(11,8 - 16,1)	(6,2 - 9,2)	(2,2 - 3,8)	(7,2 - 9,3)	(5,2 - 7,2)	(4,7 - 7,6)
2006	7,4	11,3	3,6	1,9	10,5	14,1	8,5	3,9	8,0	7,8	6,1
	(6,5 - 8,4)	(9,8 - 12,9)	(2,6 - 4,6)	(1,2 - 2,5)	(7,1 - 13,9)	(11,6 - 16,7)	(6,6 - 10,4)	(2,6 - 5,2)	(7,0 - 9,1)	(6,1 - 9,4)	(3,8 - 8,3)
2008	7,7	12,3	3,2	3,3	10,2	14,4	8,7	4,0	9,0	7,4	6,3
	(6,8 - 8,6)	(10,7 - 14,0)	(2,6 - 3,8)	(1,5 - 5,0)	(8,1 - 12,3)	(11,6 - 17,1)	(6,9 - 10,5)	(2,3 - 5,6)	(7,6 - 10,4)	(5,8 - 8,9)	(4,5 - 8,2)
2010	4,7	7,0	2,4	2,1	7,3	8,4	5,2	2,6	7,3	3,7	4,2
	(4,0 - 5,4)	(5,8 - 8,2)	(1,6 - 3,1)	(0,4 - 3,8)	(5,2 - 9,4)	(6,6 - 10,2)	(4,0 - 6,5)	(1,6 - 3,6)	(5,3 - 9,4)	(2,7 - 4,6)	(3,4 - 5,1)
2012	5,2	8,2	2,4	0,7	6,2	10,1	6,6	4,2	6,5	5,1	4,7
	(4,6 - 5,9)	(7,0 - 9,4)	(1,8 - 2,9)	(0,3 - 1,1)	(4,5 - 7,9)	(8,3 - 11,9)	(5,2 - 8,0)	(2,9 - 5,4)	(5,4 - 7,5)	(3,8 - 6,3)	(3,7 - 5,8)
2014	6,5	10,6	2,5	2,4	7,0	11,2	8,4	4,9	9,9	6,2	5,0
	(5,7 - 7,3)	(9,1 - 12,1)	(2,1 - 3,0)	(0,8 - 4,0)	(5,1 - 8,8)	(8,7 - 13,7)	(6,6 - 10,2)	(3,6 - 6,2)	(8,3 - 11,4)	(5,0 - 7,4)	(3,7 - 6,3)
2016	6,6	10,0	3,2	1,3	6,1	11,8	9,9	4,8	9,9	6,2	5,4
	(5,8 - 7,4)	(8,6 - 11,4)	(2,5 - 4,0)	(0,7 - 2,0)	(4,4 - 7,8)	(9,4 - 14,2)	(7,7 - 12,1)	(3,5 - 6,2)	(8,0 - 11,8)	(5,0 - 7,4)	(4,2 - 6,6)
2018	6,2	9,8	2,6	1,3	7,7	8,9	8,9	4,6	7,6	6,4	4,6
	(5,5 - 6,8)	(8,6 - 10,9)	(2,1 - 3,2)	(0,3 - 2,3)	(5,9 - 9,6)	(7,0 - 10,7)	(6,9 - 10,9)	(3,6 - 5,5)	(6,3 - 9,0)	(5,4 - 7,5)	(3,5 - 5,7)
2020	7,3*	11,7*	3,0	0,2*	6,5	9,4	11,6	7,1*	8,6	7,7	5,7
	(6,5 - 8,2)	(10,2 - 13,2)	(2,3 - 3,6)	(<0,1 - 0,4)	(4,2 - 8,7)	(7,3 - 11,4)	(9,2 - 13,9)	(5,8 - 8,5)	(6,8 - 10,4)	(6,2 - 9,2)	(4,2 - 7,2)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

COCAÍNA TOTAL AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	1,6	2,7	0,5	1,7	2,6	2,8	0,9		1,9	1,2	1,3
	(1,2 - 1,9)	(2,0 - 3,4)	(0,3 - 0,8)	(0,8 - 2,7)	(1,5 - 3,8)	(1,7 - 3,9)	(0,3 - 1,4)		(1,3 - 2,5)	(0,4 - 1,9)	(0,7 - 1,8)
1996	1,2	1,9	0,6	1,4	2,8	2,1	0,2	<0,1			
	(0,9 - 1,6)	(1,3 - 2,6)	(0,2 - 0,9)	(0,4 - 2,4)	(1,5 - 4,0)	(1,0 - 3,2)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,1)			
1998	1,9	3,2	0,7	1,7	4,5	2,7	1,2	0,2	2,5	2,1	1,5
	(1,7 - 2,1)	(2,9 - 3,6)	(0,5 - 0,8)	(1,2 - 2,1)	(3,7 - 5,2)	(2,2 - 3,2)	(0,8 - 1,6)	(0,1 - 0,4)	(2,1 - 2,9)	(1,7 - 2,5)	(1,2 - 1,8)
2000	1,9	3,2	0,7	1,5	4,3	3,2	1,2	0,2	2,3	1,9	1,4
	(1,7 - 2,1)	(2,9 - 3,6)	(0,5 - 0,8)	(1,1 - 1,9)	(3,6 - 5,0)	(2,6 - 3,8)	(0,9 - 1,5)	(0,1 - 0,3)	(1,9 - 2,6)	(1,5 - 2,2)	(1,1 - 1,8)
2002	1,8	3,0	0,6	1,0	4,6	3,3	1,0	0,1	2,2	1,9	0,9
	(1,5 - 2,1)	(2,5 - 3,6)	(0,3 - 0,8)	(0,5 - 1,5)	(3,4 - 5,8)	(2,4 - 4,3)	(0,5 - 1,5)	(0,0 - 0,2)	(1,7 - 2,7)	(1,3 - 2,4)	(0,5 - 1,4)
2004	1,7	2,9	0,7	1,2	4,1	2,8	1,1	0,4	2,4	1,4	1,1
	(1,4 - 2,0)	(2,3 - 3,4)	(0,4 - 0,9)	(0,7 - 1,8)	(3,0 - 5,3)	(1,8 - 3,7)	(0,6 - 1,6)	(0,1 - 0,7)	(1,8 - 2,9)	(0,9 - 1,9)	(0,6 - 1,6)
2006	1,6	2,5	0,7	1,1	3,1	2,7	1,8	0,3	2,3	1,5	0,8
	(1,3 - 2,0)	(2,0 - 3,1)	(0,3 - 1,2)	(0,6 - 1,5)	(2,1 - 4,2)	(1,7 - 3,6)	(0,7 - 2,9)	(0,1 - 0,5)	(1,7 - 2,8)	(0,8 - 2,2)	(0,4 - 1,1)
2008	2,2	3,7	0,8	1,2	4,7	2,9	2,1	0,9	3,2	1,7	1,5
	(1,6 - 2,8)	(2,5 - 4,8)	(0,4 - 1,1)	(0,6 - 1,8)	(3,1 - 6,3)	(1,3 - 4,4)	(1,0 - 3,1)	(0,0 - 2,2)	(2,3 - 4,0)	(0,6 - 2,9)	(0,8 - 2,3)
2010	0,9	1,7	0,2	0,6	1,9	1,9	0,9	0,2	1,8	0,5	0,9
	(0,7 - 1,1)	(1,3 - 2,1)	(0,1 - 0,3)	(0,2 - 1,1)	(1,2 - 2,7)	(1,0 - 2,7)	(0,3 - 1,4)	(<0,1 - 0,4)	(1,2 - 2,4)	(0,3 - 0,7)	(0,5 - 1,3)
2012	1,1	1,8	0,5	0,4	2,2	2,1	1,0	0,6	2,1	1,0	0,8
	(0,8 - 1,5)	(1,3 - 2,3)	(0,1 - 0,8)	(<0,1 - 0,8)	(1,2 - 3,3)	(1,1 - 3,1)	(0,4 - 1,6)	(0,1 - 1,0)	(1,5 - 2,6)	(0,6 - 1,4)	(0,1 - 1,4)
2014	1,7	2,7	0,6	1,6	2,1	3,3	1,8	0,7	2,9	1,5	1,2
	(1,2 - 2,1)	(1,9 - 3,5)	(0,4 - 0,9)	(0,1 - 3,2)	(1,1 - 3,1)	(1,4 - 5,2)	(1,0 - 2,5)	(0,5 - 1,0)	(2,0 - 3,8)	(0,8 - 2,1)	(0,5 - 1,9)
2016	1,3	2,1	0,5	0,6	2,2	2,6	1,8	0,4	2,4	1,2	0,9
	(1,0 - 1,6)	(1,6 - 2,5)	(0,2 - 0,8)	(0,2 - 1,0)	(1,2 - 3,2)	(1,7 - 3,4)	(0,9 - 2,7)	(0,2 - 0,6)	(1,6 - 3,1)	(0,8 - 1,6)	(0,5 - 1,3)
2018	1,3	2,3	0,4	0,1	2,3	2,3	1,8	0,7	2,1	1,2	0,8
	(1,1 - 1,6)	(1,8 - 2,8)	(0,2 - 0,7)	(0,0 - 0,3)	(1,4 - 3,1)	(1,4 - 3,1)	(1,0 - 2,6)	(0,4 - 1,0)	(1,5 - 2,8)	(0,8 - 1,6)	(0,4 - 1,2)
2020	0,7*	1,3*	0,2*	<0,1	0,9*	1,1*	1,4	0,4	1,0*	0,7*	0,5
	(0,5 - 1,0)	(0,8 - 1,8)	(0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,2 - 1,7)	(0,3 - 1,8)	(0,7 - 2,1)	(0,2 - 0,6)	(0,4 - 1,7)	(0,3 - 1,0)	(0,2 - 0,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

COCAÍNA TOTAL MES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	0,6	1,1	0,2	0,2	1,0	1,2	0,5		0,8	0,5	0,3
	(0,4 - 0,8)	(0,6 - 1,6)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,4)	(0,1 - 1,9)	(0,6 - 1,9)	(0,1 - 1,0)		(0,4 - 1,2)	(<0,1 - 0,9)	(0,0 - 0,5)
1996	0,4	0,6	0,2	0,4	0,8	0,8	0,1				
	(0,2 - 0,6)	(0,2 - 0,9)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,8)	(0,1 - 1,5)	(0,1 - 1,4)	(0,0 - 0,2)				
1998	0,8	1,3	0,2	0,6	1,5	1,2	0,5	0,1	1,1	0,8	0,5
	(0,6 - 0,9)	(1,1 - 1,6)	(0,1 - 0,3)	(0,4 - 0,9)	(1,0 - 1,9)	(0,8 - 1,6)	(0,3 - 0,8)	(<0,1 - 0,2)	(0,9 - 1,4)	(0,5 - 1,1)	(0,3 - 0,7)
2000	0,8	1,4	0,3	0,6	1,9	1,4	0,6	0,1	1,1	0,8	0,4
	(0,7 - 1,0)	(1,1 - 1,6)	(0,2 - 0,4)	(0,3 - 0,9)	(1,5 - 2,3)	(1,0 - 1,8)	(0,3 - 0,8)	(<0,1 - 0,2)	(0,9 - 1,3)	(0,6 - 1,1)	(0,3 - 0,6)
2002	0,8	1,4	0,3	0,3	2,2	1,4	0,6	0,1	1,1	0,7	0,4
	(0,6 - 1,0)	(1,0 - 1,7)	(0,1 - 0,5)	(0,1 - 0,5)	(1,3 - 3,1)	(0,8 - 2,0)	(0,2 - 0,9)	(0,0 - 0,2)	(0,8 - 1,5)	(0,4 - 1,1)	(<0,1 - 0,7)
2004	0,7	1,3	0,2	0,5	1,4	1,4	0,6	0,1	1,1	0,5	0,4
	(0,5 - 0,9)	(0,9 - 1,7)	(0,1 - 0,3)	(0,2 - 0,8)	(0,8 - 2,1)	(0,7 - 2,2)	(0,2 - 0,9)	(0,0 - 0,3)	(0,7 - 1,6)	(0,2 - 0,8)	(0,1 - 0,6)
2006	0,8	1,4	0,3	0,3	1,4	1,5	1,2	0,1	1,4	0,7	0,3
	(0,6 - 1,1)	(1,0 - 1,8)	(0,0 - 0,7)	(0,1 - 0,5)	(0,8 - 2,1)	(0,7 - 2,3)	(0,2 - 2,2)	(<0,1 - 0,3)	(0,9 - 1,8)	(0,1 - 1,3)	(<0,1 - 0,5)
2008	1,3	2,1	0,5	0,7	2,7	1,2	1,3	0,8	1,9	0,9	0,9
	(0,8 - 1,8)	(1,1 - 3,0)	(0,2 - 0,8)	(0,2 - 1,2)	(1,4 - 4,0)	(0,3 - 2,0)	(0,3 - 2,2)	(0,0 - 2,1)	(1,1 - 2,6)	(0,0 - 1,9)	(0,3 - 1,6)
2010	0,4	0,8	0,1	0,2	0,7	1,2	0,4	0,1	1,1	0,2	0,4
	(0,3 - 0,6)	(0,5 - 1,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,4)	(0,2 - 1,1)	(0,5 - 1,9)	(0,1 - 0,7)	(0,0 - 0,2)	(0,6 - 1,5)	(<0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,7)
2012	0,6	0,9	0,3	0,3	1,3	0,9	0,2	0,4	1,2	0,4	0,5
	(0,4 - 0,8)	(0,5 - 1,2)	(<0,1 - 0,7)	(0,0 - 0,7)	(0,4 - 2,2)	(0,4 - 1,3)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,9)	(0,7 - 1,6)	(0,2 - 0,6)	(0,0 - 1,0)
2014	0,7	1,2	0,3	0,5	0,8	1,6	0,9	0,4	1,6	0,7	0,4
	(0,5 - 1,0)	(0,8 - 1,6)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 1,1)	(0,2 - 1,5)	(0,7 - 2,4)	(0,4 - 1,4)	(0,2 - 0,6)	(0,9 - 2,4)	(0,3 - 1,0)	(0,1 - 0,6)
2016	0,5	0,9	0,1	0,1	0,6	1,2	0,8	0,2	1,1	0,5	0,2
	(0,3 - 0,7)	(0,6 - 1,3)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,3)	(0,1 - 1,0)	(0,6 - 1,8)	(0,2 - 1,3)	(0,1 - 0,3)	(0,6 - 1,6)	(0,2 - 0,8)	(0,1 - 0,4)
2018	0,6	1,0	0,2	0,1	0,7	0,7	1,2	0,4	1,3	0,5	0,2
	(0,4 - 0,8)	(0,7 - 1,3)	(<0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,2)	(0,2 - 1,3)	(0,4 - 1,0)	(0,4 - 1,9)	(0,2 - 0,6)	(0,8 - 1,8)	(0,2 - 0,8)	(0,1 - 0,3)
2020	0,3*	0,5*	0,1		0,2	0,3	0,9	0,2	0,5*	0,2	0,2
	(0,2 - 0,5)	(0,3 - 0,8)	(<0,1 - 0,2)		(<0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,7)	(0,3 - 1,6)	(<0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,9)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,4)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE OTRAS DROGAS
Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2000-2020.

HACHÍS VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2008	1,1	1,8	0,4	0,4	2,1	2,5	0,6	0,4	1,1	0,7	1,8
	(0,7 - 1,4)	(1,1 - 2,4)	(0,2 - 0,6)	(0,1 - 0,7)	(1,3 - 2,9)	(0,8 - 4,1)	(0,2 - 0,9)	(0,2 - 0,7)	(0,7 - 1,4)	(0,3 - 1,1)	(0,6 - 2,9)
2010	0,7	1,1	0,2	0,2	1,1	1,5	0,6	0,4	0,4	0,4	1,1
	(0,4 - 0,9)	(0,7 - 1,5)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,4)	(0,4 - 1,8)	(0,6 - 2,4)	(0,2 - 0,9)	(0,1 - 0,7)	(0,2 - 0,7)	(0,2 - 0,7)	(0,6 - 1,6)
2012	1,1	1,7	0,6	0,8	1,6	2,0	0,8	0,8	0,7	0,9	1,5
	(0,8 - 1,4)	(1,2 - 2,1)	(0,2 - 0,9)	(0,3 - 1,4)	(1,0 - 2,2)	(1,0 - 2,9)	(0,2 - 1,4)	(0,2 - 1,3)	(0,3 - 1,0)	(0,5 - 1,4)	(0,8 - 2,1)
2014	2,0	2,5	1,5	3,9	3,9	2,5	1,9	0,4	1,2	1,8	2,5
	(1,4 - 2,5)	(1,8 - 3,1)	(0,7 - 2,3)	(1,7 - 6,0)	(2,0 - 5,8)	(1,6 - 3,4)	(0,3 - 3,5)	(0,2 - 0,6)	(0,7 - 1,7)	(1,1 - 2,5)	(1,5 - 3,6)
2016	2,7	3,8	1,6	1,7	6,0	4,8	1,6	1,2	1,9	2,0	3,7
	(2,1 - 3,3)	(2,8 - 4,8)	(1,1 - 2,2)	(0,6 - 2,8)	(4,1 - 8,0)	(2,8 - 6,9)	(0,8 - 2,4)	(0,3 - 2,2)	(1,0 - 2,9)	(1,2 - 2,8)	(2,7 - 4,8)
2018	2,1	3,2	1,0	3,4	5,8	2,5	1,1	0,4	1,6	2,1	2,4
	(1,6 - 2,6)	(2,2 - 4,1)	(0,7 - 1,3)	(1,2 - 5,6)	(3,5 - 8,1)	(1,5 - 3,6)	(0,4 - 1,7)	(0,2 - 0,6)	(1,0 - 2,3)	(1,3 - 3,0)	(1,4 - 3,3)
2020	1,7	2,6	0,9	1,4	4,7	2,1	1,5	0,5	2,0	1,5	1,8
	(1,2 - 2,3)	(1,6 - 3,6)	(0,3 - 1,5)	(0,0 - 3,1)	(2,3 - 7,1)	(1,1 - 3,2)	(<0,1 - 3,0)	(0,0 - 1,2)	(0,8 - 3,2)	(0,9 - 2,2)	(0,5 - 3,1)

HACHÍS AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2008	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,8		0,1	0,2	0,1	0,7
	(<0,1 - 0,6)	(0,0 - 1,0)	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,4)	(0,2 - 0,9)	(0,0 - 2,2)		(0,0 - 0,3)	(0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 1,8)
2010	0,1	0,1	<0,1		0,1	0,3	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1
	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - <0,1)		(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,3)
2012	0,3	0,4	0,2	0,8	0,7	0,2		<0,1	0,4	0,2	0,4
	(0,2 - 0,4)	(0,2 - 0,7)	(<0,1 - 0,3)	(0,3 - 1,4)	(0,3 - 1,2)	(0,1 - 0,4)		(0,0 - 0,1)	(0,1 - 0,7)	(<0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,6)
2014	0,8	1,3	0,3	3,3	1,3	0,6	0,1	0,1	0,4	1,0	0,7
	(0,5 - 1,1)	(0,7 - 1,8)	(0,1 - 0,5)	(1,2 - 5,4)	(0,8 - 1,9)	(0,3 - 1,0)	(0,0 - 0,3)	(<0,1 - 0,1)	(0,1 - 0,8)	(0,4 - 1,7)	(0,4 - 1,1)
2016	1,2	1,6	0,8	1,3	4,4	1,4	0,5	0,1	0,7	0,8	1,8
	(0,8 - 1,6)	(1,0 - 2,2)	(0,4 - 1,3)	(0,3 - 2,3)	(2,6 - 6,2)	(0,2 - 2,7)	(<0,1 - 1,0)	(0,0 - 0,1)	(0,3 - 1,2)	(0,3 - 1,2)	(1,0 - 2,6)
2018	1,0	1,6	0,3	2,4	3,8	0,5	0,1	<0,1	0,5	1,1	1,2
	(0,6 - 1,4)	(0,8 - 2,4)	(0,2 - 0,5)	(0,3 - 4,4)	(1,8 - 5,8)	(0,2 - 0,8)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - <0,1)	(0,2 - 0,7)	(0,4 - 1,9)	(0,4 - 2,0)
2020	0,5	0,9	0,2	1,0	1,4*	1,0	0,1	<0,1	0,6	0,7	0,3*
	(0,3 - 0,8)	(0,4 - 1,4)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 2,5)	(0,8 - 2,0)	(0,3 - 1,8)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 1,3)	(0,3 - 1,1)	(0,1 - 0,5)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	8,5	8,0	9,0	3,4	9,2	8,8	10,6	9,6	8,6	8,0	8,9
	(7,9 - 9,2)	(7,1 - 9,0)	(8,0 - 9,9)	(2,4 - 4,5)	(7,3 - 11,1)	(7,4 - 10,1)	(9,0 - 12,1)	(8,2 - 11,0)	(7,6 - 9,5)	(6,9 - 9,2)	(7,5 - 10,4)
2004	7,0	6,3	7,7	3,4	6,5	8,7	7,9	7,8	6,6	6,9	7,8
	(6,4 - 7,6)	(5,5 - 7,1)	(6,9 - 8,6)	(2,3 - 4,4)	(5,0 - 7,9)	(7,3 - 10,2)	(6,6 - 9,3)	(6,6 - 9,0)	(5,7 - 7,5)	(6,0 - 7,8)	(6,5 - 9,1)
2006	8,0	7,1	8,8	3,3	12,1	9,1	7,0	8,4	5,9	8,0	10,9
	(6,9 - 9,0)	(5,6 - 8,6)	(7,4 - 10,2)	(1,9 - 4,8)	(8,0 - 16,2)	(6,8 - 11,3)	(5,3 - 8,7)	(6,6 - 10,1)	(5,1 - 6,8)	(6,5 - 9,5)	(7,9 - 13,8)
2008	6,6	6,4	6,9	2,5	6,8	7,8	6,9	8,0	6,1	5,8	8,6
	(5,6 - 7,7)	(4,9 - 7,8)	(5,4 - 8,3)	(1,4 - 3,6)	(5,1 - 8,4)	(4,8 - 10,8)	(5,2 - 8,6)	(5,6 - 10,5)	(4,9 - 7,4)	(4,1 - 7,6)	(6,1 - 11,2)
2010	2,5	1,6	3,4	0,5	2,4	2,5	2,8	3,3	2,6	2,3	2,6
	(2,0 - 3,0)	(1,2 - 2,0)	(2,6 - 4,2)	(0,1 - 1,0)	(1,5 - 3,3)	(1,7 - 3,3)	(1,5 - 4,2)	(2,4 - 4,3)	(1,8 - 3,5)	(1,6 - 3,1)	(2,0 - 3,3)
2012	3,1	2,8	3,4	0,8	3,3	4,6	3,3	3,4	3,1	2,8	3,4
	(2,6 - 3,6)	(2,1 - 3,4)	(2,7 - 4,1)	(0,3 - 1,2)	(2,1 - 4,5)	(3,1 - 6,1)	(2,3 - 4,3)	(2,5 - 4,3)	(2,3 - 3,8)	(2,1 - 3,5)	(2,5 - 4,2)
2014	3,9	3,4	4,3	1,3	4,5	4,1	3,3	4,7	4,0	4,4	3,4
	(3,2 - 4,6)	(2,7 - 4,2)	(3,2 - 5,5)	(0,6 - 1,9)	(3,0 - 6,0)	(2,9 - 5,2)	(2,4 - 4,2)	(3,1 - 6,2)	(3,1 - 4,9)	(2,8 - 6,0)	(2,6 - 4,1)
2016	4,2	4,2	4,3	1,6	3,8	4,9	4,7	4,9	3,8	4,4	4,2
	(3,6 - 4,9)	(3,1 - 5,2)	(3,6 - 5,0)	(0,7 - 2,6)	(2,6 - 5,0)	(3,3 - 6,6)	(2,9 - 6,4)	(3,6 - 6,1)	(2,7 - 5,0)	(3,3 - 5,6)	(3,3 - 5,1)
2018	3,7	3,7	3,8	2,1	5,2	4,2	4,4	3,2	3,4	3,5	4,1
	(3,2 - 4,3)	(3,0 - 4,4)	(3,1 - 4,6)	(1,1 - 3,0)	(3,6 - 6,9)	(3,0 - 5,4)	(2,9 - 5,9)	(2,5 - 3,9)	(2,5 - 4,3)	(2,9 - 4,2)	(3,0 - 5,2)
2020	5,3*	6,5*	4,1	2,8	10,1*	5,4	4,8	4,5	6,8*	4,7	4,8
	(4,4 - 6,2)	(5,0 - 8,0)	(3,2 - 5,0)	(0,9 - 4,6)	(6,9 - 13,3)	(3,9 - 6,9)	(2,9 - 6,6)	(3,3 - 5,7)	(4,7 - 8,9)	(3,4 - 6,0)	(3,4 - 6,2)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	3,3	2,7	3,8	1,8	3,4	4,1	3,3	3,6	3,3	2,8	3,8
	(2,9 - 3,7)	(2,2 - 3,3)	(3,2 - 4,4)	(1,0 - 2,6)	(2,3 - 4,4)	(3,1 - 5,1)	(2,4 - 4,1)	(2,7 - 4,4)	(2,7 - 3,9)	(2,2 - 3,5)	(2,9 - 4,8)
2004	3,0	2,4	3,7	1,8	3,3	3,2	3,2	3,4	2,7	3,2	3,4
	(2,7 - 3,4)	(1,9 - 2,8)	(3,1 - 4,3)	(1,1 - 2,5)	(2,2 - 4,4)	(2,3 - 4,1)	(2,5 - 4,0)	(2,7 - 4,2)	(2,2 - 3,3)	(2,5 - 3,8)	(2,5 - 4,2)
2006	3,5	2,9	4,0	2,1	6,6	2,7	3,1	3,3	2,7	3,1	5,2
	(2,7 - 4,2)	(1,7 - 4,1)	(3,1 - 5,0)	(1,0 - 3,3)	(3,2 - 10,0)	(1,8 - 3,6)	(1,6 - 4,6)	(2,1 - 4,5)	(2,1 - 3,3)	(2,1 - 4,0)	(2,8 - 7,6)
2008	3,2	3,1	3,4	1,1	3,6	5,1	2,4	3,7	2,6	3,3	4,0
	(2,4 - 4,1)	(1,9 - 4,3)	(2,3 - 4,5)	(0,6 - 1,7)	(2,3 - 4,8)	(2,1 - 8,0)	(1,3 - 3,4)	(1,9 - 5,5)	(1,6 - 3,7)	(1,6 - 4,9)	(2,7 - 5,4)
2010	1,3	0,6	1,9	0,4	1,0	1,2	1,7	1,6	1,2	1,3	1,4
	(0,9 - 1,6)	(0,3 - 0,9)	(1,3 - 2,5)	(0,0 - 0,7)	(0,4 - 1,7)	(0,6 - 1,8)	(0,5 - 3,0)	(1,1 - 2,2)	(0,6 - 1,7)	(0,7 - 1,9)	(0,9 - 1,8)
2012	1,4	1,2	1,6	0,5	1,7	1,9	1,2	1,6	1,3	1,1	1,8
	(1,1 - 1,8)	(0,8 - 1,7)	(1,1 - 2,1)	(0,1 - 0,9)	(1,0 - 2,5)	(1,0 - 2,9)	(0,6 - 1,8)	(0,9 - 2,4)	(0,9 - 1,8)	(0,6 - 1,5)	(1,1 - 2,4)
2014	1,2	0,9	1,4	0,2	1,3	1,0	1,3	1,4	1,5	0,8	1,3
	(0,9 - 1,4)	(0,6 - 1,3)	(1,0 - 1,7)	(<0,1 - 0,4)	(0,6 - 2,0)	(0,6 - 1,4)	(0,7 - 1,9)	(1,0 - 1,8)	(0,8 - 2,2)	(0,5 - 1,2)	(0,9 - 1,6)
2016	1,7	1,5	1,9	0,8	1,3	1,8	2,3	1,8	1,2	1,5	2,1
	(1,3 - 2,1)	(0,9 - 2,0)	(1,3 - 2,5)	(0,4 - 1,3)	(0,6 - 2,0)	(1,0 - 2,7)	(0,9 - 3,7)	(1,0 - 2,6)	(0,7 - 1,7)	(1,1 - 2,0)	(1,3 - 2,9)
2018	1,4	1,1	1,6	0,8	1,9	1,6	1,3	1,3	1,1	1,4	1,5
	(1,0 - 1,7)	(0,7 - 1,5)	(1,1 - 2,1)	(0,2 - 1,5)	(0,8 - 2,9)	(1,0 - 2,2)	(0,7 - 1,8)	(0,7 - 1,9)	(0,6 - 1,6)	(1,0 - 1,9)	(0,8 - 2,3)
2020	2,0	2,2*	1,7	1,7	3,7	1,6	1,4	1,7	2,9*	1,6	1,6
	(1,3 - 2,6)	(1,3 - 3,1)	(0,9 - 2,4)	(0,0 - 3,4)	(1,2 - 6,2)	(0,6 - 2,7)	(0,7 - 2,2)	(0,9 - 2,5)	(1,3 - 4,5)	(1,0 - 2,2)	(0,5 - 2,7)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ANALGÉSICOS SIN RECETA MÉDICA VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	1,0	0,8	1,1	0,7	1,0	1,1	1,0	1,0	0,6	0,9	1,7
	(0,7 - 1,2)	(0,5 - 1,1)	(0,8 - 1,5)	(0,2 - 1,3)	(0,5 - 1,6)	(0,6 - 1,5)	(0,6 - 1,4)	(0,5 - 1,5)	(0,3 - 0,9)	(0,6 - 1,3)	(1,1 - 2,3)
2004	1,0	1,2	0,9	0,6	0,7	1,6	1,1	1,1	0,9	0,8	1,6
	(0,8 - 1,3)	(0,8 - 1,7)	(0,6 - 1,2)	(0,1 - 1,1)	(0,3 - 1,0)	(0,7 - 2,5)	(0,6 - 1,7)	(0,7 - 1,5)	(0,5 - 1,4)	(0,5 - 1,0)	(1,0 - 2,2)
2006	1,0	1,2	0,9	0,4	0,9	1,0	1,6	1,2	0,8	1,1	1,3
	(0,7 - 1,3)	(0,7 - 1,7)	(0,6 - 1,2)	(0,1 - 0,6)	(0,4 - 1,3)	(0,5 - 1,4)	(1,0 - 2,3)	(0,3 - 2,0)	(0,4 - 1,1)	(0,7 - 1,4)	(0,5 - 2,2)
2008	1,1	0,9	1,3	0,5	0,7	2,7	0,8	0,8	0,7	1,3	1,3
	(0,6 - 1,5)	(0,6 - 1,2)	(0,4 - 2,1)	(0,0 - 1,1)	(0,1 - 1,2)	(0,4 - 5,1)	(0,4 - 1,2)	(0,6 - 1,1)	(0,4 - 1,0)	(0,2 - 2,4)	(0,8 - 1,9)
2010	0,6	0,4	0,7	0,1	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,4	0,7
	(0,4 - 0,7)	(0,2 - 0,6)	(0,4 - 1,0)	(0,0 - 0,2)	(0,1 - 1,2)	(0,1 - 0,7)	(0,2 - 1,0)	(0,5 - 1,2)	(0,2 - 0,9)	(0,2 - 0,6)	(0,4 - 1,1)
2012	0,6	0,5	0,7	0,2	0,4	1,3	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6
	(0,4 - 0,8)	(0,3 - 0,7)	(0,4 - 1,0)	(0,0 - 0,4)	(0,2 - 0,6)	(0,6 - 2,1)	(0,3 - 0,9)	(0,3 - 0,9)	(0,4 - 0,9)	(0,2 - 0,9)	(0,3 - 0,9)
2014	1,0	0,9	1,1	0,4	1,4	1,2	1,0	1,0	1,1	0,9	1,2
	(0,8 - 1,3)	(0,6 - 1,3)	(0,8 - 1,4)	(0,0 - 0,8)	(0,6 - 2,3)	(0,7 - 1,6)	(0,6 - 1,5)	(0,7 - 1,4)	(0,4 - 1,7)	(0,6 - 1,1)	(0,8 - 1,6)
2016	2,3	1,8	2,7	1,2	1,5	2,8	3,0	2,4	2,2	2,2	2,3
	(1,9 - 2,6)	(1,3 - 2,3)	(2,1 - 3,3)	(0,4 - 2,0)	(0,8 - 2,1)	(1,8 - 3,8)	(1,8 - 4,2)	(1,7 - 3,0)	(1,6 - 2,9)	(1,6 - 2,7)	(1,7 - 3,0)
2018	2,5	2,7	2,2	1,9	4,1	2,5	2,5	2,0	2,6	2,2	2,5
	(1,9 - 3,0)	(1,8 - 3,7)	(1,6 - 2,7)	(0,9 - 2,9)	(1,4 - 6,8)	(1,5 - 3,4)	(1,3 - 3,6)	(1,4 - 2,5)	(1,8 - 3,5)	(1,5 - 2,9)	(1,3 - 3,7)
2020	3,4*	3,7	3,0	0,9	5,1	3,7	3,0	3,5*	4,1	2,9	3,3
	(2,7 - 4,0)	(2,8 - 4,7)	(2,2 - 3,8)	(0,3 - 1,5)	(2,1 - 8,1)	(2,4 - 5,1)	(2,0 - 4,0)	(2,4 - 4,6)	(2,8 - 5,4)	(2,1 - 3,7)	(2,0 - 4,7)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ANALGÉSICOS SIN RECETA MÉDICA AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	0,4	0,3	0,5	0,7	0,1	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3	0,8
	(0,3 - 0,6)	(0,1 - 0,5)	(0,3 - 0,8)	(0,1 - 1,3)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,6)	(0,3 - 1,0)	(<0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,5)	(0,2 - 0,5)	(0,3 - 1,2)
2004	0,4	0,4	0,4	0,3	0,1	0,4	0,6	0,4	0,3	0,2	0,9
	(0,2 - 0,6)	(0,2 - 0,6)	(0,1 - 0,6)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 0,3)	(<0,1 - 0,8)	(0,1 - 1,0)	(0,1 - 0,8)	(<0,1 - 0,5)	(0,1 - 0,3)	(0,4 - 1,4)
2006	0,3	0,4	0,2	0,2	0,6	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2
	(0,2 - 0,4)	(0,2 - 0,5)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,4)	(0,1 - 1,0)	(<0,1 - 0,5)	(0,2 - 0,6)	(<0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,4)	(0,2 - 0,7)	(<0,1 - 0,4)
2008	0,6	0,4	0,8	0,4	0,4	1,7	0,4	0,3	0,2	0,8	0,7
	(0,2 - 1,0)	(0,1 - 0,6)	(0,0 - 1,7)	(0,0 - 1,0)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 4,0)	(0,1 - 0,7)	(0,1 - 0,4)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 1,9)	(0,2 - 1,2)
2010	0,3	0,1	0,4	<0,1	0,5	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,5
	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,1)	(0,2 - 0,7)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 1,0)	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,4)	(0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,2)	(0,2 - 0,8)
2012	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,7	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2
	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,4)	(0,2 - 0,4)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(0,1 - 1,4)	(0,1 - 0,5)	(0,1 - 0,4)	(0,2 - 0,6)	(<0,1 - 0,6)	(0,1 - 0,3)
2014	0,6	0,5	0,6	0,3	1,1	0,6	0,5	0,4	0,8	0,4	0,6
	(0,4 - 0,7)	(0,2 - 0,7)	(0,4 - 0,9)	(0,0 - 0,8)	(0,3 - 1,9)	(0,3 - 1,0)	(0,2 - 0,8)	(0,2 - 0,7)	(0,2 - 1,3)	(0,2 - 0,6)	(0,4 - 0,9)
2016	1,2	0,9	1,5	0,7	0,8	1,2	1,8	1,3	1,3	1,2	1,2
	(0,9 - 1,5)	(0,5 - 1,3)	(1,1 - 2,0)	(0,1 - 1,4)	(0,3 - 1,3)	(0,5 - 1,9)	(0,9 - 2,7)	(0,7 - 1,8)	(0,7 - 1,8)	(0,8 - 1,7)	(0,6 - 1,7)
2018	1,2	1,2	1,1	1,4	1,9	1,1	0,8	1,0	1,1	1,0	1,3
	(0,7 - 1,6)	(0,4 - 2,0)	(0,6 - 1,6)	(0,4 - 2,3)	(0,0 - 4,3)	(0,4 - 1,9)	(0,0 - 1,7)	(0,6 - 1,4)	(0,5 - 1,8)	(0,6 - 1,4)	(0,1 - 2,4)
2020	1,2	1,3	1,0	<0,1*	2,1	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	1,5
	(0,7 - 1,6)	(0,6 - 2,1)	(0,6 - 1,4)	(0,0 - 0,1)	(<0,1 - 4,2)	(0,4 - 2,3)	(0,4 - 1,8)	(0,5 - 1,5)	(0,4 - 1,6)	(0,6 - 1,4)	(0,3 - 2,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ESTIMULANTES SIN RECETA MÉDICA VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2000	2,9	4,4	1,4	0,9	4,1	4,9	3,7	1,1	3,4	2,6	2,3
	(2,6 - 3,1)	(4,0 - 4,9)	(1,2 - 1,6)	(0,6 - 1,2)	(3,4 - 4,7)	(4,2 - 5,5)	(3,2 - 4,3)	(0,8 - 1,3)	(3,0 - 3,8)	(2,2 - 3,0)	(1,9 - 2,8)
2002	3,1	5,0	1,4	1,1	4,2	6,2	3,7	1,0	3,3	3,1	2,9
	(2,7 - 3,6)	(4,2 - 5,7)	(1,0 - 1,8)	(0,5 - 1,6)	(3,0 - 5,4)	(4,9 - 7,5)	(2,7 - 4,7)	(0,5 - 1,5)	(2,6 - 3,9)	(2,4 - 3,9)	(2,1 - 3,7)
2004	2,8	4,2	1,4	1,5	2,9	4,8	3,4	1,7	2,7	2,8	3,1
	(2,4 - 3,2)	(3,5 - 4,9)	(1,0 - 1,8)	(0,8 - 2,3)	(1,9 - 3,8)	(3,7 - 6,0)	(2,3 - 4,5)	(1,1 - 2,3)	(2,1 - 3,2)	(2,1 - 3,5)	(2,1 - 4,0)
2006	2,6	3,7	1,4	1,0	2,6	3,5	3,8	1,9	2,2	3,1	2,4
	(2,1 - 3,0)	(3,0 - 4,5)	(0,9 - 2,0)	(0,5 - 1,5)	(1,6 - 3,6)	(2,2 - 4,9)	(2,3 - 5,2)	(1,3 - 2,6)	(1,7 - 2,7)	(2,0 - 4,2)	(1,7 - 3,1)
2008	2,3	3,4	1,3	1,0	2,3	3,8	2,1	2,3	2,7	2,0	2,3
	(1,7 - 2,9)	(2,3 - 4,5)	(0,5 - 2,0)	(0,2 - 1,8)	(1,5 - 3,1)	(1,8 - 5,9)	(1,4 - 2,7)	(0,6 - 3,9)	(1,6 - 3,7)	(1,0 - 3,0)	(1,0 - 3,6)
2010	1,6	1,8	1,4	0,7	2,1	1,9	1,9	1,5	1,7	1,5	1,7
	(1,2 - 2,0)	(1,3 - 2,2)	(0,9 - 1,9)	(0,2 - 1,2)	(1,0 - 3,2)	(1,2 - 2,6)	(1,2 - 2,6)	(0,9 - 2,0)	(1,1 - 2,4)	(0,8 - 2,1)	(1,2 - 2,2)
2012	1,8	2,4	1,3	0,4	2,6	2,7	2,0	1,7	1,0	2,0	2,1
	(1,3 - 2,3)	(1,5 - 3,2)	(0,8 - 1,7)	(0,1 - 0,8)	(1,3 - 3,8)	(1,5 - 3,8)	(1,1 - 2,8)	(0,6 - 2,8)	(0,7 - 1,4)	(0,9 - 3,0)	(1,3 - 2,9)
2014	1,8	2,2	1,4	0,8	2,4	2,5	2,4	1,3	1,8	1,3	2,3
	(1,4 - 2,2)	(1,8 - 2,7)	(0,7 - 2,0)	(0,1 - 1,5)	(1,4 - 3,3)	(1,8 - 3,3)	(0,8 - 3,9)	(0,9 - 1,7)	(1,1 - 2,5)	(0,9 - 1,7)	(1,4 - 3,1)
2016	2,0	2,5	1,5	0,3	2,6	2,8	2,2	1,8	2,4	1,4	2,3
	(1,5 - 2,5)	(1,6 - 3,3)	(1,0 - 2,0)	(<0,1 - 0,6)	(1,4 - 3,7)	(1,7 - 4,0)	(0,9 - 3,5)	(0,8 - 2,9)	(1,1 - 3,7)	(0,8 - 2,0)	(1,6 - 2,9)
2018	1,4	1,9	0,8	0,7	1,4	1,9	1,7	1,2	0,8	1,7	1,5
	(1,0 - 1,8)	(1,2 - 2,6)	(0,4 - 1,3)	(0,0 - 1,4)	(0,1 - 2,8)	(1,0 - 2,8)	(0,6 - 2,7)	(0,7 - 1,7)	(0,3 - 1,3)	(0,9 - 2,4)	(0,8 - 2,2)
2020	1,7	2,6	0,9	0,3	1,2	1,9	3,3	1,5	1,5	1,9	1,7
	(1,1 - 2,3)	(1,5 - 3,7)	(0,2 - 1,5)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 2,5)	(1,0 - 2,9)	(1,1 - 5,5)	(0,5 - 2,6)	(0,7 - 2,2)	(0,9 - 3,0)	(0,7 - 2,6)

ESTIMULANTES SIN RECETA MÉDICA AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2000	0,4	0,5	0,2	0,4	1,2	0,4	0,2	<0,1	0,5	0,4	0,2
	(0,3 - 0,5)	(0,4 - 0,7)	(0,1 - 0,3)	(0,2 - 0,6)	(0,8 - 1,6)	(0,2 - 0,6)	(0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,1)	(0,3 - 0,6)	(0,2 - 0,5)	(0,1 - 0,4)
2002	0,5	0,8	0,3	0,4	1,2	1,0	0,3	0,1	0,6	0,5	0,5
	(0,4 - 0,7)	(0,5 - 1,1)	(0,1 - 0,4)	(0,1 - 0,7)	(0,6 - 1,8)	(0,5 - 1,6)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,1)	(0,4 - 0,8)	(0,2 - 0,8)	(0,1 - 0,8)
2004	0,4	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,1	0,1	0,3	0,4	0,3
	(0,2 - 0,5)	(0,2 - 0,7)	(0,1 - 0,4)	(0,2 - 1,3)	(0,2 - 1,2)	(0,2 - 0,8)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,1 - 0,5)	(0,2 - 0,6)	(0,0 - 0,7)
2006	0,4	0,5	0,3	0,3	0,7	0,3	0,8	0,1	0,3	0,6	0,4
	(0,2 - 0,6)	(0,3 - 0,8)	(0,0 - 0,7)	(<0,1 - 0,5)	(0,2 - 1,2)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 1,7)	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 1,1)	(0,1 - 0,6)
2008	0,4	0,5	0,3	0,8	0,8	0,6	0,1	0,1	0,4	0,2	0,6
	(0,2 - 0,5)	(0,2 - 0,8)	(0,2 - 0,4)	(0,1 - 1,4)	(0,3 - 1,2)	(0,2 - 1,0)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,1 - 0,7)	(0,1 - 0,4)	(0,3 - 1,0)
2010	0,3	0,5	0,2	0,3	0,7	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,5
	(0,2 - 0,5)	(0,2 - 0,7)	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,6)	(0,2 - 1,3)	(<0,1 - 0,7)	(0,0 - 0,3)	(<0,1 - 0,5)	(0,1 - 0,6)	(0,1 - 0,4)	(0,2 - 0,8)
2012	0,3	0,2	0,4	0,2	0,9	0,8	0,1	<0,1	0,2	0,1	0,5
	(0,2 - 0,5)	(0,1 - 0,4)	(0,1 - 0,7)	(0,0 - 0,3)	(0,2 - 1,6)	(<0,1 - 1,5)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(<0,1 - 0,5)	(0,1 - 0,2)	(0,2 - 0,9)
2014	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,1	<0,1	0,2	0,1	0,3
	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,9)	(0,1 - 0,7)	(0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(<0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,5)
2016	0,4	0,4	0,4	0,1	0,7	0,9	0,6	0,1	0,6	0,2	0,5
	(0,2 - 0,7)	(<0,1 - 0,8)	(0,2 - 0,7)	(0,0 - 0,2)	(0,2 - 1,3)	(0,2 - 1,6)	(0,0 - 1,7)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 1,5)	(<0,1 - 0,3)	(0,2 - 0,9)
2018	0,3	0,3	0,2	0,5	0,2	0,5	0,5	<0,1	<0,1	0,3	0,5
	(0,1 - 0,5)	(0,1 - 0,6)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 1,2)	(<0,1 - 0,4)	(0,0 - 1,1)	(0,0 - 1,4)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,1)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - 1,1)
2020	0,2	0,1	0,2			0,1	0,7	0,1	<0,1	0,3	0,1
	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,7)			(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 2,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,9)	(0,0 - 0,3)

INHALABLES VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	2,3	3,6	1,1	1,7	3,9	3,2	2,9	0,5	3,2	1,8	1,5
	(2,0 - 2,7)	(2,9 - 4,2)	(0,8 - 1,4)	(1,0 - 2,4)	(2,8 - 5,1)	(2,3 - 4,2)	(2,0 - 3,8)	(0,2 - 0,8)	(2,5 - 3,8)	(1,2 - 2,3)	(0,9 - 2,0)
2004	2,2	3,4	1,0	1,8	2,8	2,7	3,4	0,7	3,4	1,2	1,3
	(1,8 - 2,5)	(2,8 - 4,1)	(0,7 - 1,3)	(1,1 - 2,4)	(1,9 - 3,7)	(1,8 - 3,6)	(2,3 - 4,5)	(0,3 - 1,1)	(2,7 - 4,1)	(0,8 - 1,6)	(0,6 - 2,0)
2006	1,4	2,0	0,7	1,8	1,3	2,5	1,4	0,4	1,6	1,0	1,5
	(1,1 - 1,7)	(1,5 - 2,6)	(0,4 - 1,1)	(0,9 - 2,7)	(0,7 - 1,9)	(1,4 - 3,6)	(0,7 - 2,2)	(0,2 - 0,5)	(1,1 - 2,1)	(0,5 - 1,6)	(0,8 - 2,1)
2008	1,9	2,9	0,9	1,9	2,3	3,3	2,1	0,6	2,3	1,7	1,5
	(1,4 - 2,3)	(2,1 - 3,7)	(0,6 - 1,2)	(0,9 - 2,8)	(1,2 - 3,4)	(1,5 - 5,0)	(1,3 - 3,0)	(0,3 - 0,8)	(1,7 - 2,9)	(1,1 - 2,3)	(0,4 - 2,7)
2010	0,7	1,0	0,4	0,6	1,5	1,1	0,3	0,4	1,4	0,4	0,6
	(0,5 - 0,9)	(0,6 - 1,4)	(0,2 - 0,7)	(0,1 - 1,0)	(0,6 - 2,4)	(0,5 - 1,8)	(0,1 - 0,5)	(0,1 - 0,8)	(0,7 - 2,1)	(0,2 - 0,6)	(0,2 - 1,0)
2012	0,8	1,1	0,5	0,8	1,1	1,3	0,6	0,4	1,1	0,8	0,6
	(0,6 - 1,0)	(0,7 - 1,5)	(0,3 - 0,6)	(0,3 - 1,3)	(0,4 - 1,7)	(0,6 - 2,1)	(0,2 - 0,9)	(0,2 - 0,7)	(0,7 - 1,5)	(0,4 - 1,2)	(0,3 - 0,8)
2014	1,0	1,3	0,7	1,5	1,9	1,1	1,0	0,4	1,4	0,7	1,0
	(0,7 - 1,3)	(0,9 - 1,6)	(0,1 - 1,2)	(0,8 - 2,2)	(0,2 - 3,7)	(0,6 - 1,7)	(0,4 - 1,6)	(0,2 - 0,6)	(0,9 - 2,0)	(0,4 - 1,0)	(0,3 - 1,7)
2016	1,3	1,9	0,7	1,4	1,0	2,0	1,8	0,8	1,9	1,2	1,1
	(1,0 - 1,6)	(1,4 - 2,4)	(0,4 - 1,0)	(0,5 - 2,2)	(0,4 - 1,6)	(1,0 - 2,9)	(0,7 - 2,8)	(0,3 - 1,3)	(0,9 - 2,8)	(0,6 - 1,8)	(0,6 - 1,5)
2018	1,5	1,9	1,1	1,1	3,6	1,4	0,8	1,1	1,9	1,4	1,2
	(0,8 - 2,2)	(1,3 - 2,5)	(0,1 - 2,0)	(0,4 - 1,8)	(0,0 - 7,8)	(0,8 - 2,0)	(0,4 - 1,2)	(0,5 - 1,8)	(1,1 - 2,6)	(0,6 - 2,2)	(0,0 - 2,5)
2020	1,7	2,6	0,7	0,8	3,1	1,7	2,9*	0,8	1,9	1,5	1,7
	(1,2 - 2,2)	(1,7 - 3,6)	(0,2 - 1,2)	(0,3 - 1,4)	(0,9 - 5,4)	(0,5 - 2,9)	(1,2 - 4,6)	(0,5 - 1,1)	(1,2 - 2,6)	(0,8 - 2,2)	(0,5 - 3,0)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

INHALABLES AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	0,3	0,3	0,2	0,6	0,3	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4
	(0,2 - 0,4)	(0,2 - 0,5)	(<0,1 - 0,3)	(0,2 - 1,0)	(0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,3)	(<0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,7)
2004	0,2	0,2	0,2	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	<0,1
	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,3)	(0,2 - 0,9)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,3)	(0,1 - 0,4)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,1)
2006	0,1	0,2	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	<0,1	0,2	0,1	0,1
	(0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,2)	(0,2 - 0,8)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,1)	(<0,1 - 0,2)
2008	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2
	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,7)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,2)	(<0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,5)
2010	0,2	0,2	0,1	0,4	0,6	0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,1	0,3
	(0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 1,2)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,6)
2012	0,1	0,2	0,1	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,3	0,1	<0,1
	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,1)	(0,1 - 0,9)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,1)
2014	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,7)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,1)	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,2)
2016	0,2	0,2	0,1	0,5	<0,1	0,1	0,4	<0,1	0,1	0,1	0,2
	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,5)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 1,1)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 1,1)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,5)
2018	0,2	0,3	0,1	0,8	0,4	0,1	0,1	<0,1	0,3	0,1	0,2
	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,2)	(0,2 - 1,4)	(0,0 - 0,9)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,6)	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,3)
2020	0,3	0,5	0,1	0,3	1,1	0,3	0,3	<0,1	0,3	<0,1	0,7
	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 1,2)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 3,1)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,6)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 1,7)

ÉXTASIS VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	0,2	0,3	<0,1	<0,1	0,2	0,5	0,2	<0,1	0,1	0,1	0,3
	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,6)	(0,1 - 1,0)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - <0,1)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,6)
2004	0,3	0,4	0,3	0,7	0,7	0,2	0,3		0,2	0,1	0,9
	(0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,8)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - 1,5)	(0,2 - 1,2)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,9)		(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,3)	(0,1 - 1,6)
2006	0,5	0,8	0,1	0,1	0,5	1,5	0,4	0,1	0,3	0,6	0,6
	(0,3 - 0,7)	(0,4 - 1,3)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,3)	(0,2 - 0,8)	(0,4 - 2,6)	(0,1 - 0,8)	(0,0 - 0,1)	(0,1 - 0,4)	(0,1 - 1,2)	(0,2 - 1,0)
2008	0,3	0,5	0,1	0,7	0,5	0,6	0,1	0,1	0,1	0,3	0,6
	(0,2 - 0,5)	(0,3 - 0,8)	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 1,4)	(0,1 - 0,8)	(0,2 - 1,0)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,3)	(<0,1 - 0,6)	(0,3 - 0,9)
2010	0,5	0,6	0,3	0,2	0,9	1,0	0,4	0,2	0,4	0,2	0,8
	(0,3 - 0,6)	(0,3 - 0,9)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,5)	(0,2 - 1,6)	(0,3 - 1,6)	(<0,1 - 0,7)	(0,0 - 0,4)	(0,1 - 0,7)	(<0,1 - 0,4)	(0,3 - 1,2)
2012	0,4	0,5	0,4	0,1	0,9	0,7	0,4	0,3	0,2	0,3	0,6
	(0,2 - 0,7)	(0,2 - 0,7)	(0,1 - 0,7)	(0,0 - 0,3)	(0,2 - 1,5)	(0,3 - 1,1)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,7)	(<0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,6)	(0,1 - 1,2)
2014	0,4	0,4	0,4	0,1	0,7	0,9	0,3	0,1	0,2	0,2	0,5
	(0,2 - 0,5)	(0,2 - 0,5)	(0,1 - 0,6)	(0,0 - 0,3)	(0,3 - 1,2)	(0,2 - 1,5)	(<0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,4)	(0,1 - 0,4)	(0,3 - 0,8)
2016	0,5	0,7	0,3	<0,1	0,4	1,5	0,7	0,2	0,3	0,5	0,6
	(0,2 - 0,8)	(0,3 - 1,2)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 0,1)	(0,1 - 0,7)	(0,3 - 2,7)	(0,1 - 1,2)	(0,0 - 0,4)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - 1,0)	(0,1 - 1,1)
2018	0,7	1,1	0,3	0,1	2,3	1,4	0,2	0,1	0,4	0,5	1,1
	(0,4 - 1,0)	(0,5 - 1,7)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,1)	(0,4 - 4,1)	(0,8 - 2,1)	(<0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,2)	(0,2 - 0,7)	(0,2 - 0,7)	(0,3 - 1,9)
2020	1,3*	1,8	0,8	0,3	3,8	2,0	1,8	<0,1*	1,2	1,2*	1,4
	(0,9 - 1,7)	(1,2 - 2,4)	(0,2 - 1,3)	(<0,1 - 0,5)	(2,1 - 5,5)	(1,0 - 3,0)	(0,0 - 3,6)	(0,0 - <0,1)	(0,4 - 2,0)	(0,7 - 1,7)	(0,5 - 2,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ÉXTASIS AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	0,1	0,2	<0,1		0,1	0,3	0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,2
	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,1)		(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - <0,1)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,5)
2004	0,1	0,2	0,1	0,4	0,3		<0,1			0,1	0,4
	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 1,1)	(0,0 - 0,7)		(0,0 - 0,1)			(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,9)
2006	0,1	0,2	<0,1		0,3	0,3	<0,1		0,1	0,1	0,2
	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,1)		(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,1)		(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,5)
2008	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,2
	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,4)
2010	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1
	(0,0 - <0,1)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)			(0,0 - <0,1)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - <0,1)
2012	<0,1	0,1	<0,1	0,1	0,1	0,2			0,1	0,1	<0,1
	(<0,1 - 0,1)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,2)	(<0,1 - 0,3)			(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(<0,1 - 0,1)
2014	0,1	0,1	0,1	<0,1	0,3	0,1		<0,1	0,1	0,1	0,1
	(<0,1 - 0,1)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,3)		(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,3)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,1)
2016	0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,2	<0,1	0,1	<0,1	0,1
	(<0,1 - 0,1)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)
2018	0,3	0,3	0,2	<0,1	0,6	0,8	<0,1		0,1	0,2	0,4
	(0,1 - 0,4)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,1)	(<0,1 - 1,2)	(0,3 - 1,4)	(0,0 - 0,1)		(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,4)	(0,1 - 0,6)
2020	0,3	0,5	0,1	0,2	1,0	0,6	<0,1	<0,1	0,2	0,3	0,3
	(0,1 - 0,4)	(0,2 - 0,8)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,4)	(0,3 - 1,8)	(0,1 - 1,1)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - <0,1)	(<0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,6)	(0,0 - 0,7)

ALUCINÓGENOS VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	0,9	1,8	0,1	0,3	1,8	1,8	0,8	0,3	0,7	1,2	1,1
	(0,7 - 1,2)	(1,4 - 2,3)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,6)	(0,9 - 2,6)	(1,1 - 2,6)	(0,4 - 1,2)	(<0,1 - 0,5)	(0,4 - 1,0)	(0,7 - 1,7)	(0,6 - 1,6)
2004	0,9	1,5	0,4	0,2	1,4	2,2	0,8	0,4	0,8	0,9	1,2
	(0,7 - 1,2)	(1,1 - 1,9)	(0,2 - 0,6)	(0,0 - 0,5)	(0,7 - 2,0)	(1,3 - 3,0)	(0,4 - 1,1)	(0,1 - 0,7)	(0,5 - 1,0)	(0,5 - 1,4)	(0,7 - 1,7)
2006	1,4	2,0	0,8	0,4	2,2	2,2	1,6	0,8	0,6	1,7	2,0
	(1,1 - 1,7)	(1,5 - 2,6)	(0,4 - 1,1)	(<0,1 - 0,8)	(1,2 - 3,2)	(1,1 - 3,4)	(1,0 - 2,2)	(0,4 - 1,1)	(0,4 - 0,9)	(1,0 - 2,4)	(1,4 - 2,7)
2008	1,0	1,6	0,4	0,4	1,5	1,4	0,8	1,0	0,7	0,7	1,9
	(0,7 - 1,3)	(1,0 - 2,3)	(0,2 - 0,6)	(0,1 - 0,7)	(0,8 - 2,2)	(0,9 - 2,0)	(0,4 - 1,2)	(<0,1 - 2,0)	(0,5 - 1,0)	(0,4 - 1,0)	(0,7 - 3,2)
2010	0,7	1,1	0,3	0,4	1,2	1,2	0,6	0,4	0,9	0,4	1,0
	(0,5 - 0,9)	(0,8 - 1,5)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,8)	(0,5 - 2,0)	(0,7 - 1,7)	(0,2 - 1,0)	(0,2 - 0,7)	(0,4 - 1,3)	(0,2 - 0,6)	(0,5 - 1,4)
2012	1,6	2,1	1,1	0,4	3,1	2,6	1,8	0,9	0,8	1,2	2,4
	(1,1 - 2,1)	(1,4 - 2,7)	(0,5 - 1,8)	(0,1 - 0,6)	(1,7 - 4,4)	(1,5 - 3,8)	(0,8 - 2,7)	(0,2 - 1,7)	(0,5 - 1,1)	(0,7 - 1,7)	(1,2 - 3,6)
2014	1,4	2,2	0,6	1,2	1,6	2,5	1,4	0,9	0,9	1,0	1,9
	(0,9 - 1,9)	(1,2 - 3,2)	(0,4 - 0,8)	(0,0 - 2,7)	(0,9 - 2,4)	(1,3 - 3,8)	(0,8 - 2,0)	(0,0 - 1,9)	(0,4 - 1,4)	(0,5 - 1,6)	(0,9 - 3,0)
2016	2,2	3,1	1,4	0,7	4,6	4,1	1,7	1,2	1,9	1,4	3,1
	(1,8 - 2,7)	(2,2 - 4,0)	(0,9 - 1,9)	(0,3 - 1,2)	(3,0 - 6,2)	(2,5 - 5,7)	(1,0 - 2,5)	(0,2 - 2,2)	(1,0 - 2,8)	(0,8 - 2,1)	(2,3 - 3,9)
2018	1,8	2,7	1,0	0,3	5,3	3,5	1,3	0,3	1,1	2,1	1,9
	(1,4 - 2,2)	(2,0 - 3,4)	(0,6 - 1,3)	(0,0 - 0,7)	(3,5 - 7,1)	(2,2 - 4,9)	(0,7 - 2,0)	(0,2 - 0,5)	(0,6 - 1,7)	(1,4 - 2,8)	(1,3 - 2,6)
2020	3,6*	5,6*	1,6	1,6	7,5	5,5	4,8*	1,2*	3,8*	3,7*	3,5*
	(3,0 - 4,3)	(4,5 - 6,8)	(1,0 - 2,2)	(0,0 - 3,2)	(5,0 - 10,0)	(3,9 - 7,1)	(2,3 - 7,3)	(0,6 - 1,8)	(2,5 - 5,0)	(2,6 - 4,7)	(2,2 - 4,7)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ALUCINÓGENOS AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	0,1	0,2		0,1	0,3	0,2	<0,1		0,1	0,2	0,1
	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,4)		(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,6)	(<0,1 - 0,4)	(0,0 - <0,1)		(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,2)
2004	0,1	0,1	<0,1	0,2	0,3	<0,1	<0,1		0,1	0,1	0,1
	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,4)	(<0,1 - 0,6)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)		(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,3)
2006	0,4	0,4	0,4	0,2	0,7	0,5	0,3	0,3	0,2	0,5	0,6
	(0,2 - 0,5)	(0,2 - 0,6)	(0,2 - 0,6)	(0,0 - 0,5)	(0,2 - 1,3)	(<0,1 - 1,0)	(<0,1 - 0,5)	(0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,3)	(0,2 - 0,7)	(0,2 - 1,0)
2008	0,2	0,3	0,1	0,2	0,6	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4
	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,3)	(0,2 - 1,0)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(<0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,8)
2010	0,2	0,2	0,1	0,3	0,5	0,2	<0,1		0,4	0,1	0,2
	(0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 1,0)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,1)		(<0,1 - 0,7)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,4)
2012	0,3	0,4	0,1	0,2	1,1	0,2		0,1	0,3	0,2	0,3
	(0,1 - 0,4)	(0,2 - 0,7)	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,4)	(0,3 - 1,8)	(<0,1 - 0,3)		(0,0 - 0,2)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,4)	(0,1 - 0,6)
2014	0,5	0,9	0,2	0,8	0,7	0,6	0,1	0,5	0,2	0,4	0,8
	(0,1 - 1,0)	(<0,1 - 1,8)	(0,1 - 0,3)	(0,0 - 2,3)	(0,3 - 1,2)	(0,2 - 1,0)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 1,5)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,9)	(0,0 - 1,8)
2016	0,6	0,8	0,3	0,5	2,2	0,8	0,1	<0,1	0,4	0,4	0,8
	(0,4 - 0,8)	(0,4 - 1,2)	(0,1 - 0,5)	(0,1 - 0,8)	(1,1 - 3,3)	(0,2 - 1,5)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - <0,1)	(0,1 - 0,8)	(0,2 - 0,6)	(0,4 - 1,2)
2018	0,5	0,7	0,3	0,2	1,4	1,4	0,1		0,3	0,7	0,4
	(0,3 - 0,7)	(0,3 - 1,1)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,5)	(0,7 - 2,1)	(0,3 - 2,5)	(0,0 - 0,3)		(<0,1 - 0,5)	(0,2 - 1,2)	(0,2 - 0,7)
2020	0,9*	1,5*	0,4	0,3	2,8	1,9	0,7	<0,1	1,0*	0,9	0,9
	(0,6 - 1,2)	(1,0 - 2,1)	(0,2 - 0,6)	(0,1 - 0,6)	(1,5 - 4,2)	(0,9 - 2,9)	(0,1 - 1,3)	(0,0 - 0,1)	(0,4 - 1,6)	(0,5 - 1,4)	(0,4 - 1,4)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

MARIHUANA SINTÉTICA (SPICE, K2) VIDA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2014	1,5	1,8	1,3	2,6	2,2	2,4	1,8	0,4	1,4	1,1	2,0
	(1,1 - 1,9)	(1,2 - 2,3)	(0,7 - 1,9)	(0,9 - 4,3)	(1,3 - 3,1)	(1,6 - 3,2)	(0,2 - 3,4)	(0,2 - 0,6)	(0,6 - 2,2)	(0,6 - 1,6)	(1,2 - 2,8)
2016	2,5	3,4	1,6	2,8	5,1	3,7	2,2	1,0	1,8	2,5	2,9
	(2,0 - 3,0)	(2,6 - 4,3)	(1,2 - 2,0)	(1,5 - 4,1)	(3,0 - 7,2)	(2,3 - 5,1)	(1,2 - 3,1)	(0,3 - 1,6)	(1,1 - 2,4)	(1,8 - 3,3)	(2,0 - 3,7)
2018	3,5	4,7	2,3	3,7	7,8	4,3	3,8	1,1	3,4	3,3	3,7
	(2,8 - 4,2)	(3,4 - 5,9)	(1,7 - 2,9)	(1,5 - 5,9)	(5,3 - 10,3)	(3,2 - 5,3)	(1,3 - 6,4)	(0,7 - 1,5)	(2,3 - 4,6)	(2,4 - 4,2)	(2,1 - 5,3)
2020	1,9*	2,2*	1,5*	1,6	3,9*	2,8	1,4	0,9	2,9	1,3*	1,7*
	(1,4 - 2,4)	(1,4 - 3,0)	(1,0 - 2,0)	(0,0 - 3,3)	(2,3 - 5,6)	(1,7 - 3,9)	(0,6 - 2,3)	(0,3 - 1,4)	(1,6 - 4,2)	(0,8 - 1,9)	(0,8 - 2,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

MARIHUANA SINTÉTICA (SPICE, K2) AÑO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2014	0,5	0,7	0,4	1,7	1,2	0,5	0,1	0,1	0,7	0,5	0,5
	(0,3 - 0,8)	(0,2 - 1,2)	(0,2 - 0,5)	(<0,1 - 3,3)	(0,4 - 1,9)	(0,2 - 0,8)	(<0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 1,4)	(0,1 - 0,9)	(0,2 - 0,8)
2016	1,0	1,4	0,6	1,8	3,2	0,9	0,5	0,1	0,5	1,1	1,2
	(0,7 - 1,4)	(0,8 - 2,1)	(0,3 - 1,0)	(0,6 - 3,0)	(1,2 - 5,3)	(0,2 - 1,7)	(<0,1 - 1,0)	(<0,1 - 0,2)	(0,2 - 0,8)	(0,5 - 1,6)	(0,6 - 1,8)
2018	1,1	1,7	0,5	1,2	3,9	1,5	0,4	<0,1	1,0	0,8	1,4
	(0,7 - 1,4)	(1,0 - 2,3)	(0,3 - 0,8)	(0,4 - 2,0)	(1,8 - 5,9)	(0,9 - 2,1)	(0,0 - 0,9)	(0,0 - 0,1)	(0,6 - 1,5)	(0,5 - 1,2)	(0,6 - 2,3)
2020	0,6*	0,8*	0,3	0,9	1,8	0,7	0,3	<0,1	1,1	0,5	0,2*
	(0,3 - 0,9)	(0,3 - 1,3)	(<0,1 - 0,7)	(0,0 - 2,5)	(0,5 - 3,1)	(<0,1 - 1,3)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 0,1)	(0,2 - 2)	(0,1 - 0,9)	(<0,1 - 0,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

MARIHUANA SINTÉTICA (SPICE, K2) MES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2014	0,3	0,4	0,1	0,8	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2
	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,7)	(0,1 - 0,2)	(0,0 - 1,9)	(0,0 - 1,2)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,2)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 0,5)
2016	0,7	0,9	0,5	1,7	2,3	0,4	0,4	<0,1	0,4	0,9	0,8
	(0,5 - 1,0)	(0,5 - 1,4)	(0,2 - 0,9)	(0,5 - 2,9)	(1,0 - 3,7)	(0,0 - 0,9)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,1)	(0,1 - 0,6)	(0,4 - 1,4)	(0,3 - 1,3)
2018	0,7	1,1	0,3	0,6	3,1	0,9	<0,1	<0,1	0,7	0,4	1,1
	(0,4 - 1,0)	(0,5 - 1,7)	(0,1 - 0,5)	(0,1 - 1,1)	(1,1 - 5,1)	(0,4 - 1,4)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,3 - 1,1)	(0,2 - 0,7)	(0,3 - 1,9)
2020	0,4	0,5	0,2	0,8	1,1	0,4	<0,1	<0,1	0,7	0,3	0,1*
	(0,1 - 0,6)	(<0,1 - 1,0)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 2,4)	(0,2 - 2,0)	(0,0 - 0,9)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 1,5)	(<0,1 - 0,6)	(0,0 - 0,2)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

INCIDENCIA DE CONSUMO DE DROGAS EN EL ÚLTIMO AÑO

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2020.

TABACO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	17,5	19,1	16,2	18,6	23,2	18,9	21,6	8,9	16,5	20,9	16,3
	(15,8 - 19,1)	(16,7 - 21,4)	(13,8 - 18,5)	(14,6 - 22,5)	(18,9 - 27,4)	(15,0 - 22,9)	(16,9 - 26,4)	(7,0 - 10,8)	(14,3 - 18,8)	(16,9 - 24,8)	(13,4 - 19,3)
1996	4,7	5,8	3,8	12,4	6,2	2,3	2,5	1,1			
	(3,9 - 5,4)	(4,6 - 7,0)	(2,8 - 4,7)	(9,7 - 15,1)	(3,5 - 8,8)	(1,4 - 3,2)	(1,3 - 3,6)	(0,5 - 1,7)			
1998	4,5	4,8	4,3	15,5	4,7	0,9	0,4	0,2	5,4	5,0	3,8
	(4,1 - 5,0)	(4,1 - 5,6)	(3,8 - 4,8)	(13,9 - 17,1)	(3,5 - 5,9)	(0,6 - 1,3)	(0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,3)	(4,5 - 6,2)	(3,9 - 6,2)	(3,3 - 4,3)
2000	6,6	7,2	6,1	12,3	8,3	5,3	5,3	3,0	6,9	6,3	6,5
	(6,2 - 7,0)	(6,5 - 7,9)	(5,5 - 6,7)	(11,0 - 13,6)	(6,8 - 9,8)	(4,4 - 6,2)	(4,5 - 6,1)	(2,5 - 3,6)	(6,2 - 7,6)	(5,5 - 7,1)	(5,6 - 7,4)
2002	8,3	9,5	7,2	11,6	10,3	7,4	8,6	5,0	9,4	8,1	6,4
	(7,3 - 9,2)	(8,0 - 11,0)	(6,0 - 8,4)	(9,3 - 14,0)	(6,9 - 13,8)	(5,6 - 9,2)	(6,0 - 11,1)	(3,7 - 6,2)	(8,0 - 10,9)	(6,3 - 10,0)	(4,5 - 8,3)
2004	3,8	3,6	4,0	13,1	2,8	0,7	0,8	0,2	4,3	4,2	2,5
	(3,2 - 4,4)	(2,9 - 4,4)	(3,0 - 4,9)	(10,8 - 15,4)	(1,2 - 4,4)	(0,2 - 1,1)	(0,2 - 1,5)	(0,1 - 0,3)	(3,2 - 5,4)	(3,1 - 5,3)	(1,5 - 3,4)
2006	8,0	8,7	7,3	10,8	11,8	8,2	8,3	3,8	8,2	7,6	7,6
	(7,0 - 9,0)	(7,3 - 10,2)	(5,9 - 8,6)	(8,6 - 13,0)	(7,8 - 15,8)	(6,0 - 10,4)	(5,8 - 10,8)	(2,9 - 4,6)	(7,1 - 9,4)	(5,8 - 9,3)	(5,4 - 9,9)
2008	11,4	12,8	10,1	12,9	12,9	17,2	10,6	7,1	10,5	12,9	10,1
	(9,9 - 12,8)	(10,6 - 15,1)	(8,3 - 11,9)	(9,5 - 16,3)	(9,7 - 16,0)	(11,9 - 22,5)	(7,7 - 13,5)	(5,5 - 8,8)	(8,4 - 12,6)	(10,1 - 15,7)	(8,1 - 12,1)
2010	9,9	11,2	8,6	6,8	13,3	13,0	9,6	9,4	12,0	8,8	10,0
	(8,9 - 10,9)	(9,7 - 12,8)	(7,4 - 9,9)	(5,0 - 8,6)	(10,2 - 16,4)	(10,5 - 15,5)	(7,5 - 11,7)	(7,7 - 11,1)	(9,6 - 14,5)	(7,5 - 10,1)	(8,2 - 11,7)
2012	10,2	11,2	9,3	7,7	10,3	15,6	10,6	9,4	11,3	11,0	8,9
	(9,2 - 11,2)	(9,6 - 12,9)	(8,1 - 10,5)	(5,7 - 9,7)	(8,0 - 12,7)	(12,7 - 18,6)	(8,6 - 12,6)	(7,4 - 11,4)	(9,2 - 13,5)	(9,1 - 12,9)	(7,4 - 10,4)
2014	9,5	9,8	9,3	7,5	13,6	12,7	10,0	7,4	7,5	11,7	8,6
	(8,4 - 10,7)	(8,2 - 11,5)	(7,9 - 10,6)	(5,3 - 9,7)	(10,1 - 17,0)	(10,1 - 15,4)	(7,7 - 12,3)	(6,1 - 8,7)	(6,0 - 9,0)	(9,4 - 14,0)	(7,1 - 10,0)
2016	8,7	9,5	8,0	6,2	9,0	12,0	11,2	7,4	10,2	7,3	9,2
	(7,6 - 9,8)	(8,0 - 11,1)	(6,7 - 9,2)	(4,4 - 8,0)	(6,9 - 11,2)	(9,5 - 14,5)	(8,7 - 13,6)	(5,9 - 8,8)	(6,8 - 13,7)	(6,2 - 8,4)	(7,6 - 10,8)
2018	12,5	14,2	10,8	6,3	15,6	15,3	15,2	11,3	11,9	12,0	13,0
	(11,3 - 13,7)	(12,4 - 16,0)	(9,5 - 12,1)	(4,4 - 8,1)	(11,2 - 19,9)	(12,6 - 18,1)	(11,8 - 18,6)	(9,7 - 12,9)	(9,9 - 14,0)	(10,3 - 13,6)	(10,9 - 15,2)
2020	3,6*	4,1*	3,1*	1,6*	4,4*	3,8*	4,3*	3,7*	3,3*	2,8*	4,7*
	(2,9 - 4,2)	(3,1 - 5,1)	(2,4 - 3,7)	(0,0 - 3,3)	(2,8 - 6,0)	(2,6 - 5,0)	(2,8 - 5,9)	(2,8 - 4,6)	(1,8 - 4,8)	(2,0 - 3,7)	(3,5 - 5,8)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ALCOHOL

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	29,3	35,0	25,3	25,7	36,5	33,8	30,2	23,7	28,1	28,1	33,4
	(27,2 - 31,4)	(31,5 - 38,5)	(22,7 - 27,8)	(21,1 - 30,4)	(31,4 - 41,5)	(28,4 - 39,1)	(25,3 - 35,2)	(20,4 - 26,9)	(25,1 - 31,1)	(24,2 - 32,1)	(29,3 - 37,4)
1996	13,6	18,1	10,6	24,0	13,2	9,2	9,9	6,8			
	(12,0 - 15,2)	(15,2 - 21,0)	(8,8 - 12,5)	(20,1 - 27,9)	(9,1 - 17,3)	(6,3 - 12,2)	(6,6 - 13,2)	(4,7 - 8,9)			
1998	11,8	15,0	10,1	28,1	8,9	2,4	1,9	1,3	12,6	13,0	10,7
	(11,0 - 12,7)	(13,4 - 16,6)	(9,1 - 11,1)	(26,1 - 30,2)	(7,0 - 10,8)	(1,5 - 3,3)	(1,2 - 2,7)	(0,7 - 1,9)	(11,1 - 14,0)	(11,0 - 15,0)	(9,5 - 11,8)
2000	21,8	25,9	18,9	25,4	26,5	19,9	21,2	16,1	21,2	19,3	25,8
	(20,8 - 22,8)	(24,3 - 27,6)	(17,7 - 20,1)	(23,6 - 27,3)	(23,4 - 29,6)	(17,6 - 22,1)	(18,8 - 23,6)	(14,4 - 17,8)	(19,8 - 22,6)	(17,7 - 21,0)	(23,6 - 28,0)
2002	28,1	31,1	25,9	31,0	34,9	30,2	25,7	20,9	27,2	29,8	27,3
	(26,2 - 29,9)	(28,2 - 34,0)	(23,4 - 28,3)	(27,6 - 34,5)	(28,6 - 41,2)	(25,6 - 34,9)	(21,7 - 29,7)	(17,5 - 24,3)	(24,6 - 29,7)	(26,2 - 33,5)	(23,3 - 31,4)
2004	15,0	16,7	13,9	32,3	10,8	2,8	1,4	1,4	16,9	14,2	12,0
	(13,4 - 16,7)	(14,5 - 19,0)	(11,7 - 16,2)	(29,0 - 35,7)	(6,4 - 15,1)	(1,3 - 4,3)	(0,3 - 2,5)	(0,3 - 2,5)	(14,4 - 19,4)	(11,7 - 16,8)	(8,6 - 15,5)
2006	24,3	27,9	21,7	22,7	30,1	29,3	27,8	18,2	22,1	25,5	26,1
	(22,2 - 26,5)	(24,7 - 31,0)	(18,8 - 24,6)	(18,8 - 26,6)	(23,4 - 36,9)	(23,2 - 35,4)	(21,8 - 33,7)	(15,4 - 21,0)	(19,6 - 24,5)	(21,5 - 29,4)	(20,6 - 31,6)
2008	25,4	33,2	19,5	22,7	28,9	36,5	23,9	21,6	22,1	29,0	24,2
	(23,2 - 27,5)	(29,5 - 37,0)	(17,0 - 22,0)	(18,3 - 27,1)	(23,4 - 34,5)	(29,6 - 43,5)	(19,3 - 28,4)	(18,1 - 25,0)	(18,8 - 25,3)	(25,0 - 32,9)	(20,6 - 27,9)
2010	18,9	24,4	14,3	11,8	29,1	22,0	19,4	18,9	20,8	17,3	19,6
	(17,3 - 20,4)	(21,6 - 27,1)	(12,7 - 16,0)	(9,6 - 14,1)	(24,2 - 33,9)	(17,8 - 26,2)	(16,2 - 22,7)	(16,0 - 21,8)	(16,7 - 24,9)	(15,3 - 19,4)	(17,0 - 22,3)
2012	19,0	23,9	15,0	16,9	19,8	29,2	19,2	16,3	19,9	16,8	20,7
	(17,4 - 20,7)	(21,0 - 26,8)	(13,3 - 16,7)	(13,0 - 20,8)	(16,2 - 23,5)	(24,4 - 34,0)	(16,1 - 22,3)	(14,0 - 18,5)	(16,6 - 23,1)	(14,6 - 19,0)	(17,8 - 23,6)
2014	21,7	26,1	18,1	15,6	29,2	29,8	24,9	18,1	14,4	22,7	24,4
	(19,8 - 23,7)	(23,1 - 29,1)	(16,0 - 20,3)	(12,7 - 18,5)	(23,4 - 35,1)	(24,6 - 34,9)	(19,7 - 30,0)	(15,3 - 20,9)	(11,8 - 17,1)	(19,9 - 25,5)	(21,1 - 27,8)
2016	21,9	26,5	18,0	14,7	31,5	28,4	25,5	19,2	20,5	17,4	27,0
	(19,8 - 24,1)	(23,6 - 29,5)	(15,3 - 20,6)	(11,8 - 17,7)	(26,6 - 36,5)	(23,9 - 32,9)	(21,0 - 30,0)	(16,1 - 22,2)	(16,4 - 24,5)	(15,2 - 19,6)	(22,8 - 31,2)
2018	28,3	35,2	22,3	18,3	35,8	37,0	36,2	23,0	23,8	26,5	33,5
	(26,3 - 30,2)	(32,3 - 38,2)	(20,2 - 24,4)	(14,8 - 21,7)	(31,0 - 40,7)	(32,8 - 41,1)	(30,7 - 41,7)	(20,4 - 25,6)	(20,9 - 26,8)	(23,8 - 29,1)	(29,6 - 37,4)
2020	9,9*	12,8*	7,6*	8,7*	10,3*	12,6*	13,5*	7,8*	7,7*	7,6*	14,8*
	(8,2 - 11,5)	(10,2 - 15,4)	(5,9 - 9,2)	(4,9 - 12,4)	(7,6 - 12,9)	(8,8 - 16,5)	(9,1 - 17,9)	(6,1 - 9,6)	(4,8 - 10,6)	(5,8 - 9,4)	(11,0 - 18,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

MARIHUANA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	1,9	2,8	1,1	3,4	4,3	1,9	0,5	0,1	1,5	1,7	2,9
	(1,4 - 2,4)	(2,0 - 3,6)	(0,6 - 1,6)	(2,0 - 4,9)	(2,5 - 6,1)	(1,0 - 2,8)	(<0,1 - 1,0)	(0,0 - 0,2)	(0,9 - 2,0)	(0,7 - 2,6)	(1,8 - 4,1)
1996	1,3	1,5	1,2	3,6	2,9	0,8	0,2	0,1			
	(0,9 - 1,8)	(0,9 - 2,2)	(0,6 - 1,7)	(2,1 - 5,2)	(1,2 - 4,6)	(<0,1 - 1,6)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,4)			
1998	1,4	1,7	1,1	4,8	2,7	0,4	0,2	0,1	1,7	1,5	1,1
	(1,2 - 1,6)	(1,4 - 2,0)	(0,9 - 1,3)	(4,0 - 5,5)	(1,9 - 3,5)	(0,2 - 0,6)	(0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,2)	(1,4 - 2,1)	(1,2 - 1,9)	(0,8 - 1,4)
2000	1,1	1,4	0,9	3,2	2,4	0,7	0,3	<0,1	1,1	0,9	1,5
	(1,0 - 1,3)	(1,2 - 1,7)	(0,7 - 1,1)	(2,6 - 3,8)	(1,8 - 3,0)	(0,5 - 1,0)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - <0,1)	(0,8 - 1,3)	(0,7 - 1,2)	(1,1 - 1,9)
2002	0,8	1,2	0,5	2,0	1,7	0,6	0,2	0,3	0,8	0,9	0,9
	(0,6 - 1,0)	(0,9 - 1,6)	(0,2 - 0,7)	(1,3 - 2,8)	(1,1 - 2,4)	(0,1 - 1,1)	(<0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,5)	(0,5 - 1,0)	(0,5 - 1,3)	(0,5 - 1,4)
2004	0,9	0,9	0,9	2,9	1,4	0,6	0,2	0,1	1,0	0,7	1,1
	(0,7 - 1,2)	(0,6 - 1,2)	(0,5 - 1,3)	(1,9 - 4,0)	(0,7 - 2,2)	(0,1 - 1,0)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,4)	(0,6 - 1,4)	(0,4 - 1,0)	(0,5 - 1,7)
2006	1,7	2,0	1,3	4,0	3,2	2,1	0,6	<0,1	1,5	1,0	2,6
	(1,1 - 2,2)	(1,3 - 2,8)	(0,6 - 2,0)	(2,5 - 5,6)	(1,2 - 5,1)	(0,4 - 3,8)	(0,1 - 1,1)	(0,0 - 0,1)	(1,0 - 2,0)	(0,3 - 1,6)	(1,1 - 4,2)
2008	1,3	1,8	0,8	4,4	2,3	0,7	0,3	0,2	1,5	0,6	2,1
	(0,9 - 1,7)	(1,1 - 2,6)	(0,5 - 1,1)	(2,3 - 6,5)	(1,3 - 3,2)	(0,2 - 1,2)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,4)	(0,6 - 2,4)	(0,4 - 0,9)	(1,2 - 3,0)
2010	0,8	1,3	0,4	1,6	2,1	1,1	0,3	0,1	1,0	0,6	1,0
	(0,6 - 1,1)	(0,8 - 1,7)	(0,2 - 0,6)	(0,7 - 2,4)	(1,3 - 3,0)	(0,3 - 1,9)	(0,1 - 0,6)	(0,0 - 0,1)	(0,4 - 1,6)	(0,4 - 0,8)	(0,5 - 1,4)
2012	1,6	2,1	1,2	3,3	2,7	2,2	0,7	0,4	1,9	1,8	1,3
	(1,3 - 1,9)	(1,5 - 2,6)	(0,8 - 1,5)	(2,1 - 4,5)	(1,8 - 3,6)	(1,1 - 3,2)	(0,3 - 1,2)	(0,1 - 0,8)	(1,1 - 2,7)	(1,2 - 2,4)	(0,8 - 1,7)
2014	2,8	3,6	2,1	5,5	7,5	2,2	1,7	1,1	1,7	3,1	3,2
	(2,3 - 3,4)	(2,6 - 4,6)	(1,7 - 2,6)	(4,0 - 7,1)	(5,1 - 9,8)	(1,4 - 3,0)	(0,7 - 2,7)	(0,3 - 1,9)	(1,1 - 2,2)	(2,2 - 4,0)	(2,2 - 4,2)
2016	3,4	3,6	3,2	5,1	11,2	4,6	1,2	0,7	2,9	2,7	4,2
	(2,7 - 4,1)	(2,7 - 4,5)	(2,2 - 4,1)	(3,6 - 6,5)	(8,1 - 14,3)	(2,9 - 6,3)	(0,6 - 1,7)	(0,4 - 1,1)	(2,0 - 3,9)	(1,4 - 3,9)	(3,3 - 5,2)
2018	3,8	5,6	2,2	4,1	11,0	5,8	2,6	1,1	3,1	3,9	4,1
	(3,1 - 4,5)	(4,3 - 6,9)	(1,7 - 2,7)	(2,8 - 5,4)	(7,6 - 14,3)	(4,0 - 7,7)	(1,5 - 3,7)	(0,6 - 1,6)	(2,3 - 3,9)	(2,9 - 5,0)	(2,8 - 5,5)
2020	1,1*	1,5*	0,7*	2,0	2,5*	1,0*	1,1*	0,3*	1,3*	0,9*	1,1*
	(0,7 - 1,4)	(0,9 - 2,1)	(0,4 - 0,9)	(0,2 - 3,8)	(1,4 - 3,5)	(0,5 - 1,4)	(0,5 - 1,7)	(0,1 - 0,5)	(0,4 - 2,2)	(0,6 - 1,2)	(0,6 - 1,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

COCAÍNA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	0,5	0,9	0,2	0,7	0,9	0,9	0,2		0,4	0,4	0,8
	(0,3 - 0,8)	(0,4 - 1,4)	(0,0 - 0,4)	(<0,1 - 1,4)	(0,0 - 1,8)	(0,2 - 1,6)	(0,0 - 0,4)		(<0,1 - 0,8)	(0,0 - 0,9)	(0,3 - 1,3)
1996	0,4	0,6	0,3	0,8	1,0	0,5	<0,1				
	(0,2 - 0,7)	(0,2 - 1,0)	(0,0 - 0,5)	(0,0 - 1,7)	(0,3 - 1,7)	(0,0 - 1,2)	(0,0 - 0,1)				
1998	0,5	0,9	0,2	0,5	1,5	0,5	0,3	0,1	0,6	0,6	0,5
	(0,4 - 0,6)	(0,7 - 1,0)	(0,1 - 0,3)	(0,3 - 0,7)	(1,1 - 1,9)	(0,3 - 0,7)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,1)	(0,4 - 0,8)	(0,4 - 0,8)	(0,3 - 0,6)
2000	0,4	0,5	0,2	0,6	0,9	0,3	0,1	0,1	0,4	0,4	0,3
	(0,3 - 0,4)	(0,4 - 0,6)	(0,1 - 0,3)	(0,4 - 0,9)	(0,6 - 1,2)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,1)	(0,3 - 0,6)	(0,2 - 0,5)	(0,1 - 0,4)
2002	0,3	0,4	0,1	0,1	1,0	0,3	0,1	<0,1	0,4	0,3	0,1
	(0,2 - 0,4)	(0,2 - 0,6)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,3)	(0,4 - 1,6)	(<0,1 - 0,6)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,1)	(0,2 - 0,6)	(0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,1)
2004	0,2	0,4	0,1	0,4	0,7	0,2		<0,1	0,3	0,2	0,2
	(0,1 - 0,3)	(0,2 - 0,5)	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,7)	(0,3 - 1,2)	(0,0 - 0,4)		(0,0 - 0,1)	(0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,4)
2006	0,3	0,4	0,3	0,2	0,6	0,2	0,7	0,1	0,4	0,5	0,1
	(0,1 - 0,6)	(0,2 - 0,5)	(0,0 - 0,7)	(<0,1 - 0,4)	(0,2 - 0,9)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 1,7)	(0,0 - 0,2)	(0,2 - 0,6)	(0,0 - 1,1)	(0,0 - 0,2)
2008	0,5	0,8	0,2	0,4	1,1	0,6	0,5		0,8	0,1	0,5
	(0,2 - 0,7)	(0,4 - 1,2)	(<0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,8)	(0,4 - 1,8)	(0,0 - 1,4)	(<0,1 - 1,0)		(0,3 - 1,4)	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,9)
2010	0,1	0,2	<0,1	0,1	0,3	0,2	0,2		0,2	0,1	0,2
	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,4)		(<0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,1)	(<0,1 - 0,3)
2012	0,1	0,3	0,1	<0,1	0,4	0,3	0,2	<0,1	0,5	0,1	<0,1
	(0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(<0,1 - 0,7)	(<0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,4)	(0,0 - <0,1)	(0,2 - 0,8)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,1)
2014	0,4	0,5	0,2	0,4	0,3	1,3	0,3	0,1	0,4	0,3	0,5
	(0,1 - 0,7)	(0,0 - 1,1)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 3,0)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,2)	(0,1 - 0,6)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 1,1)
2016	0,2	0,3	0,1	0,2	0,5	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,3)	(0,1 - 0,9)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,5)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,3)
2018	0,3	0,5	<0,1	0,1	0,6	0,5	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2
	(0,2 - 0,4)	(0,3 - 0,8)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,3)	(0,1 - 1,0)	(0,2 - 0,7)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,3)	(0,1 - 0,6)	(0,1 - 0,6)	(0,1 - 0,3)
2020	0,1*	0,2*	<0,1	<0,1	0,1*	0,1*	0,4	<0,1	0,2	<0,1*	0,1
	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,9)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,5)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PASTA BASE

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	0,5	0,8	0,2	0,6	0,8	0,7	0,4		0,7	0,2	0,3
	(0,3 - 0,7)	(0,5 - 1,1)	(0,1 - 0,3)	(0,2 - 1,1)	(0,3 - 1,4)	(0,2 - 1,2)	(0,1 - 0,7)		(0,4 - 1,0)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,5)
1996	0,3	0,4	0,3	0,7	0,7	0,4	<0,1				
	(0,1 - 0,5)	(0,1 - 0,7)	(<0,1 - 0,5)	(0,1 - 1,3)	(0,0 - 1,4)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - <0,1)				
1998	0,3	0,5	0,1	0,7	0,4	0,2	0,1	<0,1	0,5	0,2	0,2
	(0,2 - 0,3)	(0,3 - 0,6)	(<0,1 - 0,1)	(0,5 - 1,0)	(0,2 - 0,6)	(0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,3 - 0,6)	(0,1 - 0,4)	(0,1 - 0,3)
2000	0,2	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,1	<0,1	0,3	0,2	0,1
	(0,1 - 0,2)	(0,2 - 0,4)	(<0,1 - 0,2)	(0,2 - 0,6)	(0,1 - 0,4)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,2 - 0,4)	(0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,1)
2002	0,1	0,2	<0,1	0,1	0,5	0,2	<0,1		0,1	0,3	<0,1
	(0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(0,1 - 0,9)	(0,0 - 0,5)	(0,0 - <0,1)		(<0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - <0,1)
2004	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,1	<0,1
	(0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,2)	(<0,1 - 0,6)	(0,0 - 0,5)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - <0,1)
2006	0,2	0,3	0,1	0,4	0,2	0,5	0,1	<0,1	0,4	0,1	0,1
	(0,1 - 0,4)	(0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,7)	(<0,1 - 0,4)	(0,0 - 1,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - <0,1)	(0,1 - 0,7)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)
2008	0,2	0,3	0,2	0,3	0,6	0,2	0,2	<0,1	0,4	0,1	0,2
	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,6)	(0,1 - 1,1)	(0,0 - 0,5)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - <0,1)	(0,2 - 0,7)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,4)
2010	0,1	0,2	<0,1	0,2	0,1	0,1	0,1		0,2	<0,1	0,1
	(<0,1 - 0,1)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,4)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,3)		(<0,1 - 0,5)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,1)
2012	0,1	0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	<0,1	<0,1
	(<0,1 - 0,1)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,2)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,1)
2014	0,1	0,1	<0,1		0,1	0,3	0,1	<0,1	0,1	0,1	<0,1
	(<0,1 - 0,1)	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,1)		(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,1)
2016	0,1	0,2	<0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	<0,1	0,2	0,2	0,1
	(0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,5)	(0,0 - 0,3)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - <0,1)	(<0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,2)
2018	0,2	0,2	0,1		<0,1	0,3	0,3	0,1	0,4	0,2	<0,1
	(0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,2)		(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,6)	(<0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - <0,1)
2020	<0,1*	<0,1*	<0,1		<0,1	<0,1	0,2		<0,1	0,1	
	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,1)		(0,0 - <0,1)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 0,4)		(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERCEPCIÓN DE RIESGO

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2000-2020.
Proporción que declara riesgo grande

Pregunta: ¿Cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas?
Respuestas: Ningún riesgo, riesgo leve, riesgo moderado, riesgo grande, no sabe.

FUMA UNA O MÁS DE UNA CAJETILLA DE CIGARROS AL DÍA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2000	85,5	83,4	87,6	80,6	82,2	85,2	88,1	89,1	86,6	86,4	83,1
	(85,1 - 86,0)	(82,7 - 84,2)	(87,0 - 88,2)	(79,3 - 81,9)	(80,9 - 83,5)	(84,1 - 86,4)	(87,2 - 89,0)	(88,3 - 89,9)	(85,9 - 87,2)	(85,6 - 87,2)	(82,0 - 84,1)
2002	84,7	82,2	87,1	75,5	81,5	85,3	89,3	88,7	86,6	83,8	82,6
	(83,9 - 85,6)	(81,0 - 83,5)	(85,9 - 88,3)	(72,9 - 78,1)	(79,0 - 84,0)	(83,5 - 87,2)	(87,8 - 90,9)	(87,3 - 90,1)	(85,5 - 87,8)	(82,2 - 85,4)	(80,7 - 84,6)
2004	82,1	80,2	83,9	71,9	78,5	84,0	85,8	86,6	83,7	81,5	80,1
	(81,1 - 83,0)	(78,9 - 81,6)	(82,6 - 85,1)	(69,4 - 74,5)	(75,9 - 81,1)	(81,9 - 86,0)	(83,7 - 87,8)	(85,1 - 88,2)	(82,3 - 85,1)	(79,9 - 83,1)	(78,1 - 82,2)
2006	82,0	80,7	83,4	72,3	79,1	83,8	84,6	86,6	83,5	84,2	77,4
	(80,7 - 83,4)	(78,8 - 82,5)	(81,5 - 85,3)	(68,7 - 76,0)	(75,3 - 82,8)	(81,2 - 86,4)	(81,7 - 87,4)	(84,4 - 88,9)	(82,0 - 84,9)	(82,0 - 86,3)	(74,0 - 80,8)
2008	83,1	82,4	83,8	73,3	81,4	84,8	84,8	87,5	82,0	84,1	82,9
	(81,9 - 84,3)	(80,7 - 84,1)	(82,2 - 85,4)	(69,7 - 76,9)	(78,4 - 84,3)	(82,7 - 86,9)	(82,3 - 87,3)	(85,5 - 89,5)	(80,0 - 84,1)	(82,4 - 85,8)	(80,5 - 85,3)
2010	83,0	82,0	84,0	82,2	81,7	82,9	84,0	83,6	85,1	81,9	83,1
	(81,7 - 84,4)	(80,3 - 83,8)	(82,4 - 85,6)	(79,6 - 84,7)	(78,9 - 84,6)	(80,5 - 85,3)	(81,5 - 86,5)	(81,6 - 85,6)	(83,1 - 87,1)	(79,8 - 84,1)	(81,1 - 85,1)
2012	85,6	84,0	87,2	78,7	84,5	86,0	88,5	88,0	85,1	86,1	85,4
	(84,5 - 86,7)	(82,4 - 85,6)	(85,9 - 88,5)	(75,3 - 82,1)	(82,1 - 86,9)	(83,9 - 88,1)	(86,7 - 90,3)	(86,5 - 89,5)	(83,1 - 87,0)	(84,4 - 87,8)	(83,7 - 87,1)
2014	85,7	84,8	86,6	79,4	85,1	85,3	86,1	88,0	84,1	87,3	85,1
	(84,7 - 86,7)	(83,3 - 86,2)	(85,4 - 87,8)	(76,5 - 82,2)	(82,3 - 87,8)	(83,0 - 87,6)	(84,0 - 88,2)	(86,6 - 89,5)	(82,0 - 86,1)	(85,9 - 88,7)	(83,4 - 86,7)
2016	84,0	82,6	85,5	75,2	84,5	84,0	84,3	87,0	84,1	85,1	83,1
	(82,9 - 85,1)	(80,9 - 84,3)	(84,0 - 86,9)	(71,9 - 78,6)	(82,2 - 86,9)	(81,8 - 86,1)	(82,0 - 86,6)	(85,4 - 88,7)	(81,6 - 86,6)	(83,4 - 86,8)	(81,2 - 85,0)
2018	79,4	76,4	82,3	73,4	77,4	80,7	78,8	81,9	79,2	80,1	79,1
	(78,1 - 80,7)	(74,6 - 78,3)	(80,8 - 83,8)	(69,6 - 77,2)	(74,2 - 80,7)	(78,4 - 83,0)	(75,5 - 82,0)	(80,0 - 83,7)	(76,2 - 82,1)	(78,4 - 81,8)	(76,8 - 81,5)
2020	80,8	79,2	82,4	78,5	77,8	79,8	79,9	83,7	82,2	77,7	83,7*
	(78,5 - 83,0)	(76,4 - 82,0)	(80,1 - 84,6)	(74,7 - 82,4)	(74,1 - 81,5)	(75,5 - 84,1)	(76,4 - 83,4)	(81,5 - 85,9)	(79,5 - 84,9)	(73,3 - 82,1)	(81,3 - 86,0)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

TOMA CINCO O MÁS TRAGOS DIARIAMENTE

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2000	86,4	83,6	89,0	80,6	86,8	88,8	87,7	87,1	85,2	86,9	87,8
	(85,9 - 86,8)	(82,9 - 84,3)	(88,5 - 89,6)	(79,3 - 81,9)	(85,6 - 87,9)	(87,8 - 89,7)	(86,8 - 88,7)	(86,3 - 87,9)	(84,5 - 85,8)	(86,1 - 87,7)	(86,9 - 88,7)
2002	85,7	82,2	89,0	78,6	85,9	86,9	88,0	87,6	85,5	86,0	85,8
	(84,9 - 86,5)	(81,0 - 83,5)	(87,9 - 90,1)	(76,1 - 81,0)	(83,8 - 88,0)	(85,1 - 88,7)	(86,3 - 89,7)	(86,2 - 89,0)	(84,3 - 86,7)	(84,5 - 87,4)	(84,0 - 87,6)
2004	84,9	81,9	87,8	78,8	84,8	87,2	86,9	85,8	84,4	84,9	85,9
	(84,1 - 85,8)	(80,6 - 83,2)	(86,8 - 88,9)	(76,6 - 81,1)	(82,6 - 87,1)	(85,4 - 88,9)	(85,1 - 88,6)	(84,3 - 87,3)	(83,1 - 85,7)	(83,5 - 86,3)	(84,2 - 87,6)
2006	83,0	80,2	85,7	76,4	81,1	86,4	85,1	84,3	83,5	83,7	81,2
	(81,7 - 84,3)	(78,3 - 82,1)	(83,9 - 87,5)	(73,0 - 79,8)	(77,2 - 84,9)	(84,1 - 88,7)	(82,2 - 88,0)	(81,9 - 86,7)	(82,1 - 85,0)	(81,6 - 85,9)	(77,7 - 84,7)
2008	85,4	82,9	87,9	79,3	84,0	88,5	86,5	87,1	83,9	86,3	86,3
	(84,3 - 86,6)	(81,2 - 84,7)	(86,5 - 89,3)	(76,1 - 82,5)	(80,7 - 87,4)	(86,4 - 90,5)	(84,1 - 89,0)	(85,3 - 88,9)	(81,7 - 86,1)	(84,6 - 87,9)	(84,5 - 88,1)
2010	85,3	84,5	86,1	83,0	85,7	85,4	85,6	86,2	86,1	83,8	86,6
	(83,9 - 86,7)	(82,7 - 86,2)	(84,5 - 87,8)	(79,9 - 86,1)	(83,0 - 88,3)	(82,9 - 87,9)	(82,9 - 88,2)	(84,3 - 88,0)	(83,8 - 88,4)	(81,6 - 85,9)	(84,7 - 88,5)
2012	87,9	86,3	89,5	82,1	86,4	89,9	90,9	89,2	85,2	88,7	88,7
	(86,9 - 88,9)	(84,7 - 87,8)	(88,3 - 90,8)	(78,7 - 85,5)	(84,0 - 88,8)	(88,2 - 91,7)	(89,0 - 92,8)	(87,8 - 90,6)	(83,4 - 87,1)	(87,1 - 90,4)	(86,9 - 90,4)
2014	86,9	85,7	88,2	82,5	84,4	85,8	88,9	89,0	86,0	87,2	87,2
	(85,9 - 87,9)	(84,4 - 87,0)	(86,6 - 89,7)	(80,1 - 85,0)	(80,5 - 88,3)	(83,7 - 88,0)	(87,1 - 90,7)	(87,7 - 90,2)	(84,2 - 87,9)	(85,7 - 88,6)	(85,3 - 89,0)
2016	88,0	86,2	89,9	86,2	86,8	87,6	88,0	89,5	86,9	88,0	88,7
	(87,1 - 89,0)	(84,8 - 87,6)	(88,7 - 91,1)	(83,5 - 89,0)	(84,5 - 89,0)	(85,5 - 89,7)	(85,7 - 90,3)	(88,3 - 90,8)	(85,2 - 88,7)	(86,5 - 89,4)	(87,1 - 90,2)
2018	85,9	83,7	88,1	85,4	84,4	85,9	85,3	87,1	85,4	86,0	86,6
	(84,9 - 86,9)	(82,2 - 85,3)	(86,8 - 89,4)	(82,9 - 88,0)	(81,7 - 87,0)	(83,8 - 88,0)	(82,6 - 88,0)	(85,5 - 88,6)	(82,9 - 87,9)	(84,5 - 87,5)	(84,8 - 88,5)
2020	85,6	83,2	88,0	83,6	83,1	84,1	86,4	87,6	86,4	82,1	89,5*
	(83,5 - 87,7)	(80,7 - 85,6)	(85,8 - 90,2)	(78,8 - 88,4)	(80,0 - 86,2)	(80,0 - 88,2)	(83,1 - 89,7)	(85,8 - 89,5)	(84,1 - 88,8)	(77,7 - 86,4)	(87,5 - 91,5)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

TOMA TRES O MÁS TRAGOS EN UNA OCASIÓN

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2016	36,0	34,0	37,9	34,9	28,1	32,0	39,5	39,8	39,0	39,0	31,9
	(34,4 - 37,5)	(31,8 - 36,1)	(36,0 - 39,9)	(31,1 - 38,7)	(24,5 - 31,8)	(28,8 - 35,2)	(36,5 - 42,5)	(37,1 - 42,4)	(35,3 - 42,6)	(36,8 - 41,3)	(29,9 - 33,9)
2018	41,0	37,9	44,0	41,9	30,8	36,9	45,5	44,5	46,0	39,7	38,8
	(39,2 - 42,8)	(35,4 - 40,4)	(41,8 - 46,3)	(38,1 - 45,6)	(27,0 - 34,6)	(33,7 - 40,2)	(41,0 - 50,0)	(42,2 - 46,9)	(42,3 - 49,6)	(37,4 - 42,0)	(35,5 - 42,1)
2020	37,6*	34,0*	41,2	33,5*	29,1	36,7	39,1*	42,4	41,7	33,1*	40,0
	(35,5 - 39,8)	(31,4 - 36,6)	(38,6 - 43,8)	(28,5 - 38,4)	(25,4 - 32,8)	(32,5 - 40,9)	(34,6 - 43,6)	(39,7 - 45,0)	(38,5 - 45,0)	(30,3 - 35,9)	(36,0 - 44,0)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PRUEBA MARIHUANA UNA O DOS VECES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	46,6	43,2	50,0	42,5	29,9	41,1	50,7	59,5	52,3	47,3	37,8
	(45,0 - 48,2)	(41,0 - 45,4)	(47,7 - 52,3)	(38,7 - 46,3)	(26,6 - 33,2)	(37,6 - 44,5)	(47,2 - 54,2)	(56,1 - 62,8)	(50,4 - 54,2)	(44,5 - 50,2)	(34,4 - 41,2)
2008	51,8	47,7	55,7	46,4	37,0	46,9	56,8	62,6	53,0	53,6	47,0
	(50,2 - 53,3)	(45,5 - 50,0)	(53,6 - 57,8)	(42,5 - 50,4)	(32,9 - 41,2)	(43,5 - 50,3)	(53,8 - 59,9)	(59,6 - 65,7)	(50,4 - 55,5)	(51,0 - 56,1)	(43,7 - 50,3)
2010	48,1	44,2	51,9	48,5	34,5	42,1	50,5	55,9	48,2	49,0	47,0
	(46,3 - 49,9)	(41,9 - 46,6)	(49,8 - 54,1)	(44,7 - 52,4)	(31,0 - 37,9)	(38,3 - 45,8)	(47,2 - 53,7)	(53,3 - 58,5)	(44,8 - 51,6)	(46,3 - 51,7)	(44,2 - 49,8)
2012	46,8	44,5	49,0	46,7	35,4	38,9	49,4	54,7	48,6	48,5	44,2
	(45,3 - 48,2)	(42,4 - 46,6)	(47,0 - 51,0)	(43,2 - 50,2)	(31,7 - 39,0)	(35,9 - 41,9)	(46,1 - 52,8)	(52,4 - 57,1)	(46,1 - 51,2)	(46,2 - 50,9)	(41,5 - 46,8)
2014	34,4	32,9	35,9	33,8	22,6	27,2	37,1	41,1	36,4	35,7	32,2
	(33,0 - 35,8)	(31,0 - 34,9)	(34,2 - 37,6)	(30,3 - 37,3)	(19,7 - 25,4)	(24,4 - 30,0)	(34,2 - 40,1)	(38,7 - 43,5)	(33,7 - 39,0)	(33,7 - 37,8)	(29,8 - 34,6)
2016	29,2	28,3	30,1	28,9	17,8	22,9	29,8	36,8	30,9	33,9	24,4
	(27,9 - 30,6)	(26,4 - 30,2)	(28,3 - 31,9)	(25,6 - 32,2)	(15,2 - 20,4)	(20,2 - 25,5)	(26,4 - 33,2)	(34,7 - 38,9)	(27,4 - 34,5)	(31,6 - 36,1)	(22,3 - 26,6)
2018	35,3	32,9	37,7	37,5	21,1	27,1	36,4	43,9	41,4	36,8	29,4
	(33,5 - 37,2)	(30,7 - 35,2)	(35,5 - 40,0)	(33,8 - 41,3)	(18,1 - 24,1)	(24,2 - 30,1)	(32,3 - 40,5)	(41,4 - 46,4)	(37,0 - 45,8)	(34,5 - 39,0)	(26,7 - 32,2)
2020	31,4*	28,3*	34,5	31,1	16,0*	24,2	31,2	41,6	36,3	28,5*	31,1
	(29,4 - 33,4)	(25,9 - 30,8)	(32,1 - 36,9)	(25,6 - 36,6)	(13,1 - 18,9)	(20,9 - 27,5)	(27,3 - 35,1)	(39,0 - 44,2)	(33,4 - 39,3)	(25,8 - 31,2)	(27,9 - 34,2)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

FUMA MARIHUANA FRECUENTEMENTE

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	88,3	84,7	91,7	90,3	79,4	86,6	88,7	93,0	89,4	90,7	83,6
	(87,1 - 89,4)	(82,9 - 86,6)	(90,3 - 93,2)	(87,9 - 92,7)	(75,5 - 83,2)	(84,4 - 88,8)	(85,9 - 91,6)	(91,2 - 94,8)	(88,1 - 90,6)	(89,2 - 92,3)	(80,3 - 86,9)
2008	84,2	81,7	86,7	86,0	75,7	79,2	86,1	89,8	84,8	85,9	80,6
	(82,9 - 85,6)	(79,7 - 83,6)	(84,9 - 88,5)	(83,6 - 88,5)	(72,3 - 79,2)	(75,6 - 82,7)	(83,5 - 88,7)	(87,1 - 92,5)	(82,8 - 86,9)	(83,6 - 88,2)	(77,9 - 83,3)
2010	78,9	75,6	82,1	80,8	70,6	71,1	79,8	85,0	81,7	80,4	75,4
	(77,5 - 80,3)	(73,6 - 77,6)	(80,4 - 83,7)	(77,7 - 83,8)	(66,7 - 74,6)	(67,8 - 74,4)	(77,1 - 82,5)	(83,3 - 86,6)	(79,1 - 84,3)	(78,5 - 82,3)	(73,0 - 77,8)
2012	79,0	76,0	81,8	82,5	65,2	73,0	81,4	85,5	81,3	80,1	76,7
	(77,8 - 80,2)	(74,2 - 77,9)	(80,5 - 83,2)	(79,9 - 85,1)	(61,6 - 68,8)	(70,2 - 75,7)	(79,1 - 83,7)	(83,8 - 87,3)	(79,3 - 83,3)	(78,2 - 82,0)	(74,6 - 78,8)
2014	67,2	65,0	69,4	68,7	54,4	55,6	70,1	75,2	69,7	70,4	63,0
	(65,6 - 68,8)	(62,7 - 67,2)	(67,3 - 71,4)	(65,3 - 72,2)	(50,3 - 58,6)	(52,0 - 59,2)	(66,9 - 73,2)	(72,8 - 77,7)	(67,0 - 72,4)	(68,4 - 72,4)	(60,0 - 66,1)
2016	62,8	59,5	66,1	64,9	47,3	54,0	64,5	71,8	63,8	66,7	59,1
	(61,3 - 64,3)	(57,3 - 61,8)	(64,0 - 68,2)	(61,3 - 68,5)	(43,0 - 51,7)	(50,3 - 57,8)	(61,7 - 67,3)	(69,5 - 74,1)	(60,9 - 66,7)	(64,3 - 69,1)	(56,7 - 61,4)
2018	65,8	60,7	70,8	69,1	50,0	57,1	66,0	75,2	70,6	68,5	59,7
	(64,3 - 67,3)	(58,5 - 62,8)	(69,1 - 72,5)	(65,1 - 73,1)	(46,5 - 53,4)	(53,8 - 60,3)	(62,5 - 69,5)	(73,2 - 77,3)	(67,9 - 73,3)	(66,4 - 70,5)	(56,8 - 62,5)
2020	64,0	60,8	67,2*	75,2	45,8	53,6	63,4	73,1	67,8	60,6*	65,2*
	(61,9 - 66,1)	(58,1 - 63,6)	(64,6 - 69,8)	(70,1 - 80,2)	(41,3 - 50,2)	(49,4 - 57,7)	(59,3 - 67,4)	(70,3 - 75,9)	(64,9 - 70,7)	(56,7 - 64,5)	(62,2 - 68,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PRUEBA COCAÍNA UNA O DOS VECES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	69,4	66,2	72,6	60,2	56,6	65,6	72,7	82,6	72,4	70,7	63,5
	(67,8 - 71,1)	(63,8 - 68,6)	(70,3 - 74,8)	(56,4 - 64,0)	(52,4 - 60,8)	(61,7 - 69,5)	(69,2 - 76,2)	(79,5 - 85,7)	(70,6 - 74,1)	(68,0 - 73,3)	(59,3 - 67,7)
2008	74,5	72,2	76,9	66,1	62,8	73,7	79,5	83,1	75,4	75,4	71,9
	(73,2 - 75,9)	(70,1 - 74,3)	(75,1 - 78,6)	(62,4 - 69,8)	(58,7 - 66,9)	(70,8 - 76,6)	(76,9 - 82,1)	(80,7 - 85,5)	(73,3 - 77,6)	(73,1 - 77,6)	(69,1 - 74,7)
2010	69,6	66,9	72,2	67,6	61,7	66,2	70,0	75,7	68,4	70,5	69,3
	(67,9 - 71,4)	(64,6 - 69,3)	(70,2 - 74,2)	(64,0 - 71,2)	(57,7 - 65,8)	(62,8 - 69,6)	(66,9 - 73,1)	(73,4 - 78,1)	(65,2 - 71,5)	(67,8 - 73,2)	(66,7 - 71,9)
2012	74,2	73,3	75,1	67,1	66,0	71,9	78,5	80,7	73,7	76,2	72,7
	(72,8 - 75,6)	(71,4 - 75,3)	(73,0 - 77,1)	(63,7 - 70,6)	(62,0 - 70,0)	(69,1 - 74,7)	(76,0 - 81,1)	(78,8 - 82,7)	(71,4 - 75,9)	(74,2 - 78,2)	(70,0 - 75,4)
2014	73,7	73,9	73,5	70,2	67,0	67,4	76,2	79,0	73,6	75,4	72,3
	(72,3 - 75,1)	(72,0 - 75,7)	(71,5 - 75,6)	(67,1 - 73,3)	(62,9 - 71,1)	(64,2 - 70,7)	(73,3 - 79,1)	(76,9 - 81,2)	(71,0 - 76,2)	(73,4 - 77,3)	(69,8 - 74,8)
2016	71,6	69,0	74,2	65,5	64,2	67,2	74,1	77,9	72,0	73,2	70,1
	(69,9 - 73,3)	(66,8 - 71,2)	(72,0 - 76,5)	(61,0 - 70,0)	(60,1 - 68,4)	(63,1 - 71,4)	(71,0 - 77,1)	(76,0 - 79,8)	(68,5 - 75,4)	(70,6 - 75,8)	(67,4 - 72,8)
2018	73,3	70,3	76,2	68,2	67,2	69,5	74,5	78,8	76,6	75,4	69,0
	(71,8 - 74,8)	(68,2 - 72,4)	(74,4 - 78,1)	(64,1 - 72,2)	(62,1 - 72,3)	(66,4 - 72,6)	(71,4 - 77,6)	(76,9 - 80,8)	(74,2 - 79,0)	(73,3 - 77,4)	(66,1 - 71,8)
2020	71,8	69,4	74,2	72,9	64,5	65,9	70,9	77,9	73,1	67,4*	76,6*
	(69,5 - 74,1)	(66,4 - 72,3)	(71,5 - 76,9)	(68,3 - 77,4)	(60,1 - 68,9)	(61,4 - 70,4)	(66,7 - 75,1)	(75,4 - 80,4)	(69,9 - 76,3)	(63,4 - 71,3)	(73,5 - 79,7)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

USA COCAÍNA FRECUENTEMENTE

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	97,2	96,6	97,8	96,0	94,9	98,2	97,2	98,5	96,6	97,9	97,0
	(96,5 - 97,9)	(95,4 - 97,7)	(97,0 - 98,5)	(94,1 - 97,9)	(91,7 - 98,2)	(97,7 - 98,8)	(96,0 - 98,3)	(98,1 - 99,0)	(95,9 - 97,3)	(97,2 - 98,6)	(94,8 - 99,2)
2008	95,3	94,2	96,4	94,1	93,8	95,6	95,6	96,6	94,7	96,8	93,9
	(94,7 - 96,0)	(93,1 - 95,4)	(95,8 - 97,1)	(92,2 - 96,0)	(92,1 - 95,5)	(94,1 - 97,1)	(94,1 - 97,1)	(95,5 - 97,6)	(93,4 - 96,1)	(96,0 - 97,7)	(92,7 - 95,1)
2010	94,0	93,7	94,4	94,5	91,8	94,0	93,9	94,9	94,2	94,4	93,5
	(93,4 - 94,7)	(92,8 - 94,6)	(93,4 - 95,3)	(93,2 - 95,8)	(89,6 - 94,0)	(92,7 - 95,3)	(92,3 - 95,5)	(94,1 - 95,8)	(92,9 - 95,5)	(93,4 - 95,4)	(92,3 - 94,7)
2012	94,8	94,6	95,1	93,4	94,4	95,6	95,7	95,0	93,5	94,9	95,5
	(94,2 - 95,5)	(93,7 - 95,5)	(94,2 - 95,9)	(91,9 - 94,9)	(92,6 - 96,2)	(94,5 - 96,7)	(94,5 - 96,9)	(94,0 - 96,1)	(92,0 - 95,0)	(94,0 - 95,9)	(94,5 - 96,5)
2014	94,5	94,7	94,4	92,3	94,8	93,0	95,1	95,6	94,5	95,0	94,2
	(93,9 - 95,2)	(93,9 - 95,6)	(93,4 - 95,4)	(90,5 - 94,1)	(93,6 - 96,0)	(91,0 - 95,0)	(93,6 - 96,6)	(94,5 - 96,6)	(93,5 - 95,5)	(93,9 - 96,0)	(93,0 - 95,4)
2016	93,7	92,9	94,5	91,2	93,2	94,2	94,6	94,2	92,3	92,8	95,1
	(93,1 - 94,3)	(92,0 - 93,9)	(93,6 - 95,3)	(89,0 - 93,4)	(91,6 - 94,8)	(93,1 - 95,4)	(93,3 - 96,0)	(93,2 - 95,2)	(90,8 - 93,8)	(91,7 - 94,0)	(94,2 - 96,0)
2018	93,3	91,7	94,7	92,3	92,8	92,4	94,2	93,7	93,8	93,5	93,0
	(92,5 - 94,0)	(90,6 - 92,9)	(93,9 - 95,6)	(89,9 - 94,7)	(91,0 - 94,7)	(90,8 - 93,9)	(92,8 - 95,7)	(92,6 - 94,8)	(92,3 - 95,4)	(92,4 - 94,5)	(91,7 - 94,4)
2020	90,9*	90,5	91,2*	91,8	89,9	90,3	90,9	91,2*	94,0	86,7*	93,6
	(88,8 - 92,9)	(88,2 - 92,7)	(89,0 - 93,5)	(88,5 - 95,1)	(87,2 - 92,6)	(86,4 - 94,2)	(87,8 - 94,0)	(89,5 - 92,8)	(92,8 - 95,3)	(82,2 - 91,2)	(92,1 - 95,2)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PRUEBA PASTA BASE UNA O DOS VECES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	77,2	75,6	78,8	67,5	69,9	74,7	79,5	87,5	77,0	76,9	77,8
	(75,8 - 78,6)	(73,8 - 77,5)	(76,7 - 80,9)	(64,1 - 70,9)	(66,2 - 73,6)	(70,9 - 78,5)	(76,2 - 82,8)	(85,6 - 89,3)	(75,3 - 78,6)	(74,4 - 79,4)	(74,5 - 81,2)
2008	81,1	80,9	81,3	73,0	74,5	81,0	85,3	86,6	81,1	82,7	78,7
	(79,8 - 82,4)	(79,2 - 82,7)	(79,5 - 83,1)	(69,4 - 76,5)	(70,7 - 78,4)	(78,5 - 83,5)	(83,0 - 87,6)	(84,4 - 88,9)	(79,0 - 83,2)	(80,8 - 84,6)	(75,9 - 81,5)
2010	78,2	77,0	79,4	76,1	73,1	76,8	77,3	82,8	75,7	79,9	77,6
	(76,8 - 79,5)	(75,1 - 78,8)	(77,8 - 81,0)	(73,0 - 79,3)	(69,3 - 76,8)	(73,7 - 79,8)	(74,6 - 80,0)	(80,9 - 84,7)	(72,8 - 78,6)	(78,0 - 81,9)	(75,3 - 79,9)
2012	81,6	82,1	81,2	72,8	75,7	82,3	85,8	86,7	80,4	83,6	80,6
	(80,3 - 83,0)	(80,3 - 83,8)	(79,4 - 83,1)	(69,5 - 76,1)	(71,5 - 79,9)	(79,9 - 84,6)	(83,8 - 87,8)	(85,0 - 88,3)	(78,4 - 82,4)	(81,8 - 85,4)	(78,0 - 83,1)
2014	82,7	83,6	81,9	76,6	77,0	82,1	85,2	86,3	82,6	83,6	82,0
	(81,6 - 83,9)	(82,1 - 85,1)	(80,2 - 83,7)	(73,7 - 79,4)	(72,8 - 81,2)	(79,8 - 84,4)	(82,7 - 87,8)	(84,7 - 87,8)	(80,5 - 84,8)	(82,1 - 85,2)	(79,9 - 84,1)
2016	82,8	81,9	83,6	75,6	78,6	82,6	84,4	86,5	81,9	83,1	82,9
	(81,4 - 84,1)	(80,2 - 83,7)	(81,9 - 85,3)	(71,7 - 79,6)	(75,1 - 82,1)	(79,9 - 85,3)	(81,6 - 87,1)	(85,0 - 88,1)	(79,0 - 84,8)	(81,3 - 84,9)	(80,9 - 84,9)
2018	83,1	81,4	84,8	75,2	79,7	83,0	85,4	86,2	85,2	84,7	80,3
	(81,8 - 84,4)	(79,5 - 83,3)	(83,1 - 86,5)	(71,4 - 79,1)	(75,5 - 83,9)	(80,4 - 85,6)	(83,0 - 87,7)	(84,6 - 87,7)	(83,2 - 87,1)	(83,0 - 86,5)	(77,5 - 83,0)
2020	80,0*	79,6	80,5*	74,2	77,0	78,9	80,3*	83,8	82,4	75,2*	84,4*
	(77,9 - 82,1)	(77,1 - 82,1)	(78,1 - 82,9)	(69,4 - 79,0)	(73,3 - 80,7)	(74,8 - 82,9)	(76,7 - 83,9)	(81,7 - 85,9)	(79,4 - 85,4)	(71,0 - 79,4)	(82,2 - 86,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

USA PASTA BASE FRECUENTEMENTE

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	97,6	97,0	98,3	96,6	98,1	98,7	97,7	97,2	97,4	98,4	96,9
	(96,8 - 98,5)	(95,4 - 98,6)	(97,8 - 98,7)	(95,6 - 97,7)	(97,5 - 98,8)	(98,2 - 99,2)	(96,7 - 98,8)	(94,4 - 100)	(96,8 - 98,0)	(97,8 - 99,0)	(94,1 - 99,8)
2008	96,2	95,7	96,7	95,7	95,8	97,0	96,6	95,9	96,1	97,6	94,0
	(95,5 - 96,9)	(94,8 - 96,6)	(95,7 - 97,7)	(94,5 - 96,8)	(94,5 - 97,2)	(95,7 - 98,2)	(95,3 - 97,9)	(94,2 - 97,6)	(95,0 - 97,1)	(96,9 - 98,4)	(92,1 - 96,0)
2010	95,3	95,1	95,6	94,9	94,3	95,8	95,5	95,8	95,8	95,3	95,1
	(94,8 - 95,9)	(94,2 - 95,9)	(94,9 - 96,4)	(93,7 - 96,2)	(92,5 - 96,0)	(94,7 - 96,9)	(94,5 - 96,5)	(94,9 - 96,7)	(94,6 - 97,0)	(94,5 - 96,2)	(94,0 - 96,2)
2012	95,4	95,2	95,5	94,3	94,8	96,4	96,2	95,3	94,0	95,5	95,9
	(94,7 - 96,0)	(94,3 - 96,0)	(94,7 - 96,4)	(93,0 - 95,6)	(93,0 - 96,6)	(95,4 - 97,4)	(95,2 - 97,2)	(94,2 - 96,4)	(92,6 - 95,5)	(94,6 - 96,4)	(95,0 - 96,9)
2014	95,4	95,9	94,8	93,2	95,3	95,0	95,4	96,2	95,4	95,3	95,4
	(94,8 - 96,0)	(95,3 - 96,5)	(93,8 - 95,8)	(91,6 - 94,7)	(94,1 - 96,6)	(93,9 - 96,2)	(93,9 - 96,9)	(95,3 - 97,1)	(94,5 - 96,3)	(94,3 - 96,4)	(94,4 - 96,3)
2016	94,4	94,0	94,8	92,6	94,6	95,1	95,1	94,4	93,8	93,5	95,5
	(93,8 - 95,0)	(93,1 - 94,9)	(94,1 - 95,6)	(90,6 - 94,6)	(93,2 - 96,0)	(94,0 - 96,2)	(93,8 - 96,4)	(93,3 - 95,5)	(92,4 - 95,2)	(92,3 - 94,6)	(94,7 - 96,3)
2018	94,2	92,8	95,5	93,3	94,0	93,4	94,9	94,5	94,6	94,9	93,4
	(93,4 - 94,9)	(91,6 - 94,0)	(94,8 - 96,2)	(90,5 - 96,1)	(92,3 - 95,8)	(91,9 - 94,9)	(93,7 - 96,2)	(93,4 - 95,6)	(93,2 - 95,9)	(94,0 - 95,8)	(91,8 - 94,9)
2020	91,4*	91,4	91,4*	89,6	91,0*	91,3	92,4	91,8*	95,1	86,8*	94,3
	(89,3 - 93,5)	(89,2 - 93,7)	(89,2 - 93,7)	(86,1 - 93,1)	(88,4 - 93,5)	(87,4 - 95,2)	(89,4 - 95,5)	(90,2 - 93,4)	(93,9 - 96,4)	(82,2 - 91,4)	(92,8 - 95,8)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

LUGARES ESTABLECIDOS DE COMPRA DE ALCOHOL

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2020.

Proporción que declara haber comprado en los últimos 30 días

Pregunta: Pensando en los últimos 30 días, ¿ha comprado alcohol en alguno de los siguientes lugares?

BARES, PUBS O DISCOTECAS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	18,6	20,5	16,3	15,6	37,5	29,6	13,7	4,9	15,7	17,1	21,4
	(17,0 - 20,2)	(18,1 - 22,9)	(14,5 - 18,2)	(9,2 - 22,1)	(32,8 - 42,1)	(26,2 - 33,1)	(11,0 - 16,3)	(3,5 - 6,3)	(13,5 - 17,8)	(15,0 - 19,2)	(18,3 - 24,5)
2014	12,4	12,3	12,5	11,0	25,9	19,9	10,5	4,0	7,4	10,1	16,7
	(11,1 - 13,6)	(10,7 - 13,9)	(10,5 - 14,4)	(6,5 - 15,5)	(22,0 - 29,8)	(16,7 - 23,1)	(7,6 - 13,3)	(3,0 - 5,1)	(5,8 - 9,0)	(8,6 - 11,6)	(14,2 - 19,2)
2016	12,3	12,4	12,1	9,7	25,8	22,1	8,9	2,6	7,9	10,1	15,7
	(11,1 - 13,5)	(10,7 - 14,2)	(10,5 - 13,7)	(5,7 - 13,8)	(22,5 - 29,0)	(18,6 - 25,6)	(6,7 - 11,0)	(1,6 - 3,5)	(6,0 - 9,9)	(8,3 - 11,8)	(13,8 - 17,6)
2018	12,4	13,5	11,2	9,3	25,4	20,5	10,4	3,2	7,5	11,1	17,1
	(10,8 - 14,1)	(11,2 - 15,7)	(9,4 - 13,0)	(5,3 - 13,4)	(21,1 - 29,7)	(16,6 - 24,4)	(7,4 - 13,5)	(2,4 - 4,0)	(5,7 - 9,2)	(9,1 - 13,1)	(13,7 - 20,5)
2020	3,4*	2,9*	3,9*	2,1*	5,8*	4,8*	5,1*	0,5*	1,8*	2,4*	5,8*
	(2,0 - 4,8)	(1,7 - 4,1)	(1,4 - 6,5)	(<0,1 - 4,2)	(2,3 - 9,3)	(2,4 - 7,3)	(1,9 - 8,4)	(0,0 - 1,3)	(0,7 - 2,8)	(0,6 - 4,2)	(3,7 - 8,0)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

RESTAURANTES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	8,9	11,3	6,1	2,1	8,9	13,3	9,8	7,9	6,2	6,3	12,5
	(7,8 - 10,0)	(9,2 - 13,3)	(4,8 - 7,4)	(0,7 - 3,5)	(5,0 - 12,8)	(10,6 - 16,0)	(7,5 - 12,0)	(5,9 - 10,0)	(4,7 - 7,6)	(4,8 - 7,7)	(10,5 - 14,5)
2014	6,1	6,6	5,4	3,4	6,3	9,5	5,9	4,9	3,2	4,5	8,8
	(5,2 - 6,9)	(5,4 - 7,8)	(4,1 - 6,7)	(0,7 - 6,2)	(3,5 - 9,1)	(7,3 - 11,7)	(4,2 - 7,6)	(3,7 - 6,1)	(1,9 - 4,4)	(3,4 - 5,6)	(7,1 - 10,5)
2016	7,1	7,7	6,4	2,5	7,1	12,8	7,0	5,0	4,1	4,4	10,3
	(5,7 - 8,6)	(5,7 - 9,8)	(4,8 - 8,0)	(0,8 - 4,1)	(4,3 - 9,9)	(9,0 - 16,5)	(5,0 - 9,1)	(3,7 - 6,4)	(2,8 - 5,3)	(3,0 - 5,9)	(7,8 - 12,9)
2018	6,5	7,8	4,8	3,1	8,6	9,3	8,0	3,6	3,6	4,4	10,5
	(5,4 - 7,6)	(6,1 - 9,6)	(3,7 - 5,9)	(<0,1 - 6,1)	(5,2 - 11,9)	(6,6 - 12,0)	(5,7 - 10,3)	(2,5 - 4,7)	(2,4 - 4,9)	(3,5 - 5,3)	(8,1 - 13,0)
2020	2,1*	1,9*	2,4*	0,8	3,3*	2,8*	2,2*	1,2*	1,2*	0,7*	4,5*
	(1,4 - 2,8)	(0,9 - 2,8)	(1,2 - 3,6)	(0,0 - 1,9)	(0,3 - 6,3)	(1,5 - 4,1)	(0,2 - 4,2)	(0,0 - 2,8)	(0,4 - 2,0)	(0,3 - 1,1)	(2,2 - 6,8)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

BOTILLERÍAS/LICORERÍAS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	36,3	46,4	24,3	42,0	49,7	40,4	28,2	29,1	40,8	37,2	33,3
	(34,3 - 38,4)	(43,8 - 49,0)	(21,7 - 26,8)	(33,4 - 50,6)	(44,8 - 54,6)	(36,7 - 44,1)	(25,0 - 31,4)	(26,0 - 32,2)	(37,6 - 44,0)	(33,9 - 40,6)	(29,7 - 36,9)
2014	34,7	42,9	25,1	33,7	46,9	39,6	32,6	28,1	43,2	36,4	29,1
	(32,9 - 36,4)	(40,3 - 45,4)	(23,0 - 27,3)	(27,6 - 39,7)	(42,7 - 51,1)	(35,7 - 43,6)	(28,3 - 36,9)	(25,5 - 30,7)	(39,7 - 46,6)	(33,7 - 39,0)	(26,2 - 32,1)
2016	34,0	41,5	25,2	40,2	47,5	42,4	30,1	23,3	44,8	35,7	28,1
	(31,7 - 36,2)	(38,6 - 44,3)	(22,8 - 27,6)	(34,5 - 46,0)	(43,5 - 51,5)	(37,7 - 47,2)	(24,9 - 35,2)	(20,9 - 25,8)	(41,5 - 48,1)	(31,7 - 39,8)	(25,2 - 31,1)
2018	37,0	46,2	25,8	29,6	51,8	42,3	35,4	29,1	44,1	37,3	31,8
	(34,5 - 39,4)	(43,0 - 49,3)	(22,8 - 28,8)	(22,7 - 36,4)	(46,2 - 57,4)	(37,9 - 46,7)	(29,6 - 41,2)	(26,3 - 31,9)	(38,4 - 49,9)	(34,3 - 40,2)	(27,8 - 35,7)
2020	40,1	47,6	30,9*	25,3	52,7	46,5	37,3	33,8*	46,1	39,8	36,1
	(37,8 - 42,4)	(43,9 - 51,3)	(28,2 - 33,6)	(17,4 - 33,1)	(47,1 - 58,4)	(42,0 - 51,0)	(32,4 - 42,2)	(30,1 - 37,6)	(41,6 - 50,6)	(35,9 - 43,6)	(31,6 - 40,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

SUPERMERCADOS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	42,9	50,4	33,9	20,6	40,0	44,5	48,5	47,1	34,0	41,6	48,5
	(40,9 - 44,9)	(47,8 - 53,0)	(31,3 - 36,5)	(13,9 - 27,4)	(35,3 - 44,7)	(40,6 - 48,3)	(44,7 - 52,3)	(43,8 - 50,4)	(31,1 - 36,9)	(38,4 - 44,8)	(45,2 - 51,7)
2014	40,1	44,0	35,6	17,7	35,4	38,2	45,0	45,0	28,8	36,6	48,6
	(38,4 - 41,9)	(41,3 - 46,7)	(33,3 - 38,0)	(13,6 - 21,9)	(31,2 - 39,6)	(34,8 - 41,7)	(40,9 - 49,1)	(41,6 - 48,5)	(25,5 - 32,0)	(33,7 - 39,5)	(45,6 - 51,6)
2016	43,1	48,1	37,4	18,5	39,6	46,8	48,9	44,9	32,3	36,6	52,5
	(41,0 - 45,2)	(45,3 - 50,8)	(34,3 - 40,5)	(13,3 - 23,8)	(33,8 - 45,4)	(42,7 - 50,9)	(43,6 - 54,2)	(41,6 - 48,1)	(29,1 - 35,6)	(33,9 - 39,3)	(49,4 - 55,5)
2018	40,4	45,0	34,8	17,6	36,5	43,8	40,1	44,7	28,8	38,1	50,7
	(38,1 - 42,8)	(42,2 - 47,8)	(32,0 - 37,7)	(11,3 - 23,9)	(30,5 - 42,5)	(39,3 - 48,3)	(36,4 - 43,9)	(41,2 - 48,2)	(25,2 - 32,5)	(34,9 - 41,4)	(47,3 - 54,1)
2020	46,5*	48,0	44,6*	13,7	38,8	50,5*	54,2*	48,6	40,2*	47,1*	50,3
	(44,1 - 48,8)	(44,3 - 51,7)	(41,8 - 47,4)	(8,1 - 19,3)	(33,5 - 44,2)	(45,7 - 55,2)	(49,6 - 58,8)	(45,0 - 52,2)	(34,9 - 45,5)	(43,4 - 50,8)	(45,8 - 54,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

SERVICENTROS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	1,4	1,6	1,1	0,7	2,6	1,1	2,0	0,5	0,8	1,2	1,7
	(0,9 - 1,8)	(0,9 - 2,3)	(0,4 - 1,8)	(0,1 - 1,4)	(1,0 - 4,3)	(0,5 - 1,7)	(0,7 - 3,3)	(0,3 - 0,8)	(0,4 - 1,2)	(0,6 - 1,8)	(0,8 - 2,7)
2014	0,8	0,8	0,8	0,7	1,1	0,8	0,9	0,6	0,4	1,0	0,8
	(0,5 - 1,1)	(0,5 - 1,2)	(0,3 - 1,2)	(0,0 - 1,6)	(0,5 - 1,7)	(0,2 - 1,5)	(0,3 - 1,5)	(0,1 - 1,1)	(0,1 - 0,6)	(0,3 - 1,6)	(0,5 - 1,2)
2016	0,8	1,0	0,6		2,9	0,6	0,5	0,3	0,3	0,6	1,2
	(0,4 - 1,3)	(0,5 - 1,5)	(0,0 - 1,3)		(0,7 - 5,0)	(0,2 - 0,9)	(0,2 - 0,8)	(<0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,7)	(<0,1 - 1,1)	(0,4 - 2,1)
2018	0,7	1,1	0,3	0,7	1,8	0,9	0,5	0,2	0,6	0,4	1,1
	(0,2 - 1,2)	(0,2 - 1,9)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 1,4)	(0,0 - 4,5)	(0,4 - 1,4)	(0,1 - 0,8)	(0,1 - 0,4)	(0,3 - 0,9)	(0,2 - 0,7)	(0,0 - 2,4)
2020	0,2	0,3	0,1	0,2	0,5	0,2*	0,2	0,1	0,3	0,1*	0,3
	(0,1 - 0,3)	(0,1 - 0,5)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 0,6)	(0,1 - 0,9)	(0,1 - 0,4)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,3)	(<0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,5)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

OTROS LUGARES ESTABLECIDOS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	2,5	2,8	2,2	2,1	3,2	1,0	2,7	3,0	3,1	2,2	2,5
	(1,9 - 3,2)	(2,0 - 3,6)	(1,2 - 3,1)	(0,7 - 3,5)	(1,4 - 4,9)	(0,4 - 1,6)	(1,6 - 3,8)	(1,6 - 4,4)	(2,0 - 4,3)	(1,4 - 3,0)	(1,3 - 3,6)
2014	1,8	1,8	1,9	1,7	1,2	1,4	2,3	2,1	2,0	1,4	2,1
	(1,4 - 2,3)	(1,3 - 2,3)	(1,0 - 2,7)	(0,8 - 2,6)	(0,6 - 1,8)	(0,7 - 2,1)	(0,7 - 3,8)	(1,3 - 3,0)	(0,8 - 3,2)	(0,9 - 1,9)	(1,3 - 3,0)
2016	1,6	1,5	1,7	3,1	1,7	1,2	1,7	1,4	1,8	1,6	1,6
	(1,2 - 2,0)	(1,1 - 2,0)	(1,0 - 2,4)	(0,6 - 5,5)	(0,8 - 2,6)	(0,5 - 1,8)	(0,7 - 2,7)	(0,8 - 2,0)	(1,0 - 2,6)	(1,0 - 2,1)	(0,9 - 2,2)
2018	0,8	1,0	0,6	0,5	0,7	0,8	0,6	1,1	1,1	0,9	0,5
	(0,6 - 1,1)	(0,7 - 1,4)	(0,4 - 0,8)	(0,0 - 1,3)	(0,3 - 1,1)	(0,4 - 1,3)	(0,2 - 0,9)	(0,6 - 1,6)	(0,5 - 1,7)	(0,5 - 1,3)	(0,3 - 0,8)
2020	1,3	1,0	1,7*	0,6	1,0	2,2	1,8*	0,9	1,3	0,9	1,9*
	(0,8 - 1,9)	(0,5 - 1,5)	(0,9 - 2,5)	(0,0 - 1,2)	(0,3 - 1,8)	(0,4 - 4,1)	(0,8 - 2,7)	(0,5 - 1,2)	(0,4 - 2,2)	(0,4 - 1,4)	(0,6 - 3,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

LUGARES NO ESTABLECIDOS DE COMPRA DE ALCOHOL

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2020.

Proporción que declara haber comprado en los últimos 30 días

Pregunta: Pensando en los últimos 30 días, ¿ha comprado alcohol en alguno de los siguientes lugares?

FERIAS LIBRES O MERCADOS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	1,3	1,7	0,7	0,7	1,6	2,0	1,1	0,9	1,4	1,4	1,1
	(0,9 - 1,6)	(1,1 - 2,3)	(0,4 - 1,0)	(0,2 - 1,2)	(0,8 - 2,3)	(1,1 - 3,0)	(0,2 - 2,1)	(0,5 - 1,3)	(0,6 - 2,1)	(0,7 - 2,1)	(0,7 - 1,6)
2014	1,4	1,6	1,2	2,4	1,7	1,6	1,3	1,0	1,1	1,3	1,5
	(1,0 - 1,7)	(1,1 - 2,0)	(0,7 - 1,7)	(0,9 - 4,0)	(0,9 - 2,6)	(0,7 - 2,5)	(0,6 - 2,0)	(0,5 - 1,4)	(0,5 - 1,8)	(0,9 - 1,8)	(1,0 - 2,1)
2016	1,7	2,0	1,4	1,8	2,2	2,5	1,8	0,9	2,5	1,2	1,7
	(1,3 - 2,1)	(1,4 - 2,6)	(0,8 - 2,0)	(0,0 - 4,1)	(1,2 - 3,2)	(1,4 - 3,6)	(0,7 - 2,9)	(0,5 - 1,4)	(1,1 - 3,9)	(0,7 - 1,8)	(1,1 - 2,4)
2018	2,1	2,5	1,8	2,9	3,6	3,5	1,7	0,8	1,7	2,1	2,5
	(1,7 - 2,6)	(1,8 - 3,1)	(1,0 - 2,5)	(1,2 - 4,6)	(2,3 - 4,8)	(2,1 - 4,9)	(0,3 - 3,2)	(0,5 - 1,0)	(1,0 - 2,3)	(1,5 - 2,7)	(1,4 - 3,6)
2020	1,0*	1,0*	1,0	1,3	1,0*	1,1*	1,6	0,7	0,7*	0,8*	1,6
	(0,3 - 1,7)	(0,4 - 1,7)	(0,1 - 1,9)	(0,0 - 3,5)	(0,2 - 1,7)	(0,2 - 1,9)	(0,0 - 4,0)	(0,1 - 1,3)	(0,1 - 1,3)	(0,2 - 1,4)	(0,0 - 3,5)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

FIESTAS PARTICULARES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	8,3	10,0	6,2	8,4	13,1	9,6	6,9	5,3	7,3	10,2	7,2
	(7,2 - 9,4)	(8,2 - 11,8)	(5,1 - 7,2)	(5,6 - 11,3)	(10,1 - 16,2)	(7,5 - 11,8)	(4,9 - 8,9)	(3,3 - 7,4)	(5,6 - 9,1)	(7,8 - 12,6)	(5,8 - 8,6)
2014	5,7	6,4	4,8	9,1	10,2	6,3	4,7	3,2	4,5	4,8	7,0
	(4,8 - 6,6)	(5,0 - 7,8)	(3,9 - 5,8)	(5,5 - 12,7)	(7,5 - 12,9)	(4,3 - 8,2)	(3,2 - 6,1)	(1,8 - 4,6)	(2,8 - 6,1)	(3,7 - 5,9)	(5,3 - 8,6)
2016	4,2	5,3	3,0	7,2	8,6	6,5	2,6	1,1	3,7	3,1	5,3
	(3,5 - 5,0)	(4,2 - 6,4)	(2,3 - 3,7)	(2,9 - 11,6)	(6,4 - 10,8)	(4,7 - 8,2)	(1,5 - 3,6)	(0,7 - 1,6)	(2,0 - 5,3)	(2,0 - 4,2)	(4,1 - 6,6)
2018	4,8	5,7	3,7	7,1	10,4	6,7	2,8	1,7	4,9	3,7	5,9
	(4,1 - 5,6)	(4,5 - 6,9)	(2,9 - 4,5)	(3,6 - 10,6)	(7,1 - 13,6)	(5,0 - 8,5)	(1,8 - 3,9)	(1,1 - 2,3)	(3,5 - 6,4)	(2,7 - 4,6)	(4,4 - 7,4)
2020	0,7*	0,9*	0,5*	0,8*	1,0*	1,1*	1,0*	0,1*	0,5*	0,7*	0,9*
	(0,4 - 1,0)	(0,4 - 1,3)	(0,2 - 0,8)	(0,0 - 2,1)	(0,3 - 1,7)	(0,3 - 2,0)	(0,0 - 2,0)	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,9)	(0,2 - 1,1)	(0,2 - 1,5)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

LOCALES CLANDESTINOS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	2,8	4,2	1,2	3,7	4,9	4,2	1,4	1,4	5,5	2,2	1,9
	(2,3 - 3,4)	(3,2 - 5,1)	(0,7 - 1,7)	(1,6 - 5,8)	(3,1 - 6,8)	(2,7 - 5,7)	(0,7 - 2,1)	(0,8 - 1,9)	(4,2 - 6,8)	(1,5 - 3,0)	(1,0 - 2,8)
2014	2,4	3,1	1,6	5,4	4,4	3,0	1,4	1,1	3,6	2,6	1,6
	(1,9 - 2,9)	(2,3 - 3,8)	(1,1 - 2,1)	(1,8 - 9,0)	(2,9 - 5,8)	(1,9 - 4,1)	(0,8 - 2,0)	(0,7 - 1,6)	(2,4 - 4,8)	(1,7 - 3,5)	(1,1 - 2,1)
2016	2,1	2,9	1,1	2,7	5,9	2,3	1,1	0,4	3,4	2,2	1,4
	(1,6 - 2,6)	(2,1 - 3,7)	(0,7 - 1,6)	(1,0 - 4,4)	(4,1 - 7,8)	(1,5 - 3,2)	(0,5 - 1,7)	(0,2 - 0,6)	(2,1 - 4,7)	(1,2 - 3,1)	(0,9 - 2,0)
2018	2,6	3,7	1,1	3,6	6,0	2,5	2,1	1,0	3,5	2,5	1,7
	(1,9 - 3,2)	(2,6 - 4,9)	(0,8 - 1,5)	(0,6 - 6,5)	(3,0 - 9,1)	(1,7 - 3,4)	(0,9 - 3,2)	(0,6 - 1,4)	(2,5 - 4,6)	(1,2 - 3,9)	(1,0 - 2,4)
2020	1,7	2,2*	1,0	0,6	3,9	1,8	2,0	0,5	3,3	1,4	0,9
	(1,1 - 2,3)	(1,4 - 3,1)	(0,5 - 1,6)	(0,0 - 1,2)	(2,2 - 5,7)	(0,9 - 2,8)	(0,1 - 4,0)	(0,1 - 0,9)	(1,4 - 5,2)	(0,9 - 1,9)	(0,4 - 1,5)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

DELIVERY

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2020	4,3	4,3	4,2	2,7	5,8	7,3	4,7	1,8	2,0	5,1	4,9
	(3,2 - 5,3)	(3,0 - 5,6)	(2,3 - 6,1)	(0,7 - 4,7)	(3,8 - 7,8)	(4,9 - 9,7)	(3,1 - 6,3)	(0,2 - 3,3)	(1,1 - 2,9)	(3,6 - 6,7)	(3,2 - 6,6)

PRODUCTORES ARTESANALES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	1,5	1,9	1,1	1,4	3,5	2,8	0,5	0,3	0,9	1,4	1,9
	(1,1 - 2,0)	(1,2 - 2,7)	(0,6 - 1,5)	(0,2 - 2,5)	(1,6 - 5,5)	(1,6 - 3,9)	(0,2 - 0,8)	(0,1 - 0,5)	(0,4 - 1,5)	(0,7 - 2,1)	(1,1 - 2,8)
2014	1,6	1,9	1,3	0,6	2,6	2,3	2,0	0,9	0,6	1,7	2,1
	(1,2 - 2,1)	(1,2 - 2,6)	(0,8 - 1,8)	(0,0 - 1,3)	(1,5 - 3,7)	(1,3 - 3,3)	(0,5 - 3,5)	(0,5 - 1,3)	(0,3 - 0,9)	(0,8 - 2,6)	(1,5 - 2,7)
2016	1,7	1,6	1,7	2,2	4,0	2,2	1,0	0,5	0,9	0,9	2,5
	(1,1 - 2,2)	(1,0 - 2,2)	(0,7 - 2,8)	(0,2 - 4,3)	(1,9 - 6,2)	(1,2 - 3,2)	(0,5 - 1,4)	(0,2 - 0,7)	(0,4 - 1,4)	(0,4 - 1,4)	(1,4 - 3,6)
2018	1,9	2,2	1,6	1,4	3,4	3,1	1,6	0,9	1,6	1,1	3,0
	(1,4 - 2,5)	(1,5 - 2,9)	(0,9 - 2,3)	(0,3 - 2,6)	(2,1 - 4,6)	(1,5 - 4,7)	(0,5 - 2,8)	(0,3 - 1,4)	(0,5 - 2,7)	(0,7 - 1,6)	(1,8 - 4,2)
2020	1,3	1,7	0,8		1,5*	1,8	1,3	1,0	1,8	1,2	1,0*
	(0,7 - 1,8)	(0,8 - 2,5)	(0,2 - 1,4)		(0,3 - 2,7)	(0,6 - 3,0)	(0,2 - 2,4)	(0,0 - 2,1)	(0,1 - 3,4)	(0,6 - 1,8)	(0,4 - 1,7)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

OTROS LUGARES NO ESTABLECIDOS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	2,6	3,7	1,3	2,2	4,0	2,8	2,0	2,1	1,9	2,1	3,4
	(1,9 - 3,3)	(2,5 - 4,9)	(0,8 - 1,8)	(0,9 - 3,6)	(1,9 - 6,1)	(1,0 - 4,6)	(1,1 - 2,9)	(1,0 - 3,2)	(1,0 - 2,8)	(1,4 - 2,8)	(1,9 - 4,8)
2014	2,9	2,9	2,9	2,3	3,2	2,3	3,5	2,9	1,9	2,5	3,8
	(2,1 - 3,7)	(1,8 - 3,9)	(1,8 - 4,1)	(0,6 - 4,0)	(1,9 - 4,4)	(1,6 - 3,1)	(1,2 - 5,7)	(1,5 - 4,4)	(1,2 - 2,6)	(1,6 - 3,3)	(2,2 - 5,4)
2016	2,2	2,5	1,9	2,8	2,9	3,3	1,9	1,3	1,7	2,5	2,2
	(1,7 - 2,7)	(1,8 - 3,2)	(1,3 - 2,5)	(1,2 - 4,4)	(1,6 - 4,3)	(1,9 - 4,6)	(1,2 - 2,6)	(0,5 - 2,1)	(1,1 - 2,4)	(1,5 - 3,5)	(1,5 - 2,9)
2018	0,7	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8	1,0	0,5	0,5	0,9	0,7
	(0,5 - 1,0)	(0,5 - 1,1)	(0,3 - 1,1)	(0,0 - 1,8)	(0,0 - 1,6)	(0,2 - 1,3)	(0,4 - 1,5)	(0,2 - 0,8)	(0,1 - 1,0)	(0,5 - 1,3)	(0,2 - 1,2)
2020	1,6*	1,8*	1,4	0,3	1,3	1,6	2,0	1,8*	1,9	1,6	1,5
	(1,1 - 2,2)	(1,1 - 2,5)	(0,7 - 2,1)	(<0,1 - 0,6)	(0,3 - 2,3)	(0,8 - 2,3)	(0,7 - 3,3)	(0,8 - 2,9)	(0,4 - 3,4)	(0,7 - 2,4)	(0,8 - 2,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2020.
Proporción que considera fácil conseguir droga

Pregunta: ¿Cuán difícil le sería conseguir alguna de las siguientes drogas?
Respuestas: Me sería fácil, me sería difícil, no podría conseguirla, no sabe.

MARIHUANA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	39,9	42,7	37,3	41,4	51,9	46,2	34,2	27,7	41,3	37,8	38,9
	(38,1 - 41,6)	(40,1 - 45,3)	(34,9 - 39,6)	(37,1 - 45,7)	(47,9 - 55,9)	(42,4 - 50,1)	(30,2 - 38,1)	(24,3 - 31,0)	(38,8 - 43,9)	(34,4 - 41,3)	(35,7 - 42,0)
1996	34,6	40,3	29,1	31,9	49,0	41,8	31,2	21,7			
	(32,9 - 36,2)	(37,9 - 42,8)	(27,0 - 31,2)	(28,0 - 35,9)	(45,0 - 53,0)	(38,3 - 45,3)	(27,5 - 34,9)	(18,9 - 24,5)			
1998	45,3	50,6	40,2	43,3	61,4	51,0	44,8	30,8	46,7	47,9	43,1
	(44,5 - 46,0)	(49,5 - 51,8)	(39,2 - 41,2)	(41,4 - 45,1)	(59,5 - 63,3)	(49,3 - 52,7)	(43,1 - 46,5)	(29,5 - 32,1)	(45,3 - 48,0)	(46,3 - 49,5)	(42,0 - 44,3)
2000	52,7	56,9	48,7	54,1	69,7	58,4	51,1	37,3	56,9	50,8	47,9
	(52,0 - 53,3)	(55,9 - 57,8)	(47,8 - 49,6)	(52,4 - 55,7)	(68,2 - 71,2)	(56,9 - 59,8)	(49,7 - 52,5)	(36,1 - 38,6)	(56,0 - 57,9)	(49,6 - 52,1)	(46,5 - 49,2)
2002	52,1	56,0	48,4	51,2	69,0	60,5	51,8	36,0	54,9	53,6	45,5
	(50,9 - 53,3)	(54,3 - 57,6)	(46,7 - 50,1)	(48,3 - 54,2)	(66,1 - 72,0)	(58,0 - 62,9)	(49,4 - 54,3)	(33,9 - 38,1)	(53,2 - 56,5)	(51,5 - 55,8)	(43,0 - 47,9)
2004	51,9	54,7	49,1	53,7	73,2	57,0	49,2	36,5	57,1	49,7	46,0
	(50,9 - 53,1)	(53,1 - 56,4)	(47,4 - 50,8)	(50,9 - 56,6)	(70,6 - 75,9)	(54,2 - 59,7)	(46,5 - 51,9)	(34,4 - 38,5)	(55,3 - 58,8)	(47,8 - 51,7)	(43,4 - 48,7)
2006	55,6	59,1	52,2	52,7	74,8	63,0	53,5	42,9	61,3	55,7	47,0
	(54,0 - 57,2)	(56,9 - 61,3)	(49,9 - 54,4)	(48,7 - 56,6)	(71,7 - 78,0)	(59,2 - 66,8)	(50,0 - 57,0)	(39,7 - 46,1)	(59,6 - 63,1)	(52,8 - 58,5)	(43,1 - 50,9)
2008	53,2	55,8	50,5	53,6	68,3	63,2	48,0	41,7	60,4	52,1	44,4
	(51,6 - 54,7)	(53,6 - 58,1)	(48,4 - 52,7)	(49,7 - 57,4)	(64,4 - 72,3)	(60,2 - 66,3)	(45,0 - 51,0)	(38,6 - 44,7)	(58,1 - 62,8)	(49,7 - 54,6)	(41,0 - 47,7)
2010	36,1	40,4	31,8	33,8	52,1	42,4	35,7	27,0	50,8	34,9	28,7
	(34,4 - 37,8)	(38,1 - 42,8)	(29,9 - 33,8)	(29,9 - 37,6)	(48,2 - 56,0)	(38,9 - 45,9)	(32,7 - 38,7)	(24,7 - 29,3)	(47,4 - 54,2)	(32,4 - 37,5)	(26,3 - 31,2)
2012	46,7	50,4	43,2	43,8	61,1	52,5	44,7	39,4	56,1	52,6	36,4
	(45,2 - 48,3)	(48,2 - 52,5)	(41,3 - 45,1)	(40,1 - 47,5)	(57,2 - 65,0)	(49,4 - 55,6)	(41,5 - 48,0)	(37,0 - 41,8)	(53,3 - 59,0)	(50,3 - 54,9)	(34,0 - 38,9)
2014	51,0	52,9	49,2	48,9	62,2	59,7	50,3	43,9	64,8	53,5	41,6
	(49,4 - 52,6)	(50,6 - 55,1)	(47,0 - 51,3)	(45,0 - 52,7)	(58,0 - 66,4)	(56,3 - 63,2)	(46,7 - 53,9)	(41,3 - 46,5)	(62,0 - 67,6)	(51,1 - 55,9)	(39,0 - 44,1)
2016	56,5	60,0	53,0	51,6	72,3	66,8	58,0	46,2	65,9	56,0	52,4
	(54,9 - 58,2)	(57,8 - 62,2)	(50,9 - 55,1)	(48,0 - 55,3)	(69,4 - 75,2)	(63,4 - 70,1)	(54,8 - 61,2)	(43,7 - 48,7)	(62,1 - 69,7)	(53,3 - 58,6)	(49,8 - 55,0)
2018	50,3	53,6	47,1	44,5	65,7	60,7	51,2	40,5	59,8	50,7	43,3
	(48,4 - 52,2)	(51,3 - 55,9)	(44,7 - 49,5)	(40,2 - 48,7)	(61,5 - 70,0)	(57,6 - 63,7)	(46,7 - 55,6)	(38,0 - 43,1)	(56,1 - 63,4)	(48,4 - 52,9)	(40,2 - 46,4)
2020	51,4	55,9	47,0	41,7	69,0	59,6	52,1	43,2	54,9	52,1	47,6
	(49,6 - 53,3)	(52,9 - 58,8)	(44,9 - 49,2)	(35,4 - 48,0)	(65,3 - 72,7)	(56,3 - 63,0)	(47,9 - 56,3)	(40,6 - 45,8)	(51,2 - 58,6)	(49,5 - 54,6)	(44,3 - 50,9)

COCAÍNA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	14,2	15,7	12,8	13,1	16,9	15,8	14,0	11,6	13,7	12,3	16,9
	(12,9 - 15,5)	(13,8 - 17,6)	(11,1 - 14,5)	(10,0 - 16,2)	(13,9 - 19,9)	(13,2 - 18,3)	(10,8 - 17,2)	(9,1 - 14,0)	(11,9 - 15,5)	(9,9 - 14,8)	(14,4 - 19,4)
1996	12,0	14,2	9,9	7,6	13,8	14,9	14,0	9,3			
	(10,9 - 13,1)	(12,6 - 15,8)	(8,6 - 11,3)	(5,7 - 9,5)	(11,3 - 16,4)	(12,6 - 17,2)	(11,0 - 16,9)	(7,4 - 11,2)			
1998	25,6	28,6	22,8	18,6	30,9	30,1	28,3	20,4	25,1	26,3	25,6
	(24,9 - 26,3)	(27,6 - 29,6)	(21,9 - 23,7)	(17,2 - 20,1)	(29,1 - 32,7)	(28,6 - 31,7)	(26,9 - 29,8)	(19,2 - 21,6)	(23,9 - 26,3)	(25,0 - 27,6)	(24,6 - 26,5)
2000	29,3	31,4	27,3	23,8	33,5	33,1	32,6	24,4	32,5	28,1	25,6
	(28,7 - 29,9)	(30,5 - 32,3)	(26,5 - 28,2)	(22,4 - 25,3)	(31,9 - 35,2)	(31,7 - 34,5)	(31,2 - 34,0)	(23,3 - 25,5)	(31,6 - 33,4)	(27,0 - 29,2)	(24,3 - 26,8)
2002	24,2	26,8	21,6	18,6	27,9	29,7	27,5	18,5	26,1	24,8	20,0
	(23,1 - 25,2)	(25,2 - 28,3)	(20,2 - 23,1)	(16,2 - 21,0)	(25,0 - 30,8)	(27,2 - 32,3)	(25,1 - 29,8)	(16,8 - 20,2)	(24,6 - 27,7)	(22,8 - 26,7)	(17,8 - 22,2)
2004	27,1	28,5	25,7	24,3	35,2	30,8	28,1	20,5	31,1	24,5	23,6
	(25,9 - 28,2)	(26,9 - 30,1)	(24,1 - 27,2)	(21,7 - 27,0)	(31,9 - 38,4)	(28,1 - 33,5)	(25,8 - 30,5)	(18,7 - 22,3)	(29,4 - 32,9)	(22,7 - 26,4)	(21,2 - 26,0)
2006	30,8	32,4	29,1	20,8	38,0	37,0	32,4	27,3	37,1	30,1	22,6
	(29,2 - 32,3)	(30,1 - 34,8)	(27,2 - 31,1)	(18,1 - 23,5)	(33,8 - 42,1)	(33,4 - 40,5)	(29,3 - 35,6)	(24,0 - 30,6)	(35,2 - 39,0)	(27,3 - 32,8)	(19,0 - 26,2)
2008	32,8	35,4	30,3	27,6	36,8	40,9	32,3	28,9	39,4	32,4	24,1
	(31,3 - 34,3)	(33,2 - 37,7)	(28,2 - 32,3)	(23,8 - 31,4)	(32,9 - 40,6)	(37,4 - 44,5)	(29,5 - 35,1)	(25,8 - 31,9)	(36,9 - 41,8)	(29,9 - 34,9)	(21,0 - 27,2)
2010	21,3	23,6	19,1	17,0	28,7	25,4	22,5	17,5	34,7	21,1	13,7
	(20,0 - 22,7)	(21,7 - 25,5)	(17,5 - 20,7)	(14,0 - 19,9)	(25,4 - 32,0)	(22,3 - 28,6)	(19,6 - 25,3)	(15,6 - 19,5)	(31,6 - 37,8)	(19,0 - 23,2)	(12,0 - 15,4)
2012	31,8	34,2	29,5	25,6	36,2	35,1	34,1	30,0	39,6	38,3	21,8
	(30,3 - 33,3)	(32,1 - 36,2)	(27,6 - 31,3)	(22,1 - 29,0)	(32,6 - 39,8)	(31,9 - 38,2)	(31,0 - 37,3)	(27,8 - 32,3)	(36,8 - 42,5)	(35,9 - 40,7)	(19,7 - 23,9)
2014	31,0	32,5	29,5	23,4	32,0	35,6	33,9	29,8	45,8	34,7	19,9
	(29,3 - 32,6)	(30,4 - 34,6)	(27,3 - 31,6)	(20,0 - 26,8)	(28,3 - 35,6)	(32,3 - 39,0)	(30,6 - 37,2)	(27,3 - 32,4)	(42,8 - 48,9)	(32,1 - 37,3)	(17,5 - 22,3)
2016	28,8	31,6	25,9	20,7	34,4	34,5	31,4	25,6	43,2	30,7	20,2
	(27,0 - 30,6)	(29,5 - 33,7)	(23,6 - 28,3)	(17,6 - 23,8)	(30,9 - 37,9)	(31,0 - 37,9)	(27,4 - 35,5)	(23,3 - 27,9)	(38,8 - 47,5)	(28,4 - 33,0)	(18,2 - 22,1)
2018	27,6	29,2	26,0	18,9	30,7	33,4	31,1	24,7	41,3	28,9	16,0
	(25,7 - 29,5)	(26,9 - 31,5)	(23,8 - 28,3)	(15,5 - 22,4)	(26,9 - 34,5)	(29,8 - 36,9)	(27,4 - 34,8)	(22,4 - 27,1)	(37,4 - 45,2)	(26,8 - 31,1)	(13,9 - 18,1)
2020	29,1	32,1	26,1	17,1	33,1	32,9	33,9	27,4	36,1	29,4	22,6*
	(27,0 - 31,2)	(29,2 - 35,0)	(24,1 - 28,1)	(12,9 - 21,3)	(28,5 - 37,7)	(29,3 - 36,5)	(29,2 - 38,5)	(25,0 - 29,8)	(32,1 - 40,1)	(26,4 - 32,4)	(19,7 - 25,5)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PASTA BASE

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	21,7	24,0	19,7	21,3	24,1	26,2	21,3	15,9	26,0	18,1	16,5
	(20,2 - 23,2)	(21,7 - 26,3)	(17,6 - 21,7)	(17,5 - 25,2)	(20,8 - 27,5)	(22,5 - 29,9)	(17,9 - 24,7)	(13,2 - 18,5)	(23,6 - 28,4)	(15,4 - 20,9)	(14,1 - 18,9)
1996	20,2	23,1	17,4	14,2	24,6	25,7	21,5	14,7			
	(18,8 - 21,5)	(21,1 - 25,1)	(15,7 - 19,2)	(11,4 - 17,1)	(21,2 - 28,0)	(22,7 - 28,7)	(18,1 - 24,9)	(12,3 - 17,1)			
1998	33,5	37,3	29,9	26,3	40,3	39,5	36,7	25,6	38,2	37,2	29,0
	(32,8 - 34,2)	(36,2 - 38,4)	(28,9 - 30,8)	(24,7 - 27,9)	(38,4 - 42,2)	(37,9 - 41,2)	(35,0 - 38,3)	(24,4 - 26,9)	(36,9 - 39,6)	(35,6 - 38,7)	(28,0 - 30,0)
2000	36,1	38,4	33,9	28,5	40,4	41,7	40,2	30,3	42,3	34,9	27,6
	(35,5 - 36,8)	(37,4 - 39,4)	(33,0 - 34,8)	(27,0 - 30,1)	(38,8 - 42,1)	(40,2 - 43,2)	(38,8 - 41,6)	(29,1 - 31,5)	(41,4 - 43,3)	(33,7 - 36,1)	(26,3 - 28,8)
2002	32,9	35,0	30,9	23,7	35,8	39,9	38,5	27,5	38,5	33,4	22,6
	(31,8 - 34,1)	(33,4 - 36,6)	(29,4 - 32,5)	(21,1 - 26,3)	(32,8 - 38,7)	(37,3 - 42,5)	(36,1 - 40,9)	(25,5 - 29,5)	(36,9 - 40,2)	(31,3 - 35,5)	(20,5 - 24,7)
2004	34,6	36,4	32,8	28,5	40,6	38,6	38,4	29,0	42,5	32,1	24,4
	(33,4 - 35,7)	(34,8 - 38,1)	(31,2 - 34,4)	(25,7 - 31,2)	(37,4 - 43,9)	(35,9 - 41,3)	(35,8 - 41,0)	(27,1 - 31,0)	(40,7 - 44,3)	(30,2 - 34,1)	(22,2 - 26,7)
2006	37,2	39,2	35,3	24,7	43,1	45,0	39,6	34,7	47,1	37,0	23,3
	(35,7 - 38,8)	(36,8 - 41,5)	(33,3 - 37,4)	(21,9 - 27,5)	(39,0 - 47,2)	(41,4 - 48,6)	(36,3 - 42,9)	(31,4 - 37,9)	(45,2 - 49,0)	(34,1 - 39,8)	(19,8 - 26,9)
2008	35,2	36,6	33,8	29,0	36,6	44,3	36,7	31,2	44,2	34,7	23,0
	(33,7 - 36,7)	(34,4 - 38,9)	(31,7 - 35,9)	(25,1 - 32,9)	(32,7 - 40,4)	(40,7 - 47,8)	(33,8 - 39,7)	(28,2 - 34,3)	(41,6 - 46,7)	(32,2 - 37,2)	(19,9 - 26,0)
2010	24,6	27,5	21,8	20,0	32,4	28,2	27,0	20,4	41,6	24,3	14,9
	(23,2 - 26,0)	(25,5 - 29,4)	(20,2 - 23,4)	(16,8 - 23,1)	(28,9 - 35,8)	(25,0 - 31,4)	(24,0 - 29,9)	(18,3 - 22,4)	(38,3 - 45,0)	(22,1 - 26,5)	(13,3 - 16,4)
2012	32,1	34,8	29,4	24,9	37,0	34,4	35,1	30,6	41,7	39,0	20,7
	(30,5 - 33,6)	(32,7 - 36,9)	(27,6 - 31,3)	(21,4 - 28,4)	(33,2 - 40,7)	(31,3 - 37,5)	(32,0 - 38,3)	(28,3 - 32,9)	(38,8 - 44,6)	(36,6 - 41,5)	(18,5 - 22,9)
2014	31,2	32,5	29,9	22,5	30,0	34,6	34,2	31,8	48,9	34,9	18,7
	(29,5 - 32,9)	(30,4 - 34,7)	(27,7 - 32,0)	(19,1 - 25,8)	(26,6 - 33,4)	(31,0 - 38,1)	(31,1 - 37,4)	(29,2 - 34,4)	(45,7 - 52,1)	(32,3 - 37,5)	(16,4 - 21,0)
2016	27,2	30,5	23,8	18,4	28,5	31,8	31,3	25,7	44,4	30,0	16,3
	(25,1 - 29,2)	(28,2 - 32,8)	(21,4 - 26,2)	(15,2 - 21,6)	(25,2 - 31,9)	(28,2 - 35,4)	(27,2 - 35,5)	(23,3 - 28,1)	(39,8 - 49,0)	(27,4 - 32,6)	(14,4 - 18,2)
2018	27,4	28,6	26,3	19,6	27,2	31,9	32,0	25,7	42,4	28,7	15,0
	(25,5 - 29,3)	(26,4 - 30,8)	(24,0 - 28,5)	(15,6 - 23,5)	(23,5 - 30,9)	(28,7 - 35,2)	(28,0 - 36,0)	(23,3 - 28,1)	(38,6 - 46,2)	(26,5 - 31,0)	(12,9 - 17,1)
2020	28,0	31,7	24,3	16,1	30,9	30,0	31,3	28,5	35,5*	29,5	19,5*
	(25,8 - 30,2)	(28,9 - 34,6)	(22,1 - 26,6)	(12,1 - 20,1)	(26,2 - 35,5)	(26,2 - 33,9)	(27,6 - 35,1)	(26,0 - 30,9)	(31,5 - 39,6)	(26,2 - 32,9)	(16,9 - 22,1)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ÉXTASIS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	9,6	9,7	9,4	7,4	9,3	11,4	10,8	8,8	9,9	8,9	9,7
	(8,8 - 10,3)	(8,6 - 10,7)	(8,4 - 10,4)	(5,7 - 9,1)	(7,4 - 11,2)	(9,4 - 13,3)	(9,2 - 12,3)	(7,5 - 10,0)	(8,9 - 11,0)	(7,7 - 10,1)	(8,0 - 11,4)
2004	11,8	11,7	11,8	10,5	13,8	12,8	12,8	9,9	12,4	10,4	12,6
	(11,0 - 12,6)	(10,6 - 12,9)	(10,6 - 13,0)	(8,5 - 12,5)	(11,3 - 16,4)	(10,9 - 14,7)	(11,0 - 14,5)	(8,6 - 11,2)	(11,2 - 13,7)	(9,0 - 11,8)	(10,7 - 14,4)
2006	16,3	15,4	17,1	9,4	18,3	18,8	17,9	16,5	19,0	15,7	13,1
	(15,0 - 17,6)	(13,4 - 17,5)	(15,5 - 18,7)	(7,7 - 11,1)	(15,5 - 21,1)	(16,0 - 21,6)	(15,3 - 20,5)	(13,2 - 19,7)	(17,4 - 20,6)	(13,5 - 17,9)	(10,0 - 16,2)
2008	13,4	13,1	13,6	10,0	14,7	17,0	13,2	12,4	14,9	12,0	13,3
	(12,2 - 14,6)	(11,4 - 14,9)	(11,9 - 15,2)	(7,3 - 12,6)	(11,7 - 17,7)	(14,6 - 19,5)	(11,0 - 15,4)	(9,6 - 15,1)	(13,1 - 16,8)	(10,0 - 14,0)	(10,7 - 16,0)
2010	7,3	8,0	6,6	6,1	10,1	8,7	7,3	6,0	9,8	7,5	5,7
	(6,5 - 8,2)	(6,8 - 9,3)	(5,6 - 7,6)	(3,9 - 8,2)	(7,9 - 12,3)	(6,8 - 10,6)	(5,7 - 8,9)	(4,7 - 7,4)	(7,8 - 11,7)	(6,1 - 9,0)	(4,6 - 6,7)
2012	17,3	18,4	16,2	15,3	20,0	17,2	17,8	16,7	18,2	21,3	13,2
	(16,0 - 18,6)	(16,7 - 20,1)	(14,6 - 17,8)	(12,2 - 18,3)	(17,0 - 23,1)	(14,7 - 19,7)	(15,3 - 20,2)	(14,7 - 18,6)	(15,7 - 20,8)	(19,1 - 23,5)	(11,3 - 15,0)
2014	13,1	13,0	13,2	9,6	12,1	14,4	13,8	13,8	17,9	13,7	10,1
	(11,8 - 14,4)	(11,5 - 14,5)	(11,4 - 15,0)	(7,0 - 12,2)	(9,7 - 14,5)	(12,2 - 16,7)	(11,6 - 16,0)	(11,5 - 16,1)	(15,7 - 20,2)	(11,6 - 15,7)	(8,0 - 12,2)
2016	12,3	13,9	10,7	7,7	15,9	14,4	12,1	11,6	16,6	12,7	9,8
	(11,2 - 13,4)	(12,3 - 15,4)	(9,2 - 12,2)	(5,7 - 9,8)	(13,2 - 18,7)	(11,9 - 16,8)	(10,2 - 14,0)	(9,8 - 13,3)	(14,5 - 18,7)	(10,8 - 14,7)	(8,2 - 11,4)
2018	11,3	10,8	11,9	9,1	13,1	12,7	12,6	10,1	15,9	11,2	8,0
	(9,8 - 12,8)	(9,1 - 12,5)	(10,1 - 13,7)	(6,5 - 11,8)	(10,4 - 15,8)	(10,5 - 15,0)	(9,0 - 16,2)	(8,4 - 11,7)	(11,8 - 20,0)	(9,5 - 12,8)	(6,4 - 9,7)
2020	17,0*	18,7*	15,3*	13,5	23,3*	17,1*	18,2*	15,1*	22,7*	15,9*	13,7*
	(15,4 - 18,7)	(16,3 - 21,2)	(13,6 - 17,1)	(9,5 - 17,6)	(19,2 - 27,4)	(14,6 - 19,6)	(14,7 - 21,7)	(13,2 - 16,9)	(18,8 - 26,6)	(13,5 - 18,3)	(11,5 - 15,8)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

OFRECIMIENTO RECIENTE DE DROGAS

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2020.
Proporción que declara haber recibido oferta de drogas durante los últimos 12 meses

Pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de estas drogas, ya sea para comprar o probar?

MARIHUANA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	13,9	19,9	8,1	19,9	31,1	17,1	7,2	2,2	14,3	12,5	14,6
	(13,1 - 14,7)	(18,6 - 21,2)	(7,1 - 9,1)	(17,5 - 22,2)	(28,4 - 33,9)	(15,0 - 19,2)	(5,9 - 8,6)	(1,5 - 2,9)	(13,1 - 15,5)	(11,1 - 13,9)	(12,8 - 16,4)
2004	15,1	20,0	10,4	21,7	35,3	17,4	7,9	2,8	15,6	13,2	16,7
	(14,2 - 16,0)	(18,6 - 21,3)	(9,2 - 11,5)	(19,3 - 24,2)	(32,2 - 38,4)	(15,2 - 19,5)	(6,4 - 9,3)	(2,1 - 3,5)	(14,3 - 17,0)	(11,8 - 14,6)	(14,7 - 18,7)
2006	16,0	20,9	11,1	21,5	33,2	20,1	10,6	3,9	14,7	14,8	19,1
	(14,8 - 17,2)	(19,0 - 22,8)	(9,6 - 12,7)	(18,2 - 24,8)	(29,2 - 37,2)	(17,2 - 23,1)	(8,3 - 13,0)	(2,7 - 5,1)	(13,4 - 16,0)	(12,8 - 16,9)	(15,9 - 22,3)
2008	15,8	21,0	10,6	25,2	34,7	18,6	7,3	3,8	17,1	13,9	16,9
	(14,5 - 17,0)	(19,0 - 23,0)	(9,0 - 12,2)	(21,7 - 28,7)	(30,4 - 39,0)	(15,8 - 21,3)	(5,6 - 8,9)	(2,0 - 5,7)	(15,0 - 19,2)	(11,8 - 16,0)	(14,2 - 19,6)
2010	10,3	13,9	6,7	13,6	25,2	12,8	6,7	2,3	12,4	8,5	11,1
	(9,3 - 11,2)	(12,5 - 15,4)	(5,7 - 7,7)	(11,2 - 16,0)	(21,4 - 29,1)	(10,8 - 14,9)	(5,2 - 8,1)	(1,7 - 3,0)	(10,2 - 14,5)	(7,2 - 9,8)	(9,4 - 12,7)
2012	15,7	20,7	10,7	22,9	32,7	18,9	8,3	5,8	16,5	15,8	15,1
	(14,5 - 16,8)	(18,9 - 22,6)	(9,4 - 12,0)	(19,3 - 26,5)	(29,1 - 36,3)	(16,5 - 21,4)	(6,7 - 9,9)	(4,4 - 7,1)	(14,7 - 18,4)	(13,9 - 17,7)	(13,1 - 17,0)
2014	18,6	22,2	15,2	25,3	35,4	27,5	13,9	8,2	20,2	17,7	18,7
	(17,4 - 19,8)	(20,3 - 24,0)	(13,7 - 16,7)	(21,8 - 28,8)	(31,7 - 39,0)	(24,4 - 30,5)	(11,2 - 16,5)	(6,6 - 9,9)	(17,9 - 22,5)	(15,8 - 19,5)	(16,6 - 20,8)
2016	22,9	28,2	17,6	26,2	47,7	32,0	16,2	10,2	21,9	20,2	25,6
	(21,1 - 24,6)	(26,1 - 30,2)	(15,4 - 19,8)	(22,6 - 29,8)	(43,2 - 52,2)	(28,4 - 35,7)	(13,7 - 18,7)	(8,0 - 12,3)	(19,0 - 24,9)	(17,8 - 22,6)	(22,9 - 28,3)
2018	21,4	27,4	15,5	24,0	45,8	30,4	19,0	7,3	20,9	20,2	23,1
	(20,1 - 22,7)	(25,5 - 29,3)	(14,0 - 17,0)	(20,2 - 27,9)	(41,9 - 49,7)	(27,1 - 33,7)	(15,9 - 22,1)	(6,2 - 8,4)	(18,2 - 23,6)	(18,3 - 22,1)	(20,8 - 25,3)
2020	17,6*	23,0*	12,2*	11,9*	41,8	25,7*	16,7	5,9	17,0*	17,9	17,6*
	(16,1 - 19,0)	(20,9 - 25,2)	(10,3 - 14,0)	(8,7 - 15,0)	(37,6 - 45,9)	(22,5 - 29,0)	(13,4 - 19,9)	(4,7 - 7,1)	(14,7 - 19,3)	(16,2 - 19,7)	(14,7 - 20,5)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

COCAÍNA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	4,4	7,1	1,8	3,1	9,6	7,1	3,3	0,9	4,6	4,5	3,8
	(3,9 - 4,9)	(6,2 - 8,0)	(1,3 - 2,2)	(2,1 - 4,0)	(7,9 - 11,3)	(5,7 - 8,5)	(2,3 - 4,4)	(0,4 - 1,4)	(3,9 - 5,3)	(3,5 - 5,5)	(2,9 - 4,7)
2004	5,2	7,7	2,9	3,7	12,2	8,4	3,7	1,1	5,6	4,6	5,3
	(4,6 - 5,8)	(6,7 - 8,6)	(2,2 - 3,5)	(2,5 - 4,9)	(10,0 - 14,3)	(6,6 - 10,1)	(2,6 - 4,7)	(0,6 - 1,5)	(4,7 - 6,5)	(3,7 - 5,5)	(4,0 - 6,7)
2006	5,0	7,4	2,6	3,6	8,6	8,5	5,1	1,4	5,5	5,2	4,0
	(4,3 - 5,6)	(6,3 - 8,5)	(1,9 - 3,4)	(2,5 - 4,6)	(6,7 - 10,6)	(6,4 - 10,6)	(3,3 - 6,8)	(0,9 - 1,9)	(4,6 - 6,4)	(3,8 - 6,6)	(2,9 - 5,1)
2008	6,4	9,6	3,2	6,2	12,1	9,0	4,3	3,1	7,5	6,0	5,5
	(5,5 - 7,2)	(8,1 - 11,1)	(2,5 - 4,0)	(4,5 - 7,9)	(9,8 - 14,4)	(6,9 - 11,0)	(2,9 - 5,7)	(1,3 - 4,9)	(6,2 - 8,7)	(4,5 - 7,6)	(4,0 - 7,0)
2010	3,0	4,8	1,1	2,2	6,0	5,4	2,6	1,0	4,5	2,3	2,8
	(2,5 - 3,4)	(4,0 - 5,7)	(0,8 - 1,5)	(1,3 - 3,1)	(4,3 - 7,7)	(3,8 - 6,9)	(1,7 - 3,5)	(0,5 - 1,4)	(3,2 - 5,8)	(1,7 - 3,0)	(2,1 - 3,4)
2012	4,8	7,1	2,5	3,9	9,8	7,5	2,6	2,6	6,3	5,2	3,5
	(4,2 - 5,3)	(6,1 - 8,1)	(1,8 - 3,1)	(2,5 - 5,4)	(7,7 - 11,8)	(5,7 - 9,3)	(1,7 - 3,5)	(1,8 - 3,4)	(5,1 - 7,4)	(4,2 - 6,3)	(2,6 - 4,4)
2014	5,2	7,2	3,2	4,7	9,1	7,9	4,9	2,7	7,5	5,6	3,6
	(4,5 - 5,9)	(6,1 - 8,3)	(2,4 - 3,9)	(2,8 - 6,6)	(7,1 - 11,2)	(5,8 - 9,9)	(3,4 - 6,3)	(2,0 - 3,4)	(5,9 - 9,1)	(4,3 - 6,8)	(2,8 - 4,4)
2016	6,1	9,0	3,2	3,8	11,6	9,5	5,6	3,3	8,1	6,4	4,9
	(5,3 - 6,9)	(7,6 - 10,4)	(2,4 - 4,0)	(2,2 - 5,3)	(9,3 - 13,9)	(7,4 - 11,5)	(3,9 - 7,4)	(1,5 - 5,1)	(6,0 - 10,2)	(5,2 - 7,6)	(3,8 - 5,9)
2018	6,4	9,6	3,1	3,2	12,6	10,1	7,4	2,6	7,4	6,7	5,0
	(5,6 - 7,1)	(8,3 - 11,0)	(2,4 - 3,9)	(2,1 - 4,3)	(9,9 - 15,2)	(7,7 - 12,4)	(5,2 - 9,5)	(1,9 - 3,3)	(5,7 - 9,1)	(5,4 - 8,0)	(4,0 - 6,1)
2020	3,6*	5,9*	1,4*	0,8*	7,7*	4,6*	4,2*	2,1	4,5*	3,6*	2,9*
	(2,9 - 4,3)	(4,6 - 7,1)	(1,0 - 1,8)	(0,3 - 1,4)	(5,0 - 10,4)	(3,2 - 6,0)	(2,7 - 5,6)	(1,4 - 2,8)	(3,2 - 5,8)	(2,8 - 4,4)	(1,6 - 4,1)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PASTA BASE

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	2,8	4,7	1,0	2,8	5,7	3,9	2,4	0,7	4,1	2,1	1,4
	(2,5 - 3,2)	(4,1 - 5,4)	(0,7 - 1,3)	(1,9 - 3,6)	(4,5 - 7,0)	(2,9 - 4,9)	(1,7 - 3,1)	(0,3 - 1,1)	(3,5 - 4,8)	(1,6 - 2,7)	(0,8 - 1,9)
2004	3,9	5,7	2,2	4,8	7,9	4,7	3,1	1,0	5,6	3,1	2,0
	(3,4 - 4,4)	(4,9 - 6,5)	(1,7 - 2,7)	(3,6 - 6,0)	(6,2 - 9,6)	(3,4 - 6,1)	(2,2 - 4,0)	(0,6 - 1,3)	(4,7 - 6,5)	(2,4 - 3,8)	(1,3 - 2,8)
2006	4,0	6,1	2,0	3,5	6,0	5,4	4,3	2,0	5,5	3,9	2,0
	(3,5 - 4,5)	(5,2 - 7,0)	(1,5 - 2,4)	(2,5 - 4,5)	(4,7 - 7,3)	(4,0 - 6,9)	(2,8 - 5,8)	(1,4 - 2,5)	(4,7 - 6,4)	(2,9 - 5,0)	(1,3 - 2,6)
2008	3,9	5,8	2,1	4,7	7,7	4,4	3,3	1,5	5,4	3,4	2,7
	(3,4 - 4,5)	(4,9 - 6,7)	(1,5 - 2,7)	(3,1 - 6,2)	(5,8 - 9,6)	(3,4 - 5,5)	(2,2 - 4,4)	(0,8 - 2,2)	(4,4 - 6,4)	(2,5 - 4,2)	(1,8 - 3,6)
2010	2,6	4,2	1,2	2,5	5,5	3,6	1,9	1,3	4,9	2,1	1,9
	(2,2 - 3,1)	(3,3 - 5,0)	(0,8 - 1,6)	(1,6 - 3,3)	(3,9 - 7,2)	(2,3 - 5,0)	(1,2 - 2,7)	(0,7 - 1,8)	(3,7 - 6,1)	(1,5 - 2,7)	(1,3 - 2,6)
2012	2,8	4,4	1,2	2,6	5,0	4,1	1,7	1,8	4,5	3,1	1,5
	(2,4 - 3,2)	(3,7 - 5,2)	(0,8 - 1,5)	(1,6 - 3,6)	(3,4 - 6,5)	(2,8 - 5,4)	(1,1 - 2,2)	(1,2 - 2,3)	(3,6 - 5,4)	(2,4 - 3,9)	(0,9 - 2,1)
2014	2,7	4,0	1,4	2,7	3,8	3,7	2,6	1,8	4,7	2,8	1,5
	(2,2 - 3,1)	(3,2 - 4,8)	(1,0 - 1,8)	(1,6 - 3,9)	(2,4 - 5,2)	(2,4 - 5,0)	(1,7 - 3,4)	(1,3 - 2,4)	(3,7 - 5,7)	(1,9 - 3,6)	(1,0 - 2,0)
2016	2,8	4,4	1,2	2,6	4,8	3,3	3,0	1,7	5,2	3,2	1,3
	(2,3 - 3,3)	(3,5 - 5,4)	(0,7 - 1,7)	(1,2 - 4,0)	(3,3 - 6,4)	(2,0 - 4,7)	(1,5 - 4,5)	(1,0 - 2,5)	(3,3 - 7,1)	(2,4 - 4,1)	(0,9 - 1,8)
2018	3,0	4,3	1,7	2,4	4,4	3,9	3,9	1,7	4,0	3,4	1,7
	(2,6 - 3,4)	(3,5 - 5,1)	(1,3 - 2,1)	(1,4 - 3,5)	(3,2 - 5,7)	(2,8 - 5,0)	(2,7 - 5,1)	(1,2 - 2,2)	(3,1 - 4,9)	(2,6 - 4,1)	(1,2 - 2,3)
2020	1,5*	2,5*	0,4*	0,3*	2,5*	1,4*	2,5	1,0*	2,2*	1,6*	0,7*
	(1,1 - 1,8)	(1,8 - 3,2)	(0,3 - 0,6)	(0,0 - 0,8)	(1,1 - 3,9)	(0,8 - 2,1)	(1,3 - 3,6)	(0,5 - 1,5)	(1,3 - 3,1)	(1,0 - 2,2)	(0,3 - 1,0)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ÉXTASIS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	0,8	1,4	0,4	1,0	1,9	1,4	0,4	<0,1	0,7	0,6	1,4
	(0,6 - 1,1)	(1,0 - 1,7)	(0,2 - 0,6)	(0,5 - 1,5)	(1,1 - 2,6)	(0,7 - 2,1)	(0,1 - 0,7)	(0,0 - 0,1)	(0,4 - 0,9)	(0,3 - 1,0)	(0,8 - 2,0)
2004	1,2	1,6	0,8	1,8	2,3	2,0	0,4	0,1	1,0	1,0	1,7
	(0,9 - 1,5)	(1,1 - 2,0)	(0,5 - 1,1)	(0,8 - 2,8)	(1,4 - 3,2)	(1,1 - 2,8)	(0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,3)	(0,6 - 1,4)	(0,6 - 1,4)	(0,9 - 2,5)
2006	1,9	2,3	1,5	1,9	3,7	3,0	1,3	0,6	1,9	2,1	1,7
	(1,5 - 2,3)	(1,7 - 2,9)	(1,0 - 2,0)	(1,2 - 2,5)	(2,4 - 5,1)	(1,6 - 4,4)	(0,7 - 1,9)	(0,3 - 0,9)	(1,3 - 2,4)	(1,3 - 2,9)	(1,1 - 2,4)
2008	1,7	2,4	1,1	1,8	4,0	2,1	1,1	0,6	1,7	1,2	2,5
	(1,3 - 2,1)	(1,8 - 3,0)	(0,6 - 1,6)	(0,7 - 2,9)	(2,6 - 5,5)	(1,3 - 2,9)	(0,4 - 1,8)	(0,2 - 1,0)	(1,2 - 2,3)	(0,7 - 1,8)	(1,5 - 3,5)
2010	0,7	0,9	0,4	0,2	2,1	0,8	0,7	0,1	0,7	0,6	0,7
	(0,5 - 0,9)	(0,6 - 1,3)	(0,2 - 0,5)	(<0,1 - 0,4)	(1,1 - 3,1)	(0,3 - 1,3)	(0,2 - 1,3)	(<0,1 - 0,2)	(0,3 - 1,1)	(0,3 - 1,0)	(0,3 - 1,0)
2012	1,2	1,8	0,6	1,1	2,3	1,8	0,5	0,7	1,5	0,9	1,3
	(0,9 - 1,5)	(1,2 - 2,3)	(0,4 - 0,8)	(0,5 - 1,8)	(1,2 - 3,4)	(0,9 - 2,6)	(0,2 - 0,8)	(0,3 - 1,2)	(0,9 - 2,1)	(0,5 - 1,2)	(0,7 - 1,9)
2014	1,5	2,2	0,8	1,1	3,1	1,7	1,1	1,1	1,8	1,1	1,7
	(1,0 - 2,0)	(1,2 - 3,1)	(0,4 - 1,2)	(0,4 - 1,8)	(1,8 - 4,5)	(0,9 - 2,5)	(0,4 - 1,8)	(<0,1 - 2,1)	(1,1 - 2,5)	(0,6 - 1,7)	(0,6 - 2,8)
2016	1,8	2,3	1,3	0,9	4,5	2,4	1,3	1,0	2,1	2,3	1,3
	(1,4 - 2,2)	(1,6 - 3,0)	(0,8 - 1,9)	(0,4 - 1,4)	(2,8 - 6,3)	(1,2 - 3,7)	(0,4 - 2,2)	(0,3 - 1,7)	(1,0 - 3,1)	(1,5 - 3,1)	(0,8 - 1,8)
2018	1,9	2,9	0,9	1,3	4,1	3,0	2,4	0,4	1,8	1,4	2,5
	(1,4 - 2,4)	(1,9 - 3,9)	(0,7 - 1,2)	(0,7 - 1,8)	(3,0 - 5,3)	(1,9 - 4,1)	(0,1 - 4,7)	(0,2 - 0,6)	(1,1 - 2,6)	(1,0 - 1,8)	(1,2 - 3,8)
2020	2,4	3,9	0,8	2,2	6,6	3,1	1,7	0,6	3,6*	2,0	1,8
	(1,8 - 3,0)	(2,8 - 5,1)	(0,6 - 1,1)	(0,5 - 4,0)	(3,8 - 9,5)	(1,6 - 4,6)	(0,7 - 2,8)	(0,1 - 1,1)	(2,1 - 5,1)	(1,3 - 2,8)	(0,6 - 2,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

LUGAR DE ÚLTIMO OFRECIMIENTO DE MARIHUANA

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2020.

Todas las categorías incluidas

Preguntas: Si le han ofrecido marihuana, ¿cuándo fue la última vez que se la ofrecieron? ¿En cuál de los siguientes lugares se la ofrecieron?

CASA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	7,7	6,7	9,5	6,7	7,9	8,5	12,1	4,6	3,1	5,1	12,8
	(4,4 - 11,0)	(1,8 - 11,6)	(5,6 - 13,4)	(0,0 - 14,9)	(0,8 - 14,9)	(4,0 - 13,0)	(2,8 - 21,4)	(1,3 - 7,9)	(1,1 - 5,1)	(2,8 - 7,5)	(5,1 - 20,4)
2014	6,5	5,3	8,2	3,5	6,8	8,1	5,7	7,4	4,2	4,7	9,3
	(4,9 - 8,1)	(3,2 - 7,4)	(5,9 - 10,4)	(0,0 - 7,4)	(4,1 - 9,5)	(5,3 - 10,9)	(2,2 - 9,2)	(2,2 - 12,7)	(2,3 - 6,2)	(2,9 - 6,4)	(6,1 - 12,6)
2016	9,8	9,3	10,7	2,0	10,9	11,5	9,3	13,7	6,2	8,1	12,5
	(7,0 - 12,6)	(5,9 - 12,8)	(7,6 - 13,8)	(0,5 - 3,5)	(4,6 - 17,1)	(7,5 - 15,4)	(4,0 - 14,5)	(7,5 - 20,0)	(3,7 - 8,8)	(4,5 - 11,8)	(7,2 - 17,8)
2018	7,5	5,8	10,3	1,5	4,3	7,9	10,9	17,1	9,7	5,0	8,3
	(5,8 - 9,1)	(3,8 - 7,9)	(7,6 - 13,1)	(0,2 - 2,7)	(1,8 - 6,8)	(5,2 - 10,6)	(6,7 - 15,1)	(9,8 - 24,5)	(5,7 - 13,7)	(3,6 - 6,5)	(5,2 - 11,3)
2020	12,8*	11,0*	16,2*	2,3	15,8*	15,1*	9,5	10,7	13,5	12,0*	13,3
	(10,0 - 15,5)	(7,0 - 14,9)	(12,5 - 19,9)	(0,0 - 5,7)	(9,5 - 22,1)	(10,4 - 19,8)	(4,7 - 14,3)	(6,0 - 15,4)	(8,1 - 19,0)	(8,3 - 15,7)	(7,4 - 19,1)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

BARRIO O COMUNA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	32,7	37,0	24,6	29,1	30,8	35,2	32,3	42,2	52,8	33,0	20,6
	(29,4 - 36,1)	(32,4 - 41,6)	(19,6 - 29,7)	(21,6 - 36,7)	(25,0 - 36,6)	(28,1 - 42,3)	(24,0 - 40,7)	(30,8 - 53,6)	(46,6 - 58,9)	(27,0 - 39,0)	(15,7 - 25,5)
2014	29,6	32,3	25,8	37,0	22,2	28,6	32,3	34,4	46,3	36,0	14,9
	(26,6 - 32,6)	(28,2 - 36,4)	(21,6 - 30,0)	(28,7 - 45,3)	(17,8 - 26,5)	(21,8 - 35,5)	(24,7 - 39,9)	(26,3 - 42,5)	(40,0 - 52,6)	(30,7 - 41,3)	(11,4 - 18,4)
2016	25,8	29,4	20,0	28,0	21,0	24,5	30,0	31,8	43,0	30,0	15,8
	(22,7 - 28,8)	(25,3 - 33,4)	(15,6 - 24,4)	(21,2 - 34,8)	(16,3 - 25,7)	(17,9 - 31,0)	(21,4 - 38,5)	(23,0 - 40,6)	(36,1 - 49,9)	(24,6 - 35,4)	(12,4 - 19,1)
2018	31,0	34,8	24,2	35,0	28,6	30,7	28,9	36,0	51,5	33,5	14,5
	(26,7 - 35,2)	(30,1 - 39,6)	(18,7 - 29,7)	(24,1 - 45,9)	(22,4 - 34,8)	(23,2 - 38,1)	(20,0 - 37,7)	(28,4 - 43,6)	(43,0 - 59,9)	(27,3 - 39,7)	(10,7 - 18,2)
2020	31,3	34,3	25,7	39,3	31,4	28,0	28,5	36,3	43,9	25,5*	28,6*
	(27,5 - 35,1)	(29,3 - 39,2)	(20,5 - 31,0)	(26,5 - 52,1)	(24,0 - 38,8)	(21,9 - 34,1)	(19,5 - 37,5)	(27,9 - 44,7)	(35,5 - 52,4)	(20,9 - 30,0)	(21,4 - 35,8)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

LUGAR DE ESTUDIO O TRABAJO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	15,2	14,6	16,3	12,8	19,2	9,5	16,1	16,4	13,1	15,5	16,0
	(12,6 - 17,7)	(11,6 - 17,6)	(11,5 - 21,0)	(8,5 - 17,1)	(14,2 - 24,2)	(6,2 - 12,9)	(9,6 - 22,7)	(7,2 - 25,5)	(9,5 - 16,8)	(11,0 - 20,1)	(11,8 - 20,2)
2014	16,9	18,4	14,8	14,4	19,7	10,6	15,9	24,0	14,7	16,6	18,4
	(13,7 - 20,1)	(13,8 - 23,0)	(11,0 - 18,6)	(10,2 - 18,6)	(14,5 - 24,8)	(7,3 - 13,9)	(7,5 - 24,3)	(11,2 - 36,8)	(9,3 - 20,2)	(13,0 - 20,2)	(11,9 - 24,8)
2016	18,8	18,5	19,4	23,2	22,0	13,1	12,9	21,1	16,4	17,0	21,1
	(16,0 - 21,6)	(15,3 - 21,7)	(15,2 - 23,6)	(15,2 - 31,1)	(17,8 - 26,2)	(7,7 - 18,5)	(7,8 - 18,1)	(11,1 - 31,0)	(12,4 - 20,3)	(12,7 - 21,2)	(16,3 - 25,8)
2018	17,4	16,1	19,6	26,6	19,4	14,9	13,7	11,4	14,2	19,1	17,7
	(14,9 - 19,8)	(13,3 - 18,9)	(15,0 - 24,1)	(18,2 - 34,9)	(14,9 - 23,8)	(10,0 - 19,8)	(7,6 - 19,8)	(7,6 - 15,3)	(10,1 - 18,3)	(14,8 - 23,4)	(13,9 - 21,5)
2020	8,0*	9,5*	5,2*	6,1*	6,3*	6,6*	14,7	8,6	6,6*	8,4*	8,7*
	(5,5 - 10,5)	(6,0 - 13,0)	(2,7 - 7,7)	(1,4 - 10,8)	(3,3 - 9,2)	(3,0 - 10,1)	(3,8 - 25,6)	(4,4 - 12,8)	(3,2 - 10,0)	(5,8 - 10,9)	(2,6 - 14,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ALREDEDORES LUGAR DE ESTUDIO O TRABAJO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	6,3	6,5	6,0	13,3	3,4	4,0	7,2	3,1	5,4	5,3	7,9
	(4,2 - 8,4)	(3,7 - 9,3)	(2,8 - 9,2)	(6,4 - 20,2)	(1,5 - 5,4)	(1,6 - 6,4)	(0,5 - 13,9)	(0,4 - 5,8)	(2,4 - 8,3)	(2,7 - 7,8)	(3,4 - 12,3)
2014	4,7	4,9	4,4	5,3	6,0	2,7	4,3	4,7	4,5	5,5	4,2
	(3,5 - 5,9)	(3,2 - 6,6)	(2,5 - 6,3)	(2,1 - 8,5)	(3,1 - 9,0)	(1,3 - 4,2)	(1,0 - 7,7)	(1,8 - 7,5)	(2,1 - 6,8)	(3,2 - 7,8)	(2,3 - 6,0)
2016	7,1	6,3	8,4	13,5	7,6	4,3	5,5	5,1	4,9	7,4	7,8
	(5,5 - 8,7)	(4,0 - 8,6)	(5,1 - 11,7)	(6,7 - 20,3)	(4,0 - 11,3)	(1,6 - 7,0)	(1,6 - 9,4)	(2,2 - 7,9)	(2,4 - 7,5)	(4,2 - 10,5)	(4,9 - 10,7)
2018	6,3	6,8	5,4	7,0	8,3	5,9	3,9	4,6	3,5	6,9	7,8
	(4,7 - 7,9)	(4,5 - 9,2)	(3,6 - 7,2)	(3,9 - 10,1)	(4,9 - 11,7)	(2,7 - 9,0)	(1,4 - 6,4)	(1,8 - 7,5)	(1,7 - 5,3)	(3,5 - 10,3)	(5,1 - 10,4)
2020	4,5	4,5	4,3	9,0	7,1	1,1*	3,5	2,3	7,6	3,7	3,0*
	(2,4 - 6,5)	(2,0 - 7,1)	(0,7 - 8,0)	(0,0 - 22,6)	(2,5 - 11,8)	(<0,1 - 2,1)	(0,1 - 6,8)	(0,7 - 3,8)	(1,8 - 13,4)	(0,4 - 6,9)	(1,0 - 5,0)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

FIESTA, JUNTA, DISCOTECA, RECITALES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	31,2	29,5	34,5	28,2	33,7	37,2	23,1	27,7	22,3	31,0	36,7
	(27,4 - 35,1)	(24,8 - 34,3)	(28,7 - 40,2)	(19,8 - 36,6)	(28,1 - 39,3)	(30,6 - 43,8)	(15,8 - 30,4)	(13,5 - 42,0)	(17,1 - 27,5)	(24,6 - 37,5)	(29,9 - 43,5)
2014	31,0	28,9	34,1	26,8	34,4	36,3	32,9	20,9	20,3	25,9	41,4
	(27,8 - 34,2)	(24,9 - 32,9)	(28,8 - 39,3)	(20,2 - 33,3)	(28,2 - 40,6)	(29,7 - 42,9)	(23,2 - 42,7)	(13,4 - 28,3)	(14,6 - 26,0)	(21,5 - 30,2)	(35,2 - 47,6)
2016	31,7	28,9	36,0	27,3	34,6	36,9	34,5	20,2	21,7	30,9	36,3
	(28,9 - 34,4)	(25,1 - 32,8)	(31,8 - 40,2)	(19,2 - 35,4)	(28,6 - 40,6)	(31,1 - 42,7)	(26,1 - 42,9)	(11,7 - 28,7)	(15,8 - 27,6)	(26,0 - 35,8)	(31,1 - 41,6)
2018	29,3	27,9	31,6	21,9	32,8	33,0	30,1	19,8	15,3	27,5	40,6
	(25,8 - 32,8)	(23,5 - 32,4)	(25,5 - 37,7)	(15,2 - 28,5)	(26,7 - 39,0)	(26,5 - 39,5)	(18,9 - 41,4)	(14,2 - 25,4)	(10,8 - 19,8)	(23,1 - 32,0)	(33,9 - 47,3)
2020	33,3	31,9	36,0	31,6	30,3	38,0	38,5	26,2	22,1	38,5*	35,7
	(28,9 - 37,7)	(25,9 - 37,9)	(28,6 - 43,5)	(18,9 - 44,3)	(22,9 - 37,6)	(31,7 - 44,3)	(26,7 - 50,3)	(16,5 - 35,9)	(15,7 - 28,6)	(32,5 - 44,4)	(27,8 - 43,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

INTERNET, MAIL O CHAT

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	1,7	0,7	3,6	4,9	0,5	0,2	2,8		0,2	3,5	0,9
	(0,0 - 4,1)	(0,0 - 1,5)	(0,0 - 10,2)	(0,0 - 14,0)	(0,1 - 0,9)	(0,0 - 0,5)	(0,0 - 7,9)		(0,0 - 0,6)	(0,0 - 9,7)	(0,0 - 2,1)
2014	1,2	0,4	2,3	1,8	1,5	0,9	1,3	0,4	0,6	1,5	1,3
	(0,7 - 1,7)	(0,2 - 0,7)	(1,1 - 3,5)	(0,4 - 3,2)	(0,2 - 2,7)	(0,1 - 1,7)	(0,0 - 2,9)	(0,0 - 1,0)	(0,0 - 1,3)	(0,6 - 2,4)	(0,4 - 2,2)
2016	0,7	1,0	0,3	0,3	1,1	1,1	0,3	0,2	0,7	0,6	0,9
	(0,2 - 1,3)	(0,2 - 1,8)	(0,1 - 0,6)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 2,4)	(0,2 - 2,1)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 1,4)	(<0,1 - 1,2)	(<0,1 - 1,7)
2018	1,4	0,9	2,3	1,3	0,9	1,2	2,7	1,3	0,4	1,0	2,5
	(0,7 - 2,1)	(0,4 - 1,4)	(0,6 - 4,0)	(0,4 - 2,3)	(0,3 - 1,6)	(0,2 - 2,3)	(0,0 - 6,2)	(0,0 - 2,9)	(<0,1 - 0,7)	(0,3 - 1,7)	(0,7 - 4,2)
2020	2,3	2,1	2,8	7,0	2,5	2,3	0,8	0,5	1,2	1,9	3,9
	(1,2 - 3,4)	(0,9 - 3,2)	(0,4 - 5,3)	(0,0 - 16,2)	(0,8 - 4,1)	(0,7 - 4,0)	(0,1 - 1,5)	(0,0 - 1,2)	(<0,1 - 2,4)	(0,9 - 2,8)	(0,8 - 6,9)

OTRO LUGAR

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	5,1	5,0	5,5	4,9	4,5	5,3	6,4	6,1	3,1	6,5	5,1
	(3,8 - 6,5)	(3,2 - 6,7)	(3,2 - 7,8)	(1,8 - 8,1)	(2,4 - 6,7)	(1,7 - 8,9)	(2,7 - 10,0)	(2,6 - 9,5)	(1,3 - 4,9)	(3,7 - 9,3)	(3,1 - 7,1)
2014	7,6	8,1	7,0	7,5	7,6	9,6	5,8	6,5	6,2	7,7	8,4
	(6,0 - 9,2)	(5,7 - 10,4)	(5,0 - 9,1)	(4,0 - 10,9)	(4,4 - 10,9)	(5,5 - 13,8)	(3,1 - 8,6)	(3,7 - 9,3)	(2,5 - 9,8)	(5,1 - 10,2)	(5,8 - 11,0)
2016	6,0	6,6	5,1	5,8	2,8	8,6	7,5	8,0	7,1	6,0	5,6
	(4,5 - 7,6)	(4,4 - 8,8)	(3,2 - 7,0)	(2,6 - 9,0)	(1,4 - 4,2)	(4,3 - 12,9)	(2,7 - 12,2)	(4,1 - 11,8)	(3,6 - 10,5)	(3,0 - 9,0)	(3,7 - 7,6)
2018	7,2	7,6	6,5	6,7	5,7	6,4	9,7	9,7	5,5	6,9	8,7
	(5,5 - 8,9)	(5,4 - 9,8)	(4,1 - 8,9)	(3,6 - 9,9)	(3,0 - 8,4)	(3,4 - 9,4)	(3,7 - 15,8)	(5,9 - 13,6)	(2,4 - 8,5)	(4,4 - 9,3)	(5,7 - 11,8)
2020	7,8	6,8	9,6	4,8	6,7	8,9	4,5	15,4	5,0	10,1	6,9
	(5,6 - 10,0)	(3,7 - 9,9)	(5,9 - 13,4)	(1,8 - 7,8)	(1,8 - 11,5)	(4,7 - 13,0)	(2,0 - 7,0)	(5,0 - 25,7)	(2,6 - 7,5)	(5,3 - 15,0)	(4,5 - 9,4)

LUGAR DE ÚLTIMO OFRECIMIENTO DE COCAÍNA

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2020.

Todas las categorías incluidas

Preguntas: Si le han ofrecido cocaína, ¿cuándo fue la última vez que se la ofrecieron? ¿En cuál de los siguientes lugares se la ofrecieron?

CASA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	2,1	1,6	3,4	3,7	1,9	1,4	2,5	1,7	3,7	1,0	1,9
	(0,6 - 3,5)	(0,3 - 2,9)	(0,0 - 7,4)	(0,0 - 10,9)	(0,0 - 3,9)	(0,1 - 2,8)	(0,0 - 5,1)	(0,0 - 5,1)	(0,0 - 7,8)	(0,1 - 1,9)	(0,0 - 4,0)
2014	1,2	1,1	1,3	0,8	1,4	1,5	1,2	0,5	2,4	0,8	0,3
	(0,5 - 1,8)	(0,3 - 2,0)	(<0,1 - 2,5)	(0,0 - 2,5)	(0,0 - 3,2)	(0,0 - 3,1)	(0,0 - 2,8)	(0,0 - 1,3)	(0,4 - 4,4)	(<0,1 - 1,6)	(0,0 - 0,6)
2016	1,2	1,2	1,1		0,9	2,4	1,2	0,6	1,4	0,6	1,7
	(0,5 - 1,9)	(0,3 - 2,1)	(0,2 - 2,1)		(0,0 - 2,0)	(0,4 - 4,3)	(0,0 - 2,4)	(0,0 - 1,6)	(0,0 - 2,9)	(<0,1 - 1,1)	(0,2 - 3,2)
2018	1,4	1,1	2,2		0,9	1,1	2,6	1,6	1,4	1,4	1,1
	(0,7 - 2,0)	(0,4 - 1,7)	(0,4 - 4,1)		(0,0 - 1,8)	(<0,1 - 2,1)	(0,4 - 4,9)	(<0,1 - 3,1)	(<0,1 - 2,8)	(0,4 - 2,4)	(0,0 - 2,4)
2020	1,5	0,9	3,9		0,7	1,3	1,5	3,0	1,4	1,6	1,3
	(0,5 - 2,4)	(0,2 - 1,6)	(0,0 - 8,2)		(0,0 - 1,5)	(0,0 - 2,9)	(0,1 - 2,9)	(0,0 - 6,7)	(0,3 - 2,6)	(0,0 - 3,5)	(0,0 - 2,9)

BARRIO O COMUNA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	48,8	53,7	35,1	50,0	44,7	49,3	49,5	54,4	60,5	51,1	34,3
	(42,5 - 55,0)	(46,4 - 60,9)	(24,1 - 46,1)	(30,8 - 69,2)	(34,3 - 55,2)	(36,7 - 61,9)	(32,7 - 66,4)	(37,9 - 70,9)	(51,4 - 69,7)	(40,6 - 61,7)	(21,7 - 46,9)
2014	44,0	46,8	37,9	41,8	34,9	49,2	43,2	52,3	51,1	48,3	30,4
	(38,2 - 49,9)	(39,1 - 54,5)	(26,8 - 48,9)	(19,1 - 64,5)	(24,1 - 45,6)	(35,6 - 62,8)	(28,4 - 58,1)	(39,3 - 65,4)	(39,7 - 62,6)	(39,4 - 57,2)	(19,2 - 41,7)
2016	38,5	41,2	30,9	45,5	34,1	31,9	50,2	41,1	60,6	33,8	25,9
	(31,6 - 45,4)	(33,5 - 49,0)	(18,6 - 43,2)	(18,1 - 73,0)	(23,7 - 44,4)	(19,7 - 44,2)	(35,2 - 65,1)	(22,3 - 59,9)	(47,9 - 73,4)	(23,1 - 44,5)	(15,9 - 35,8)
2018	38,8	38,1	41,2	37,9	24,1	43,2	44,6	52,2	61,6	35,9	16,7
	(32,4 - 45,3)	(30,5 - 45,7)	(27,7 - 54,6)	(20,3 - 55,4)	(15,1 - 33,0)	(29,8 - 56,6)	(29,7 - 59,5)	(38,1 - 66,2)	(51,3 - 72,0)	(25,1 - 46,8)	(10,5 - 22,8)
2020	34,0	36,2	24,6	18,0	33,7	21,6*	37,2	46,9	53,1	28,1	18,0
	(26,0 - 42,0)	(25,7 - 46,7)	(12,9 - 36,4)	(0,0 - 39,1)	(15,6 - 51,8)	(11,5 - 31,7)	(21,3 - 53,1)	(29,6 - 64,2)	(36,5 - 69,6)	(18,7 - 37,5)	(6,3 - 29,8)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

LUGAR DE ESTUDIO O TRABAJO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	10,5	8,9	15,2	12,4	6,4	12,4	6,4	16,9	10,5	5,5	17,3
	(6,3 - 14,8)	(5,5 - 12,2)	(2,6 - 27,8)	(0,6 - 24,1)	(2,4 - 10,4)	(5,3 - 19,4)	(0,7 - 12,1)	(0,1 - 33,7)	(5,6 - 15,4)	(1,4 - 9,6)	(5,9 - 28,7)
2014	12,0	11,8	12,3	17,2	18,3	8,8	8,6	6,9	9,8	13,6	12,1
	(7,8 - 16,2)	(6,7 - 16,9)	(5,9 - 18,8)	(5,2 - 29,3)	(6,4 - 30,1)	(3,8 - 13,8)	(3,3 - 13,8)	(2,6 - 11,1)	(3,9 - 15,7)	(5,1 - 22,0)	(6,2 - 18,0)
2016	10,0	10,9	7,4	3,5	10,2	9,6	7,6	15,0	5,5	13,2	10,1
	(5,6 - 14,4)	(4,8 - 17,0)	(2,7 - 12,1)	(0,0 - 7,0)	(2,7 - 17,7)	(2,2 - 16,9)	(0,0 - 15,4)	(1,1 - 28,9)	(1,8 - 9,2)	(5,6 - 20,9)	(1,3 - 18,8)
2018	11,3	10,9	12,5	10,5	13,6	7,6	14,7	9,4	10,9	13,7	8,8
	(7,9 - 14,7)	(7,1 - 14,8)	(4,8 - 20,1)	(2,4 - 18,6)	(6,0 - 21,2)	(3,7 - 11,5)	(5,4 - 24,0)	(2,1 - 16,6)	(5,1 - 16,7)	(7,4 - 20,0)	(3,7 - 13,9)
2020	10,0	11,4	3,9*	8,9	2,1*	20,3	13,0	8,2	8,3	10,7	11,1
	(4,6 - 15,4)	(4,7 - 18,1)	(0,4 - 7,5)	(0,0 - 26,1)	(0,0 - 5,1)	(2,9 - 37,7)	(0,0 - 26,3)	(0,5 - 15,9)	(0,0 - 18,7)	(4,3 - 17,0)	(0,0 - 24,8)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ALREDEDORES LUGAR DE ESTUDIO O TRABAJO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	4,2	3,9	5,0	7,2	0,8	1,8	14,1	6,3	1,0	5,6	5,5
	(1,7 - 6,7)	(0,8 - 7,0)	(0,2 - 9,7)	(0,0 - 15,5)	(0,2 - 1,4)	(<0,1 - 3,6)	(0,0 - 32,3)	(0,1 - 12,6)	(0,0 - 2,1)	(0,2 - 11,0)	(0,8 - 10,2)
2014	4,6	4,4	4,9	2,6	6,4	3,7	5,2	3,9	2,5	5,7	5,4
	(2,2 - 7,0)	(1,7 - 7,2)	(0,0 - 9,8)	(0,0 - 5,7)	(0,0 - 13,1)	(0,4 - 7,0)	(<0,1 - 10,3)	(0,0 - 8,2)	(0,0 - 5,0)	(0,7 - 10,6)	(1,3 - 9,4)
2016	5,3	5,2	5,5	6,7	6,0	3,3	5,4	6,0	2,4	6,3	6,5
	(2,5 - 8,0)	(1,6 - 8,8)	(1,6 - 9,4)	(0,0 - 14,2)	(0,0 - 12,9)	(0,9 - 5,7)	(0,0 - 14,6)	(0,8 - 11,3)	(0,0 - 5,2)	(1,2 - 11,4)	(1,0 - 11,9)
2018	4,6	4,5	4,9	5,6	4,9	5,9	3,4	2,5	1,4	5,0	7,7
	(2,2 - 6,9)	(1,6 - 7,4)	(1,4 - 8,3)	(0,0 - 11,7)	(1,0 - 8,9)	(0,0 - 12,3)	(0,1 - 6,8)	(0,0 - 6,1)	(0,1 - 2,6)	(2,1 - 7,9)	(0,7 - 14,7)
2020	3,1	3,8	0,4*		0,3*	2,9	8,1	3,4	4,3	2,4	2,8
	(0,8 - 5,5)	(0,8 - 6,8)	(0,0 - 1,1)		(0,0 - 0,8)	(0,0 - 8,2)	(<0,1 - 16,2)	(0,0 - 9,3)	(0,0 - 9,3)	(0,0 - 5,3)	(0,0 - 8,0)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

FIESTA, JUNTA, DISCOTECA, RECITALES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	30,6	27,9	37,9	23,0	41,9	31,7	22,8	17,5	21,7	33,5	35,2
	(24,9 - 36,2)	(21,2 - 34,7)	(26,6 - 49,1)	(10,4 - 35,5)	(31,3 - 52,5)	(18,9 - 44,5)	(11,0 - 34,7)	(7,5 - 27,4)	(13,5 - 29,9)	(23,7 - 43,2)	(23,2 - 47,3)
2014	29,3	26,8	34,9	20,4	34,1	24,1	34,6	29,6	22,3	24,7	43,2
	(24,4 - 34,2)	(21,2 - 32,4)	(22,6 - 47,1)	(7,6 - 33,3)	(24,3 - 44,0)	(14,9 - 33,2)	(17,5 - 51,7)	(16,0 - 43,3)	(11,0 - 33,6)	(17,5 - 31,9)	(33,0 - 53,4)
2016	39,0	35,9	47,8	37,3	40,8	47,1	31,5	32,6	23,3	40,9	49,6
	(33,1 - 44,9)	(28,1 - 43,6)	(35,1 - 60,6)	(12,1 - 62,4)	(31,3 - 50,3)	(36,2 - 58,1)	(18,9 - 44,2)	(14,1 - 51,2)	(12,5 - 34,2)	(30,9 - 51,0)	(40,7 - 58,4)
2018	35,9	36,8	33,3	37,0	50,3	37,6	21,7	24,0	18,9	34,4	56,9
	(29,3 - 42,5)	(29,1 - 44,4)	(21,9 - 44,6)	(19,0 - 55,1)	(38,3 - 62,3)	(25,6 - 49,5)	(11,2 - 32,2)	(8,7 - 39,4)	(9,5 - 28,2)	(23,6 - 45,2)	(46,6 - 67,2)
2020	42,7	40,3	52,9*	71,5*	55,0	41,0	36,3	28,0	29,3	47,1	53,5
	(34,5 - 50,9)	(30,1 - 50,5)	(37,5 - 68,3)	(45,1 - 98,0)	(36,6 - 73,5)	(25,9 - 56,2)	(19,4 - 53,1)	(12,5 - 43,5)	(14,5 - 44,2)	(36,5 - 57,8)	(31,2 - 75,8)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

INTERNET, MAIL O CHAT

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,8			0,4		0,8
	(0,1 - 0,7)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 1,3)	(0,0 - 1,0)	(0,0 - 1,7)			(0,0 - 1,2)		(0,0 - 1,6)
2014	0,4	0,2	0,9	2,0	0,2		0,8		0,4	0,8	
	(0,0 - 1,0)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 2,5)	(0,0 - 5,9)	(0,0 - 0,6)		(0,0 - 2,4)		(0,0 - 1,3)	(0,0 - 1,9)	
2016	0,9	0,9	0,8	0,6	0,8	1,8	0,7	0,1	1,2	0,5	1,0
	(0,1 - 1,6)	(0,1 - 1,7)	(0,0 - 1,6)	(0,0 - 1,9)	(0,0 - 1,6)	(0,0 - 4,0)	(0,0 - 1,7)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 3,2)	(0,0 - 1,1)	(0,1 - 1,8)
2018	1,3	0,9	2,7	1,3	1,7	0,6	0,7	2,9	1,0	0,9	2,4
	(0,4 - 2,2)	(0,3 - 1,5)	(0,0 - 5,7)	(0,0 - 3,9)	(0,3 - 3,2)	(0,0 - 1,3)	(0,0 - 1,8)	(0,0 - 7,3)	(0,0 - 2,1)	(0,1 - 1,8)	(0,0 - 5,0)
2020	3,6	3,7	3,1		6,7	4,4	2,0		1,4	4,8*	4,5
	(1,0 - 6,2)	(0,5 - 6,9)	(0,2 - 5,9)		(0,0 - 14,2)	(0,5 - 8,3)	(0,0 - 4,3)		(0,1 - 2,6)	(1,3 - 8,3)	(0,0 - 13,0)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

OTRO LUGAR

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	3,5	3,6	3,2	3,3	3,9	2,7	4,7	3,2	2,2	3,2	5,0
	(1,9 - 5,0)	(1,7 - 5,4)	(0,4 - 6,0)	(0,0 - 9,5)	(1,2 - 6,7)	(0,5 - 4,8)	(0,0 - 10,9)	(0,2 - 6,2)	(0,2 - 4,2)	(0,9 - 5,6)	(1,4 - 8,7)
2014	5,9	6,2	5,1	5,4	3,3	11,7	2,9	5,4	7,0	4,5	6,6
	(2,8 - 9,0)	(2,1 - 10,4)	(2,0 - 8,2)	(0,0 - 11,6)	(0,7 - 5,9)	(0,3 - 23,1)	(0,5 - 5,4)	(1,7 - 9,1)	(0,0 - 15,7)	(1,9 - 7,1)	(2,9 - 10,4)
2016	5,1	4,7	6,4	6,5	7,2	3,9	3,4	4,5	5,4	4,7	5,4
	(3,0 - 7,3)	(2,1 - 7,3)	(2,3 - 10,4)	(0,0 - 12,9)	(2,3 - 12,2)	(0,9 - 7,0)	(0,5 - 6,3)	(0,0 - 10,6)	(0,7 - 10,1)	(1,4 - 8,1)	(2,0 - 8,8)
2018	6,7	7,8	3,3	7,7	4,5	4,1	12,3	7,5	4,9	8,6	6,4
	(4,0 - 9,4)	(4,3 - 11,3)	(1,3 - 5,3)	(1,7 - 13,7)	(2,0 - 6,9)	(1,6 - 6,6)	(1,7 - 22,8)	(3,4 - 11,6)	(1,8 - 8,0)	(2,7 - 14,4)	(3,5 - 9,4)
2020	5,1	3,7	11,2	1,6	13*	8,5	2,0	10,5	2,1	5,3	8,7
	(2,9 - 7,2)	(1,0 - 6,3)	(0,0 - 23,0)	(0,0 - 4,9)	(0,0 - 3,0)	(1,5 - 15,5)	(0,4 - 3,6)	(0,0 - 22,2)	(0,4 - 3,9)	(2,6 - 8,0)	(0,9 - 16,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

LUGAR DE ÚLTIMO OFRECIMIENTO DE PASTA BASE
Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2020.
Todas las categorías incluidas

Preguntas: Si le han ofrecido pasta base, ¿cuándo fue la última vez que se la ofrecieron? ¿En cuál de los siguientes lugares se la ofrecieron?

CASA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	3,4	3,4	3,7		5,7	2,2	3,2	4,3	3,8	4,9	
	(0,2 - 6,7)	(0,0 - 7,3)	(0,0 - 7,8)		(0,0 - 15,1)	(0,0 - 4,5)	(0,0 - 7,0)	(0,0 - 10,2)	(0,1 - 7,6)	(0,0 - 11,9)	
2014	0,7	0,6	1,0			1,2	0,8	1,1	0,8	0,8	0,2
	(0,2 - 1,2)	(<0,1 - 1,1)	(0,0 - 2,2)			(0,0 - 2,7)	(0,0 - 2,1)	(0,0 - 2,5)	(0,0 - 1,7)	(0,0 - 1,8)	(0,0 - 0,7)
2016	0,3	0,1	0,8	1,2		0,5			<0,1	0,6	
	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 2,3)	(0,0 - 3,7)		(0,0 - 1,1)			(0,0 - 0,1)	(0,0 - 1,4)	
2018	3,1	3,8	1,5		3,8	4,6	1,2	4,6	3,1	3,7	1,6
	(0,8 - 5,5)	(0,7 - 6,9)	(0,0 - 3,4)		(0,0 - 10,0)	(0,7 - 8,6)	(0,0 - 2,8)	(0,0 - 11,7)	(0,0 - 7,7)	(0,1 - 7,3)	(0,0 - 4,8)
2020	1,8	0,6	8,5		0,6		0,2	6,3	2,1	2,0	
	(0,0 - 3,7)	(0,0 - 1,5)	(0,0 - 20,8)		(0,0 - 1,8)		(0,0 - 0,6)	(0,0 - 14,5)	(0,0 - 4,3)	(0,0 - 6,0)	

BARRIO O COMUNA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	64,8	66,9	56,8	55,5	62,0	68,8	73,4	67,2	67,9	62,5	64,1
	(57,3 - 72,2)	(58,6 - 75,2)	(41,5 - 72,2)	(35,5 - 75,4)	(47,1 - 76,9)	(54,1 - 83,5)	(60,9 - 85,9)	(51,8 - 82,5)	(58,6 - 77,2)	(49,1 - 75,8)	(47,8 - 80,4)
2014	57,1	62,1	42,7	43,1	32,4	72,0	63,0	69,1	71,9	54,2	38,0
	(50,0 - 64,2)	(53,4 - 70,9)	(29,0 - 56,4)	(21,3 - 65,0)	(18,3 - 46,5)	(56,5 - 87,5)	(47,8 - 78,2)	(53,3 - 84,9)	(62,1 - 81,6)	(40,8 - 67,6)	(23,8 - 52,1)
2016	56,3	56,0	57,1	44,0	49,7	66,9	59,4	58,9	78,9	46,7	33,0
	(46,0 - 66,6)	(44,6 - 67,4)	(34,2 - 80,0)	(14,2 - 73,8)	(32,8 - 66,7)	(50,7 - 83,0)	(34,2 - 84,5)	(32,7 - 85,2)	(66,8 - 90,9)	(31,0 - 62,5)	(16,1 - 49,9)
2018	53,0	56,6	44,1	27,3	43,8	51,3	61,7	66,9	71,2	48,7	28,6
	(46,1 - 59,9)	(47,7 - 65,6)	(32,3 - 55,9)	(10,4 - 44,3)	(29,9 - 57,7)	(36,7 - 66,0)	(45,4 - 78,0)	(54,1 - 79,8)	(61,7 - 80,7)	(37,1 - 60,4)	(14,7 - 42,5)
2020	63,0*	66,3	44,6	6,2	61,1	48,7	70,3	73,6	85,0*	42,9	63,7*
	(56,6 - 69,5)	(55,3 - 77,2)	(24,6 - 64,6)	(0,0 - 21,7)	(37,0 - 85,3)	(25,5 - 71,9)	(52,0 - 88,6)	(54,4 - 92,8)	(75,1 - 94,8)	(27,2 - 58,6)	(41,0 - 86,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

LUGAR DE ESTUDIO O TRABAJO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	8,3	9,9	2,5	10,2	3,1	7,8	11,3	13,4	9,2	6,4	10,5
	(4,7 - 12,0)	(5,2 - 14,6)	(0,0 - 5,3)	(0,8 - 19,6)	(0,1 - 6,1)	(0,0 - 16,0)	(1,7 - 20,9)	(1,5 - 25,2)	(3,4 - 15,0)	(0,9 - 11,9)	(1,8 - 19,1)
2014	12,0	12,2	11,6	20,9	22,9	7,5	3,6	7,5	5,4	18,1	12,8
	(5,7 - 18,4)	(4,1 - 20,2)	(3,0 - 20,2)	(5,7 - 36,1)	(0,6 - 45,3)	(0,0 - 16,0)	(0,0 - 8,2)	(0,0 - 15,3)	(1,2 - 9,7)	(4,0 - 32,1)	(4,6 - 21,0)
2016	6,9	8,0	2,6	3,3	3,1	6,8	14,8	6,6	2,3	10,9	7,3
	(2,6 - 11,1)	(2,6 - 13,4)	(<0,1 - 5,1)	(0,0 - 8,0)	(0,0 - 6,2)	(0,0 - 15,3)	(0,0 - 30,2)	(0,0 - 16,9)	(0,0 - 4,6)	(1,6 - 20,2)	(1,9 - 12,7)
2018	8,5	6,4	13,6	21,6	7,2	3,0	6,6	11,7	4,3	11,7	10,0
	(5,4 - 11,6)	(3,3 - 9,6)	(4,3 - 23,0)	(3,2 - 39,9)	(<0,1 - 14,4)	(0,2 - 5,8)	(0,0 - 13,7)	(3,6 - 19,9)	(0,7 - 7,9)	(5,1 - 18,4)	(4,5 - 15,5)
2020	10,9	10,2	14,8	60,8	5,2	18,8	4,5	12,5	2,6	21,6	0,6*
	(7,4 - 14,3)	(3,0 - 17,4)	(0,0 - 36,5)	(0,0 - 100)	(0,0 - 13,9)	(0,0 - 41,5)	(0,0 - 11,5)	(0,0 - 28,0)	(0,0 - 5,7)	(7,1 - 36,1)	(0,0 - 1,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ALREDEDORES LUGAR DE ESTUDIO O TRABAJO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	2,3	2,3	2,4	2,2	1,0	2,6	3,3	3,5		1,5	7,6
	(0,9 - 3,7)	(0,8 - 3,8)	(0,0 - 5,9)	(0,0 - 6,6)	(0,0 - 2,3)	(0,0 - 5,6)	(0,0 - 8,8)	(0,0 - 7,2)		(0,0 - 3,1)	(1,9 - 13,3)
2014	3,3	3,2	3,5	5,1	2,4	0,8	7,4	2,5	2,4	1,1	8,3
	(1,1 - 5,4)	(0,6 - 5,8)	(0,0 - 7,6)	(0,0 - 11,3)	(0,0 - 5,4)	(0,0 - 2,0)	(0,0 - 16,0)	(0,0 - 6,7)	(0,0 - 5,8)	(0,0 - 2,8)	(1,5 - 15,1)
2016	6,9	5,7	11,1	4,7	9,8	2,4	9,8	6,0	1,9	11,2	7,3
	(2,3 - 11,4)	(0,1 - 11,2)	(0,0 - 23,9)	(0,0 - 11,1)	(0,0 - 21,2)	(0,0 - 6,1)	(0,0 - 26,2)	(0,0 - 13,3)	(0,0 - 4,3)	(1,2 - 21,3)	(0,0 - 17,6)
2018	7,2	7,0	7,5	10,1	7,0	12,7	4,0	3,3	4,0	7,1	13,7
	(2,6 - 11,7)	(1,0 - 13,0)	(2,4 - 12,7)	(0,0 - 20,9)	(0,0 - 15,5)	(0,0 - 27,9)	(-0,1 - 8,0)	(0,0 - 8,1)	(0,0 - 9,6)	(2,6 - 11,5)	(0,0 - 30,5)
2020	4,8	5,5	0,4*		4,6	0,4	11,8	0,3	4,1	6,9	
	(0,7 - 8,8)	(0,1 - 10,9)	(0,0 - 1,3)		(0,0 - 13,6)	(0,0 - 1,3)	(0,0 - 25,4)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 11,3)	(0,0 - 14,9)	

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

FIESTA, JUNTA, DISCOTECA, RECITALES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	17,9	14,0	32,2	28,4	25,1	16,9	6,9	6,1	12,8	23,3	15,9
	(11,7 - 24,0)	(7,8 - 20,2)	(16,6 - 47,7)	(9,0 - 47,8)	(12,2 - 38,1)	(4,2 - 29,7)	(1,6 - 12,2)	(0,0 - 14,1)	(6,0 - 19,6)	(11,6 - 34,9)	(5,1 - 26,8)
2014	18,7	15,8	26,9	13,5	34,4	15,0	16,6	12,2	14,7	16,7	28,4
	(12,5 - 24,9)	(9,3 - 22,4)	(10,2 - 43,6)	(1,1 - 26,0)	(17,6 - 51,2)	(1,7 - 28,4)	(3,9 - 29,4)	(0,0 - 27,3)	(6,4 - 23,1)	(4,5 - 29,0)	(16,2 - 40,5)
2016	15,7	13,7	23,1	32,1	17,9	17,6	13,0	4,4	8,8	12,1	36,3
	(9,2 - 22,3)	(7,9 - 19,5)	(3,0 - 43,1)	(3,1 - 61,2)	(7,7 - 28,2)	(5,7 - 29,6)	(2,5 - 23,5)	(0,0 - 8,9)	(2,3 - 15,2)	(5,9 - 18,2)	(15,7 - 56,9)
2018	14,9	13,0	19,5	30,9	23,7	17,2	7,8	3,6	7,3	15,1	29,3
	(9,9 - 19,9)	(7,4 - 18,6)	(10,5 - 28,5)	(7,6 - 54,2)	(11,8 - 35,6)	(8,5 - 25,9)	(2,7 - 12,8)	(0,6 - 6,6)	(2,1 - 12,4)	(7,5 - 22,6)	(15,7 - 42,8)
2020	12,9	10,9	24,6	33,0	18,5	15,0	10,1	6,4	4,7	19,4	16,2
	(9,1 - 16,7)	(5,8 - 16,0)	(9,1 - 40,1)	(0,0 - 91,1)	(2,0 - 35,1)	(0,9 - 29,2)	(1,2 - 19,1)	(0,0 - 13,0)	(0,1 - 9,4)	(9,7 - 29,0)	(3,8 - 28,6)

INTERNET, MAIL O CHAT

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	0,3	0,1	1,1	1,2	0,4				0,6		0,5
	(0,1 - 0,6)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 2,6)	(0,0 - 3,0)	(0,0 - 1,3)				(0,0 - 1,5)		(0,0 - 1,4)
2014	0,6	0,1	2,0	4,4	0,1				0,3	1,2	
	(0,0 - 1,5)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 5,4)	(0,0 - 11,2)	(0,0 - 0,3)				(0,0 - 0,8)	(0,0 - 3,5)	
2016	0,3	0,3	0,1			1,2		0,1		0,2	0,9
	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,4)			(0,0 - 3,1)		(0,0 - 0,4)		(0,0 - 0,4)	(0,0 - 2,7)
2018	1,9	0,6	5,2	2,0	2,0	0,9	1,0	3,9	2,4	0,5	4,5
	(0,2 - 3,6)	(0,0 - 1,4)	(0,0 - 10,5)	(0,0 - 6,0)	(0,0 - 4,7)	(0,0 - 2,7)	(0,0 - 3,0)	(0,0 - 10,4)	(0,1 - 4,8)	(0,0 - 1,4)	(0,0 - 11,5)
2020	3,0	2,9	3,6		7,6	2,5	2,3		0,3	6,5	
	(1,1 - 5,0)	(0,0 - 6,2)	(0,0 - 8,3)		(0,0 - 17,9)	(0,0 - 6,3)	(0,0 - 5,5)		(0,0 - 0,9)	(0,1 - 12,8)	

OTRO LUGAR

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	3,0	3,4	1,3	2,5	2,6	1,7	2,0	5,5	5,7	1,4	1,4
	(1,3 - 4,6)	(1,3 - 5,5)	(0,0 - 2,8)	(0,0 - 6,0)	(0,5 - 4,7)	(0,1 - 3,4)	(0,0 - 4,1)	(0,0 - 12,1)	(1,4 - 10,0)	(<0,1 - 2,8)	(<0,1 - 2,8)
2014	5,0	3,8	8,5	6,4	4,2	3,5	6,4	5,4	1,7	5,7	9,4
	(2,2 - 7,8)	(1,4 - 6,2)	(0,2 - 16,9)	(0,0 - 15,4)	(0,0 - 9,5)	(0,0 - 7,6)	(1,3 - 11,6)	(0,0 - 12,7)	(0,0 - 3,3)	(1,6 - 9,8)	(0,0 - 18,8)
2016	13,8	16,2	5,2	14,7	19,4	4,6	3,0	23,9	8,1	18,3	15,2
	(5,5 - 22,0)	(6,2 - 26,2)	(0,6 - 9,7)	(0,0 - 29,4)	(3,4 - 35,4)	(0,8 - 8,5)	(0,0 - 6,6)	(0,0 - 53,2)	(0,0 - 16,3)	(1,3 - 35,3)	(4,0 - 26,5)
2018	11,4	12,5	8,6	8,0	12,5	10,2	17,7	5,9	7,7	13,2	12,3
	(6,3 - 16,4)	(5,8 - 19,2)	(3,5 - 13,6)	(0,2 - 15,9)	(5,5 - 19,4)	(3,1 - 17,2)	(0,8 - 34,6)	(1,8 - 10,0)	(2,6 - 12,9)	(3,1 - 23,4)	(5,5 - 19,2)
2020	3,6*	3,6*	3,5		2,4*	14,5	0,8	0,8*	1,3*	0,8*	19,5
	(1,1 - 6,1)	(0,0 - 7,2)	(0,0 - 7,1)		(0,0 - 5,7)	(0,0 - 30,3)	(0,0 - 2,2)	(0,0 - 2,0)	(0,0 - 2,8)	(0,0 - 1,9)	(0,0 - 39,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

VÍAS DE ACCESO A TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2016–2020.

Todas las categorías incluidas

Pregunta: Piense en la última vez que usted consumió tranquilizantes sin receta médica, ¿cómo los consiguió?

COMPRADO EN UNA FARMACIA CON UNA RECETA MÉDICA DE OTRA PERSONA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2016	15,7	12,0	18,4	3,8		5,2	34,1	14,9	6,8	10,0	21,4
	(12,2 - 19,3)	(0,0 - 24,3)	(3,7 - 33,1)	(0,0 - 11,4)		(0,0 - 11,2)	(2,8 - 65,5)	(7,2 - 22,6)	(0,0 - 18,8)	(3,6 - 16,5)	(7,2 - 35,7)
2018	5,7	8,7	3,7		0,2	4,5	10,4	8,6	1,4	6,8	5,6
	(1,6 - 9,7)	(0,9 - 16,6)	(0,0 - 8,1)		(0,0 - 0,6)	(0,0 - 12,3)	(0,0 - 24,4)	(0,2 - 17,0)	(0,0 - 3,6)	(0,0 - 14,1)	(0,0 - 12,9)
2020	5,3	4,9	5,9	1,3	0,2	0,7	14,1	9,5	2,0	9,8	5,0
	(2,0 - 8,6)	(0,9 - 8,9)	(0,0 - 12,5)	(0,0 - 4,4)	(0,0 - 0,5)	(0,0 - 2,1)	(1,0 - 27,2)	(0,1 - 18,9)	(0,0 - 4,6)	(0,6 - 19,0)	(0,0 - 11,5)

COMPRADO EN UNA FERIA LIBRE O MERCADO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2016	20,5	31,1	12,7	7,1	26,2	21,5	13,2	25,5	20,2	30,0	14,9
	(8,2 - 32,8)	(8,0 - 54,2)	(2,7 - 22,7)	(0,0 - 20,3)	(0,0 - 56,4)	(1,6 - 41,5)	(0,0 - 30,7)	(3,7 - 47,3)	(1,2 - 39,3)	(11,6 - 48,4)	(0,0 - 33,5)
2018	21,7	15,0	26,0	1,8	14,1	11,7	20,2	37,2	26,9	13,9	27,4
	(9,4 - 34,0)	(2,6 - 27,5)	(7,4 - 44,6)	(0,0 - 5,5)	(0,0 - 33,8)	(2,0 - 21,5)	(2,9 - 37,4)	(9,9 - 64,4)	(5,6 - 48,2)	(5,9 - 21,8)	(0,3 - 54,5)
2020	30,0	39,1	18,0	5,3	29,6	64,6*	23,4	26,8	24,9	28,0	40,7
	(13,5 - 46,5)	(14,7 - 63,5)	(7,6 - 28,5)	(0,0 - 17,2)	(0,0 - 72,3)	(36,9 - 92,3)	(0,0 - 49,8)	(11,3 - 42,3)	(6,6 - 43,3)	(7,4 - 48,6)	(0,8 - 80,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

LO COMPRÉ POR INTERNET

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2016											
2018	4,6	9,4	1,5	40,6		3,9	4,3		4,3	9,3	0,2
	(0,0 - 10,3)	(0,0 - 23,7)	(0,0 - 4,0)	(0,0 - 88,0)		(0,0 - 10,9)	(0,0 - 12,7)		(0,0 - 11,6)	(0,0 - 23,2)	(0,0 - 0,5)
2020	2,5	4,3	0,2	1,3	8,0			0,3	5,8	0,3	
	(0,0 - 7,1)	(0,0 - 12,1)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 4,2)	(0,0 - 23,6)			(0,0 - 0,8)	(0,0 - 16,7)	(0,0 - 0,8)	

PASÓ CONVIVIENTE/PAREJA, UN FAMILIAR Y/O AMIGO/A

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2016	49,7	46,4	52,1	67,1	60,7	58,6	37,9	47,2	52,5	47,8	50,1
	(36,5 - 62,9)	(24,9 - 67,8)	(37,0 - 67,2)	(43,8 - 90,3)	(31,1 - 90,3)	(33,7 - 83,5)	(8,7 - 67,1)	(25,3 - 69,2)	(29,3 - 75,7)	(29,6 - 65,9)	(29,3 - 70,9)
2018	36,4	30,6	40,1	31,1	36,1	40,8	38,9	33,9	24,0	34,9	45,0
	(28,3 - 44,4)	(14,1 - 47,0)	(25,0 - 55,2)	(0,9 - 61,3)	(9,1 - 63,1)	(20,8 - 60,9)	(17,4 - 60,3)	(15,1 - 52,7)	(5,9 - 42,0)	(20,9 - 48,9)	(23,8 - 66,1)
2020	24,8*	14,8	37,8	6,1	26,3	25,8	30,6	26,9	18,4	29,1	29,5
	(19,5 - 30,1)	(4,9 - 24,7)	(22,5 - 53,1)	(0,0 - 16,2)	(2,2 - 50,4)	(2,4 - 49,3)	(4,9 - 56,4)	(8,0 - 45,9)	(4,5 - 32,4)	(15,3 - 42,8)	(5,9 - 53,1)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ENTREGADO EN EL CONSULTORIO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2016	2,8	2,4	3,1			2,2	1,2	5,3	1,7	4,8	1,9
	(1,7 - 3,9)	(0,0 - 5,1)	(0,2 - 5,9)			(0,0 - 6,4)	(0,0 - 3,5)	(0,6 - 10,0)	(0,0 - 5,0)	(0,0 - 9,7)	(0,0 - 4,0)
2018	2,4	2,8	2,1	1,7	3,0	2,3	4,7	1,0	1,6	4,2	1,0
	(1,0 - 3,8)	(0,0 - 6,4)	(0,0 - 4,4)	(0,0 - 4,9)	(0,0 - 9,1)	(0,0 - 5,6)	(0,0 - 12,2)	(0,0 - 2,3)	(0,0 - 4,0)	(0,0 - 8,7)	(0,0 - 2,5)
2020	5,1	6,9	2,8		13,0	0,9	7,0	1,1	8,9	1,1	4,1
	(0,0 - 12,4)	(0,0 - 19,2)	(0,0 - 7,1)		(0,0 - 36,7)	(0,0 - 2,3)	(0,0 - 20,3)	(0,0 - 2,8)	(0,0 - 25,4)	(0,0 - 2,8)	(0,0 - 11,6)

ESTABA EN MI CASA Y LO TOMÉ

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2016	6,3	6,2	6,4	9,2	13,1	4,0	5,8	5,4	3,8	6,5	6,8
	(3,3 - 9,3)	(0,6 - 11,7)	(1,3 - 11,5)	(0,0 - 20,3)	(0,0 - 27,8)	(0,0 - 11,1)	(0,0 - 14,6)	(0,0 - 11,4)	(0,0 - 11,2)	(0,0 - 14,2)	(1,5 - 12,1)
2018	17,7	15,5	19,1	21,6	21,4	27,5	13,9	10,7	14,2	20,0	17,4
	(10,0 - 25,3)	(2,5 - 28,5)	(8,7 - 29,5)	(0,0 - 44,9)	(0,2 - 42,6)	(7,7 - 47,3)	(0,0 - 30,7)	(0,0 - 22,2)	(1,9 - 26,6)	(8,1 - 31,9)	(2,4 - 32,5)
2020	18,5	12,9	25,8	37,0	15,1	5,9*	10,7	23,6	21,7	14,7	18,1
	(12,0 - 24,9)	(1,4 - 24,3)	(2,1 - 49,6)	(0,0 - 86,2)	(0,0 - 34,4)	(0,0 - 14,1)	(0,0 - 24,3)	(0,0 - 53,8)	(0,0 - 48,8)	(0,0 - 30,0)	(0,0 - 37,2)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

LO CONSEGUÍ DE OTRA FORMA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2016	5,0	1,9	7,3	12,9		8,5	7,8	1,6	15,0	0,9	4,9
	(1,2 - 8,8)	(0,0 - 3,9)	(1,2 - 13,5)	(0,0 - 29,8)		(0,0 - 21,3)	(0,0 - 18,3)	(0,0 - 3,9)	(0,0 - 30,5)	(0,0 - 2,1)	(0,0 - 10,3)
2018	11,6	18,0	7,5	3,2	25,2	9,2	7,7	8,6	27,5	11,0	3,4
	(4,4 - 18,9)	(3,2 - 32,8)	(1,8 - 13,2)	(0,0 - 9,9)	(0,0 - 51,1)	(0,0 - 18,6)	(0,0 - 15,9)	(1,2 - 16,1)	(2,6 - 52,5)	(3,2 - 18,8)	(0,3 - 6,5)
2020	13,8	17,1	9,5	49,0	7,9	2,1	14,2	11,8	18,2	17,1	2,5
	(4,4 - 23,2)	(0,0 - 35,2)	(2,6 - 16,4)	(0,0 - 100)	(0,0 - 17,8)	(0,0 - 4,4)	(0,0 - 29,2)	(3,3 - 20,3)	(0,0 - 39,0)	(5,9 - 28,3)	(0,0 - 5,2)

PERCEPCIÓN DE DROGAS EN EL ENTORNO DEL HOGAR

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2000-2020.

Pregunta: En su casa, y hasta donde usted conoce, ¿alguien usa o consume alguna de estas drogas?

MARIHUANA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2000	6,1	6,8	5,4	7,0	10,7	6,2	4,6	3,6	7,0	4,8	6,0
	(5,7 - 6,5)	(6,2 - 7,4)	(4,9 - 5,9)	(6,1 - 7,9)	(9,4 - 12,0)	(5,4 - 7,1)	(3,9 - 5,3)	(3,1 - 4,2)	(6,4 - 7,5)	(4,2 - 5,4)	(5,2 - 6,8)
2002	4,1	3,2	4,9	4,9	7,9	3,9	2,3	2,7	4,5	4,5	2,8
	(3,5 - 4,6)	(2,6 - 3,8)	(4,0 - 5,7)	(3,5 - 6,2)	(6,1 - 9,7)	(2,8 - 5,1)	(1,5 - 3,1)	(1,8 - 3,5)	(3,7 - 5,3)	(3,4 - 5,5)	(1,9 - 3,8)
2004	4,3	3,8	4,7	5,6	7,8	4,0	3,3	2,1	5,1	4,0	3,2
	(3,7 - 4,8)	(3,1 - 4,4)	(4,0 - 5,5)	(4,3 - 7,0)	(5,9 - 9,6)	(2,9 - 5,1)	(2,3 - 4,3)	(1,5 - 2,7)	(4,3 - 5,9)	(3,1 - 5,0)	(2,3 - 4,1)
2006	6,8	5,8	7,8	5,3	15,4	8,1	5,2	3,1	6,3	6,6	7,7
	(5,9 - 7,8)	(4,6 - 7,1)	(6,4 - 9,1)	(4,0 - 6,6)	(11,4 - 19,4)	(6,3 - 10,0)	(3,6 - 6,9)	(1,9 - 4,3)	(5,4 - 7,2)	(5,2 - 8,1)	(5,2 - 10,3)
2008	5,4	5,2	5,5	6,8	9,0	6,4	3,1	3,4	7,1	4,3	4,3
	(4,7 - 6,0)	(4,2 - 6,2)	(4,6 - 6,4)	(4,9 - 8,7)	(6,9 - 11,1)	(4,8 - 8,1)	(2,0 - 4,1)	(2,4 - 4,5)	(5,8 - 8,5)	(3,5 - 5,2)	(3,1 - 5,6)
2010	4,2	5,0	3,3	3,0	7,3	5,1	2,5	3,8	6,1	4,0	3,2
	(3,5 - 4,8)	(4,0 - 6,1)	(2,6 - 4,0)	(1,6 - 4,4)	(5,3 - 9,2)	(3,5 - 6,6)	(1,7 - 3,2)	(2,7 - 5,0)	(4,4 - 7,8)	(2,9 - 5,1)	(2,4 - 4,1)
2012	5,2	5,8	4,6	5,4	8,3	5,3	3,8	4,2	6,4	4,7	5,0
	(4,5 - 5,9)	(4,5 - 7,0)	(3,9 - 5,4)	(3,1 - 7,7)	(5,6 - 11,1)	(4,0 - 6,6)	(2,6 - 5,0)	(3,2 - 5,2)	(5,1 - 7,7)	(3,8 - 5,7)	(3,6 - 6,3)
2014	5,9	6,1	5,8	6,0	8,9	8,4	4,2	4,5	7,6	6,4	4,6
	(5,2 - 6,6)	(5,0 - 7,2)	(5,0 - 6,6)	(3,9 - 8,1)	(6,9 - 11,0)	(6,3 - 10,4)	(2,6 - 5,7)	(3,6 - 5,4)	(6,1 - 9,0)	(5,0 - 7,8)	(3,7 - 5,6)
2016	9,8	9,2	10,3	8,7	17,0	13,0	6,2	7,3	10,0	7,5	11,5
	(8,4 - 11,1)	(7,6 - 10,8)	(8,6 - 12,0)	(6,5 - 10,8)	(12,3 - 21,7)	(10,2 - 15,8)	(3,8 - 8,6)	(5,9 - 8,8)	(7,5 - 12,4)	(5,9 - 9,1)	(9,3 - 13,7)
2018	11,7	13,6	9,8	12,6	19,6	16,1	9,8	7,0	12,1	10,7	12,3
	(10,6 - 12,8)	(11,8 - 15,4)	(8,6 - 11,0)	(9,2 - 16,0)	(16,3 - 22,9)	(13,1 - 19,0)	(6,5 - 13,0)	(5,9 - 8,1)	(10,1 - 14,1)	(9,1 - 12,4)	(10,3 - 14,4)
2020	9,7*	10,0*	9,3	7,4*	18,1	11,0*	6,7	7,7	11,7	9,1	8,7*
	(8,6 - 10,7)	(8,3 - 11,7)	(7,9 - 10,7)	(4,4 - 10,3)	(13,6 - 22,7)	(8,6 - 13,4)	(4,7 - 8,6)	(6,2 - 9,2)	(9,3 - 14,0)	(7,5 - 10,7)	(6,5 - 10,8)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

COCAÍNA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2000	1,6	1,8	1,5	1,8	2,7	1,6	1,4	1,0	1,7	1,3	1,8
	(1,4 - 1,8)	(1,5 - 2,1)	(1,2 - 1,7)	(1,3 - 2,3)	(2,1 - 3,3)	(1,2 - 2,0)	(1,0 - 1,7)	(0,7 - 1,4)	(1,4 - 2,0)	(1,0 - 1,6)	(1,4 - 2,3)
2002	0,7	0,6	0,7	1,0	1,3	0,8	0,3	0,4	0,9	0,6	0,5
	(0,5 - 0,9)	(0,4 - 0,9)	(0,4 - 1,1)	(0,2 - 1,7)	(0,6 - 2,0)	(0,3 - 1,4)	(<0,1 - 0,5)	(0,1 - 0,7)	(0,5 - 1,2)	(0,2 - 0,9)	(0,1 - 1,0)
2004	0,9	0,9	0,9	1,0	1,6	1,0	0,9	0,4	1,2	0,8	0,6
	(0,7 - 1,2)	(0,6 - 1,2)	(0,6 - 1,3)	(0,4 - 1,7)	(0,8 - 2,3)	(0,5 - 1,5)	(0,3 - 1,4)	(0,2 - 0,7)	(0,8 - 1,6)	(0,5 - 1,2)	(0,2 - 1,0)
2006	1,6	1,2	2,1	1,5	2,6	2,6	1,3	0,7	1,7	1,9	1,2
	(1,2 - 2,0)	(0,8 - 1,5)	(1,4 - 2,8)	(0,7 - 2,4)	(1,4 - 3,8)	(1,3 - 3,9)	(0,3 - 2,3)	(0,3 - 1,1)	(1,1 - 2,2)	(0,9 - 2,9)	(0,8 - 1,7)
2008	1,4	1,4	1,4	1,5	2,0	1,1	1,2	1,3	2,5	1,0	0,4
	(1,0 - 1,8)	(0,7 - 2,0)	(0,9 - 1,8)	(0,5 - 2,4)	(0,9 - 3,1)	(0,5 - 1,7)	(0,5 - 1,8)	(0,4 - 2,2)	(1,5 - 3,5)	(0,5 - 1,4)	(0,1 - 0,6)
2010	0,8	1,1	0,5	0,5	0,8	1,0	0,5	0,9	1,1	0,9	0,4
	(0,4 - 1,1)	(0,6 - 1,6)	(0,2 - 0,7)	(0,0 - 1,0)	(0,4 - 1,3)	(0,3 - 1,7)	(0,2 - 0,8)	(0,2 - 1,5)	(0,5 - 1,6)	(0,2 - 1,6)	(0,1 - 0,7)
2012	1,2	0,9	1,5	1,0	1,1	1,3	1,2	1,3	1,4	1,6	0,7
	(0,9 - 1,5)	(0,6 - 1,2)	(1,1 - 2,0)	(0,3 - 1,7)	(0,6 - 1,7)	(0,7 - 1,8)	(0,6 - 1,9)	(0,8 - 1,8)	(0,9 - 2,0)	(1,1 - 2,2)	(0,4 - 1,0)
2014	1,1	1,1	1,2	0,7	2,0	1,2	1,1	0,9	2,2	1,3	0,5
	(0,9 - 1,4)	(0,7 - 1,5)	(0,8 - 1,5)	(0,0 - 1,4)	(1,0 - 3,0)	(0,6 - 1,9)	(0,6 - 1,6)	(0,6 - 1,3)	(1,4 - 3,1)	(0,8 - 1,7)	(0,2 - 0,7)
2016	1,5	1,1	1,9	0,8	2,7	1,9	1,6	1,1	2,3	1,3	1,3
	(1,1 - 2,0)	(0,7 - 1,6)	(1,2 - 2,6)	(0,2 - 1,3)	(1,3 - 4,1)	(0,9 - 2,9)	(0,3 - 2,8)	(0,7 - 1,6)	(1,1 - 3,6)	(0,6 - 2,0)	(0,8 - 1,8)
2018	1,7	1,9	1,6	1,4	2,2	2,7	1,3	1,4	2,0	2,1	1,1
	(1,3 - 2,2)	(1,1 - 2,7)	(1,1 - 2,0)	(0,2 - 2,6)	(0,3 - 4,0)	(1,3 - 4,0)	(0,7 - 1,9)	(0,9 - 2,0)	(1,1 - 2,9)	(1,1 - 3,0)	(0,6 - 1,6)
2020	0,9*	0,8*	1,0	0,6	1,3	0,6*	0,6	1,2	1,7	0,6*	0,7
	(0,5 - 1,4)	(0,4 - 1,3)	(0,4 - 1,7)	(0,0 - 1,3)	(0,3 - 2,4)	(0,2 - 1,0)	(<0,1 - 1,2)	(0,3 - 2,0)	(0,4 - 2,9)	(<0,1 - 1,1)	(0,1 - 1,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PASTA BASE

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2000	2,0	2,1	1,9	2,0	2,5	1,9	2,1	1,7	2,7	1,6	1,3
	(1,8 - 2,2)	(1,7 - 2,4)	(1,6 - 2,2)	(1,4 - 2,5)	(1,9 - 3,0)	(1,4 - 2,4)	(1,6 - 2,6)	(1,3 - 2,1)	(2,3 - 3,1)	(1,2 - 1,9)	(0,9 - 1,7)
2002	0,8	0,5	1,1	0,8	1,1	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,4
	(0,6 - 1,1)	(0,3 - 0,8)	(0,7 - 1,5)	(0,1 - 1,5)	(0,6 - 1,7)	(0,5 - 1,7)	(0,2 - 1,0)	(0,2 - 1,0)	(0,8 - 1,7)	(0,3 - 0,9)	(0,1 - 0,8)
2004	1,2	1,2	1,2	1,5	1,6	0,9	1,2	0,9	2,0	0,9	0,3
	(0,9 - 1,5)	(0,8 - 1,5)	(0,8 - 1,6)	(0,8 - 2,3)	(0,8 - 2,3)	(0,4 - 1,4)	(0,7 - 1,8)	(0,5 - 1,4)	(1,5 - 2,5)	(0,5 - 1,2)	(0,1 - 0,6)
2006	1,6	1,2	1,9	1,4	1,5	3,0	1,3	0,9	2,4	1,3	0,6
	(1,2 - 1,9)	(0,8 - 1,5)	(1,4 - 2,5)	(0,8 - 2,0)	(0,8 - 2,2)	(1,6 - 4,4)	(0,9 - 1,8)	(0,5 - 1,3)	(1,8 - 3,0)	(0,7 - 2,0)	(0,4 - 0,9)
2008	1,3	1,4	1,2	1,3	2,7	1,2	0,7	0,9	2,3	0,8	0,6
	(0,9 - 1,7)	(0,7 - 2,0)	(0,8 - 1,7)	(0,4 - 2,3)	(1,4 - 4,0)	(0,3 - 2,0)	(0,3 - 1,2)	(0,1 - 1,7)	(1,3 - 3,3)	(0,5 - 1,1)	(0,2 - 1,0)
2010	1,5	2,1	1,0	1,4	2,3	0,9	1,0	1,8	2,6	2,0	0,4
	(1,1 - 2,0)	(1,3 - 2,9)	(0,6 - 1,3)	(0,5 - 2,4)	(0,7 - 3,9)	(0,4 - 1,5)	(0,5 - 1,4)	(1,0 - 2,6)	(1,2 - 3,9)	(1,1 - 2,8)	(0,2 - 0,6)
2012	1,5	1,2	1,7	1,3	1,4	1,7	1,7	1,4	2,4	1,8	0,7
	(1,2 - 1,8)	(0,9 - 1,6)	(1,3 - 2,2)	(0,6 - 1,9)	(0,8 - 2,0)	(1,1 - 2,4)	(0,9 - 2,4)	(0,9 - 2,0)	(1,6 - 3,2)	(1,3 - 2,4)	(0,4 - 1,0)
2014	1,4	1,4	1,5	0,9	1,7	1,3	1,2	1,6	3,0	1,6	0,5
	(1,1 - 1,7)	(0,9 - 1,8)	(1,1 - 1,8)	(0,2 - 1,7)	(0,9 - 2,6)	(0,7 - 1,9)	(0,6 - 1,7)	(1,2 - 2,1)	(2,1 - 3,9)	(1,1 - 2,1)	(0,3 - 0,6)
2016	1,4	1,2	1,6	0,6	1,5	1,3	1,7	1,6	3,0	1,1	0,9
	(1,0 - 1,8)	(0,9 - 1,6)	(1,0 - 2,2)	(0,3 - 1,0)	(0,6 - 2,4)	(0,7 - 1,9)	(0,5 - 2,9)	(1,0 - 2,1)	(1,6 - 4,4)	(0,7 - 1,4)	(0,4 - 1,4)
2018	1,7	1,7	1,6	1,5	1,6	1,9	1,2	1,9	2,9	1,5	0,9
	(1,3 - 2,1)	(1,2 - 2,3)	(1,1 - 2,1)	(0,4 - 2,6)	(0,8 - 2,4)	(1,0 - 2,8)	(0,6 - 1,8)	(1,3 - 2,5)	(1,9 - 4,0)	(0,9 - 2,0)	(0,5 - 1,4)
2020	1,0*	1,0	1,1	0,7	0,8	0,9	0,6	1,5	1,8	0,9	0,5
	(0,5 - 1,5)	(0,5 - 1,5)	(0,4 - 1,7)	(0,1 - 1,2)	(0,0 - 1,7)	(0,3 - 1,5)	(0,1 - 1,1)	(0,6 - 2,4)	(0,3 - 3,3)	(0,2 - 1,6)	(0,2 - 0,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

TIPOS DE MARIHUANA CONSUMIDAS CON MAYOR FRECUENCIA¹

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2020.

Pregunta: ¿Qué tipo de marihuana consumió con mayor frecuencia?

Respuestas: Marihuana prensada o paraguaya, marihuana verde, o marihuana *skunk* o de alta potencia.

MARIHUANA PRENSADA O PARAGUAYA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	32,1	36,4	22,6	42,4	31,9	26,1	26,3	36,2	39,6	36,9	23,7
	(27,3 - 36,9)	(30,0 - 42,8)	(14,1 - 31,0)	(29,2 - 55,6)	(23,8 - 40,0)	(17,0 - 35,2)	(14,3 - 38,3)	(15,0 - 57,4)	(30,2 - 49,0)	(29,4 - 44,5)	(15,2 - 32,2)
2014	15,9	17,7	12,6	30,9	12,6	14,7	12,1	13,2	25,7	20,4	8,3
	(12,8 - 19,0)	(13,4 - 22,1)	(9,4 - 15,9)	(19,3 - 42,4)	(8,5 - 16,7)	(8,3 - 21,2)	(6,2 - 17,9)	(6,7 - 19,8)	(18,6 - 32,7)	(13,7 - 27,1)	(5,2 - 11,3)
2016	8,1	9,4	5,9	13,8	6,4	7,4	11,7	6,3	16,0	10,6	3,3
	(5,4 - 10,9)	(5,7 - 13,2)	(3,3 - 8,5)	(5,6 - 22,0)	(3,9 - 8,9)	(1,7 - 13,0)	(1,5 - 21,9)	(2,3 - 10,3)	(8,0 - 24,0)	(5,3 - 15,8)	(2,0 - 4,7)
2018	3,8	4,1	3,3	4,4	3,5	3,2	2,7	7,4	6,3	4,4	1,2
	(2,7 - 5,0)	(2,6 - 5,5)	(1,2 - 5,3)	(0,7 - 8,1)	(1,7 - 5,4)	(1,5 - 4,8)	(0,3 - 5,1)	(1,5 - 13,3)	(2,9 - 9,8)	(2,5 - 6,3)	(0,4 - 2,1)
2020	2,2*	2,3	1,9	2,3	1,8	3,4	1,5	1,4	3,0	2,4	1,4
	(1,3 - 3,1)	(1,0 - 3,6)	(0,7 - 3,1)	(0,1 - 4,5)	(0,8 - 2,8)	(0,8 - 6,0)	(0,1 - 2,8)	(0,0 - 2,8)	(0,1 - 6,0)	(1,1 - 3,6)	(0,3 - 2,4)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

MARIHUANA VERDE

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	54,4	50,0	64,1	49,4	50,7	60,5	63,0	55,4	53,8	49,7	58,8
	(48,6 - 60,3)	(42,6 - 57,4)	(55,0 - 73,2)	(36,3 - 62,4)	(40,0 - 61,3)	(50,5 - 70,5)	(49,1 - 76,9)	(34,9 - 75,8)	(43,9 - 63,7)	(42,1 - 57,4)	(46,9 - 70,7)
2014	68,9	65,7	74,5	54,4	78,3	62,1	73,9	69,0	64,6	70,3	69,8
	(64,6 - 73,2)	(59,6 - 71,8)	(69,7 - 79,4)	(42,9 - 66,0)	(72,9 - 83,6)	(51,8 - 72,3)	(63,1 - 84,7)	(56,4 - 81,6)	(57,3 - 71,9)	(63,2 - 77,3)	(62,7 - 76,9)
2016	72,9	70,9	76,4	65,2	75,3	76,1	66,7	72,3	65,4	75,6	74,5
	(68,8 - 77,1)	(65,8 - 76,0)	(71,0 - 81,8)	(54,8 - 75,7)	(69,7 - 81,0)	(68,7 - 83,6)	(55,4 - 78,0)	(60,0 - 84,6)	(56,5 - 74,2)	(70,1 - 81,2)	(68,4 - 80,5)
2018	74,4	72,7	78,4	54,0	72,2	81,0	84,4	71,3	69,5	71,2	81,1
	(70,3 - 78,4)	(67,2 - 78,3)	(72,9 - 83,8)	(36,7 - 71,2)	(64,4 - 80,0)	(74,7 - 87,3)	(77,2 - 91,6)	(62,7 - 79,9)	(60,8 - 78,1)	(64,0 - 78,4)	(76,7 - 85,6)
2020	83,1*	81,9*	85,8*	84,6*	76,7	87,7	85,8	86,9*	82,2*	84,1*	82,2
	(78,3 - 87,9)	(75,7 - 88,2)	(81,1 - 90,6)	(74,8 - 94,5)	(66,7 - 86,6)	(81,9 - 93,4)	(79,0 - 92,6)	(80,1 - 93,7)	(75,4 - 88,9)	(77,5 - 90,8)	(73,0 - 91,4)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

MARIHUANA SKUNK O DE ALTA POTENCIA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	6,2	7,4	3,5	2,2	10,2	4,2	4,0	2,7	0,9	4,3	10,8
	(0,7 - 11,7)	(0,0 - 15,3)	(0,7 - 6,3)	(0,0 - 4,5)	(0,0 - 22,6)	(0,0 - 9,9)	(0,0 - 10,2)	(0,0 - 7,9)	(0,0 - 2,0)	(0,4 - 8,3)	(0,0 - 23,3)
2014	5,7	6,9	3,8	4,4	3,2	13,5	3,0	3,1	1,5	4,2	8,8
	(3,5 - 8,0)	(3,5 - 10,3)	(1,8 - 5,7)	(0,0 - 11,1)	(1,3 - 5,0)	(5,9 - 21,0)	(0,4 - 5,6)	(0,0 - 6,3)	(<0,1 - 2,9)	(0,9 - 7,4)	(4,5 - 13,1)
2016	9,7	11,6	6,3	8,7	11,9	9,9	9,9	4,3	7,7	6,4	12,5
	(6,6 - 12,8)	(8,0 - 15,3)	(2,5 - 10,2)	(3,3 - 14,1)	(7,2 - 16,5)	(4,5 - 15,4)	(1,1 - 18,6)	(0,7 - 7,9)	(4,0 - 11,5)	(3,5 - 9,4)	(7,3 - 17,7)
2018	12,1	14,5	6,4	25,1	15,0	10,1	6,2	3,2	16,9	14,8	6,1
	(8,8 - 15,5)	(10,1 - 19,0)	(3,3 - 9,5)	(7,7 - 42,4)	(8,9 - 21,1)	(4,9 - 15,3)	(1,0 - 11,3)	(0,7 - 5,8)	(9,8 - 24,0)	(7,9 - 21,6)	(3,8 - 8,5)
2020	8,3	9,1	6,4	4,8*	13,3	5,9	6,4	3,5	7,1*	7,7	10,2
	(4,5 - 12,2)	(4,0 - 14,3)	(2,1 - 10,8)	(0,0 - 11,3)	(4,7 - 22,0)	(0,9 - 11,0)	(0,4 - 12,5)	(0,0 - 7,3)	(1,4 - 12,7)	(3,1 - 12,2)	(1,3 - 19,1)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

1 En ENPG 2016 se añadieron alternativas de respuesta: marihuana verde o yerba de "autocultivo" y marihuana *skunk* o de alta potencia de "autocultivo". En el análisis de tendencia se añadieron a las categorías marihuana verde y marihuana *skunk* respectivamente.

CONOCIMIENTO CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y PRESENCIA DE NICOTINA EN DISPOSITIVO

Según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2014-2020.

CONOCIMIENTO CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2014	46,9	48,8	45,0	38,2	56,4	55,3	48,7	41,6	35,8	43,5	55,6
	(45,2 - 48,5)	(46,4 - 51,2)	(42,9 - 47,0)	(34,5 - 42,0)	(52,4 - 60,4)	(51,6 - 58,9)	(45,3 - 52,0)	(39,0 - 44,2)	(33,0 - 38,6)	(41,0 - 46,0)	(52,8 - 58,4)
2016	66,5	67,1	66,0	63,7	76,2	73,8	70,0	58,4	59,0	63,2	72,9
	(64,7 - 68,3)	(64,9 - 69,3)	(64,0 - 67,9)	(60,0 - 67,4)	(72,9 - 79,5)	(70,5 - 77,0)	(67,0 - 73,1)	(55,5 - 61,3)	(55,5 - 62,6)	(60,7 - 65,8)	(70,5 - 75,4)
2018	66,1	68,0	64,2	65,7	73,8	74,8	67,9	57,7	62,2	66,5	68,8
	(64,7 - 67,4)	(66,0 - 70,0)	(62,4 - 66,0)	(61,8 - 69,7)	(70,5 - 77,2)	(72,4 - 77,3)	(64,8 - 71,0)	(55,5 - 60,0)	(59,8 - 64,6)	(64,2 - 68,8)	(66,4 - 71,2)
2020	73,9*	77,1*	70,7*	72,0	85,2*	79,6*	76,9*	65,5*	72,8*	70,4*	79,3*
	(72,0 - 75,7)	(74,8 - 79,4)	(68,7 - 72,7)	(66,6 - 77,4)	(81,8 - 88,7)	(76,5 - 82,7)	(74,3 - 79,5)	(62,8 - 68,2)	(69,5 - 76,1)	(67,2 - 73,7)	(77,2 - 81,4)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PRESENCIA DE NICOTINA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2014	30,7	32,8	28,3	25,9	29,8	33,9	35,5	27,1	24,8	27,7	35,1
	(25,4 - 36,0)	(24,9 - 40,7)	(22,1 - 34,4)	(10,0 - 41,8)	(18,4 - 41,1)	(25,6 - 42,2)	(22,4 - 48,5)	(16,3 - 38,0)	(15,6 - 34,1)	(18,3 - 37,2)	(27,0 - 43,1)
2016	39,4	42,2	36,2	34,0	45,5	42,0	36,1	36,3	30,4	37,2	43,7
	(35,1 - 43,8)	(36,9 - 47,5)	(30,5 - 42,0)	(22,8 - 45,3)	(35,5 - 55,5)	(32,9 - 51,0)	(27,9 - 44,2)	(28,4 - 44,2)	(21,5 - 39,4)	(31,0 - 43,3)	(35,5 - 51,9)
2018	38,3	38,7	37,8	29,5	46,9	37,9	40,3	33,1	28,7	32,9	48,6
	(34,1 - 42,4)	(33,5 - 43,8)	(29,5 - 46,0)	(21,0 - 38,1)	(34,5 - 59,3)	(28,6 - 47,1)	(31,1 - 49,4)	(25,1 - 41,0)	(21,9 - 35,5)	(27,7 - 38,1)	(41,4 - 55,8)
2020	43,2	49,8*	33,5	40,7	43,8	37,3	51,9	43,8	35,8	43,4*	48,5
	(38,4 - 47,9)	(42,9 - 56,8)	(27,3 - 39,6)	(25,6 - 55,8)	(34,6 - 53,0)	(29,2 - 45,4)	(41,1 - 62,6)	(27,5 - 60,1)	(26,6 - 45,0)	(35,8 - 50,9)	(37,1 - 60,0)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

DEPENDENCIA DE DROGAS ENTRE PREVALENTES DE ÚLTIMO AÑO (CRITERIO CIE-10)

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2006-2020.

MARIHUANA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	19,8	22,1	15,0	26,8	25,0	10,5	12,8	12,9	25,9	9,8	21,5
	(13,0 - 26,5)	(12,8 - 31,4)	(8,2 - 21,9)	(15,9 - 37,7)	(10,9 - 39,2)	(4,9 - 16,2)	(4,0 - 21,5)	(0,0 - 28,8)	(19,4 - 32,4)	(5,4 - 14,1)	(5,8 - 37,2)
2008	24,2	27,2	18,0	21,8	21,7	32,6	23,6	28,8	28,0	21,6	20,9
	(19,0 - 29,5)	(20,6 - 33,9)	(10,6 - 25,5)	(12,2 - 31,3)	(14,1 - 29,4)	(19,8 - 45,4)	(4,1 - 43,1)	(3,5 - 54,1)	(19,7 - 36,3)	(12,0 - 31,1)	(11,5 - 30,4)
2010	16,2	17,6	11,9	20,2	14,8	11,5	15,8	40,4	27,7	15,8	8,5
	(11,9 - 20,5)	(12,5 - 22,6)	(3,5 - 20,3)	(8,4 - 32,0)	(8,2 - 21,5)	(4,4 - 18,5)	(4,2 - 27,5)	(12,6 - 68,2)	(16,4 - 39,0)	(9,5 - 22,1)	(3,1 - 13,9)
2012	19,4	21,0	15,8	28,9	20,8	18,0	8,4	12,8	27,1	20,9	13,7
	(15,1 - 23,6)	(15,7 - 26,4)	(8,7 - 22,9)	(17,5 - 40,4)	(13,7 - 27,9)	(9,0 - 27,0)	(1,5 - 15,4)	(3,1 - 22,5)	(20,0 - 34,2)	(13,4 - 28,4)	(7,3 - 20,2)
2014	16,4	16,2	16,8	16,0	15,8	9,8	24,1	21,6	20,8	12,2	17,6
	(12,6 - 20,2)	(10,5 - 21,9)	(10,0 - 23,6)	(7,1 - 25,0)	(10,6 - 21,0)	(5,3 - 14,3)	(9,3 - 38,9)	(2,0 - 41,2)	(13,9 - 27,6)	(7,9 - 16,6)	(10,7 - 24,6)
2016	14,8	18,7	7,9	17,3	18,8	17,0	6,9	4,4	17,4	17,7	11,9
	(11,6 - 18,0)	(13,9 - 23,5)	(5,1 - 10,8)	(9,6 - 25,0)	(12,9 - 24,7)	(11,0 - 22,9)	(2,1 - 11,7)	(1,8 - 7,1)	(12,0 - 22,7)	(11,7 - 23,8)	(7,7 - 16,1)
2018	20,3	24,5	10,4	15,6	27,9	20,1	10,4	11,3	21,0	22,1	17,5
	(16,7 - 24,0)	(19,5 - 29,4)	(6,8 - 13,9)	(6,7 - 24,4)	(20,5 - 35,4)	(13,0 - 27,3)	(1,7 - 19,1)	(6,1 - 16,5)	(13,1 - 28,9)	(15,7 - 28,5)	(11,1 - 23,9)
2020	20,2	23,8	12,0	45,1*	24,2	18,8	12,5	9,2	34,2*	17,2	14,7
	(15,8 - 24,7)	(17,9 - 29,8)	(7,2 - 16,8)	(24,5 - 65,6)	(16,4 - 31,9)	(10,1 - 27,5)	(5,0 - 20,0)	(3,3 - 15,1)	(23,8 - 44,7)	(10,9 - 23,5)	(9,5 - 20,0)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

COCAÍNA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	29,4	29,8	28,2	37,0	33,6	21,9	25,9	40,4	42,2	18,1	10,8
	(19,2 - 39,5)	(18,6 - 40,9)	(4,6 - 51,8)	(3,1 - 70,9)	(17,4 - 49,9)	(5,5 - 38,4)	(0,0 - 52,5)	(0,0 - 85,0)	(27,8 - 56,6)	(3,1 - 33,1)	(0,0 - 23,3)
2008	20,5	17,8	35,0	1,6	26,8	19,4	30,0	6,1	19,2	18,0	27,6
	(10,5 - 30,4)	(7,2 - 28,5)	(10,9 - 59,2)	(0,0 - 5,1)	(10,6 - 43,1)	(2,8 - 36,0)	(0,0 - 61,7)	(0,0 - 23,1)	(8,0 - 30,5)	(0,0 - 39,1)	(2,9 - 52,3)
2010	24,7	22,8	39,8		15,2	37,7	30,8	26,6	47,8	21,9	8,3
	(16,8 - 32,6)	(10,7 - 35,0)	(0,0 - 80,9)		(1,2 - 29,2)	(11,3 - 64,1)	(0,5 - 61,0)	(0,0 - 75,2)	(24,5 - 71,2)	(0,0 - 44,8)	(0,0 - 16,9)
2012	33,8	24,0	61,0	73,7	32,4	20,8	10,7	68,8	25,6	17,9	54,5
	(20,5 - 47,2)	(5,5 - 42,5)	(29,8 - 92,2)	(28,5 - 100)	(2,4 - 62,4)	(5,9 - 35,7)	(0,0 - 25,3)	(22,4 - 100)	(9,7 - 41,6)	(0,0 - 37,1)	(27,6 - 81,5)
2014	22,1	20,5	28,1	3,4	13,7	32,0	24,3	29,7	18,7	30,6	16,3
	(10,6 - 33,5)	(8,4 - 32,5)	(9,8 - 46,3)	(0,0 - 8,0)	(0,3 - 27,2)	(3,3 - 60,7)	(6,0 - 42,6)	(7,6 - 51,9)	(6,4 - 31,0)	(8,9 - 52,2)	(0,4 - 32,3)
2016	29,6	21,8	57,9		26,5	34,0	24,8	44,3	30,8	22,5	35,7
	(20,8 - 38,3)	(10,5 - 33,1)	(28,7 - 87,2)		(0,0 - 60,1)	(14,3 - 53,7)	(2,1 - 47,4)	(12,5 - 76,1)	(11,0 - 50,7)	(6,3 - 38,8)	(21,7 - 49,7)
2018	25,6	18,7	62,1		14,7	30,8	43,5	7,2	26,7	38,2	4,4
	(17,5 - 33,7)	(8,8 - 28,6)	(32,8 - 91,4)		(0,2 - 29,2)	(12,4 - 49,1)	(11,4 - 75,6)	(0,0 - 17,7)	(3,8 - 49,6)	(20,5 - 55,9)	(0,0 - 9,5)
2020	33,2	31,6	51,8		29,0	20,3	54,9	25,5	33,9	32,0	33,7
	(24,0 - 42,4)	(13,9 - 49,3)	(18,0 - 85,5)		(0,0 - 63,2)	(0,0 - 43,9)	(24,1 - 85,6)	(0,0 - 51,7)	(4,1 - 63,6)	(6,8 - 57,2)	(0,0 - 68,5)

PASTA BASE

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	52,2	55,9	34,1	36,0	34,8	71,4	66,2	21,4	65,0	15,7	18,1
	(36,0 - 68,5)	(37,6 - 74,2)	(1,1 - 67,0)	(6,3 - 65,8)	(4,1 - 65,4)	(48,3 - 94,5)	(36,4 - 96,0)	(0,0 - 65,5)	(47,8 - 82,3)	(0,0 - 32,2)	(0,0 - 53,9)
2008	50,2	48,7	54,4	26,5	51,8	56,6	48,6	68,7	43,5	27,5	94,0
	(34,6 - 65,8)	(31,1 - 66,2)	(17,7 - 91,1)	(0,0 - 61,3)	(26,9 - 76,7)	(26,5 - 86,8)	(5,5 - 91,7)	(23,9 - 100)	(26,7 - 60,2)	(6,2 - 48,8)	(78,9 - 100)
2010	54,6	53,8	64,9	22,7	56,8	59,0	44,6	89,6	58,8	60,1	29,4
	(43,7 - 65,6)	(37,3 - 70,2)	(29,6 - 100)	(0,0 - 52,6)	(32,9 - 80,8)	(31,3 - 86,7)	(0,0 - 91,7)	(67,9 - 100)	(37,6 - 80,0)	(30,9 - 89,3)	(5,3 - 53,6)
2012	57,7	58,8	47,4	36,7	19,7	70,5	79,3	62,1	47,1	68,5	65,2
	(44,9 - 70,6)	(39,9 - 77,6)	(3,8 - 91,1)	(0,0 - 90,2)	(0,0 - 41,7)	(40,2 - 100)	(53,3 - 100)	(29,6 - 94,6)	(26,2 - 68,0)	(41,9 - 95,0)	(16,9 - 100)
2014	65,6	63,4	86,2	96,5	71,7	60,2	58,5	65,5	69,8	63,0	48,7
	(52,8 - 78,4)	(47,5 - 79,4)	(70,2 - 100)	(87,3 - 100)	(37,8 - 100)	(33,2 - 87,2)	(29,8 - 87,2)	(38,9 - 92,2)	(51,3 - 88,3)	(39,2 - 86,9)	(10,5 - 86,9)
2016	44,6	45,4	37,7	19,9	23,4	45,0	68,9	52,9	42,8	53,8	33,7
	(31,8 - 57,4)	(27,3 - 63,4)	(0,0 - 85,4)	(0,0 - 57,4)	(0,0 - 49,1)	(15,0 - 75,1)	(40,3 - 97,5)	(16,9 - 88,8)	(20,1 - 65,5)	(24,1 - 83,6)	(4,7 - 62,7)
2018	57,4	53,3	71,3		21,3	59,2	69,5	59,7	66,1	41,1	47,5
	(43,5 - 71,2)	(36,3 - 70,3)	(45,3 - 97,3)		(0,0 - 47,0)	(32,6 - 85,7)	(42,7 - 96,2)	(30,3 - 89,1)	(45,9 - 86,4)	(18,2 - 64,1)	(5,3 - 89,7)
2020	69,2	75,8	31,8		45,8	100*	55,3	71,8	55,4	64,2	99,1*
	(62,9 - 75,5)	(50,1 - 100)	(0,0 - 64,4)		(0,0 - 100)	(100 - 100)	(15,3 - 95,3)	(37,8 - 100)	(12,8 - 98,0)	(38,7 - 89,7)	(97,0 - 100)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ABUSO DE DROGAS ENTRE PREVALENTES DE ÚLTIMO AÑO (CRITERIO DSM-IV)

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2020.

MARIHUANA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	28,9	29,4	27,1	31,9	33,4	23,9	19,1	17,3	32,4	28,9	22,0
	(24,0 - 33,8)	(23,8 - 34,9)	(16,6 - 37,7)	(21,0 - 42,7)	(25,4 - 41,3)	(14,3 - 33,4)	(3,9 - 34,2)	(0,0 - 36,2)	(25,3 - 39,6)	(19,7 - 38,1)	(12,1 - 31,9)
2004	24,6	27,8	17,4	32,9	23,8	24,4	18,1	6,6	29,5	25,6	18,0
	(19,8 - 29,5)	(21,8 - 33,9)	(9,9 - 25,0)	(21,9 - 43,9)	(16,1 - 31,5)	(14,4 - 34,4)	(4,1 - 32,1)	(0,0 - 19,9)	(21,8 - 37,1)	(17,2 - 34,1)	(9,0 - 26,9)
2006	18,9	20,3	16,1	27,1	21,9	12,0	14,5	8,8	27,8	13,0	15,4
	(14,7 - 23,1)	(15,2 - 25,4)	(8,8 - 23,5)	(16,7 - 37,6)	(14,3 - 29,5)	(5,3 - 18,8)	(5,8 - 23,2)	(0,0 - 22,3)	(21,3 - 34,4)	(6,9 - 19,2)	(8,0 - 22,8)
2008	22,3	22,0	22,8	28,8	21,9	17,3	22,1	10,7	29,7	17,6	16,5
	(17,1 - 27,4)	(16,6 - 27,4)	(11,5 - 34,2)	(16,8 - 40,8)	(13,6 - 30,3)	(10,2 - 24,5)	(2,5 - 41,6)	(1,5 - 19,9)	(20,5 - 39,0)	(9,8 - 25,4)	(8,1 - 24,9)
2010	16,6	19,0	8,7	30,4	12,5	7,9	14,6	48,2	25,9	14,5	11,7
	(11,3 - 21,9)	(12,8 - 25,3)	(1,3 - 16,1)	(12,5 - 48,3)	(6,2 - 18,9)	(1,6 - 14,2)	(3,8 - 25,4)	(22,1 - 74,4)	(15,1 - 36,6)	(8,1 - 21,0)	(1,9 - 21,4)
2012	15,3	17,4	10,7	24,3	13,6	20,4	4,4	7,7	22,0	15,9	11,0
	(11,5 - 19,1)	(12,6 - 22,1)	(5,4 - 16,1)	(13,5 - 35,1)	(7,9 - 19,3)	(11,0 - 29,9)	(0,9 - 8,0)	(0,9 - 14,5)	(15,2 - 28,8)	(9,1 - 22,7)	(5,2 - 16,9)
2014	10,2	12,3	6,5	16,3	8,0	10,7	12,0	6,4	13,3	9,9	9,1
	(7,6 - 12,8)	(8,4 - 16,2)	(4,2 - 8,9)	(7,3 - 25,2)	(4,4 - 11,6)	(4,0 - 17,5)	(5,5 - 18,5)	(2,9 - 10,0)	(8,2 - 18,3)	(5,6 - 14,2)	(4,9 - 13,3)
2016	11,5	14,6	6,0	22,6	11,5	11,7	3,8	7,7	11,5	9,6	12,5
	(8,8 - 14,1)	(10,5 - 18,6)	(3,4 - 8,6)	(12,5 - 32,6)	(7,2 - 15,8)	(6,7 - 16,6)	(1,3 - 6,3)	(0,0 - 16,0)	(6,5 - 16,6)	(5,6 - 13,7)	(7,8 - 17,3)
2018	10,2	12,4	5,1	12,3	12,7	9,8	6,1	5,9	10,3	13,6	6,5
	(7,3 - 13,2)	(8,4 - 16,4)	(2,1 - 8,0)	(4,2 - 20,5)	(6,3 - 19,1)	(5,5 - 14,2)	(2,2 - 10,0)	(1,6 - 10,3)	(5,4 - 15,1)	(6,9 - 20,2)	(4,0 - 9,0)
2020	9,6	11,1	6,1	6,7	14,2	7,6	5,9	7,0	17,2	8,4	5,9
	(6,7 - 12,4)	(7,5 - 14,6)	(2,3 - 9,9)	(1,1 - 12,2)	(7,8 - 20,6)	(3,8 - 11,4)	(1,4 - 10,4)	(0,9 - 13,1)	(9,0 - 25,5)	(5,0 - 11,8)	(2,9 - 8,8)

COCAÍNA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	31,7	30,3	38,0	27,5	25,9	38,2	32,7	60,7	33,9	20,1	46,0
	(22,5 - 40,9)	(20,5 - 40,1)	(11,9 - 64,1)	(0,0 - 55,6)	(13,4 - 38,5)	(21,3 - 55,0)	(0,0 - 66,0)	(0,0 - 100)	(21,5 - 46,4)	(5,9 - 34,2)	(18,5 - 73,4)
2004	30,5	29,6	34,2	42,9	22,6	24,1	62,4	37,3	22,6	41,4	34,4
	(21,0 - 40,1)	(19,0 - 40,3)	(11,6 - 56,8)	(11,8 - 73,9)	(8,1 - 37,2)	(7,7 - 40,5)	(33,2 - 91,7)	(0,0 - 94,7)	(11,3 - 33,9)	(21,6 - 61,3)	(11,8 - 57,0)
2006	25,5	29,9	12,0	21,1	28,8	18,2	26,4	40,4	31,1	22,1	9,6
	(15,3 - 35,7)	(17,9 - 41,9)	(0,0 - 24,4)	(0,8 - 41,4)	(8,9 - 48,8)	(6,0 - 30,3)	(0,7 - 52,0)	(0,0 - 85,0)	(17,9 - 44,2)	(0,4 - 43,9)	(0,0 - 20,1)
2008	29,7	27,5	41,4	25,9	28,7	44,1	32,2	6,1	25,0	36,7	28,8
	(15,7 - 43,6)	(11,7 - 43,3)	(16,0 - 66,9)	(0,2 - 51,6)	(11,8 - 45,6)	(8,7 - 79,5)	(0,3 - 64,0)	(0,0 - 23,1)	(12,2 - 37,8)	(0,8 - 72,6)	(3,8 - 53,8)
2010	31,7	30,9	37,6	42,4	15,7	51,4	21,4	26,6	53,4	30,9	15,4
	(18,1 - 45,2)	(15,1 - 46,8)	(0,0 - 79,5)	(0,0 - 96,5)	(0,6 - 30,8)	(20,0 - 82,8)	(0,0 - 48,2)	(0,0 - 75,2)	(28,6 - 78,2)	(5,2 - 56,6)	(0,0 - 34,4)
2012	33,0	28,0	47,0	34,5	19,1	26,3	50,2	70,3	21,0	31,5	47,1
	(22,9 - 43,2)	(13,3 - 42,7)	(8,2 - 85,8)	(0,0 - 81,9)	(2,8 - 35,5)	(9,1 - 43,4)	(12,7 - 87,7)	(25,5 - 100)	(9,0 - 33,0)	(10,4 - 52,6)	(0,6 - 93,6)
2014	21,8	21,9	21,6	3,4	30,0	11,9	44,5	19,2	25,7	11,4	29,1
	(13,3 - 30,3)	(9,8 - 33,9)	(7,5 - 35,7)	(0,0 - 8,0)	(5,1 - 55,0)	(0,0 - 24,6)	(20,0 - 68,9)	(5,2 - 33,2)	(8,9 - 42,5)	(3,1 - 19,7)	(5,5 - 52,7)
2016	23,6	23,4	24,1		8,9	31,6	22,0	45,5	22,4	20,3	28,7
	(15,2 - 31,9)	(11,9 - 34,9)	(1,4 - 46,9)		(0,0 - 18,5)	(13,4 - 49,7)	(0,0 - 44,1)	(13,9 - 77,2)	(5,8 - 39,0)	(5,0 - 35,5)	(10,6 - 46,8)
2018	31,8	25,4	65,7	18,0	19,7	46,0	29,5	27,5	30,1	30,8	37,5
	(19,6 - 44,0)	(13,1 - 37,7)	(38,5 - 92,9)	(0,0 - 53,1)	(4,0 - 35,4)	(22,0 - 70,0)	(0,0 - 61,5)	(2,2 - 52,8)	(7,7 - 52,5)	(15,4 - 46,2)	(0,0 - 78,1)
2020	44,2	43,9	48,0	52,7	77,2*	20,4	52,6	16,9	50,1	48,1	29,6
	(32,2 - 56,2)	(23,1 - 64,7)	(13,9 - 82,0)	(0,0 - 100)	(51,4 - 100)	(0,0 - 44,0)	(21,3 - 83,9)	(0,0 - 36,6)	(19,3 - 80,9)	(18,0 - 78,2)	(0,0 - 61,1)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PASTA BASE

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	48,3	50,8	27,6	39,3	36,1	63,5	58,6		57,6	30,4	
	(32,3 - 64,3)	(33,9 - 67,7)	(0,0 - 70,1)	(0,0 - 100)	(12,5 - 59,7)	(35,5 - 91,6)	(15,4 - 100)		(38,3 - 77,0)	(4,7 - 56,1)	
2004	56,3	54,8	63,7	49,1	53,1	54,0	85,4	5,6	57,2	55,5	19,0
	(41,9 - 70,6)	(38,7 - 70,9)	(26,9 - 100)	(14,0 - 84,3)	(28,8 - 77,4)	(20,5 - 87,5)	(65,9 - 100)	(0,0 - 24,7)	(41,2 - 73,3)	(16,1 - 94,9)	(0,0 - 78,9)
2006	65,4	71,8	33,9	39,9	63,5	72,7	78,2	76,9	67,5	63,6	18,1
	(51,7 - 79,1)	(58,3 - 85,2)	(1,0 - 66,8)	(9,4 - 70,5)	(33,8 - 93,3)	(49,7 - 95,8)	(55,1 - 100)	(31,9 - 100)	(50,8 - 84,3)	(31,2 - 96,0)	(0,0 - 53,9)
2008	66,5	61,3	80,8	60,6	70,5	64,9	62,5	68,7	63,8	43,2	94,7
	(53,1 - 79,9)	(45,2 - 77,4)	(58,5 - 100)	(16,9 - 100)	(50,7 - 90,4)	(35,1 - 94,7)	(25,5 - 99,4)	(23,9 - 100)	(47,5 - 80,1)	(17,3 - 69,0)	(80,2 - 100)
2010	50,8	49,7	64,9	74,8	47,9	37,9	44,6	89,6	50,2	54,2	48,2
	(34,7 - 66,9)	(32,3 - 67,1)	(29,6 - 100)	(43,4 - 100)	(24,1 - 71,7)	(11,2 - 64,6)	(0,0 - 91,7)	(67,9 - 100)	(26,9 - 73,4)	(24,3 - 84,1)	(18,5 - 78,0)
2012	64,6	67,1	40,8	44,3	26,7	87,8	66,3	65,9	52,0	77,9	69,1
	(54,4 - 74,9)	(50,2 - 83,9)	(0,0 - 84,6)	(0,0 - 96,8)	(1,6 - 51,9)	(74,1 - 100)	(32,5 - 100)	(33,9 - 97,9)	(30,8 - 73,2)	(58,8 - 96,9)	(22,2 - 100)
2014	54,8	52,5	77,1	96,5	25,2	62,4	53,6	52,5	54,9	57,7	48,7
	(39,7 - 70,0)	(34,5 - 70,5)	(52,4 - 100)	(87,3 - 100)	(0,0 - 55,5)	(35,9 - 88,8)	(26,8 - 80,3)	(25,3 - 79,7)	(31,9 - 78,0)	(33,3 - 82,1)	(10,5 - 86,9)
2016	47,6	48,7	37,7	20,5	23,4	61,2	61,2	55,8	43,4	58,2	38,5
	(33,0 - 62,2)	(30,3 - 67,1)	(0,0 - 85,4)	(0,0 - 58,1)	(0,0 - 49,1)	(34,1 - 88,2)	(28,0 - 94,3)	(20,4 - 91,3)	(19,8 - 67,0)	(29,0 - 87,3)	(3,2 - 73,8)
2018	59,1	54,4	75,1		15,8	75,3	70,3	48,8	62,9	58,5	27,3
	(45,3 - 72,8)	(37,4 - 71,4)	(50,2 - 100)		(0,0 - 37,1)	(56,0 - 94,6)	(43,5 - 97,1)	(19,3 - 78,3)	(42,4 - 83,5)	(33,8 - 83,2)	(0,0 - 58,3)
2020	59,0	57,8	65,5		45,8	54,3	43,0	98,3*	60,7	69,3	41,2
	(51,8 - 66,2)	(31,5 - 84,2)	(27,7 - 100)		(0,0 - 100)	(7,6 - 100)	(5,4 - 80,7)	(95,6 - 100)	(16,8 - 100)	(45,0 - 93,7)	(0,0 - 93,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ENTRE PREVALENTES DE ÚLTIMO AÑO (DEPENDENCIA Y/O ABUSO)

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2006–2020.

MARIHUANA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	28,0	31,7	20,6	36,2	35,6	15,4	20,0	16,6	34,9	17,6	29,9
	(21,1 - 34,9)	(22,7 - 40,8)	(12,4 - 28,7)	(24,3 - 48,2)	(22,2 - 49,1)	(8,1 - 22,7)	(8,9 - 31,2)	(0,0 - 35,7)	(27,9 - 41,8)	(10,5 - 24,6)	(14,6 - 45,2)
2008	33,5	34,6	31,1	40,1	30,5	36,4	24,9	33,3	41,1	29,2	26,2
	(27,4 - 39,6)	(27,7 - 41,5)	(19,2 - 43,1)	(26,7 - 53,5)	(21,1 - 40,0)	(23,6 - 49,2)	(5,5 - 44,3)	(8,4 - 58,2)	(31,1 - 51,2)	(18,5 - 39,8)	(16,5 - 36,0)
2010	23,8	25,6	17,8	38,8	20,4	14,4	19,8	51,7	32,0	22,6	18,9
	(17,9 - 29,7)	(19,0 - 32,3)	(7,4 - 28,1)	(21,1 - 56,4)	(12,0 - 28,8)	(6,7 - 22,0)	(7,6 - 32,0)	(26,4 - 77,0)	(20,1 - 43,9)	(14,9 - 30,4)	(8,6 - 29,2)
2012	24,9	27,3	19,7	33,7	27,3	25,2	10,2	15,2	37,1	23,5	19,2
	(20,2 - 29,5)	(21,5 - 33,0)	(12,4 - 27,0)	(21,7 - 45,7)	(19,8 - 34,8)	(15,7 - 34,6)	(2,8 - 17,6)	(4,4 - 26,0)	(28,9 - 45,4)	(15,9 - 31,0)	(11,8 - 26,6)
2014	21,7	22,4	20,4	23,6	19,2	17,4	29,8	24,5	26,5	15,7	24,0
	(17,6 - 25,7)	(16,5 - 28,4)	(13,4 - 27,3)	(14,1 - 33,1)	(13,7 - 24,7)	(10,0 - 24,8)	(15,5 - 44,0)	(5,3 - 43,7)	(19,4 - 33,7)	(11,0 - 20,4)	(16,5 - 31,5)
2016	20,3	25,6	11,1	31,1	22,9	22,2	8,2	10,7	23,9	21,8	18,0
	(16,8 - 23,8)	(20,5 - 30,7)	(7,6 - 14,6)	(21,2 - 41,0)	(16,6 - 29,2)	(15,5 - 28,9)	(3,1 - 13,3)	(2,7 - 18,7)	(17,4 - 30,4)	(15,2 - 28,3)	(12,5 - 23,4)
2018	24,7	29,7	12,7	19,2	33,1	24,1	14,4	15,2	24,1	28,2	21,1
	(20,7 - 28,7)	(24,4 - 35,1)	(8,7 - 16,8)	(9,6 - 28,8)	(25,0 - 41,3)	(16,6 - 31,6)	(5,3 - 23,5)	(8,8 - 21,7)	(15,7 - 32,5)	(20,6 - 35,9)	(14,8 - 27,4)
2020	23,5	27,9	13,2	46,8*	27,5	22,8	14,0	13,5	37,1	20,9	17,6
	(18,7 - 28,3)	(21,6 - 34,3)	(8,2 - 18,2)	(26,7 - 66,9)	(19,6 - 35,4)	(13,9 - 31,8)	(6,4 - 21,6)	(5,2 - 21,9)	(26,1 - 48,0)	(14,3 - 27,6)	(12,0 - 23,2)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

COCAÍNA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	40,2	42,8	32,1	46,4	48,1	31,8	35,6	40,4	49,8	35,8	17,5
	(28,5 - 51,9)	(30,3 - 55,3)	(6,6 - 57,6)	(13,8 - 79,0)	(29,3 - 66,9)	(13,6 - 49,9)	(4,8 - 66,3)	(0,0 - 85,0)	(35,7 - 63,8)	(11,0 - 60,7)	(1,9 - 33,1)
2008	33,6	31,1	47,5	25,9	33,7	52,3	33,6	6,1	29,5	40,5	31,6
	(19,4 - 47,7)	(15,1 - 47,1)	(21,8 - 73,1)	(0,2 - 51,6)	(16,1 - 51,2)	(19,1 - 85,5)	(1,8 - 65,4)	(0,0 - 23,1)	(15,9 - 43,0)	(4,1 - 76,8)	(6,3 - 56,8)
2010	39,6	39,6	39,8	42,4	27,3	53,7	40,6	26,6	62,0	41,5	21,6
	(25,4 - 53,7)	(22,9 - 56,2)	(0,0 - 80,9)	(0,0 - 96,5)	(7,6 - 47,0)	(22,1 - 85,2)	(6,5 - 74,7)	(0,0 - 75,2)	(38,9 - 85,0)	(14,8 - 68,2)	(0,7 - 42,5)
2012	46,8	39,9	65,9	100,0	39,3	30,4	52,2	70,3	35,2	31,5	70,7
	(35,7 - 57,9)	(21,5 - 58,2)	(37,6 - 94,3)	(100 - 100)	(11,0 - 67,5)	(12,1 - 48,7)	(15,7 - 88,8)	(25,5 - 100)	(18,7 - 51,7)	(10,4 - 52,6)	(38,6 - 100)
2014	35,2	36,2	31,1	3,4	35,3	38,0	56,9	33,2	33,5	33,9	38,2
	(22,3 - 48,0)	(20,2 - 52,2)	(12,5 - 49,8)	(0,0 - 8,0)	(9,8 - 60,8)	(7,1 - 68,8)	(33,3 - 80,5)	(10,9 - 55,6)	(15,8 - 51,1)	(11,9 - 55,8)	(10,7 - 65,7)
2016	37,9	32,0	59,1		31,2	53,5	26,0	45,5	37,1	27,6	50,3
	(28,3 - 47,4)	(18,9 - 45,1)	(30,4 - 87,9)		(0,0 - 63,6)	(35,8 - 71,1)	(2,9 - 49,2)	(13,9 - 77,2)	(16,2 - 58,1)	(9,7 - 45,4)	(34,1 - 66,5)
2018	37,4	32,1	65,7	18,0	22,4	48,7	44,8	30,0	30,1	46,0	38,5
	(25,4 - 49,4)	(18,9 - 45,2)	(38,5 - 92,9)	(0,0 - 53,1)	(6,4 - 38,4)	(24,9 - 72,4)	(13,1 - 76,6)	(4,4 - 55,6)	(7,7 - 52,5)	(28,8 - 63,3)	(0,0 - 79,0)
2020	50,7	48,5	76,7	52,7	80,1*	22,1	60,6	33,9	59,3	50,4	37,8
	(38,4 - 63,0)	(28,4 - 68,6)	(51,3 - 100)	(0,0 - 100)	(55,8 - 100)	(0,0 - 46,6)	(31,8 - 89,4)	(4,3 - 63,4)	(32,7 - 85,8)	(20,1 - 80,6)	(1,6 - 74,1)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PASTA BASE

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	70,2	76,2	40,5	46,3	64,6	82,3	78,2	79,3	74,7	63,6	18,1
	(57,6 - 82,8)	(64,3 - 88,1)	(6,3 - 74,8)	(14,3 - 78,3)	(35,3 - 93,9)	(65,9 - 98,6)	(55,1 - 100)	(36,9 - 100)	(60,0 - 89,4)	(31,2 - 96,0)	(0,0 - 53,9)
2008	67,5	62,7	80,8	60,6	70,5	64,9	66,9	68,7	65,2	43,2	94,7
	(54,3 - 80,8)	(46,7 - 78,6)	(58,5 - 100)	(16,9 - 100)	(50,7 - 90,4)	(35,1 - 94,7)	(31,6 - 100)	(23,9 - 100)	(49,0 - 81,5)	(17,3 - 69,0)	(80,2 - 100)
2010	61,9	61,7	64,9	74,8	58,1	61,0	44,6	89,6	64,9	63,0	48,2
	(51,2 - 72,7)	(45,8 - 77,6)	(29,6 - 100)	(43,4 - 100)	(34,1 - 82,1)	(33,8 - 88,2)	(0,0 - 91,7)	(67,9 - 100)	(44,5 - 85,3)	(34,0 - 91,9)	(18,5 - 78,0)
2012	70,3	72,6	47,4	44,3	30,4	93,0	84,0	65,9	59,0	82,6	69,1
	(59,2 - 81,4)	(56,7 - 88,5)	(3,8 - 91,1)	(0,0 - 96,8)	(3,9 - 56,9)	(83,4 - 100)	(60,5 - 100)	(33,9 - 97,9)	(37,6 - 80,4)	(65,8 - 99,4)	(22,2 - 100)
2014	68,2	66,0	88,6	96,5	71,7	62,7	65,1	66,8	73,3	64,4	48,7
	(55,7 - 80,7)	(50,5 - 81,5)	(73,6 - 100)	(87,3 - 100)	(37,8 - 100)	(36,3 - 89,1)	(36,5 - 93,7)	(40,1 - 93,5)	(55,6 - 91,0)	(40,5 - 88,3)	(10,5 - 86,9)
2016	54,8	56,7	37,7	20,5	23,4	65,7	75,0	77,9	48,6	64,7	49,7
	(40,4 - 69,1)	(38,7 - 74,7)	(0,0 - 85,4)	(0,0 - 58,1)	(0,0 - 49,1)	(39,2 - 92,2)	(49,5 - 100)	(49,4 - 100)	(25,8 - 71,3)	(37,1 - 92,3)	(13,2 - 86,2)
2018	64,4	61,2	75,1		21,3	80,7	70,3	59,7	66,1	62,3	47,5
	(51,1 - 77,6)	(44,3 - 78,2)	(50,2 - 100)		(0,0 - 47,0)	(63,3 - 98,1)	(43,5 - 97,1)	(30,3 - 89,1)	(45,9 - 86,4)	(37,5 - 87,1)	(5,3 - 89,7)
2020	75,7	77,5	65,5		45,8	100*	55,3	98,3*	60,7	76,6	99,1*
	(69,2 - 82,2)	(51,6 - 100)	(27,7 - 100)		(0,0 - 100)	(100 - 100)	(15,3 - 95,3)	(95,6 - 100)	(16,8 - 100)	(50,7 - 100)	(97,0 - 100)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS SOBRE TOTAL DE LA POBLACIÓN (DEPENDENCIA Y/O ABUSO)

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2006-2020.

MARIHUANA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	2,0	3,1	1,0	2,7	6,6	1,5	0,8	0,2	2,0	1,1	3,1
	(1,4 - 2,6)	(1,9 - 4,2)	(0,6 - 1,3)	(1,7 - 3,6)	(3,3 - 9,9)	(0,8 - 2,2)	(0,4 - 1,1)	(<0,1 - 0,4)	(1,6 - 2,5)	(0,7 - 1,5)	(1,1 - 5,1)
2008	2,2	3,0	1,3	3,7	5,4	2,4	0,7	0,3	3,1	1,6	1,7
	(1,7 - 2,6)	(2,3 - 3,8)	(0,7 - 1,8)	(2,3 - 5,0)	(3,6 - 7,3)	(1,3 - 3,5)	(0,1 - 1,3)	(<0,1 - 0,6)	(2,1 - 4,0)	(1,0 - 2,2)	(1,0 - 2,4)
2010	1,1	1,8	0,4	2,1	2,5	1,0	0,5	0,3	1,9	0,8	1,0
	(0,8 - 1,4)	(1,3 - 2,4)	(0,1 - 0,6)	(0,8 - 3,3)	(1,5 - 3,5)	(0,4 - 1,5)	(0,2 - 0,8)	(<0,1 - 0,5)	(1,2 - 2,7)	(0,5 - 1,0)	(0,4 - 1,6)
2012	1,8	2,7	0,9	2,3	4,8	2,6	0,5	0,3	2,7	1,6	1,4
	(1,4 - 2,1)	(2,1 - 3,3)	(0,5 - 1,2)	(1,3 - 3,2)	(3,3 - 6,3)	(1,4 - 3,7)	(0,1 - 0,8)	(0,1 - 0,5)	(2,0 - 3,5)	(1,0 - 2,2)	(0,8 - 1,9)
2014	2,5	3,3	1,7	3,2	4,6	3,0	2,7	1,0	2,8	1,6	3,0
	(1,9 - 3,0)	(2,2 - 4,3)	(1,0 - 2,3)	(1,8 - 4,6)	(3,2 - 6,0)	(1,6 - 4,4)	(1,0 - 4,3)	(<0,1 - 2,1)	(1,9 - 3,7)	(1,1 - 2,2)	(1,8 - 4,3)
2016	2,9	4,7	1,2	3,9	7,7	5,2	0,8	0,6	3,4	2,6	3,0
	(2,4 - 3,5)	(3,7 - 5,7)	(0,8 - 1,5)	(2,4 - 5,4)	(5,6 - 9,9)	(3,6 - 6,8)	(0,3 - 1,2)	(0,1 - 1,1)	(2,4 - 4,4)	(1,8 - 3,5)	(2,1 - 3,9)
2018	3,1	5,4	0,9	1,9	10,6	4,8	1,3	0,6	3,0	3,5	2,8
	(2,6 - 3,7)	(4,2 - 6,5)	(0,6 - 1,3)	(1,0 - 2,8)	(7,6 - 13,7)	(3,2 - 6,4)	(0,4 - 2,3)	(0,3 - 0,9)	(2,0 - 4,0)	(2,4 - 4,5)	(1,8 - 3,9)
2020	2,7	4,5	0,9	2,7	7,5	4,1	1,5	0,5	3,5	2,6	2,0
	(2,1 - 3,3)	(3,3 - 5,6)	(0,6 - 1,2)	(0,8 - 4,6)	(5,1 - 9,8)	(2,3 - 6,0)	(0,7 - 2,4)	(0,2 - 0,8)	(2,0 - 4,9)	(1,8 - 3,5)	(1,3 - 2,7)

COCAÍNA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	0,5	0,8	0,2	0,3	1,3	0,6	0,5	0,1	0,8	0,5	0,1
	(0,3 - 0,7)	(0,5 - 1,2)	(0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,6)	(0,6 - 2,1)	(0,2 - 0,9)	(0,1 - 1,0)	(0,0 - 0,3)	(0,5 - 1,1)	(0,1 - 0,8)	(<0,1 - 0,2)
2008	0,6	1,0	0,3	0,3	1,3	1,3	0,6	0,1	0,7	0,6	0,5
	(0,3 - 0,9)	(0,4 - 1,6)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,5)	(0,6 - 2,0)	(0,0 - 2,5)	(0,0 - 1,2)	(0,0 - 0,2)	(0,4 - 1,0)	(0,0 - 1,3)	(0,1 - 0,9)
2010	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	0,7	0,3	<0,1	0,6	0,1	0,2
	(0,1 - 0,4)	(0,2 - 0,7)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,5)	(0,1 - 0,6)	(0,2 - 1,2)	(<0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,1)	(0,2 - 1,1)	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,3)
2012	0,4	0,5	0,3	0,3	0,8	0,5	0,3	0,2	0,5	0,2	0,5
	(0,1 - 0,7)	(0,2 - 0,9)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 1,6)	(0,2 - 0,8)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,7)	(0,2 - 0,8)	(<0,1 - 0,4)	(0,0 - 1,2)
2014	0,5	0,8	0,2	0,1	0,7	1,0	0,9	0,2	0,7	0,4	0,4
	(0,3 - 0,7)	(0,4 - 1,2)	(0,1 - 0,3)	(<0,1 - 0,1)	(0,1 - 1,3)	(0,2 - 1,8)	(0,3 - 1,4)	(<0,1 - 0,3)	(0,2 - 1,2)	(0,1 - 0,8)	(0,1 - 0,7)
2016	0,4	0,5	0,3		0,6	1,1	0,4	0,2	0,7	0,3	0,4
	(0,2 - 0,6)	(0,3 - 0,8)	(0,0 - 0,5)		(0,0 - 1,4)	(0,5 - 1,8)	(<0,1 - 0,7)	(<0,1 - 0,3)	(0,3 - 1,2)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,7)
2018	0,4	0,6	0,2	<0,1	0,4	0,9	0,6	0,1	0,5	0,4	0,3
	(0,2 - 0,6)	(0,3 - 0,9)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,1)	(0,1 - 0,8)	(0,3 - 1,6)	(0,0 - 1,3)	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,9)	(0,2 - 0,7)	(0,0 - 0,6)
2020	0,3	0,5	0,1	<0,1	0,7	0,2*	0,5	0,1	0,5	0,2	0,2
	(0,1 - 0,4)	(0,2 - 0,7)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,1)	(<0,1 - 1,4)	(<0,1 - 0,3)	(<0,1 - 1,0)	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,9)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PASTA BASE

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2006	0,4	0,8	0,1	0,3	0,7	1,0	0,4	0,1	0,8	0,3	<0,1
	(0,3 - 0,6)	(0,4 - 1,2)	(<0,1 - 0,2)	(0,1 - 0,5)	(<0,1 - 1,4)	(0,3 - 1,7)	(0,1 - 0,7)	(0,0 - 0,2)	(0,4 - 1,3)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,1)
2008	0,5	0,7	0,3	0,2	1,4	0,5	0,6	0,1	0,9	0,1	0,5
	(0,3 - 0,7)	(0,4 - 1,0)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 0,5)	(0,5 - 2,2)	(0,2 - 0,9)	(0,0 - 1,1)	(0,0 - 0,1)	(0,5 - 1,3)	(<0,1 - 0,2)	(0,0 - 1,0)
2010	0,2	0,4	<0,1	0,2	0,5	0,5	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1
	(0,1 - 0,3)	(0,3 - 0,6)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,4)	(0,2 - 0,8)	(0,1 - 0,9)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,2)	(0,3 - 1,1)	(<0,1 - 0,2)	(<0,1 - 0,1)
2012	0,3	0,6	<0,1	0,1	0,2	0,9	0,3	0,2	0,6	0,4	<0,1
	(0,2 - 0,4)	(0,3 - 0,8)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(<0,1 - 0,3)	(0,2 - 1,7)	(<0,1 - 0,7)	(<0,1 - 0,3)	(0,3 - 0,8)	(0,1 - 0,8)	(0,0 - 0,1)
2014	0,3	0,6	0,1	0,3	0,4	0,6	0,4	0,2	1,0	0,2	0,1
	(0,2 - 0,5)	(0,3 - 0,8)	(<0,1 - 0,1)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,8)	(0,1 - 1,1)	(0,1 - 0,7)	(0,1 - 0,3)	(0,4 - 1,6)	(0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,2)
2016	0,2	0,4	<0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,1	0,3	0,2	0,1
	(0,1 - 0,3)	(0,2 - 0,6)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,3)	(0,1 - 0,7)	(<0,1 - 0,8)	(<0,1 - 0,1)	(0,1 - 0,6)	(<0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,2)
2018	0,3	0,4	0,2		0,1	0,6	0,5	0,2	0,6	0,2	0,1
	(0,2 - 0,4)	(0,3 - 0,6)	(<0,1 - 0,3)		(0,0 - 0,2)	(0,2 - 1,1)	(0,2 - 0,8)	(0,1 - 0,3)	(0,2 - 0,9)	(0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,1)
2020	0,2	0,4	0,1		<0,1	0,4	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2
	(0,1 - 0,3)	(0,2 - 0,6)	(0,0 - 0,1)		(0,0 - 0,1)	(0,1 - 0,7)	(0,1 - 0,9)	(<0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,5)	(0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,5)

CONSUMO DE RIESGO DE ALCOHOL ENTRE PREVALENTES DE ÚLTIMO AÑO (ESCALA AUDIT)

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2008-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2008	9,2	14,0	3,4	9,0	12,8	12,2	6,9	6,4	12,6	7,8	6,3
	(8,1 - 10,2)	(12,3 - 15,7)	(2,4 - 4,4)	(6,0 - 11,9)	(10,3 - 15,3)	(9,2 - 15,1)	(5,3 - 8,5)	(4,6 - 8,3)	(10,6 - 14,5)	(6,3 - 9,3)	(4,3 - 8,4)
2010	8,7	13,9	2,4	8,1	14,0	10,3	6,2	6,4	12,5	8,0	7,2
	(7,6 - 9,8)	(12,1 - 15,7)	(1,6 - 3,2)	(5,4 - 10,9)	(10,2 - 17,7)	(8,1 - 12,5)	(4,8 - 7,7)	(4,9 - 7,9)	(9,8 - 15,2)	(6,3 - 9,8)	(5,7 - 8,7)
2012	9,2	14,2	3,1	6,1	14,5	9,1	5,6	9,1	13,5	9,5	6,8
	(8,0 - 10,3)	(12,3 - 16,1)	(2,1 - 4,1)	(2,3 - 10,0)	(11,5 - 17,5)	(6,9 - 11,4)	(4,2 - 7,0)	(6,7 - 11,6)	(11,4 - 15,5)	(7,3 - 11,7)	(5,0 - 8,5)
2014	8,7	12,2	4,7	8,0	11,1	11,1	7,9	7,2	13,1	6,4	8,6
	(7,7 - 9,8)	(10,6 - 13,8)	(3,4 - 6,1)	(4,4 - 11,6)	(8,7 - 13,5)	(8,4 - 13,8)	(5,0 - 10,8)	(5,8 - 8,5)	(10,4 - 15,7)	(5,2 - 7,5)	(6,8 - 10,4)
2016	9,3	13,8	4,1	6,0	15,3	12,1	7,8	6,3	13,6	8,3	8,3
	(8,3 - 10,4)	(12,1 - 15,5)	(3,1 - 5,1)	(3,4 - 8,5)	(12,3 - 18,3)	(9,6 - 14,5)	(5,7 - 10,0)	(4,9 - 7,7)	(10,9 - 16,3)	(6,8 - 9,8)	(6,7 - 9,9)
2018	9,3	13,3	4,3	3,5	14,7	11,1	8,9	6,8	12,1	8,5	7,8
	(8,0 - 10,5)	(11,4 - 15,2)	(3,1 - 5,5)	(2,1 - 4,9)	(10,7 - 18,7)	(7,6 - 14,6)	(6,4 - 11,3)	(5,4 - 8,2)	(10,1 - 14,1)	(6,7 - 10,4)	(5,5 - 10,1)
2020	9,8	14,9	3,6	3,0	14,3	10,9	11,9	6,8	12,0	9,6	8,6
	(8,4 - 11,3)	(12,4 - 17,3)	(2,5 - 4,7)	(0,8 - 5,2)	(9,2 - 19,4)	(8,1 - 13,7)	(8,1 - 15,7)	(5,2 - 8,5)	(9,2 - 14,7)	(7,8 - 11,4)	(5,7 - 11,5)

CONSUMO DE RIESGO DE ALCOHOL SOBRE TOTAL DE LA POBLACIÓN (ESCALA AUDIT)

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2008-2020.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2008	6,3	10,6	2,1	4,1	10,0	9,5	5,0	4,4	8,2	5,4	4,5
	(5,6 - 7,0)	(9,3 - 11,9)	(1,5 - 2,7)	(2,8 - 5,5)	(8,0 - 11,9)	(7,1 - 11,8)	(3,8 - 6,1)	(3,1 - 5,6)	(6,9 - 9,6)	(4,4 - 6,5)	(3,0 - 5,9)
2010	5,0	8,9	1,2	2,5	10,0	6,7	3,9	3,7	7,4	4,4	4,3
	(4,4 - 5,7)	(7,6 - 10,1)	(0,8 - 1,7)	(1,7 - 3,4)	(7,2 - 12,7)	(5,2 - 8,2)	(2,9 - 4,8)	(2,9 - 4,6)	(5,8 - 9,0)	(3,4 - 5,4)	(3,4 - 5,3)
2012	5,1	8,8	1,6	2,0	9,5	6,2	3,4	5,0	7,5	5,0	4,0
	(4,5 - 5,8)	(7,6 - 10,0)	(1,1 - 2,1)	(0,7 - 3,2)	(7,5 - 11,4)	(4,7 - 7,7)	(2,5 - 4,3)	(3,6 - 6,4)	(6,3 - 8,7)	(3,8 - 6,2)	(3,0 - 5,0)
2014	5,5	8,4	2,8	2,9	7,7	8,1	5,6	4,5	8,1	3,9	5,7
	(4,9 - 6,2)	(7,3 - 9,5)	(1,9 - 3,6)	(1,6 - 4,3)	(5,9 - 9,4)	(6,1 - 10,1)	(3,5 - 7,6)	(3,6 - 5,4)	(6,4 - 9,8)	(3,2 - 4,6)	(4,5 - 6,9)
2016	6,0	9,5	2,4	2,1	11,3	9,0	5,6	3,9	8,0	5,0	5,7
	(5,3 - 6,6)	(8,3 - 10,6)	(1,9 - 3,0)	(1,2 - 3,0)	(9,0 - 13,6)	(7,2 - 10,8)	(4,1 - 7,1)	(3,1 - 4,8)	(6,5 - 9,4)	(4,1 - 6,0)	(4,6 - 6,8)
2018	5,6	9,0	2,3	1,1	10,3	7,9	6,0	4,1	7,1	5,1	5,0
	(4,9 - 6,4)	(7,7 - 10,3)	(1,7 - 3,0)	(0,7 - 1,6)	(7,4 - 13,1)	(5,4 - 10,4)	(4,3 - 7,6)	(3,2 - 4,9)	(5,9 - 8,2)	(4,0 - 6,3)	(3,5 - 6,4)
2020	5,8	9,6	1,9	0,7	10,0	7,3	7,9	4,0	6,3	5,7	5,3
	(4,9 - 6,6)	(8,0 - 11,3)	(1,3 - 2,5)	(0,2 - 1,2)	(6,3 - 13,7)	(5,4 - 9,2)	(5,3 - 10,5)	(2,9 - 5,0)	(4,8 - 7,9)	(4,5 - 7,0)	(3,5 - 7,1)

EMBRIAGUEZ DE ALCOHOL SOBRE CONSUMIDORES DE ÚLTIMO MES

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2020.

Preguntas:
Pensando en los últimos 30 días, y tomando en cuenta todos los tipos de bebidas alcohólicas, si es hombre, ¿cuántas veces tomó 5 o más tragos en una sola ocasión? Si es mujer, ¿cuántas veces tomó 4 o más tragos en una sola ocasión?

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	52,1	59,3	41,4	57,6	63,7	57,9	44,9	44,4	60,6	50,9	48,8
	(49,8 - 54,4)	(56,2 - 62,5)	(38,4 - 44,5)	(46,3 - 68,9)	(59,0 - 68,5)	(53,7 - 62,1)	(40,7 - 49,2)	(40,5 - 48,2)	(56,8 - 64,4)	(47,3 - 54,5)	(45,0 - 52,7)
2014	43,7	51,3	34,0	38,4	58,5	48,3	45,5	34,9	47,9	44,2	41,4
	(41,6 - 45,8)	(48,3 - 54,2)	(31,2 - 36,9)	(30,8 - 45,9)	(53,7 - 63,3)	(43,7 - 52,9)	(40,7 - 50,2)	(31,9 - 37,9)	(44,1 - 51,6)	(40,9 - 47,4)	(38,0 - 44,8)
2016	51,1	55,4	45,3	57,7	60,2	59,1	50,2	40,7	58,6	50,3	48,7
	(49,1 - 53,2)	(52,6 - 58,3)	(41,8 - 48,8)	(47,4 - 68,1)	(54,9 - 65,5)	(53,8 - 64,4)	(45,4 - 55,1)	(37,3 - 44,2)	(54,6 - 62,7)	(45,9 - 54,7)	(45,5 - 51,9)
2018	56,3	59,5	51,4	54,3	60,3	62,2	57,3	50,0	59,3	56,3	53,9
	(53,8 - 58,7)	(56,3 - 62,7)	(47,8 - 55,0)	(44,2 - 64,5)	(53,6 - 67,0)	(57,5 - 67,0)	(51,6 - 62,9)	(45,8 - 54,2)	(54,9 - 63,7)	(52,4 - 60,1)	(49,7 - 58,2)
2020	50,2*	55,2	43,3*	57,5	59,2	55,0	49,0*	42,7*	54,4	51,1	45,9*
	(47,3 - 53,1)	(51,5 - 58,9)	(39,2 - 47,4)	(40,4 - 74,6)	(53,1 - 65,2)	(49,2 - 60,9)	(43,3 - 54,6)	(38,7 - 46,7)	(49,1 - 59,8)	(46,6 - 55,6)	(40,8 - 51,0)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

EMBRIAGUEZ DE ALCOHOL SOBRE TOTAL DE LA POBLACIÓN

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2020.

Preguntas:
Pensando en los últimos 30 días, y tomando en cuenta todos los tipos de bebidas alcohólicas, si es hombre, ¿cuántas veces tomó 5 o más tragos en una sola ocasión? Si es mujer, ¿cuántas veces tomó 4 o más tragos en una sola ocasión?

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	21,2	29,2	13,5	10,4	32,0	30,0	20,2	17,9	24,2	19,2	21,5
	(20,0 - 22,5)	(27,2 - 31,2)	(12,2 - 14,8)	(7,7 - 13,1)	(28,3 - 35,7)	(27,1 - 32,8)	(17,9 - 22,5)	(16,0 - 19,8)	(22,0 - 26,4)	(17,3 - 21,0)	(19,5 - 23,5)
2014	21,3	28,4	14,5	8,8	31,5	27,7	24,7	17,3	22,2	20,4	21,8
	(20,2 - 22,5)	(26,5 - 30,2)	(13,1 - 15,9)	(6,8 - 10,7)	(27,8 - 35,1)	(24,7 - 30,7)	(21,6 - 27,9)	(15,6 - 18,9)	(19,8 - 24,6)	(18,6 - 22,2)	(19,8 - 23,8)
2016	23,5	29,2	17,8	10,8	34,2	34,3	25,2	18,0	24,1	21,4	25,0
	(22,3 - 24,7)	(27,3 - 31,0)	(16,1 - 19,6)	(7,6 - 14,0)	(30,3 - 38,0)	(30,3 - 38,4)	(21,8 - 28,6)	(16,1 - 19,8)	(21,7 - 26,4)	(18,9 - 23,9)	(22,6 - 27,4)
2018	24,4	31,2	17,6	10,1	32,1	32,8	27,8	20,2	23,5	24,0	25,2
	(23,0 - 25,7)	(29,2 - 33,2)	(15,9 - 19,2)	(7,5 - 12,8)	(27,9 - 36,3)	(29,5 - 36,1)	(24,5 - 31,1)	(18,1 - 22,3)	(21,0 - 26,1)	(22,1 - 26,0)	(22,7 - 27,6)
2020	22,2	28,4	16,1	7,8	32,4	27,7	25,7	18,7	22,1	23,1	21,2*
	(20,3 - 24,2)	(25,6 - 31,3)	(14,0 - 18,2)	(3,4 - 12,3)	(28,1 - 36,8)	(23,9 - 31,6)	(22,1 - 29,4)	(16,5 - 20,9)	(18,7 - 25,5)	(19,9 - 26,3)	(18,4 - 24,1)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

INTENSIDAD DE USO

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2020.
Promedio de días de consumo en el último mes

TABACO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	22,7	22,7	22,7	18,9	21,8	22,3	23,9	24,4	23,2	22,0	22,6
	(22,3 - 23,1)	(22,2 - 23,2)	(22,1 - 23,3)	(17,6 - 20,3)	(20,9 - 22,6)	(21,6 - 23,1)	(23,2 - 24,6)	(23,7 - 25,1)	(22,7 - 23,7)	(21,3 - 22,8)	(21,8 - 23,3)
2004	22,3	22,1	22,5	19,1	21,7	21,8	22,7	24,4	22,7	22,2	21,7
	(21,9 - 22,7)	(21,6 - 22,7)	(21,8 - 23,1)	(17,8 - 20,4)	(20,9 - 22,6)	(21,0 - 22,6)	(21,6 - 23,8)	(23,7 - 25,1)	(22,2 - 23,3)	(21,6 - 22,8)	(20,6 - 22,7)
2006	22,1	22,6	21,5	17,6	19,7	21,5	22,5	26,0	21,9	22,7	21,5
	(21,6 - 22,6)	(22,0 - 23,3)	(20,8 - 22,3)	(16,1 - 19,2)	(18,6 - 20,9)	(20,5 - 22,6)	(21,4 - 23,6)	(25,3 - 26,6)	(21,3 - 22,6)	(21,8 - 23,6)	(20,4 - 22,7)
2008	22,2	21,9	22,7	17,3	20,7	21,3	23,1	25,4	22,3	22,7	21,3
	(21,7 - 22,8)	(21,1 - 22,6)	(22,0 - 23,4)	(15,3 - 19,3)	(19,3 - 22,2)	(20,2 - 22,4)	(22,2 - 24,0)	(24,7 - 26,1)	(21,5 - 23,1)	(22,0 - 23,5)	(19,9 - 22,7)
2010	22,3	22,4	22,2	20,4	20,0	21,6	22,5	24,6	22,9	21,9	22,3
	(21,8 - 22,8)	(21,7 - 23,1)	(21,6 - 22,9)	(18,8 - 22,1)	(18,8 - 21,2)	(20,6 - 22,7)	(21,3 - 23,7)	(24,0 - 25,3)	(21,8 - 24,0)	(21,1 - 22,7)	(21,6 - 23,1)
2012	21,4	21,3	21,4	17,4	19,1	19,7	22,0	24,1	21,6	21,0	21,6
	(20,9 - 21,8)	(20,6 - 22,0)	(20,7 - 22,1)	(15,0 - 19,7)	(18,1 - 20,1)	(18,8 - 20,6)	(21,0 - 23,0)	(23,2 - 25,0)	(20,8 - 22,3)	(20,1 - 21,9)	(20,8 - 22,4)
2014	21,6	21,5	21,7	18,4	18,5	21,0	21,2	23,9	22,8	21,6	20,8
	(21,0 - 22,2)	(20,6 - 22,3)	(20,7 - 22,6)	(16,2 - 20,5)	(17,1 - 20,0)	(19,9 - 22,0)	(19,9 - 22,5)	(22,6 - 25,1)	(21,9 - 23,8)	(20,8 - 22,4)	(19,5 - 22,1)
2016	21,0	20,9	21,2	15,5	17,6	20,5	21,7	23,2	22,7	20,6	20,4
	(20,5 - 21,6)	(20,1 - 21,7)	(20,3 - 22,1)	(12,8 - 18,2)	(16,4 - 18,8)	(19,3 - 21,8)	(20,6 - 22,8)	(22,1 - 24,2)	(21,8 - 23,5)	(19,6 - 21,6)	(19,6 - 21,3)
2018	20,8	20,2	21,4	14,7	17,5	19,0	22,2	23,1	22,1	20,6	20,0
	(20,1 - 21,4)	(19,3 - 21,1)	(20,6 - 22,2)	(11,7 - 17,8)	(15,8 - 19,2)	(17,8 - 20,3)	(20,8 - 23,6)	(22,2 - 23,9)	(21,0 - 23,1)	(19,8 - 21,4)	(18,6 - 21,3)
2020	22,0*	21,7*	22,4	18,9	17,9	20,6	22,5	24,2*	23,6*	21,8	20,8
	(21,3 - 22,7)	(20,7 - 22,6)	(21,5 - 23,3)	(13,5 - 24,2)	(15,8 - 20,1)	(19,2 - 21,9)	(21,0 - 24,1)	(23,5 - 24,9)	(22,6 - 24,6)	(20,6 - 23,0)	(19,3 - 22,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ALCOHOL

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	4,2	5,0	3,1	2,7	3,8	3,6	3,9	5,6	3,7	3,7	5,3
	(4,0 - 4,4)	(4,7 - 5,3)	(2,9 - 3,3)	(2,3 - 3,0)	(3,5 - 4,1)	(3,3 - 3,9)	(3,4 - 4,4)	(5,1 - 6,1)	(3,5 - 4,0)	(3,4 - 3,9)	(4,8 - 5,8)
2004	3,9	4,7	2,9	2,9	3,8	3,8	3,3	5,0	3,6	3,8	4,6
	(3,8 - 4,1)	(4,5 - 4,9)	(2,8 - 3,1)	(2,6 - 3,2)	(3,5 - 4,0)	(3,5 - 4,1)	(3,0 - 3,6)	(4,6 - 5,4)	(3,4 - 3,8)	(3,5 - 4,0)	(4,3 - 4,9)
2006	4,4	5,1	3,5	3,2	4,5	3,8	4,5	4,9	3,7	4,0	5,5
	(4,1 - 4,7)	(4,7 - 5,4)	(2,9 - 4,0)	(2,6 - 3,9)	(4,0 - 5,0)	(3,6 - 4,1)	(3,6 - 5,4)	(4,3 - 5,5)	(3,5 - 4,0)	(3,6 - 4,4)	(4,7 - 6,2)
2008	3,6	4,2	2,8	2,8	3,6	3,6	3,4	4,1	3,4	3,7	3,8
	(3,5 - 3,8)	(3,9 - 4,5)	(2,6 - 3,0)	(2,5 - 3,1)	(3,3 - 3,9)	(3,1 - 4,1)	(3,0 - 3,7)	(3,8 - 4,5)	(3,1 - 3,6)	(3,4 - 4,1)	(3,5 - 4,1)
2010	4,2	4,8	3,3	3,4	4,2	4,2	4,0	4,5	4,8	4,1	4,1
	(4,0 - 4,4)	(4,6 - 5,1)	(3,1 - 3,5)	(3,0 - 3,9)	(3,9 - 4,6)	(3,9 - 4,6)	(3,6 - 4,4)	(4,2 - 4,9)	(4,2 - 5,3)	(3,8 - 4,3)	(3,9 - 4,4)
2012	4,1	4,6	3,4	3,3	4,1	4,2	3,6	4,6	4,3	4,0	4,1
	(3,9 - 4,3)	(4,4 - 4,9)	(3,1 - 3,7)	(2,7 - 3,9)	(3,7 - 4,5)	(3,8 - 4,5)	(3,3 - 4,0)	(4,2 - 5,1)	(3,9 - 4,8)	(3,7 - 4,4)	(3,8 - 4,4)
2014	4,2	4,8	3,3	3,5	4,0	4,3	3,9	4,4	4,2	3,8	4,4
	(3,9 - 4,4)	(4,5 - 5,1)	(3,2 - 3,5)	(2,9 - 4,0)	(3,6 - 4,3)	(3,8 - 4,9)	(3,5 - 4,3)	(4,0 - 4,8)	(3,7 - 4,8)	(3,5 - 4,1)	(4,0 - 4,7)
2016	4,4	4,9	3,8	3,0	4,4	4,5	4,2	4,8	4,5	4,0	4,8
	(4,2 - 4,7)	(4,7 - 5,2)	(3,5 - 4,1)	(2,5 - 3,6)	(3,9 - 4,9)	(4,0 - 4,9)	(3,8 - 4,7)	(4,4 - 5,2)	(4,1 - 4,9)	(3,6 - 4,3)	(4,4 - 5,1)
2018	4,4	5,1	3,3	3,1	4,7	4,3	4,4	4,5	4,2	4,4	4,5
	(4,1 - 4,7)	(4,7 - 5,5)	(3,1 - 3,5)	(2,5 - 3,7)	(3,7 - 5,8)	(3,9 - 4,6)	(3,9 - 4,9)	(4,0 - 4,9)	(3,8 - 4,6)	(3,8 - 4,9)	(4,1 - 5,0)
2020	4,6	5,0	3,9*	3,1	4,1	4,5	4,6	5,0	4,7	4,6	4,4
	(4,3 - 4,8)	(4,6 - 5,5)	(3,5 - 4,4)	(2,4 - 3,8)	(3,5 - 4,6)	(4,1 - 5,0)	(3,9 - 5,3)	(4,4 - 5,6)	(4,0 - 5,4)	(4,2 - 4,9)	(3,9 - 4,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

MARIHUANA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	8,8	9,1	7,8	6,8	9,1	9,8	9,5	6,6	9,9	9,2	6,1
	(7,6 - 10,0)	(7,7 - 10,4)	(5,2 - 10,4)	(4,9 - 8,6)	(7,1 - 11,2)	(7,7 - 12,0)	(4,8 - 14,1)	(0,3 - 13,0)	(8,2 - 11,7)	(6,8 - 11,7)	(4,3 - 7,8)
2004	9,6	10,6	6,3	8,2	9,8	11,8	6,0	5,1	10,5	8,9	8,9
	(8,3 - 10,9)	(9,1 - 12,1)	(4,4 - 8,1)	(6,3 - 10,0)	(7,9 - 11,8)	(9,1 - 14,6)	(2,3 - 9,7)	(0,0 - 10,9)	(8,5 - 12,5)	(6,2 - 11,5)	(6,8 - 11,0)
2006	10,5	11,8	6,5	7,2	12,3	11,6	9,3	5,2	11,8	10,1	9,8
	(8,1 - 12,8)	(9,2 - 14,5)	(3,6 - 9,4)	(3,7 - 10,7)	(8,3 - 16,2)	(8,0 - 15,1)	(4,8 - 13,7)	(0,0 - 11,3)	(9,6 - 14,0)	(6,8 - 13,4)	(4,9 - 14,6)
2008	11,7	12,7	8,5	11,4	11,6	13,3	8,0	15,5	14,5	7,2	12,1
	(9,9 - 13,4)	(10,6 - 14,8)	(6,1 - 10,8)	(7,0 - 15,8)	(9,3 - 14,0)	(8,6 - 18,0)	(5,2 - 10,8)	(6,1 - 24,8)	(11,9 - 17,0)	(5,2 - 9,2)	(8,4 - 15,7)
2010	10,1	10,6	8,4	8,9	9,4	10,0	12,5	15,4	13,7	8,9	8,1
	(8,4 - 11,9)	(8,8 - 12,4)	(4,2 - 12,5)	(4,3 - 13,4)	(6,5 - 12,2)	(7,3 - 12,8)	(8,4 - 16,5)	(9,4 - 21,3)	(10,3 - 17,0)	(6,1 - 11,6)	(5,9 - 10,4)
2012	10,9	12,3	7,4	9,8	12,0	9,9	7,0	14,4	11,6	11,6	10,0
	(9,7 - 12,1)	(10,8 - 13,7)	(4,4 - 10,4)	(6,6 - 13,0)	(9,9 - 14,0)	(8,1 - 11,7)	(4,5 - 9,6)	(7,9 - 20,9)	(9,7 - 13,5)	(9,5 - 13,7)	(7,9 - 12,1)
2014	9,9	10,9	8,2	12,4	9,5	10,8	8,2	8,7	12,1	9,8	9,1
	(8,6 - 11,3)	(9,0 - 12,7)	(6,8 - 9,6)	(9,3 - 15,5)	(7,4 - 11,6)	(7,7 - 13,9)	(6,0 - 10,5)	(6,1 - 11,4)	(9,8 - 14,4)	(8,2 - 11,4)	(6,7 - 11,4)
2016	11,0	11,6	9,5	10,5	10,8	13,9	8,9	7,0	11,8	12,6	9,6
	(9,7 - 12,3)	(10,2 - 13,1)	(7,0 - 12,0)	(7,6 - 13,4)	(9,1 - 12,6)	(11,4 - 16,5)	(6,1 - 11,8)	(4,4 - 9,6)	(9,6 - 14,0)	(10,8 - 14,5)	(7,5 - 11,7)
2018	12,4	13,1	10,2	12,5	13,1	12,9	10,2	10,3	14,6	12,2	10,6
	(11,2 - 13,5)	(11,7 - 14,6)	(8,4 - 12,0)	(8,4 - 16,5)	(11,3 - 14,9)	(10,3 - 15,5)	(7,3 - 13,1)	(6,8 - 13,8)	(12,4 - 16,8)	(10,1 - 14,2)	(9,1 - 12,1)
2020	13,8	15,0	10,9	16,5	15,5	12,9	12,3	11,5	17,8	11,7	13,9
	(12,1 - 15,6)	(12,9 - 17,1)	(8,1 - 13,8)	(7,8 - 25,3)	(12,4 - 18,6)	(10,4 - 15,4)	(8,3 - 16,4)	(7,7 - 15,3)	(15,0 - 20,5)	(9,4 - 14,1)	(10,7 - 17,0)

COCAÍNA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	3,8	3,7	4,0	6,4	2,6	4,0	3,0	24,2	3,6	4,7	2,9
	(2,2 - 5,4)	(1,9 - 5,6)	(0,8 - 7,2)	(0,0 - 17,6)	(1,7 - 3,5)	(0,2 - 7,9)	(0,0 - 6,0)	(0,0 - 53,8)	(1,3 - 5,8)	(1,1 - 8,2)	(1,2 - 4,6)
2004	4,1	4,1	3,8	1,1	2,0	3,1	10,2	7,2	3,6	6,3	1,6
	(1,9 - 6,3)	(1,7 - 6,6)	(0,0 - 7,8)	(0,8 - 1,4)	(1,0 - 3,0)	(0,8 - 5,4)	(0,0 - 22,0)	(2,6 - 11,8)	(1,7 - 5,6)	(0,1 - 12,4)	(0,6 - 2,5)
2006	3,4	3,8	2,4	2,6	2,3	5,4	3,4	2,6	4,1	3,0	1,6
	(2,1 - 4,7)	(2,1 - 5,4)	(1,5 - 3,4)	(0,2 - 5,0)	(1,5 - 3,1)	(0,5 - 10,3)	(1,1 - 5,8)	(0,0 - 7,8)	(2,0 - 6,3)	(1,3 - 4,8)	(1,0 - 2,2)
2008	4,7	3,5	11,2	4,6	6,5	4,8	4,4	2,2	4,9	2,4	7,9
	(2,7 - 6,6)	(2,2 - 4,9)	(2,1 - 20,3)	(0,4 - 8,9)	(1,4 - 11,7)	(1,8 - 7,9)	(1,7 - 7,1)	(1,0 - 3,4)	(2,5 - 7,2)	(1,5 - 3,4)	(1,7 - 14,0)
2010	5,1	5,0	6,0	1,5	3,4	6,5	5,8	1,3	8,1	4,8	2,0
	(2,9 - 7,4)	(2,0 - 8,0)	(2,2 - 9,7)	(0,8 - 2,2)	(0,6 - 6,3)	(2,2 - 10,9)	(0,0 - 15,0)	(0,6 - 2,0)	(3,7 - 12,5)	(0,0 - 12,2)	(0,6 - 3,3)
2012	6,3	7,2	5,0	6,2	6,7	7,9	3,2	4,9	4,6	4,4	8,3
	(4,9 - 7,7)	(2,4 - 12,0)	(2,7 - 7,2)	(0,0 - 12,9)	(0,4 - 13,0)	(2,2 - 13,5)	(0,6 - 5,7)	(4,6 - 5,1)	(1,5 - 7,7)	(0,0 - 9,2)	(2,7 - 13,9)
2014	5,1	4,4	6,9	2,2	5,5	2,6	2,9	14,7	5,5	3,9	6,8
	(2,2 - 8,1)	(2,2 - 6,7)	(0,0 - 14,0)	(0,1 - 4,3)	(0,4 - 10,6)	(1,7 - 3,5)	(1,2 - 4,6)	(6,5 - 22,8)	(1,5 - 9,4)	(1,4 - 6,4)	(0,0 - 14,7)
2016	3,8	4,0	1,9	1,2	1,7	3,8	4,2	6,8	3,5	4,2	3,8
	(2,5 - 5,1)	(2,2 - 5,8)	(1,1 - 2,7)	(0,8 - 1,6)	(0,9 - 2,6)	(1,0 - 6,7)	(0,9 - 7,5)	(2,6 - 11,0)	(1,6 - 5,3)	(0,4 - 8,0)	(1,8 - 5,9)
2018	6,2	3,0	15,3	1,0	2,1	4,5	9,7	3,5	8,9	3,5	3,4
	(0,0 - 12,7)	(2,1 - 4,0)	(3,7 - 26,9)	(1,0 - 1,0)	(1,3 - 3,0)	(2,4 - 6,6)	(0,0 - 20,1)	(0,0 - 7,5)	(0,0 - 18,5)	(1,8 - 5,1)	(1,7 - 5,1)
2020	8,7	9,7*	3,0*		1,2	1,5*	11,5	13,5*	9,7	6,6	9,4
	(7,9 - 9,4)	(4,7 - 14,7)	(1,8 - 4,1)		(0,8 - 1,7)	(1,0 - 2,1)	(6,4 - 16,5)	(4,8 - 22,3)	(3,3 - 16,0)	(0,0 - 13,5)	(0,0 - 18,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS Y CONSUMO DE DROGAS

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2020.

Proporción de individuos que declara consumir

Preguntas:

- Durante los últimos 12 meses, ¿ha manejado algún vehículo después de haber consumido alcohol (independiente de la cantidad consumida)?
- Durante los últimos 12 meses, ¿ha manejado algún vehículo después de haber consumido marihuana?
- Durante los últimos 12 meses, ¿ha manejado algún vehículo después de haber consumido alguna droga, sea lícita o ilícita (como cocaína, éxtasis, estimulantes u otra)?

ALCOHOL

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad				Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	17 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	15,5	16,5	13,2	22,1	18,5	14,8	11,9	13,6	14,1	16,7
	(13,5 - 17,5)	(14,0 - 19,0)	(10,1 - 16,3)	(12,8 - 31,5)	(15,4 - 21,7)	(11,6 - 18,1)	(9,4 - 14,3)	(10,2 - 17,0)	(11,4 - 16,8)	(13,6 - 19,8)
2014	14,2	16,2	10,0	13,8	22,9	15,4	10,2	13,9	10,9	16,2
	(12,3 - 16,2)	(13,8 - 18,7)	(7,5 - 12,5)	(9,6 - 18,1)	(17,6 - 28,1)	(12,1 - 18,8)	(7,9 - 12,6)	(10,5 - 17,4)	(8,1 - 13,7)	(13,2 - 19,2)
2016	13,5	16,0	8,5	11,5	19,5	14,5	10,3	14,1	10,3	15,1
	(11,1 - 15,9)	(12,8 - 19,1)	(6,1 - 11,0)	(8,3 - 14,7)	(14,4 - 24,7)	(10,3 - 18,7)	(7,4 - 13,1)	(8,5 - 19,8)	(7,6 - 13,0)	(11,8 - 18,3)
2018	13,8	17,4	6,2	21,0	18,4	11,8	10,8	8,8	11,6	17,2
	(11,4 - 16,2)	(14,1 - 20,7)	(4,6 - 7,8)	(10,6 - 31,3)	(13,5 - 23,3)	(7,3 - 16,2)	(8,1 - 13,4)	(5,3 - 12,3)	(8,6 - 14,6)	(12,8 - 21,6)
2020	8,2*	9,8*	5,3	10,2	9,8*	9,1	6,6*	8,4	7,2*	9,1*
	(6,6 - 9,8)	(7,6 - 11,9)	(3,2 - 7,3)	(3,9 - 16,5)	(6,8 - 12,9)	(6,4 - 11,7)	(4,2 - 9,0)	(4,4 - 12,4)	(5,3 - 9,0)	(6,7 - 11,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

MARIHUANA

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad				Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	17 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	2,8	3,1	2,0	5,6	4,1	2,8	1,0	3,2	3,1	2,5
	(2,1 - 3,5)	(2,2 - 4,1)	(0,9 - 3,0)	(3,1 - 8,1)	(2,2 - 6,0)	(1,3 - 4,3)	(0,4 - 1,6)	(1,5 - 4,8)	(1,6 - 4,5)	(1,6 - 3,4)
2014	3,2	3,8	2,0	4,4	9,1	2,5	0,9	2,9	1,8	4,1
	(2,1 - 4,2)	(2,3 - 5,2)	(1,0 - 2,9)	(2,3 - 6,4)	(4,3 - 13,9)	(1,2 - 3,7)	(0,3 - 1,4)	(1,4 - 4,3)	(1,0 - 2,5)	(2,2 - 5,9)
2016	3,5	4,5	1,6	10,1	7,9	2,0	0,5	3,7	2,6	4,0
	(2,5 - 4,6)	(3,1 - 6,0)	(0,7 - 2,4)	(5,5 - 14,7)	(4,7 - 11,0)	(1,0 - 3,1)	(0,1 - 0,9)	(1,8 - 5,7)	(0,9 - 4,3)	(2,5 - 5,6)
2018	4,1	5,3	1,7	10,5	9,0	2,3	1,1	4,8	3,2	4,6
	(2,9 - 5,4)	(3,5 - 7,1)	(0,8 - 2,6)	(3,4 - 17,6)	(5,1 - 12,9)	(0,9 - 3,6)	(0,5 - 1,8)	(1,6 - 8,0)	(1,7 - 4,8)	(2,5 - 6,7)
2020	2,6	3,6	0,8	6,3	4,8	2,5	0,9	3,1	2,7	2,4
	(1,6 - 3,6)	(2,1 - 5,1)	(0,2 - 1,4)	(1,5 - 11,1)	(2,1 - 7,4)	(0,7 - 4,2)	(0,3 - 1,6)	(0,7 - 5,5)	(1,2 - 4,1)	(1,2 - 3,6)

OTRAS DROGAS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad				Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	17 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	0,6	0,8	0,2	0,5	0,6	1,1	0,4	1,1	0,5	0,6
	(0,4 - 0,9)	(0,4 - 1,2)	(<0,1 - 0,4)	(<0,1 - 0,9)	(0,2 - 0,9)	(0,3 - 1,8)	(0,0 - 0,9)	(0,1 - 2,1)	(0,2 - 0,8)	(0,2 - 1,0)
2014	1,0	0,9	1,0	0,4	2,0	1,6	0,3	2,1	0,4	1,0
	(0,5 - 1,4)	(0,4 - 1,5)	(0,0 - 2,0)	(<0,1 - 0,8)	(0,2 - 3,8)	(0,3 - 2,9)	(0,1 - 0,5)	(0,0 - 4,3)	(0,1 - 0,8)	(0,3 - 1,6)
2016	1,0	1,1	0,8	1,7	1,1	1,9	0,2	2,6	0,2	1,0
	(0,4 - 1,6)	(0,3 - 1,8)	(0,0 - 1,8)	(0,0 - 4,6)	(0,0 - 2,5)	(0,2 - 3,5)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 6,4)	(<0,1 - 0,4)	(0,1 - 1,9)
2018	0,4	0,5	0,1	0,3	0,5	0,7	0,1	0,4	0,5	0,2
	(0,1 - 0,6)	(0,2 - 0,9)	(0,0 - 0,1)	(<0,1 - 0,6)	(0,1 - 0,9)	(0,0 - 1,5)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 1,0)	(0,0 - 1,1)	(0,1 - 0,4)
2020	0,7	0,6	0,7	0,1	1,5	1,1	0,1	0,1	0,9	0,8
	(0,0 - 1,7)	(0,0 - 1,4)	(0,0 - 2,1)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 3,7)	(0,0 - 3,0)	(<0,1 - 0,3)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 2,2)	(0,0 - 1,9)

PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS EN EL BARRIO DE RESIDENCIA

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2004-2020.
Proporción de individuos que declara mucho/bastante

Pregunta: Hasta donde usted conoce, ¿cuánto de las siguientes situaciones ocurren en su barrio?
Respuestas: Mucho, bastante, algo, poco, nada, no sabe.

TRÁFICO DE DROGAS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2004	31,4	28,9	33,8	33,7	33,3	31,3	32,4	27,9	45,5	27,3	13,1
	(30,3 - 32,5)	(27,4 - 30,4)	(32,2 - 35,4)	(30,9 - 36,4)	(30,2 - 36,5)	(28,8 - 33,9)	(29,9 - 34,9)	(26,0 - 29,8)	(43,7 - 47,3)	(25,5 - 29,1)	(11,3 - 14,8)
2006	32,7	31,6	33,8	29,3	35,3	34,9	31,9	32,6	46,9	31,6	14,2
	(31,2 - 34,2)	(29,4 - 33,8)	(31,8 - 35,9)	(25,9 - 32,6)	(31,7 - 39,0)	(31,5 - 38,3)	(28,8 - 34,9)	(29,4 - 35,7)	(45,0 - 48,8)	(28,9 - 34,3)	(11,1 - 17,3)
2008	36,4	34,4	38,3	37,6	37,2	38,1	34,7	35,3	49,3	33,7	22,0
	(34,8 - 37,9)	(32,2 - 36,7)	(36,1 - 40,4)	(33,4 - 41,7)	(33,2 - 41,2)	(34,7 - 41,6)	(31,7 - 37,6)	(32,3 - 38,3)	(46,8 - 51,8)	(31,4 - 36,1)	(18,8 - 25,2)
2010	28,6	28,5	28,7	24,8	30,2	29,6	29,1	29,0	53,5	27,9	14,6
	(26,8 - 30,3)	(26,3 - 30,6)	(26,7 - 30,7)	(21,5 - 28,0)	(26,6 - 33,7)	(26,2 - 32,9)	(25,9 - 32,4)	(26,6 - 31,5)	(50,0 - 57,0)	(25,4 - 30,3)	(12,7 - 16,5)
2012	27,4	27,0	27,8	22,0	30,3	26,5	27,3	29,3	43,8	34,1	12,8
	(25,8 - 29,0)	(24,9 - 29,1)	(26,0 - 29,7)	(18,7 - 25,3)	(26,9 - 33,7)	(23,6 - 29,4)	(24,4 - 30,2)	(26,9 - 31,7)	(40,7 - 46,9)	(31,6 - 36,5)	(11,0 - 14,5)
2014	30,3	29,4	31,1	24,7	27,7	31,9	30,8	32,2	50,5	36,4	14,3
	(28,5 - 32,1)	(27,2 - 31,7)	(29,0 - 33,2)	(21,3 - 28,2)	(24,4 - 31,0)	(28,8 - 35,1)	(27,5 - 34,1)	(29,7 - 34,7)	(47,1 - 54,0)	(33,7 - 39,1)	(12,5 - 16,1)
2016	28,3	27,3	29,2	24,7	27,8	29,1	28,3	29,4	50,3	32,0	14,4
	(26,1 - 30,4)	(25,0 - 29,6)	(26,5 - 31,9)	(20,7 - 28,6)	(24,3 - 31,2)	(25,5 - 32,7)	(24,0 - 32,5)	(26,8 - 32,1)	(45,6 - 54,9)	(29,2 - 34,7)	(12,4 - 16,4)
2018	28,5	27,1	30,0	25,4	28,1	29,8	30,2	28,4	48,1	30,3	12,2
	(26,2 - 30,9)	(24,5 - 29,7)	(27,1 - 32,8)	(21,0 - 29,8)	(24,0 - 32,2)	(26,5 - 33,1)	(26,0 - 34,4)	(25,8 - 31,0)	(43,3 - 53,0)	(27,7 - 33,0)	(10,3 - 14,2)
2020	31,2	29,1	33,4	24,5	30,7	32,8	31,3	33,0*	41,3*	32,9	20,2*
	(29,1 - 33,4)	(26,3 - 31,9)	(31,0 - 35,8)	(19,8 - 29,2)	(26,2 - 35,2)	(29,1 - 36,6)	(27,4 - 35,1)	(30,2 - 35,8)	(37,1 - 45,6)	(30,0 - 35,9)	(17,5 - 22,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ROBOS EN LAS CASAS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2004	27,6	25,2	29,9	23,4	23,5	27,5	31,5	29,7	32,1	25,6	22,7
	(26,5 - 28,6)	(23,8 - 26,6)	(28,4 - 31,4)	(21,0 - 25,8)	(20,9 - 26,1)	(25,1 - 29,9)	(29,0 - 33,9)	(27,8 - 31,5)	(30,4 - 33,7)	(23,9 - 27,2)	(20,6 - 24,7)
2006	33,5	31,1	35,9	27,8	28,7	35,3	34,6	38,0	38,5	34,6	25,4
	(32,0 - 35,1)	(28,9 - 33,3)	(33,9 - 38,0)	(24,2 - 31,4)	(25,4 - 31,9)	(31,9 - 38,6)	(31,4 - 37,7)	(34,7 - 41,2)	(36,7 - 40,4)	(31,8 - 37,5)	(22,0 - 28,8)
2008	32,0	28,1	35,7	26,5	30,9	32,4	33,4	34,6	35,1	30,9	29,5
	(30,5 - 33,5)	(26,1 - 30,2)	(33,6 - 37,8)	(22,9 - 30,1)	(26,9 - 34,8)	(29,1 - 35,7)	(30,6 - 36,2)	(31,6 - 37,5)	(32,8 - 37,4)	(28,5 - 33,3)	(26,2 - 32,8)
2010	19,9	18,5	21,3	15,0	19,2	20,7	22,8	20,9	27,7	20,0	15,3
	(18,7 - 21,2)	(16,9 - 20,2)	(19,7 - 22,9)	(12,8 - 17,2)	(16,3 - 22,0)	(18,0 - 23,4)	(19,9 - 25,8)	(19,0 - 22,7)	(24,7 - 30,8)	(18,1 - 21,8)	(13,4 - 17,2)
2012	21,6	19,6	23,5	16,4	24,0	18,5	22,0	24,2	26,8	24,5	16,1
	(20,2 - 23,0)	(17,8 - 21,4)	(21,7 - 25,2)	(13,7 - 19,1)	(20,7 - 27,3)	(16,2 - 20,9)	(19,1 - 24,8)	(22,2 - 26,3)	(24,1 - 29,5)	(22,2 - 26,8)	(14,0 - 18,3)
2014	24,4	21,9	26,9	17,6	20,4	22,7	24,1	29,2	32,6	26,4	18,4
	(22,9 - 25,9)	(19,9 - 23,9)	(24,9 - 28,8)	(14,9 - 20,3)	(17,3 - 23,4)	(20,0 - 25,3)	(21,0 - 27,3)	(26,6 - 31,7)	(29,8 - 35,4)	(24,0 - 28,9)	(16,2 - 20,6)
2016	23,1	19,5	26,6	17,1	20,1	22,4	24,8	26,0	29,8	23,2	19,6
	(21,4 - 24,7)	(17,4 - 21,6)	(24,5 - 28,7)	(14,1 - 20,1)	(17,5 - 22,8)	(18,9 - 25,9)	(21,6 - 28,0)	(23,8 - 28,3)	(26,4 - 33,2)	(20,6 - 25,8)	(17,8 - 21,4)
2018	22,8	19,8	25,7	13,9	22,0	21,7	24,9	25,6	29,3	23,2	17,5
	(21,0 - 24,5)	(17,7 - 21,9)	(23,6 - 27,8)	(11,2 - 16,5)	(18,7 - 25,4)	(18,8 - 24,6)	(20,8 - 29,0)	(23,2 - 28,1)	(25,0 - 33,5)	(20,9 - 25,4)	(15,0 - 20,0)
2020	20,9	18,5	23,3	10,6	15,8*	21,9	23,2	25,1	25,2	19,2*	19,4
	(19,3 - 22,5)	(16,2 - 20,7)	(21,4 - 25,3)	(8,1 - 13,0)	(12,4 - 19,2)	(18,7 - 25,2)	(19,1 - 27,3)	(22,5 - 27,6)	(22,1 - 28,3)	(17,1 - 21,3)	(16,0 - 22,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

RAYADO EN LAS PAREDES, DAÑOS AL ALUMBRADO O COSAS SIMILARES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2004	37,2	35,4	39,0	48,0	36,9	35,7	36,3	32,1	40,5	38,6	29,8
	(36,1 - 38,4)	(33,8 - 37,0)	(37,3 - 40,6)	(45,1 - 50,9)	(33,9 - 40,0)	(33,1 - 38,3)	(33,8 - 38,9)	(30,1 - 34,0)	(38,8 - 42,3)	(36,6 - 40,5)	(27,6 - 32,1)
2006	38,3	38,6	38,0	43,8	40,8	37,9	37,1	34,7	44,0	40,2	28,3
	(36,8 - 39,8)	(36,4 - 40,8)	(35,9 - 40,2)	(39,9 - 47,6)	(36,9 - 44,7)	(34,4 - 41,4)	(33,8 - 40,3)	(31,7 - 37,7)	(42,1 - 45,9)	(37,3 - 43,0)	(25,2 - 31,4)
2008	39,9	37,5	42,2	44,2	45,3	37,9	35,9	38,3	45,8	39,5	32,4
	(38,3 - 41,5)	(35,2 - 39,7)	(40,1 - 44,4)	(40,2 - 48,2)	(41,0 - 49,7)	(34,5 - 41,4)	(33,0 - 38,8)	(35,3 - 41,4)	(43,2 - 48,3)	(37,0 - 42,0)	(29,1 - 35,7)
2010	30,5	30,2	30,8	29,6	35,3	30,3	29,0	29,6	43,7	31,6	21,5
	(28,8 - 32,2)	(28,1 - 32,4)	(28,7 - 32,9)	(26,4 - 32,9)	(31,4 - 39,3)	(27,0 - 33,6)	(26,1 - 32,0)	(27,3 - 32,0)	(40,1 - 47,3)	(29,1 - 34,1)	(19,3 - 23,7)
2012	28,5	27,8	29,2	30,8	34,4	26,7	25,2	26,9	34,9	32,7	21,3
	(27,0 - 30,0)	(25,8 - 29,8)	(27,3 - 31,0)	(27,3 - 34,3)	(30,8 - 37,9)	(24,0 - 29,5)	(22,3 - 28,0)	(24,6 - 29,2)	(32,0 - 37,8)	(30,4 - 35,1)	(19,0 - 23,5)
2014	30,1	28,5	31,6	31,7	30,1	30,0	27,8	30,6	42,6	33,8	20,2
	(28,4 - 31,7)	(26,4 - 30,6)	(29,5 - 33,6)	(28,0 - 35,4)	(26,6 - 33,6)	(27,0 - 33,0)	(24,6 - 31,0)	(28,0 - 33,1)	(39,2 - 46,0)	(31,3 - 36,4)	(17,8 - 22,5)
2016	25,9	24,4	27,5	30,4	30,5	25,3	25,9	22,6	35,7	29,8	17,9
	(24,4 - 27,5)	(22,4 - 26,4)	(25,6 - 29,5)	(26,3 - 34,5)	(26,8 - 34,1)	(21,9 - 28,6)	(22,3 - 29,5)	(20,5 - 24,8)	(31,3 - 40,2)	(27,4 - 32,2)	(15,6 - 20,3)
2018	21,6	19,7	23,5	25,5	24,5	23,1	22,2	18,0	33,5	20,6	14,1
	(19,6 - 23,6)	(17,6 - 21,8)	(20,9 - 26,1)	(21,3 - 29,7)	(20,0 - 29,0)	(20,1 - 26,1)	(17,7 - 26,7)	(16,1 - 20,0)	(28,4 - 38,7)	(18,6 - 22,6)	(12,3 - 16,0)
2020	22,7	21,5	24,0	20,0	24,7	24,4	25,2	20,8	29,2	22,1	17,9
	(20,3 - 25,1)	(18,4 - 24,5)	(21,3 - 26,6)	(15,3 - 24,8)	(20,5 - 28,9)	(21,2 - 27,7)	(19,7 - 30,7)	(17,7 - 23,9)	(25,5 - 33,0)	(19,0 - 25,1)	(14,4 - 21,5)

CONSUMO DE DROGAS EN LUGARES PÚBLICOS COMO EN LA CALLE O PLAZAS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2004	35,1	33,6	36,4	36,1	38,5	36,8	35,8	30,5	47,5	32,9	17,1
	(33,9 - 36,2)	(32,1 - 35,2)	(34,8 - 38,1)	(33,3 - 39,0)	(35,4 - 41,7)	(34,2 - 39,5)	(33,3 - 38,3)	(28,5 - 32,4)	(45,7 - 49,3)	(31,0 - 34,8)	(15,3 - 18,9)
2006	39,0	38,5	39,5	35,4	45,6	42,6	39,7	34,6	51,4	40,8	19,6
	(37,5 - 40,6)	(36,3 - 40,8)	(37,3 - 41,7)	(31,7 - 39,0)	(41,5 - 49,7)	(39,0 - 46,2)	(36,4 - 43,1)	(31,7 - 37,4)	(49,6 - 53,3)	(37,9 - 43,7)	(16,8 - 22,5)
2008	46,0	44,1	47,8	46,6	51,1	46,4	41,9	45,4	58,1	45,4	29,8
	(44,4 - 47,6)	(41,8 - 46,4)	(45,7 - 50,0)	(42,6 - 50,6)	(46,9 - 55,3)	(42,9 - 49,9)	(38,9 - 44,9)	(42,3 - 48,5)	(55,7 - 60,5)	(42,9 - 48,0)	(26,4 - 33,3)
2010	32,5	32,4	32,6	30,9	34,6	33,0	34,0	31,2	54,7	31,9	20,0
	(30,6 - 34,4)	(30,1 - 34,7)	(30,5 - 34,7)	(27,2 - 34,6)	(30,9 - 38,3)	(29,5 - 36,6)	(30,6 - 37,4)	(28,7 - 33,7)	(50,9 - 58,5)	(29,3 - 34,6)	(17,6 - 22,3)
2012	35,7	35,0	36,4	30,2	39,8	34,6	36,3	36,7	51,2	42,8	21,1
	(34,0 - 37,4)	(32,8 - 37,2)	(34,4 - 38,4)	(26,4 - 33,9)	(36,2 - 43,5)	(31,5 - 37,7)	(33,0 - 39,6)	(34,2 - 39,2)	(48,5 - 54,0)	(40,2 - 45,3)	(18,7 - 23,4)
2014	36,1	35,0	37,1	31,9	34,9	37,0	35,4	37,9	55,1	41,9	20,9
	(34,2 - 37,9)	(32,6 - 37,4)	(35,0 - 39,3)	(28,1 - 35,7)	(31,2 - 38,6)	(33,8 - 40,2)	(31,9 - 38,9)	(35,3 - 40,4)	(51,8 - 58,5)	(39,2 - 44,7)	(18,5 - 23,3)
2016	36,3	35,2	37,3	36,7	38,1	37,9	36,4	34,4	56,2	40,5	23,0
	(34,1 - 38,4)	(32,8 - 37,7)	(34,6 - 40,0)	(32,9 - 40,6)	(34,3 - 41,9)	(33,9 - 41,9)	(31,9 - 41,0)	(31,8 - 37,1)	(51,8 - 60,6)	(37,7 - 43,2)	(20,8 - 25,2)
2018	34,9	34,4	35,5	32,5	37,4	36,9	38,9	31,8	52,6	37,1	19,8
	(32,6 - 37,3)	(31,7 - 37,0)	(32,7 - 38,4)	(27,9 - 37,1)	(32,7 - 42,1)	(33,4 - 40,3)	(34,5 - 43,4)	(29,2 - 34,5)	(47,9 - 57,2)	(34,5 - 39,6)	(16,9 - 22,6)
2020	35,8	34,3	37,2	30,0	38,1	37,2	36,3	35,9	45,2*	36,5	26,7*
	(33,4 - 38,1)	(31,2 - 37,5)	(34,7 - 39,7)	(24,7 - 35,2)	(33,3 - 42,9)	(33,5 - 41,0)	(31,9 - 40,6)	(32,4 - 39,4)	(40,8 - 49,6)	(33,4 - 39,5)	(23,2 - 30,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

ASALTOS O ROBOS EN LAS CALLES

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2004	25,3	22,6	27,9	23,0	26,0	25,0	28,0	24,3	30,4	24,1	18,2
	(24,2 - 26,3)	(21,2 - 23,9)	(26,3 - 29,4)	(20,5 - 25,5)	(23,1 - 29,0)	(22,6 - 27,3)	(25,6 - 30,4)	(22,5 - 26,0)	(28,8 - 32,1)	(22,3 - 25,8)	(16,3 - 20,1)
2006	28,1	26,7	29,4	23,1	30,7	31,4	27,7	27,6	34,6	28,6	18,3
	(26,6 - 29,5)	(24,6 - 28,8)	(27,4 - 31,3)	(20,1 - 26,2)	(26,7 - 34,7)	(28,1 - 34,8)	(24,7 - 30,7)	(25,0 - 30,2)	(32,8 - 36,5)	(25,9 - 31,2)	(15,4 - 21,1)
2008	31,4	28,6	34,0	26,4	32,3	32,2	29,6	34,4	35,5	32,0	24,7
	(29,8 - 32,9)	(26,3 - 30,9)	(31,9 - 36,2)	(22,6 - 30,2)	(28,2 - 36,3)	(28,7 - 35,7)	(26,7 - 32,4)	(31,2 - 37,6)	(33,1 - 37,9)	(29,4 - 34,6)	(21,3 - 28,1)
2010	18,1	17,8	18,4	14,2	22,0	18,8	19,4	17,3	27,7	18,6	11,9
	(16,7 - 19,5)	(15,9 - 19,7)	(16,8 - 20,0)	(11,7 - 16,6)	(18,6 - 25,3)	(16,0 - 21,5)	(16,5 - 22,2)	(15,4 - 19,2)	(24,4 - 30,9)	(16,5 - 20,8)	(10,1 - 13,6)
2012	18,9	18,0	19,9	15,2	20,2	16,4	19,8	20,9	25,4	23,5	11,5
	(17,6 - 20,2)	(16,2 - 19,8)	(18,3 - 21,5)	(12,6 - 17,8)	(17,3 - 23,1)	(14,0 - 18,8)	(17,0 - 22,7)	(18,8 - 23,0)	(22,8 - 28,0)	(21,1 - 25,8)	(9,8 - 13,1)
2014	23,1	21,4	24,8	17,8	20,2	22,0	23,6	26,3	35,1	25,6	14,7
	(21,6 - 24,7)	(19,4 - 23,5)	(22,9 - 26,7)	(14,8 - 20,8)	(17,3 - 23,1)	(19,4 - 24,7)	(20,5 - 26,8)	(23,9 - 28,7)	(32,2 - 38,1)	(23,3 - 27,9)	(12,6 - 16,8)
2016	22,7	20,4	25,0	18,2	22,3	24,6	23,0	23,4	32,6	25,4	15,5
	(20,8 - 24,5)	(18,3 - 22,5)	(22,7 - 27,2)	(15,1 - 21,4)	(19,2 - 25,5)	(20,7 - 28,4)	(19,2 - 26,9)	(21,1 - 25,8)	(28,7 - 36,5)	(22,2 - 28,6)	(13,3 - 17,7)
2018	23,0	21,6	24,3	15,7	23,7	24,1	26,5	22,9	30,7	22,8	17,4
	(21,2 - 24,8)	(19,2 - 23,9)	(22,2 - 26,5)	(12,6 - 18,8)	(19,6 - 27,8)	(21,0 - 27,2)	(22,2 - 30,8)	(20,5 - 25,3)	(26,5 - 34,9)	(20,7 - 24,9)	(14,3 - 20,4)
2020	25,4	23,0	27,9	18,9	25,0	24,1	26,7	27,9*	35,7	22,5	20,4
	(22,9 - 27,9)	(20,2 - 25,8)	(24,5 - 31,2)	(13,9 - 23,8)	(20,7 - 29,3)	(20,7 - 27,4)	(21,6 - 31,8)	(24,3 - 31,5)	(31,2 - 40,1)	(19,2 - 25,8)	(16,8 - 24,1)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

JÓVENES PARADOS NO HACIENDO NADA EN LAS ESQUINAS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2004	31,2	29,4	33,0	36,8	33,8	30,5	32,1	25,9	44,0	28,1	13,9
	(30,1 - 32,3)	(27,9 - 30,8)	(31,4 - 34,6)	(34,0 - 39,6)	(30,7 - 36,8)	(28,0 - 32,9)	(29,6 - 34,5)	(24,1 - 27,6)	(42,2 - 45,7)	(26,3 - 29,9)	(12,2 - 15,7)
2008	53,4	50,7	55,9	58,6	57,4	56,5	49,9	48,6	66,2	54,0	34,1
	(51,8 - 54,9)	(48,5 - 53,0)	(53,9 - 58,0)	(54,8 - 62,3)	(53,2 - 61,5)	(53,1 - 59,9)	(46,9 - 52,9)	(45,6 - 51,6)	(63,9 - 68,5)	(51,5 - 56,5)	(30,7 - 37,5)
2010	38,4	39,0	37,9	40,0	42,3	38,2	37,2	36,6	61,5	40,1	22,8
	(36,4 - 40,4)	(36,5 - 41,5)	(35,7 - 40,1)	(36,1 - 44,0)	(38,3 - 46,2)	(34,5 - 41,9)	(33,7 - 40,8)	(33,9 - 39,3)	(57,7 - 65,3)	(37,5 - 42,7)	(20,3 - 25,3)
2012	40,1	39,1	41,0	41,4	48,0	38,0	37,7	37,6	58,5	47,9	23,2
	(38,3 - 41,8)	(36,8 - 41,4)	(38,9 - 43,0)	(37,6 - 45,2)	(44,0 - 52,0)	(34,8 - 41,1)	(34,4 - 41,0)	(35,1 - 40,2)	(55,6 - 61,4)	(45,2 - 50,6)	(20,9 - 25,4)
2014	37,2	36,4	37,9	37,0	40,1	38,9	36,2	35,8	59,1	44,8	19,0
	(35,4 - 39,0)	(34,1 - 38,8)	(35,8 - 40,0)	(33,4 - 40,6)	(36,3 - 44,0)	(35,3 - 42,4)	(32,8 - 39,7)	(33,2 - 38,4)	(55,9 - 62,4)	(42,2 - 47,3)	(17,2 - 20,9)
2016	34,7	33,3	36,2	36,8	38,5	35,8	34,8	31,8	57,2	39,2	20,0
	(32,4 - 37,1)	(30,7 - 35,9)	(33,2 - 39,1)	(32,9 - 40,6)	(34,7 - 42,3)	(31,7 - 40,0)	(30,2 - 39,3)	(29,3 - 34,3)	(52,9 - 61,5)	(36,1 - 42,4)	(18,0 - 22,0)
2018	32,2	30,3	34,1	37,7	33,8	34,9	32,0	28,5	50,8	34,5	16,2
	(29,8 - 34,6)	(27,7 - 33,0)	(31,3 - 36,8)	(33,0 - 42,3)	(29,4 - 38,2)	(31,4 - 38,3)	(27,6 - 36,4)	(25,9 - 31,0)	(45,9 - 55,7)	(31,8 - 37,1)	(13,9 - 18,4)
2020	31,9	29,9	33,9	32,1	33,7	33,3	31,4	30,6	43,4*	32,7	20,9*
	(29,8 - 33,9)	(26,7 - 33,0)	(31,4 - 36,4)	(26,4 - 37,7)	(30,1 - 37,3)	(29,8 - 36,8)	(27,5 - 35,3)	(27,3 - 33,9)	(39,4 - 47,4)	(29,7 - 35,7)	(18,0 - 23,7)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

BALACERAS Y ACCIONES VIOLENTAS CON ARMAS DE FUEGO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2004	15,0	13,6	16,3	16,6	16,7	15,9	15,4	11,9	24,0	11,6	4,3
	(14,1 - 15,8)	(12,5 - 14,7)	(15,0 - 17,6)	(14,3 - 18,9)	(14,3 - 19,1)	(13,9 - 17,9)	(13,5 - 17,2)	(10,6 - 13,3)	(22,4 - 25,6)	(10,3 - 12,8)	(3,4 - 5,2)
2006	16,6	15,8	17,4	14,0	18,5	19,6	18,6	13,6	26,3	15,4	4,7
	(15,5 - 17,7)	(14,2 - 17,5)	(15,8 - 18,9)	(11,6 - 16,3)	(15,6 - 21,4)	(16,7 - 22,6)	(15,9 - 21,4)	(11,7 - 15,5)	(24,5 - 28,1)	(13,1 - 17,7)	(3,4 - 5,9)
2008	20,0	17,7	22,3	21,1	21,0	22,1	17,7	19,2	26,6	19,2	12,1
	(18,7 - 21,4)	(15,9 - 19,5)	(20,4 - 24,2)	(17,4 - 24,8)	(17,4 - 24,7)	(18,8 - 25,5)	(15,4 - 20,0)	(16,9 - 21,5)	(24,4 - 28,8)	(17,0 - 21,4)	(9,5 - 14,7)
2010	14,1	14,3	13,8	14,3	13,1	15,5	13,5	14,0	26,6	14,1	6,6
	(12,7 - 15,4)	(12,6 - 16,0)	(12,3 - 15,4)	(11,8 - 16,8)	(10,5 - 15,7)	(12,8 - 18,2)	(11,1 - 15,9)	(12,2 - 15,9)	(23,0 - 30,2)	(12,3 - 16,0)	(5,2 - 7,9)
2012	15,7	15,8	15,7	13,7	19,6	13,8	16,0	15,6	24,6	20,9	6,3
	(14,4 - 17,0)	(14,1 - 17,5)	(14,2 - 17,1)	(11,2 - 16,3)	(16,6 - 22,6)	(11,6 - 16,0)	(13,3 - 18,7)	(13,8 - 17,4)	(21,8 - 27,4)	(18,6 - 23,3)	(5,0 - 7,7)
2014	17,6	16,3	18,9	15,4	16,3	17,4	18,3	18,6	34,3	20,6	6,3
	(16,1 - 19,1)	(14,5 - 18,1)	(17,1 - 20,6)	(12,4 - 18,5)	(13,6 - 19,0)	(14,9 - 20,0)	(15,3 - 21,2)	(16,6 - 20,7)	(30,8 - 37,8)	(18,6 - 22,6)	(4,9 - 7,6)
2016	17,3	16,0	18,5	15,5	15,9	19,9	18,1	16,9	35,0	20,0	6,4
	(15,2 - 19,4)	(13,8 - 18,2)	(16,1 - 20,9)	(12,5 - 18,4)	(13,1 - 18,7)	(16,2 - 23,6)	(14,2 - 22,0)	(14,8 - 19,1)	(30,2 - 39,7)	(17,3 - 22,7)	(5,2 - 7,5)
2018	17,5	15,8	19,1	16,2	15,2	18,7	20,3	16,8	33,0	17,3	6,2
	(15,3 - 19,6)	(13,6 - 18,0)	(16,5 - 21,7)	(12,8 - 19,5)	(11,9 - 18,5)	(15,6 - 21,9)	(15,9 - 24,7)	(14,5 - 19,1)	(27,6 - 38,4)	(15,1 - 19,5)	(4,8 - 7,6)
2020	22,2*	20,7*	23,7*	16,3	20,3	22,6	23,9	24,0*	31,5	22,1*	14,3*
	(20,4 - 24,0)	(18,3 - 23,2)	(21,6 - 25,8)	(12,0 - 20,7)	(16,2 - 24,4)	(19,1 - 26,1)	(19,8 - 27,9)	(21,4 - 26,7)	(27,2 - 35,9)	(19,7 - 24,5)	(11,6 - 16,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

VENTA CLANDESTINA DE ALCOHOL

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	11,9	12,1	11,8	10,2	16,2	11,3	11,8	11,1	17,8	16,1	5,1
	(10,7 - 13,1)	(10,5 - 13,8)	(10,4 - 13,1)	(7,8 - 12,5)	(13,5 - 19,0)	(9,3 - 13,4)	(9,3 - 14,4)	(9,3 - 12,8)	(15,3 - 20,3)	(13,9 - 18,2)	(3,8 - 6,4)
2014	11,6	10,9	12,3	11,0	10,5	12,1	12,3	11,8	23,7	12,9	4,2
	(10,6 - 12,7)	(9,6 - 12,2)	(10,9 - 13,7)	(8,8 - 13,2)	(8,4 - 12,6)	(9,8 - 14,4)	(10,2 - 14,5)	(10,2 - 13,3)	(21,0 - 26,5)	(11,4 - 14,5)	(3,2 - 5,2)
2016	10,2	10,2	10,2	9,9	11,1	12,3	10,3	9,0	19,7	11,5	4,6
	(8,7 - 11,8)	(8,5 - 12,0)	(8,6 - 11,9)	(7,6 - 12,2)	(8,2 - 14,0)	(9,7 - 14,9)	(7,3 - 13,2)	(7,7 - 10,4)	(15,5 - 23,8)	(9,6 - 13,4)	(3,7 - 5,4)
2018	11,2	10,5	11,9	10,3	12,4	11,7	14,4	9,2	20,6	10,9	4,4
	(9,4 - 13,0)	(8,5 - 12,5)	(9,7 - 14,1)	(7,4 - 13,2)	(9,5 - 15,3)	(9,2 - 14,3)	(9,7 - 19,0)	(7,6 - 10,8)	(15,4 - 25,8)	(9,2 - 12,7)	(2,9 - 5,9)
2020	11,3	11,1	11,5	8,8	10,7	10,4	13,1	12,1	18,1	10,7	6,3
	(9,7 - 13,0)	(9,0 - 13,2)	(9,7 - 13,4)	(6,0 - 11,7)	(7,4 - 14,0)	(8,1 - 12,7)	(10,0 - 16,2)	(9,2 - 15,0)	(14,2 - 21,9)	(8,6 - 12,9)	(4,4 - 8,2)

APROBACIÓN DE POLÍTICAS DE CONTROL DE DROGAS

Según sexo, tramos de edad y nivel socioeconómico. Chile, 2008-2020.
Proporción de individuos que declara muy de acuerdo/de acuerdo

Pregunta: Pensando en drogas como marihuana, cocaína o pasta base, ¿cuán de acuerdo está usted con las siguientes medidas?
Respuestas: Muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo.

SUSPENDER EL JUICIO A QUIENES HAN DELINQUIDO POR PRIMERA VEZ A CAMBIO DE INGRESAR A TRATAMIENTO

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2008	59,8	60,1	59,4	62,4	55,1	57,5	61,1	61,3	61,0	61,2	55,7
	(58,2 - 61,3)	(57,9 - 62,3)	(57,3 - 61,5)	(58,6 - 66,2)	(50,9 - 59,3)	(54,1 - 60,9)	(58,2 - 64,0)	(58,4 - 64,3)	(58,5 - 63,4)	(58,8 - 63,6)	(52,5 - 59,0)
2010	64,6	65,0	64,2	65,1	64,8	62,4	64,9	65,1	63,6	65,8	63,8
	(63,2 - 66,0)	(63,0 - 66,9)	(62,3 - 66,1)	(61,8 - 68,3)	(61,4 - 68,3)	(59,1 - 65,7)	(62,0 - 67,8)	(62,7 - 67,5)	(60,4 - 66,8)	(63,6 - 67,9)	(61,5 - 66,2)
2012	61,5	61,6	61,4	62,6	58,3	58,2	62,0	63,8	64,3	63,1	58,5
	(59,9 - 63,1)	(59,5 - 63,7)	(59,4 - 63,4)	(58,4 - 66,8)	(54,4 - 62,2)	(55,1 - 61,3)	(58,9 - 65,2)	(61,4 - 66,1)	(61,8 - 66,9)	(61,0 - 65,2)	(55,6 - 61,5)
2014	64,0	64,0	64,0	65,1	65,7	63,0	62,8	64,0	62,6	64,7	64,2
	(62,7 - 65,4)	(62,0 - 66,1)	(62,2 - 65,8)	(61,6 - 68,6)	(62,2 - 69,3)	(59,9 - 66,1)	(59,5 - 66,2)	(61,7 - 66,3)	(60,0 - 65,2)	(62,4 - 67,0)	(62,0 - 66,4)
2016	62,1	63,0	61,3	65,5	57,8	60,4	60,2	64,5	60,8	62,3	62,6
	(60,5 - 63,8)	(60,6 - 65,3)	(59,4 - 63,2)	(61,2 - 69,9)	(54,5 - 61,0)	(57,3 - 63,5)	(57,2 - 63,1)	(61,8 - 67,1)	(57,5 - 64,1)	(59,8 - 64,8)	(60,2 - 65,1)
2018	56,1	56,3	55,9	56,7	57,4	50,4	52,8	59,8	56,8	55,4	56,6
	(54,4 - 57,8)	(54,1 - 58,6)	(53,7 - 58,2)	(52,3 - 61,0)	(53,7 - 61,1)	(47,0 - 53,8)	(48,8 - 56,9)	(57,4 - 62,2)	(52,6 - 61,0)	(53,3 - 57,5)	(53,6 - 59,6)
2020	60,6*	61,5*	59,7*	70,7*	62,6*	54,9	56,0	61,3	64,7*	58,9	59,5
	(58,5 - 62,7)	(58,7 - 64,4)	(57,3 - 62,2)	(65,6 - 75,9)	(59,0 - 66,1)	(51,3 - 58,5)	(51,9 - 60,1)	(58,2 - 64,4)	(61,5 - 67,9)	(55,8 - 61,9)	(56,0 - 63,0)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

DAR LA MISMA PENA A QUIENES TRAFICAN CON MARIHUANA QUE LOS QUE TRAFICAN CON COCAÍNA O PASTA BASE

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2008	71,1	69,5	72,7	70,0	68,4	69,4	71,8	73,7	69,9	73,4	69,1
	(69,7 - 72,5)	(67,3 - 71,6)	(70,8 - 74,5)	(66,2 - 73,7)	(64,5 - 72,3)	(66,1 - 72,8)	(69,1 - 74,5)	(71,2 - 76,2)	(67,4 - 72,3)	(71,3 - 75,6)	(66,2 - 71,9)
2010	67,5	66,9	68,2	67,3	64,9	67,2	66,6	69,6	71,4	68,4	64,3
	(65,8 - 69,3)	(64,8 - 69,0)	(65,9 - 70,4)	(63,6 - 70,9)	(61,1 - 68,7)	(64,1 - 70,2)	(63,3 - 69,8)	(67,0 - 72,2)	(68,2 - 74,6)	(65,8 - 71,0)	(61,4 - 67,1)
2012	63,6	62,2	64,9	65,3	59,0	64,7	63,4	64,5	63,3	65,8	61,7
	(62,2 - 65,0)	(60,1 - 64,3)	(63,1 - 66,7)	(61,6 - 68,9)	(55,2 - 62,9)	(61,8 - 67,6)	(60,5 - 66,4)	(62,3 - 66,8)	(60,7 - 66,0)	(63,6 - 67,9)	(59,3 - 64,2)
2014	51,6	52,3	50,9	53,7	46,5	46,7	54,5	53,5	55,5	51,5	49,6
	(50,1 - 53,0)	(50,0 - 54,6)	(48,9 - 52,9)	(50,0 - 57,4)	(42,4 - 50,6)	(43,4 - 50,0)	(51,4 - 57,7)	(51,0 - 56,0)	(52,7 - 58,4)	(49,1 - 54,0)	(47,2 - 52,0)
2016	57,0	55,8	58,1	57,1	48,2	56,8	60,6	59,0	61,4	60,2	52,1
	(55,2 - 58,8)	(53,7 - 57,9)	(55,8 - 60,5)	(53,3 - 60,9)	(44,3 - 52,2)	(53,4 - 60,1)	(57,2 - 64,0)	(56,6 - 61,4)	(59,0 - 63,8)	(57,5 - 63,0)	(49,2 - 55,0)
2018	54,7	52,7	56,8	56,1	48,6	50,3	56,1	58,3	60,3	56,1	49,4
	(53,1 - 56,4)	(50,2 - 55,1)	(54,9 - 58,6)	(52,1 - 60,2)	(44,4 - 52,7)	(46,7 - 53,8)	(51,6 - 60,5)	(55,9 - 60,7)	(57,4 - 63,1)	(53,8 - 58,4)	(46,2 - 52,5)
2020	55,0	54,7	55,3	57,3	45,8	49,6	59,0	58,7	58,6	55,4	51,3
	(53,4 - 56,6)	(52,4 - 57,0)	(52,8 - 57,7)	(52,5 - 62,1)	(41,7 - 50,0)	(46,1 - 53,1)	(54,8 - 63,3)	(56,1 - 61,2)	(55,0 - 62,3)	(53,1 - 57,7)	(48,3 - 54,2)

PENALIZAR EL PORTE Y CONSUMO DE MARIHUANA AUNQUE SEA EN PEQUEÑAS CANTIDADES Y PARA USO PERSONAL

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2008	74,6	71,2	78,0	74,4	64,3	71,1	79,7	79,2	75,2	77,7	68,7
	(73,1 - 76,1)	(69,0 - 73,4)	(76,0 - 79,9)	(71,0 - 77,8)	(60,1 - 68,5)	(67,8 - 74,4)	(77,2 - 82,2)	(76,2 - 82,3)	(72,9 - 77,5)	(75,4 - 79,9)	(65,4 - 72,1)
2010	72,6	71,1	74,1	71,2	62,3	68,6	74,9	78,9	74,5	74,5	69,4
	(71,3 - 74,0)	(69,2 - 73,0)	(72,4 - 75,9)	(68,0 - 74,4)	(58,6 - 66,1)	(65,5 - 71,6)	(72,1 - 77,6)	(76,8 - 81,0)	(71,4 - 77,6)	(72,4 - 76,5)	(67,0 - 71,8)
2012	65,0	61,0	68,9	64,8	53,9	61,1	67,6	71,0	67,5	67,4	61,5
	(63,6 - 66,4)	(58,9 - 63,1)	(67,0 - 70,8)	(61,1 - 68,5)	(50,1 - 57,8)	(58,0 - 64,3)	(64,7 - 70,5)	(69,0 - 73,1)	(65,0 - 70,0)	(65,4 - 69,5)	(59,1 - 63,8)
2014	51,6	51,0	52,2	52,7	44,1	47,2	53,3	55,3	55,3	53,8	47,7
	(50,1 - 53,1)	(48,8 - 53,1)	(50,3 - 54,1)	(48,9 - 56,5)	(40,3 - 48,0)	(43,9 - 50,4)	(50,2 - 56,5)	(52,8 - 57,7)	(52,3 - 58,2)	(51,5 - 56,2)	(45,2 - 50,2)
2016	50,3	48,1	52,6	53,5	39,2	46,7	51,6	54,9	53,8	54,6	45,1
	(48,7 - 52,0)	(46,1 - 50,1)	(50,3 - 54,9)	(49,7 - 57,2)	(35,4 - 43,1)	(43,4 - 49,9)	(48,3 - 54,9)	(52,2 - 57,6)	(51,0 - 56,6)	(51,9 - 57,3)	(42,5 - 47,6)
2018	53,8	50,4	57,2	56,4	38,8	45,4	56,7	61,7	57,5	57,3	47,4
	(52,2 - 55,4)	(48,2 - 52,5)	(55,1 - 59,3)	(52,3 - 60,5)	(34,9 - 42,7)	(42,1 - 48,6)	(52,4 - 60,9)	(59,4 - 64,0)	(54,8 - 60,2)	(55,0 - 59,7)	(44,5 - 50,3)
2020	46,0*	44,7*	47,2*	51,3	31,5*	39,3*	46,5*	53,2*	50,7*	44,7*	43,6
	(44,1 - 47,9)	(41,8 - 47,7)	(45,1 - 49,3)	(44,5 - 58,1)	(27,6 - 35,5)	(35,5 - 43,1)	(42,3 - 50,7)	(50,9 - 55,4)	(47,4 - 54,0)	(41,5 - 47,9)	(41,0 - 46,2)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERMITIR EL USO DE MARIHUANA PARA FINES TERAPÉUTICOS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2008	57,5	63,1	52,1	57,3	64,7	60,4	56,4	52,6	54,2	58,6	60,6
	(56,0 - 59,1)	(61,0 - 65,2)	(50,0 - 54,2)	(53,6 - 61,1)	(60,6 - 68,8)	(56,9 - 64,0)	(53,4 - 59,3)	(49,6 - 55,6)	(51,7 - 56,7)	(56,2 - 61,0)	(57,4 - 63,9)
2010	59,4	62,3	56,5	54,6	68,3	63,1	58,2	56,6	59,5	57,0	62,1
	(57,8 - 61,0)	(60,2 - 64,5)	(54,5 - 58,6)	(51,2 - 58,0)	(64,8 - 71,8)	(59,9 - 66,3)	(54,8 - 61,5)	(54,0 - 59,1)	(56,1 - 62,9)	(54,5 - 59,5)	(59,6 - 64,6)
2012	68,2	72,2	64,2	63,7	74,0	74,1	68,4	64,7	65,0	67,4	70,5
	(66,7 - 69,6)	(70,5 - 73,9)	(62,2 - 66,3)	(60,2 - 67,2)	(70,1 - 77,8)	(71,3 - 76,9)	(65,2 - 71,5)	(62,4 - 67,0)	(62,5 - 67,6)	(65,0 - 69,7)	(68,2 - 72,9)
2014	84,8	85,1	84,5	81,6	89,4	88,6	85,0	82,3	85,5	84,1	85,0
	(83,7 - 85,9)	(83,4 - 86,7)	(83,1 - 85,9)	(78,8 - 84,5)	(87,1 - 91,6)	(86,7 - 90,6)	(82,7 - 87,3)	(80,4 - 84,2)	(83,7 - 87,4)	(82,3 - 85,8)	(83,1 - 86,9)
2016											
2018	82,5	82,8	82,2	75,6	87,2	84,9	82,6	81,7	81,4	82,8	83,3
	(81,3 - 83,7)	(81,2 - 84,4)	(80,7 - 83,7)	(72,2 - 78,9)	(85,0 - 89,4)	(82,9 - 86,9)	(79,9 - 85,2)	(79,9 - 83,6)	(78,8 - 84,0)	(81,0 - 84,6)	(81,3 - 85,3)
2020	83,5	84,2	82,7	78,1	90,6*	87,7	84,2	79,9	80,2	84,4	85,1
	(82,1 - 84,8)	(82,3 - 86,2)	(80,9 - 84,4)	(73,2 - 83,0)	(88,3 - 92,8)	(85,3 - 90,2)	(81,7 - 86,7)	(78,0 - 81,9)	(77,5 - 82,8)	(82,7 - 86,0)	(81,8 - 88,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

LA MARIHUANA DEBERÍA SER LEGAL PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2008	26,5	30,3	22,7	26,5	34,4	29,3	23,2	22,5	26,9	26,0	26,6
	(25,0 - 27,9)	(28,1 - 32,5)	(20,9 - 24,5)	(22,8 - 30,2)	(30,3 - 38,5)	(26,1 - 32,6)	(20,6 - 25,9)	(19,9 - 25,1)	(24,6 - 29,1)	(23,6 - 28,5)	(23,7 - 29,5)
2010	25,6	28,4	22,8	23,6	36,0	30,4	24,4	20,1	27,2	23,7	26,8
	(24,2 - 26,9)	(26,6 - 30,3)	(21,1 - 24,4)	(20,6 - 26,6)	(32,1 - 39,9)	(27,7 - 33,1)	(21,6 - 27,1)	(18,1 - 22,0)	(24,0 - 30,3)	(21,8 - 25,6)	(24,4 - 29,1)
2012	34,6	40,0	29,5	33,5	44,0	37,8	30,4	31,4	35,4	36,6	32,5
	(33,2 - 36,1)	(37,9 - 42,0)	(27,7 - 31,2)	(29,7 - 37,3)	(40,2 - 47,8)	(34,8 - 40,8)	(27,5 - 33,2)	(29,2 - 33,5)	(33,0 - 37,7)	(34,3 - 38,9)	(30,1 - 35,0)
2014	45,7	48,6	42,9	45,0	56,7	51,3	41,6	41,1	48,8	44,9	44,8
	(44,1 - 47,2)	(46,5 - 50,7)	(40,8 - 44,9)	(41,3 - 48,6)	(52,9 - 60,6)	(47,9 - 54,7)	(38,4 - 44,8)	(38,7 - 43,4)	(46,0 - 51,6)	(42,7 - 47,2)	(41,9 - 47,6)
2016	50,6	53,5	47,6	45,2	62,1	57,5	48,0	45,8	49,5	51,4	50,4
	(49,0 - 52,1)	(51,6 - 55,5)	(45,4 - 49,8)	(41,3 - 49,2)	(58,1 - 66,2)	(54,3 - 60,6)	(44,2 - 51,8)	(43,8 - 47,8)	(46,3 - 52,7)	(48,9 - 53,8)	(47,5 - 53,4)
2018	47,0	51,3	42,8	42,5	59,9	50,6	46,5	41,8	47,9	46,9	46,4
	(45,4 - 48,7)	(49,1 - 53,5)	(40,6 - 45,0)	(38,1 - 46,8)	(55,8 - 64,1)	(47,0 - 54,3)	(42,2 - 50,7)	(39,6 - 44,0)	(44,7 - 51,0)	(44,5 - 49,2)	(43,4 - 49,4)
2020	47,9	51,2	44,6	42,5	62,9	57,6*	46,9	39,2	48,8	48,2	46,7
	(46,2 - 49,6)	(48,6 - 53,8)	(41,9 - 47,2)	(36,9 - 48,2)	(58,7 - 67,0)	(53,8 - 61,3)	(42,0 - 51,7)	(36,8 - 41,6)	(45,2 - 52,3)	(46,0 - 50,3)	(43,5 - 49,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.



ANEXO II

**Situación Regional del
Consumo de Alcohol y
otras Drogas**

Anexo II

Situación regional del consumo de alcohol y otras drogas²

TABACO DIARIO

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional					30,6	30,5	28,8	28,2	24,5	21,9	22,7	21,2	19,6	19,5
					(29,5 - 31,7)	(29,4 - 31,6)	(27,3 - 30,2)	(26,7 - 29,6)	(23,3 - 25,8)	(20,8 - 23,0)	(21,5 - 23,9)	(20,1 - 22,4)	(18,2 - 20,9)	(18,1 - 21,0)
Tarapacá					25,9	26,6	27,4	19,5	19,6	12,2	19,4	16,7	14,9	17,4
					(20,9 - 30,8)	(21,1 - 32,1)	(23,0 - 31,8)	(15,9 - 23,2)	(14,3 - 25,0)	(8,9 - 15,6)	(15,4 - 23,4)	(14,5 - 19,0)	(12,4 - 17,5)	(14,9 - 19,9)
Antofagasta					28,3	29,3	25,5	24,4	23,3	21,9	14,6	19,4	18,7	15,5
					(25,3 - 31,3)	(25,7 - 32,9)	(21,8 - 29,2)	(21,3 - 27,5)	(19,0 - 27,5)	(18,3 - 25,6)	(11,1 - 18,1)	(12,5 - 26,3)	(14,8 - 22,6)	(11,5 - 19,4)
Atacama					29,3	28,5	27,0	26,5	22,6	18,7	20,0	18,3	20,5	13,4*
					(25,8 - 32,9)	(24,4 - 32,7)	(22,5 - 31,5)	(22,0 - 30,9)	(16,8 - 28,4)	(12,9 - 24,6)	(15,4 - 24,6)	(13,4 - 23,2)	(16,5 - 24,6)	(9,2 - 17,5)
Coquimbo					27,5	29,1	26,4	27,6	22,6	16,1	14,4	18,3	18,2	15,7
					(23,5 - 31,6)	(24,8 - 33,5)	(21,7 - 31,2)	(22,9 - 32,3)	(18,0 - 27,1)	(12,5 - 19,8)	(10,9 - 17,9)	(13,9 - 22,8)	(15,1 - 21,4)	(12,5 - 18,8)
Valparaíso					31,2	31,7	30,5	27,0	21,4	24,6	22,4	22,1	20,3	22,5
					(28,1 - 34,3)	(28,9 - 34,4)	(27,2 - 33,8)	(24,0 - 30,1)	(18,9 - 23,8)	(21,4 - 27,8)	(18,6 - 26,2)	(19,1 - 25,2)	(17,9 - 22,8)	(17,4 - 27,7)
O'Higgins					34,9	30,7	26,8	27,7	20,5	23,1	22,6	22,4	19,9	22,8
					(30,3 - 39,6)	(26,4 - 35,1)	(22,9 - 30,7)	(23,8 - 31,5)	(16,3 - 24,6)	(17,8 - 28,5)	(18,8 - 26,4)	(19,4 - 25,4)	(16,9 - 22,9)	(16,9 - 28,7)
Maule					27,4	28,7	24,5	23,5	22,6	21,4	18,9	15,3	17,5	16,8
					(24,2 - 30,6)	(25,2 - 32,2)	(21,3 - 27,7)	(20,0 - 27,0)	(17,9 - 27,4)	(17,9 - 24,8)	(15,6 - 22,2)	(10,4 - 20,1)	(14,0 - 21,1)	(12,4 - 21,2)
Biobío					25,9	28,8	27,3	23,0	19,2	19,1	20,7	19,0	16,2	19,9
					(23,4 - 28,3)	(26,3 - 31,3)	(24,8 - 29,9)	(20,7 - 25,4)	(16,6 - 21,7)	(16,7 - 21,4)	(17,9 - 23,6)	(16,7 - 21,3)	(13,9 - 18,6)	(16,6 - 23,2)
La Araucanía					23,6	24,3	25,0	25,4	21,8	19,6	16,2	16,2	14,0	17,3*
					(20,2 - 27,0)	(20,7 - 27,9)	(20,7 - 29,3)	(21,6 - 29,2)	(18,1 - 25,6)	(15,7 - 23,4)	(13,3 - 19,1)	(12,3 - 20,2)	(11,5 - 16,5)	(15,5 - 19,2)
Los Lagos					27,1	24,4	25,3	27,3	20,5	21,4	18,7	19,3	10,8	13,6
					(23,1 - 31,1)	(20,9 - 27,9)	(21,4 - 29,2)	(23,5 - 31,1)	(15,8 - 25,2)	(17,4 - 25,4)	(15,5 - 21,8)	(15,7 - 22,9)	(8,2 - 13,3)	(10,3 - 17,0)
Aysén					26,1	26,9	26,1	26,6	22,4	24,8	21,1	14,7	13,8	21,5*
					(23,1 - 29,1)	(23,8 - 30,0)	(23,0 - 29,3)	(22,0 - 31,3)	(15,8 - 29,1)	(17,7 - 31,9)	(16,7 - 25,5)	(10,3 - 19,1)	(11,0 - 16,6)	(15,1 - 28,0)
Magallanes					31,1	31,0	25,4	30,6	22,9	20,8	23,0	24,2	20,1	18,3
					(27,6 - 34,6)	(27,3 - 34,7)	(22,0 - 28,7)	(26,8 - 34,3)	(17,7 - 28,0)	(15,0 - 26,7)	(15,8 - 30,1)	(19,7 - 28,6)	(16,6 - 23,7)	(13,9 - 22,6)
Metropolitana					33,1	32,0	30,4	31,0	28,0	23,3	26,1	23,5	22,4	21,0
					(31,3 - 34,9)	(30,2 - 33,9)	(27,8 - 33,0)	(28,3 - 33,6)	(25,8 - 30,2)	(21,5 - 25,2)	(24,1 - 28,1)	(21,4 - 25,5)	(19,8 - 25,0)	(18,4 - 23,5)
Los Ríos					24,7	33,6	31,6	26,9	29,1	15,4	16,8	20,2	13,0	12,1
					(18,9 - 30,5)	(26,5 - 40,8)	(25,1 - 38,1)	(20,6 - 33,3)	(22,1 - 36,1)	(10,8 - 20,0)	(12,5 - 21,1)	(16,9 - 23,4)	(10,3 - 15,6)	(10,1 - 14,1)
Arica y Parinacota					23,1	21,0	17,2	19,6	8,4	17,2	15,1	11,5	14,9	8,2*
					(18,4 - 27,7)	(17,0 - 25,0)	(13,3 - 21,0)	(15,9 - 23,3)	(3,7 - 13,1)	(9,7 - 24,7)	(10,7 - 19,5)	(7,4 - 15,7)	(11,4 - 18,4)	(4,5 - 12,0)
Ñuble													14,6	15,6
													(11,0 - 18,1)	(12,5 - 18,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

- 2 Las tablas que dan cuenta de las realidades regionales deben ser interpretadas con cautela. La desagregación de la muestra por sexo, edad y nivel socioeconómico reduce significativamente la cantidad de observaciones disponibles por región, restando validez a la inferencia estadística como también a la validez de los datos obtenidos.

ALCOHOL MES

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional	40,4	48,1	53,0	54,4	59,6	57,9	58,1	49,8	40,5	40,8	48,9	46,0	43,3	44,3
	(38,6 - 42,1)	(46,3 - 49,8)	(52,2 - 53,7)	(53,8 - 55,1)	(58,5 - 60,8)	(56,7 - 59,0)	(56,6 - 59,6)	(48,3 - 51,4)	(39,0 - 41,9)	(39,3 - 42,2)	(47,2 - 50,5)	(44,5 - 47,5)	(41,8 - 44,8)	(42,1 - 46,6)
Tarapacá	38,4	46,1	45,0	57,2	58,6	56,8	51,8	43,3	31,1	24,8	52,3	37,3	41,2	41,4
	(31,7 - 45,0)	(38,6 - 53,6)	(39,8 - 50,2)	(53,2 - 61,3)	(53,1 - 64,1)	(50,8 - 62,8)	(46,7 - 57,0)	(38,2 - 48,4)	(25,7 - 36,4)	(20,2 - 29,4)	(46,0 - 58,7)	(32,5 - 42,2)	(36,5 - 45,9)	(35,3 - 47,4)
Antofagasta	39,0	42,2	51,2	56,1	53,1	52,4	48,5	42,7	31,8	45,1	33,4	35,6	40,4	41,9
	(34,2 - 43,9)	(38,2 - 46,3)	(47,8 - 54,6)	(52,8 - 59,4)	(49,7 - 56,4)	(48,7 - 56,2)	(44,4 - 52,7)	(38,6 - 46,8)	(26,6 - 37,0)	(39,6 - 50,6)	(28,0 - 38,8)	(28,5 - 42,7)	(35,7 - 45,0)	(34,9 - 48,8)
Atacama	35,3	38,7	45,6	50,4	52,1	51,6	44,7	48,8	35,6	36,2	43,6	35,7	42,7	47,2
	(26,7 - 43,9)	(33,8 - 43,6)	(39,4 - 51,7)	(47,2 - 53,6)	(48,2 - 55,9)	(46,9 - 56,3)	(39,8 - 49,5)	(43,8 - 53,7)	(29,1 - 42,1)	(29,9 - 42,5)	(38,0 - 49,3)	(30,1 - 41,3)	(36,6 - 48,9)	(42,6 - 51,8)
Coquimbo	33,1	41,8	41,9	54,9	63,9	52,1	52,4	51,1	46,1	44,1	33,9	22,2	36,9	41,1
	(28,0 - 38,2)	(36,5 - 47,2)	(37,7 - 46,2)	(52,1 - 57,6)	(59,7 - 68,1)	(47,4 - 56,8)	(46,5 - 58,4)	(45,9 - 56,2)	(40,4 - 51,9)	(38,4 - 49,9)	(27,3 - 40,5)	(19,5 - 24,9)	(32,6 - 41,2)	(34,6 - 47,5)
Valparaíso	42,9	48,3	49,2	57,5	61,1	61,7	59,0	47,1	50,3	48,8	44,8	47,1	44,8	42,4
	(39,4 - 46,4)	(44,3 - 52,2)	(47,1 - 51,3)	(55,7 - 59,2)	(57,5 - 64,7)	(58,9 - 64,6)	(55,6 - 62,5)	(43,5 - 50,8)	(46,8 - 53,8)	(44,6 - 52,9)	(40,8 - 48,7)	(43,2 - 51,0)	(41,5 - 48,0)	(37,2 - 47,5)
O'Higgins	43,0	54,7	45,8	53,2	58,6	56,4	52,1	43,7	36,0	43,4	46,4	42,5	41,2	30,5*
	(35,4 - 50,6)	(48,7 - 60,8)	(38,9 - 52,8)	(50,4 - 56,0)	(53,9 - 63,3)	(51,6 - 61,2)	(47,6 - 56,7)	(39,4 - 48,0)	(29,7 - 42,3)	(37,6 - 49,3)	(41,9 - 50,9)	(37,3 - 47,7)	(37,6 - 44,8)	(25,9 - 35,1)
Maule	40,3	39,7	51,1	49,9	58,3	49,2	52,2	42,3	33,0	41,6	36,8	34,4	35,1	39,3
	(34,8 - 45,9)	(35,1 - 44,3)	(46,8 - 55,3)	(47,7 - 52,0)	(54,8 - 61,8)	(45,3 - 53,1)	(48,4 - 55,9)	(38,2 - 46,3)	(27,8 - 38,2)	(37,6 - 45,7)	(32,7 - 41,0)	(24,2 - 44,7)	(30,3 - 40,0)	(27,9 - 50,7)
Biobío	35,4	36,9	51,1	45,2	59,5	55,5	53,4	46,5	43,1	40,1	48,7	40,1	37,0	43,8
	(32,2 - 38,7)	(34,0 - 39,8)	(48,5 - 53,7)	(43,6 - 46,7)	(56,8 - 62,3)	(52,8 - 58,2)	(50,5 - 56,3)	(43,6 - 49,4)	(39,8 - 46,4)	(36,7 - 43,5)	(45,6 - 51,8)	(36,4 - 43,8)	(34,0 - 40,0)	(36,6 - 50,9)
La Araucanía	37,3	47,6	54,4	54,5	59,0	53,7	55,3	55,2	48,7	52,2	56,0	48,9	40,1	38,1
	(30,4 - 44,1)	(42,2 - 52,9)	(49,6 - 59,3)	(51,0 - 57,9)	(54,8 - 63,2)	(49,5 - 57,9)	(51,0 - 59,7)	(51,1 - 59,4)	(43,8 - 53,5)	(46,5 - 57,9)	(51,4 - 60,6)	(42,6 - 55,3)	(36,4 - 43,8)	(33,9 - 42,4)
Los Lagos	37,6	41,4	49,0	48,3	50,4	50,0	54,2	48,3	38,4	35,6	44,1	47,8	25,5	29,2
	(31,4 - 43,8)	(35,9 - 46,9)	(44,8 - 53,2)	(45,1 - 51,6)	(46,0 - 54,8)	(45,7 - 54,3)	(49,7 - 58,7)	(44,1 - 52,5)	(34,1 - 42,7)	(30,4 - 40,8)	(38,1 - 50,1)	(41,0 - 54,5)	(21,2 - 29,8)	(19,3 - 39,0)
Aysén	14,6	43,6	51,6	46,1	59,4	54,8	52,6	43,0	46,7	41,2	55,2	29,4	36,2	49,2*
	(5,3 - 23,9)	(39,7 - 47,4)	(46,2 - 57,0)	(41,8 - 50,4)	(56,0 - 62,8)	(51,2 - 58,5)	(49,1 - 56,0)	(37,6 - 48,4)	(39,8 - 53,7)	(35,3 - 47,1)	(47,2 - 63,1)	(24,4 - 34,4)	(31,6 - 40,9)	(43,2 - 55,3)
Magallanes	43,6	34,9	42,1	48,7	48,5	50,1	44,3	46,5	29,0	50,6	44,4	28,7	32,6	35,5
	(32,9 - 54,2)	(31,7 - 38,1)	(37,6 - 46,5)	(44,8 - 52,6)	(44,8 - 52,2)	(46,2 - 54,1)	(40,3 - 48,3)	(42,5 - 50,6)	(22,4 - 35,6)	(40,9 - 60,4)	(35,0 - 53,9)	(25,2 - 32,3)	(28,1 - 37,1)	(25,0 - 45,9)
Metropolitana	42,2	52,3	55,7	56,7	61,1	60,7	62,0	52,6	39,3	38,7	53,3	52,3	47,8	48,2
	(39,2 - 45,3)	(49,1 - 55,4)	(54,7 - 56,8)	(55,6 - 57,7)	(59,2 - 63,0)	(58,7 - 62,7)	(59,3 - 64,7)	(49,8 - 55,3)	(36,9 - 41,8)	(36,2 - 41,1)	(50,3 - 56,2)	(50,1 - 54,5)	(45,1 - 50,6)	(44,6 - 51,8)
Los Ríos	37,8	54,2	59,7	54,7	54,4	52,3	64,0	51,0	55,5	50,2	51,3	48,5	39,9	43,8
	(28,1 - 47,6)	(45,5 - 62,9)	(54,7 - 64,8)	(49,6 - 59,8)	(47,7 - 61,1)	(45,2 - 59,3)	(57,2 - 70,8)	(43,4 - 58,6)	(49,0 - 61,9)	(42,0 - 58,3)	(42,2 - 60,4)	(44,7 - 52,2)	(35,3 - 44,4)	(36,9 - 50,8)
Arica y Parinacota	38,7	45,5	54,3	48,3	53,6	51,2	54,5	48,0	21,8	24,1	34,5	24,2	41,5	40,0
	(31,6 - 45,7)	(38,6 - 52,4)	(50,0 - 58,7)	(43,9 - 52,6)	(48,3 - 58,9)	(46,0 - 56,3)	(48,8 - 60,2)	(43,1 - 52,8)	(15,2 - 28,4)	(18,2 - 30,1)	(26,1 - 42,9)	(17,7 - 30,7)	(36,0 - 47,1)	(31,5 - 48,6)
Ñuble													51,7	39,2*
													(45,0 - 58,5)	(33,7 - 44,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

CONSUMO DE RIESGO DE ALCOHOL

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional								9,2	8,7	9,2	8,7	9,3	9,3	9,8
								(8,1 - 10,2)	(7,6 - 9,8)	(8,0 - 10,3)	(7,7 - 9,8)	(8,3 - 10,4)	(8,0 - 10,5)	(8,4 - 11,3)
Tarapacá								7,9	10,0	5,3	8,1	7,0	12,2	10,0
								(4,7 - 11,2)	(5,3 - 14,8)	(1,8 - 8,8)	(3,0 - 13,3)	(4,3 - 9,7)	(8,4 - 16,0)	(7,3 - 12,6)
Antofagasta								10,0	3,7	10,0	10,4	7,3	13,7	6,3*
								(7,3 - 12,8)	(1,4 - 5,9)	(6,7 - 13,3)	(5,5 - 15,3)	(0,8 - 13,8)	(8,5 - 18,9)	(3,9 - 8,7)
Atacama								15,7	8,0	8,1	12,2	13,0	13,6	9,7
								(11,2 - 20,3)	(4,3 - 11,7)	(2,0 - 14,2)	(5,9 - 18,6)	(8,4 - 17,6)	(9,4 - 17,8)	(6,2 - 13,2)
Coquimbo								12,3	14,3	9,6	5,8	8,7	10,2	7,0
								(8,2 - 16,4)	(9,4 - 19,3)	(5,9 - 13,3)	(2,6 - 9,0)	(4,4 - 13,1)	(7,2 - 13,3)	(1,7 - 12,2)
Valparaíso								9,6	6,6	8,5	10,2	10,9	7,5	8,6
								(7,0 - 12,3)	(4,6 - 8,7)	(3,3 - 13,7)	(7,1 - 13,4)	(8,3 - 13,5)	(5,2 - 9,8)	(6,4 - 10,9)
O'Higgins								10,1	9,1	5,7	9,8	9,8	8,9	17,9*
								(7,1 - 13,1)	(4,5 - 13,6)	(3,3 - 8,2)	(6,4 - 13,2)	(6,8 - 12,8)	(6,2 - 11,6)	(11,6 - 24,3)
Maule								7,1	11,5	8,4	12,9	12,3	9,7	8,6
								(4,3 - 10,0)	(6,5 - 16,4)	(5,2 - 11,7)	(8,2 - 17,6)	(8,5 - 16,0)	(5,7 - 13,8)	(1,7 - 15,6)
Biobío								10,4	10,0	6,4	7,9	10,1	9,2	9,4
								(8,3 - 12,6)	(7,3 - 12,6)	(4,3 - 8,4)	(5,2 - 10,6)	(6,4 - 13,7)	(6,0 - 12,4)	(5,5 - 13,2)
La Araucanía								10,0	6,9	8,4	9,1	9,5	5,2	5,5
								(7,3 - 12,7)	(3,5 - 10,3)	(5,0 - 11,8)	(4,5 - 13,8)	(6,1 - 12,9)	(3,4 - 7,0)	(3,2 - 7,7)
Los Lagos								8,3	8,5	11,2	9,8	8,9	7,8	6,9
								(5,3 - 11,2)	(4,7 - 12,3)	(7,1 - 15,3)	(6,4 - 13,1)	(4,9 - 12,9)	(4,2 - 11,3)	(3,8 - 10,0)
Aysén								9,0	4,5	10,8	8,8	10,4	9,4	16,2*
								(5,0 - 13,1)	(0,2 - 8,9)	(5,8 - 15,9)	(3,9 - 13,6)	(4,8 - 15,9)	(5,6 - 13,2)	(11,9 - 20,4)
Magallanes								8,2	4,3	4,8	9,6	5,6	6,9	6,1
								(5,5 - 11,0)	(0,9 - 7,8)	(1,1 - 8,5)	(3,4 - 15,8)	(2,1 - 9,2)	(4,1 - 9,6)	(0,5 - 11,6)
Metropolitana								8,6	8,7	10,2	8,1	8,9	9,3	10,6
								(6,8 - 10,4)	(6,7 - 10,6)	(8,3 - 12,2)	(6,4 - 9,8)	(7,3 - 10,6)	(7,1 - 11,5)	(8,1 - 13,1)
Los Ríos								8,2	12,1	12,3	10,3	6,5	8,3	9,2
								(3,6 - 12,8)	(6,5 - 17,6)	(4,1 - 20,5)	(3,7 - 16,9)	(4,4 - 8,6)	(4,9 - 11,7)	(3,7 - 14,8)
Arica y Parinacota								7,5	12,0	13,5	12,1	7,6	12,6	7,5
								(4,2 - 10,7)	(5,1 - 19,0)	(6,2 - 20,8)	(6,1 - 18,1)	(3,2 - 11,9)	(7,9 - 17,3)	(0,0 - 15,3)
Ñuble													11,5	12,3
													(5,8 - 17,2)	(7,4 - 17,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

EMBRIAGUEZ ASOCIADA AL USO DE ALCOHOL

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional										52,1	43,7	51,1	56,3	50,2*
										(49,8 - 54,4)	(41,6 - 45,8)	(49,1 - 53,2)	(53,8 - 58,7)	(47,3 - 53,1)
Tarapacá										75,9	47,0	53,4	62,7	50,9*
										(66,5 - 85,3)	(36,8 - 57,2)	(45,7 - 61,1)	(55,9 - 69,6)	(46,5 - 55,2)
Antofagasta										43,4	62,0	42,6	69,9	35,0*
										(35,9 - 50,8)	(53,5 - 70,6)	(34,9 - 50,4)	(62,9 - 76,9)	(26,3 - 43,7)
Atacama										36,0	56,5	42,0	69,3	64,4
										(24,8 - 47,2)	(46,8 - 66,2)	(30,2 - 53,8)	(62,5 - 76,1)	(58,1 - 70,7)
Coquimbo										60,1	49,4	74,0	69,7	49,5*
										(51,6 - 68,5)	(38,1 - 60,7)	(65,6 - 82,4)	(62,1 - 77,4)	(35,4 - 63,5)
Valparaíso										47,0	49,9	51,2	60,5	51,5*
										(40,0 - 53,9)	(43,6 - 56,1)	(47,7 - 54,7)	(56,0 - 64,9)	(46,6 - 56,4)
O'Higgins										40,1	48,0	44,1	51,9	52,0
										(32,6 - 47,6)	(40,9 - 55,1)	(37,9 - 50,4)	(45,7 - 58,2)	(45,2 - 58,8)
Maule										55,6	51,4	68,2	61,1	48,5*
										(47,5 - 63,7)	(44,4 - 58,3)	(58,0 - 78,4)	(52,1 - 70,1)	(40,5 - 56,5)
Biobío										48,2	43,1	46,9	57,1	45,5*
										(42,7 - 53,7)	(38,1 - 48,0)	(40,1 - 53,8)	(50,2 - 64,1)	(38,5 - 52,5)
La Araucanía										48,1	53,6	44,0	49,4	34,1*
										(38,7 - 57,6)	(46,2 - 61,0)	(38,5 - 49,6)	(43,5 - 55,2)	(25,1 - 43,0)
Los Lagos										56,1	51,4	65,7	61,8	46,8
										(49,5 - 62,7)	(44,3 - 58,4)	(54,8 - 76,7)	(53,3 - 70,4)	(30,7 - 63,0)
Aysén										61,5	70,1	46,1	52,2	41,9*
										(52,9 - 70,2)	(62,1 - 78,2)	(34,6 - 57,5)	(44,5 - 59,9)	(36,6 - 47,1)
Magallanes										40,2	40,8	55,3	54,8	48,3
										(26,9 - 53,5)	(29,0 - 52,7)	(46,5 - 64,1)	(46,5 - 63,1)	(36,5 - 60,1)
Metropolitana										55,4	38,4	50,2	53,1	53,0
										(51,3 - 59,6)	(35,2 - 41,6)	(47,0 - 53,5)	(48,8 - 57,4)	(48,2 - 57,8)
Los Ríos										44,1	53,3	48,9	58,8	40,3*
										(32,7 - 55,4)	(40,3 - 66,3)	(43,0 - 54,7)	(52,2 - 65,3)	(34,7 - 45,8)
Arica y Parinacota										54,5	56,5	54,4	63,0	46,7*
										(40,8 - 68,1)	(44,8 - 68,1)	(42,2 - 66,6)	(54,6 - 71,3)	(28,7 - 64,6)
Ñuble													55,7	38,5*
													(43,0 - 68,4)	(34,7 - 42,2)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

MARIHUANA AÑO

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional	4,0	4,0	4,8	5,7	5,0	5,4	7,2	6,4	4,6	7,1	11,3	14,5	12,7	11,4
	(3,3 - 4,6)	(3,2 - 4,7)	(4,4 - 5,1)	(5,4 - 6,1)	(4,5 - 5,5)	(4,8 - 5,9)	(6,2 - 8,2)	(5,6 - 7,3)	(3,9 - 5,3)	(6,3 - 7,8)	(10,3 - 12,3)	(13,1 - 15,9)	(11,7 - 13,8)	(10,2 - 12,6)
Tarapacá	3,3	3,6	4,1	6,2	4,6	8,8	6,9	7,4	5,3	3,7	12,3	7,9	8,6	7,7
	(0,2 - 6,4)	(1,1 - 6,1)	(2,3 - 5,9)	(4,2 - 8,3)	(2,1 - 7,1)	(4,6 - 12,9)	(3,4 - 10,4)	(4,8 - 9,9)	(3,0 - 7,6)	(1,6 - 5,8)	(6,9 - 17,7)	(5,5 - 10,2)	(6,0 - 11,3)	(5,7 - 9,8)
Antofagasta	1,5	0,8	3,1	5,3	2,6	2,6	4,3	4,7	2,5	7,4	5,5	5,7	9,2	8,5
	(0,5 - 2,6)	(0,1 - 1,6)	(1,8 - 4,3)	(3,8 - 6,8)	(1,6 - 3,6)	(1,6 - 3,7)	(2,9 - 5,8)	(3,2 - 6,2)	(0,9 - 4,1)	(4,8 - 10,0)	(3,4 - 7,6)	(3,3 - 8,0)	(6,3 - 12,0)	(5,3 - 11,7)
Atacama	2,8	3,8	6,5	3,7	3,9	4,0	6,4	4,9	2,2	4,4	10,0	8,0	9,3	7,2
	(0,0 - 5,6)	(1,5 - 6,1)	(3,6 - 9,5)	(2,5 - 4,8)	(2,4 - 5,4)	(2,1 - 6,0)	(3,8 - 8,9)	(2,7 - 7,1)	(0,2 - 4,3)	(1,4 - 7,5)	(5,1 - 14,9)	(5,3 - 10,6)	(6,5 - 12,0)	(3,8 - 10,7)
Coquimbo	3,2	2,5	4,1	4,6	4,0	2,7	6,9	5,9	7,5	7,9	4,5	6,8	11,1	8,1
	(1,4 - 5,1)	(1,3 - 3,7)	(2,0 - 6,2)	(3,4 - 5,8)	(2,1 - 5,9)	(1,4 - 3,9)	(0,5 - 13,4)	(3,4 - 8,3)	(4,7 - 10,3)	(5,2 - 10,5)	(2,6 - 6,4)	(4,5 - 9,2)	(8,9 - 13,3)	(5,0 - 11,2)
Valparaíso	6,8	3,4	4,5	6,6	6,9	5,7	8,8	6,2	5,5	8,1	13,5	18,6	15,1	10,5*
	(4,8 - 8,9)	(2,3 - 4,6)	(3,6 - 5,4)	(5,7 - 7,6)	(5,2 - 8,7)	(4,3 - 7,2)	(6,3 - 11,2)	(4,4 - 7,9)	(4,0 - 7,1)	(6,1 - 10,0)	(10,7 - 16,3)	(15,9 - 21,4)	(13,0 - 17,2)	(7,8 - 13,2)
O'Higgins	6,0	2,8	2,4	4,4	5,0	5,3	6,7	4,8	3,3	4,0	12,1	11,4	13,4	7,5*
	(2,7 - 9,3)	(0,6 - 5,1)	(0,9 - 4,0)	(3,2 - 5,7)	(2,7 - 7,2)	(3,1 - 7,6)	(4,2 - 9,3)	(2,8 - 6,7)	(1,2 - 5,4)	(2,0 - 6,0)	(9,0 - 15,3)	(9,2 - 13,5)	(10,4 - 16,3)	(4,9 - 10,1)
Maule	1,4	0,7	2,8	3,5	3,1	2,7	1,6	2,4	2,4	2,7	5,3	8,0	9,9	7,7
	(0,3 - 2,6)	(0,1 - 1,4)	(1,7 - 3,9)	(2,6 - 4,3)	(1,8 - 4,4)	(1,6 - 3,9)	(0,7 - 2,6)	(0,8 - 4,0)	(0,6 - 4,2)	(1,4 - 4,1)	(3,4 - 7,1)	(4,4 - 11,6)	(6,7 - 13,0)	(6,0 - 9,3)
Biobío	2,5	2,1	3,4	4,0	3,5	3,8	3,9	4,2	3,3	5,4	8,4	10,0	8,3	11,1
	(1,5 - 3,5)	(0,9 - 3,3)	(2,5 - 4,3)	(3,3 - 4,6)	(2,5 - 4,6)	(2,8 - 4,8)	(2,8 - 4,9)	(2,8 - 5,5)	(1,9 - 4,7)	(3,6 - 7,2)	(6,0 - 10,8)	(7,5 - 12,5)	(6,5 - 10,1)	(8,4 - 13,8)
La Araucanía	2,4	1,8	2,7	4,3	2,4	2,8	4,3	4,2	2,9	6,2	9,7	11,8	9,5	7,9
	(0,6 - 4,1)	(0,5 - 3,1)	(1,5 - 3,8)	(2,9 - 5,6)	(1,1 - 3,7)	(1,5 - 4,2)	(2,6 - 6,0)	(2,6 - 5,9)	(1,1 - 4,8)	(3,9 - 8,5)	(6,8 - 12,6)	(7,8 - 15,8)	(7,3 - 11,7)	(5,5 - 10,4)
Los Lagos	0,9	0,8	1,7	3,3	2,7	2,6	4,2	4,4	2,8	4,6	7,4	9,1	6,6	6,0
	(0,0 - 2,1)	(0,0 - 1,7)	(1,0 - 2,5)	(2,1 - 4,5)	(0,8 - 4,6)	(1,3 - 3,9)	(2,4 - 6,0)	(2,6 - 6,2)	(1,1 - 4,5)	(2,8 - 6,5)	(4,6 - 10,3)	(5,3 - 12,8)	(4,3 - 8,8)	(2,0 - 9,9)
Aysén		0,9	1,7	2,4	2,2	2,1	2,4	2,7	4,5	6,1	8,3	3,6	7,3	10,7*
		(0,2 - 1,5)	(0,4 - 3,0)	(1,0 - 3,9)	(1,1 - 3,2)	(1,1 - 3,2)	(1,4 - 3,4)	(0,7 - 4,7)	(1,0 - 8,0)	(2,9 - 9,2)	(4,5 - 12,1)	(2,0 - 5,2)	(4,9 - 9,6)	(7,7 - 13,7)
Magallanes	1,7	0,5	1,2	2,7	1,9	3,5	4,4	6,4	2,5	6,0	14,5	8,2	7,5	6,1
	(0,0 - 4,0)	(0,1 - 0,9)	(0,3 - 2,2)	(1,1 - 4,2)	(0,8 - 2,9)	(1,9 - 5,0)	(2,7 - 6,0)	(3,6 - 9,3)	(<0,1 - 5,0)	(2,6 - 9,5)	(4,6 - 24,4)	(5,5 - 10,9)	(5,1 - 9,9)	(3,3 - 8,9)
Metropolitana	4,4	5,4	5,9	6,6	5,8	6,6	8,7	7,9	5,2	8,3	13,4	18,3	15,1	13,7
	(3,3 - 5,4)	(4,1 - 6,8)	(5,3 - 6,4)	(6,1 - 7,2)	(5,0 - 6,7)	(5,6 - 7,6)	(7,0 - 10,4)	(6,4 - 9,4)	(3,9 - 6,4)	(6,9 - 9,6)	(11,6 - 15,2)	(15,8 - 20,9)	(13,2 - 17,1)	(11,6 - 15,8)
Los Ríos	3,9	5,7	2,1	4,6	1,7	4,1	8,4	6,6	3,9	6,9	9,6	12,3	7,6	12,0*
	(0,0 - 7,9)	(0,5 - 10,9)	(0,7 - 3,5)	(1,7 - 7,5)	(0,2 - 3,3)	(0,8 - 7,3)	(4,4 - 12,4)	(2,2 - 11,1)	(1,4 - 6,4)	(1,8 - 11,9)	(5,1 - 14,1)	(8,8 - 15,9)	(5,0 - 10,1)	(8,8 - 15,2)
Arica y Parinacota	3,8	1,5	2,9	4,3	6,1	4,1	3,4	4,0	4,9	4,4	8,9	7,1	13,6	7,7*
	(0,5 - 7,1)	(0,2 - 2,8)	(1,4 - 4,4)	(2,9 - 5,8)	(3,0 - 9,2)	(1,6 - 6,6)	(1,5 - 5,2)	(2,0 - 6,0)	(1,5 - 8,2)	(1,9 - 6,9)	(4,4 - 13,3)	(4,4 - 9,8)	(10,4 - 16,8)	(0,7 - 14,7)
Ñuble													11,7	8,5
													(7,2 - 16,3)	(6,3 - 10,7)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

COCAÍNA TOTAL AÑO

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional	1,6	1,2	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	2,2	0,9	1,1	1,7	1,3	1,3	0,7*
	(1,2 - 1,9)	(0,9 - 1,6)	(1,7 - 2,1)	(1,7 - 2,1)	(1,5 - 2,1)	(1,4 - 2,0)	(1,3 - 2,0)	(1,6 - 2,8)	(0,7 - 1,1)	(0,8 - 1,5)	(1,2 - 2,1)	(1,0 - 1,6)	(1,1 - 1,6)	(0,5 - 1,0)
Tarapacá	2,3	1,2	0,6	2,0	3,1	3,8	1,6	2,6	1,1	0,4	1,1	0,4	0,8	0,9
	(0,0 - 4,7)	(0,0 - 2,8)	(<0,1 - 1,1)	(0,9 - 3,1)	(0,9 - 5,3)	(1,4 - 6,2)	(0,3 - 2,9)	(1,0 - 4,2)	(0,2 - 2,0)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 2,3)	(0,0 - 0,8)	(0,2 - 1,4)	(0,1 - 1,7)
Antofagasta	0,8	0,4	1,5	0,9	0,9	0,7	1,7	1,6	0,7	1,2	0,8	0,1	1,2	0,5
	(0,0 - 1,6)	(0,0 - 0,9)	(0,5 - 2,4)	(0,3 - 1,5)	(0,3 - 1,4)	(0,2 - 1,3)	(0,7 - 2,6)	(0,7 - 2,5)	(0,0 - 1,4)	(0,3 - 2,2)	(0,1 - 1,5)	(0,0 - 0,3)	(0,2 - 2,2)	(0,0 - 1,3)
Atacama	0,5	0,6	1,8	0,5	0,6	0,2	1,6	1,1	<0,1	1,8	1,8	0,4	2,1	<0,1*
	(0,0 - 1,4)	(<0,1 - 1,2)	(0,3 - 3,2)	(0,2 - 0,8)	(<0,1 - 1,1)	(0,0 - 0,4)	(0,2 - 3,0)	(0,1 - 2,2)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - 4,5)	(0,0 - 3,6)	(0,0 - 0,8)	(0,3 - 3,9)	(0,0 - 0,1)
Coquimbo	1,8	0,7	0,7	1,0	0,2	0,4	0,7	1,0	1,8	1,6	0,9	0,3	1,8	0,1*
	(0,3 - 3,3)	(0,2 - 1,3)	(0,2 - 1,2)	(0,5 - 1,6)	(0,0 - 0,5)	(<0,1 - 0,8)	(<0,1 - 1,4)	(0,2 - 1,7)	(0,6 - 3,0)	(0,4 - 2,9)	(0,1 - 1,7)	(0,0 - 0,6)	(0,6 - 2,9)	(0,0 - 0,2)
Valparaíso	1,8	1,3	2,2	2,3	2,0	2,6	2,4	2,3	0,9	1,2	1,6	1,4	1,6	1,0
	(0,9 - 2,7)	(0,5 - 2,0)	(1,5 - 2,9)	(1,7 - 2,9)	(1,1 - 2,9)	(1,6 - 3,6)	(1,4 - 3,4)	(1,2 - 3,5)	(0,3 - 1,5)	(0,4 - 1,9)	(0,8 - 2,5)	(0,8 - 2,0)	(0,8 - 2,4)	(0,1 - 1,9)
O'Higgins	4,6	0,8	1,5	1,7	1,9	1,6	1,8	1,7	0,4	0,2	0,5	2,1	0,9	0,4
	(1,2 - 8,0)	(0,0 - 1,7)	(0,1 - 2,9)	(0,7 - 2,8)	(0,3 - 3,5)	(0,1 - 3,1)	(0,4 - 3,2)	(0,7 - 2,7)	(0,0 - 1,2)	(0,0 - 0,4)	(0,2 - 0,9)	(1,1 - 3,0)	(0,1 - 1,6)	(0,0 - 1,2)
Maule	0,6	0,2	0,4	0,2	0,8	0,1	0,9	0,5	0,2	0,6	0,7	0,1	1,0	<0,1*
	(0,0 - 1,2)	(0,0 - 0,5)	(0,0 - 0,8)	(<0,1 - 0,3)	(0,1 - 1,4)	(0,0 - 0,3)	(0,2 - 1,6)	(0,0 - 1,3)	(0,0 - 0,7)	(0,2 - 1,0)	(0,1 - 1,2)	(0,0 - 0,3)	(0,1 - 1,9)	(0,0 - <0,1)
Biobío	0,4	0,4	0,8	0,9	0,6	0,7	1,1	1,0	0,4	0,4	1,4	1,2	0,6	1,3
	(0,1 - 0,7)	(0,1 - 0,8)	(0,5 - 1,2)	(0,6 - 1,3)	(0,2 - 1,0)	(0,3 - 1,2)	(0,6 - 1,6)	(0,5 - 1,4)	(<0,1 - 0,7)	(0,1 - 0,8)	(0,4 - 2,3)	(0,3 - 2,2)	(0,2 - 1,0)	(0,2 - 2,3)
La Araucanía	0,6	0,4	0,3	0,9	0,9	0,7	1,0	0,9	0,3	0,5	0,7	4,1	0,4	0,8
	(0,0 - 1,5)	(0,0 - 0,9)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 1,9)	(<0,1 - 1,8)	(0,0 - 1,5)	(0,0 - 1,9)	(0,1 - 1,6)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 1,2)	(0,2 - 1,2)	(2,4 - 5,8)	(<0,1 - 0,8)	(0,0 - 2,1)
Los Lagos	0,2	0,5	0,3	0,4	0,1	0,2	0,5	0,1	0,1	0,5	1,4	1,1	0,6	0,7
	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 1,2)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 1,2)	(0,0 - 0,2)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 1,1)	(0,0 - 3,2)	(0,3 - 1,9)	(0,2 - 1,0)	(0,0 - 1,5)
Aysén		0,1			0,3	0,4	0,2		0,4	0,3	0,7	0,4	1,0	0,9
		(0,0 - 0,4)			(0,0 - 0,8)	(0,0 - 0,9)	(0,0 - 0,4)		(0,0 - 1,1)	(0,0 - 0,9)	(0,0 - 1,7)	(0,0 - 1,3)	(0,2 - 1,9)	(0,4 - 1,4)
Magallanes		0,5		0,6	0,3	0,2	0,4	0,1		0,1	0,3	1,4	0,5	0,1
		(0,0 - 1,2)		(0,0 - 1,6)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 0,5)	(0,0 - 1,0)	(0,0 - 0,2)		(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,9)	(0,1 - 2,6)	(0,0 - 1,2)	(0,0 - 0,4)
Metropolitana	2,0	1,4	2,6	2,5	2,4	2,3	1,8	3,0	1,2	1,5	2,2	1,5	1,7	0,7*
	(1,3 - 2,6)	(0,8 - 2,0)	(2,2 - 2,9)	(2,2 - 2,8)	(1,9 - 3,0)	(1,7 - 2,8)	(1,2 - 2,5)	(1,9 - 4,1)	(0,8 - 1,6)	(0,9 - 2,2)	(1,4 - 3,0)	(1,0 - 1,9)	(1,2 - 2,2)	(0,3 - 1,1)
Los Ríos	0,2	5,8	0,2	0,3	0,6	0,3	1,1	0,5	1,4	<0,1	<0,1	0,7	1,1	0,3
	(0,0 - 0,7)	(0,2 - 11,4)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 1,5)	(0,0 - 1,0)	(0,0 - 2,7)	(0,0 - 1,0)	(0,2 - 2,6)	(0,0 - 0,1)	(0,0 - <0,1)	(0,0 - 1,8)	(0,0 - 2,1)	(<0,1 - 0,5)
Arica y Parinacota	3,6	2,4	2,0	2,9	2,7	2,3	1,9	1,6	2,0	0,2	0,3	0,7	0,8	0,7
	(0,5 - 6,6)	(0,3 - 4,6)	(0,9 - 3,2)	(1,6 - 4,2)	(0,9 - 4,5)	(0,5 - 4,1)	(0,6 - 3,2)	(0,2 - 3,0)	(0,0 - 4,7)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 0,8)	(0,0 - 1,9)	(0,1 - 1,5)	(0,0 - 2,0)
Ñuble													0,9	1,4
													(0,0 - 2,1)	(0,4 - 2,4)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

INCIDENCIA AÑO TABACO

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional	17,5	4,7	4,5	6,6	8,3	3,8	8,0	11,4	9,9	10,2	9,5	8,7	12,5	3,6*
	(15,8 - 19,1)	(3,9 - 5,4)	(4,1 - 5,0)	(6,2 - 7,0)	(7,3 - 9,2)	(3,2 - 4,4)	(7,0 - 9,0)	(9,9 - 12,8)	(8,9 - 10,9)	(9,2 - 11,2)	(8,4 - 10,7)	(7,6 - 9,8)	(11,3 - 13,7)	(2,9 - 4,2)
Tarapacá	15,3	5,5	5,6	5,5	9,6	5,6	12,3	12,0	13,6	9,1	7,5	7,5	8,8	4,5*
	(9,6 - 20,9)	(1,5 - 9,4)	(3,1 - 8,2)	(2,9 - 8,1)	(4,5 - 14,8)	(1,2 - 9,9)	(8,0 - 16,7)	(7,9 - 16,1)	(7,7 - 19,5)	(5,1 - 13,1)	(4,2 - 10,8)	(5,2 - 9,9)	(6,1 - 11,4)	(1,9 - 7,1)
Antofagasta	16,8	11,3	3,6	11,3	13,1	4,3	16,7	15,0	10,6	7,7	9,8	13,2	20,1	1,1*
	(12,4 - 21,1)	(8,1 - 14,4)	(2,0 - 5,2)	(8,6 - 14,1)	(10,2 - 16,1)	(2,4 - 6,2)	(12,2 - 21,2)	(11,8 - 18,2)	(7,0 - 14,2)	(4,5 - 10,8)	(6,6 - 12,9)	(10,3 - 16,1)	(15,1 - 25,0)	(0,0 - 3,0)
Atacama	13,5	4,0	3,9	2,9	3,2	2,5	5,7	8,7	11,0	3,4	18,8	16,1	14,0	9,7
	(5,8 - 21,1)	(1,5 - 6,5)	(1,5 - 6,2)	(1,5 - 4,4)	(1,5 - 4,9)	(0,0 - 5,0)	(2,8 - 8,5)	(4,4 - 13,1)	(6,0 - 16,0)	(1,2 - 5,5)	(12,2 - 25,4)	(11,0 - 21,3)	(9,8 - 18,3)	(6,3 - 13,1)
Coquimbo	23,2	7,9	3,9	5,0	13,9	3,0	10,0	11,1	7,3	7,5	8,3	10,9	16,5	2,7*
	(18,1 - 28,2)	(4,0 - 11,7)	(2,2 - 5,5)	(3,3 - 6,6)	(9,5 - 18,2)	(0,6 - 5,4)	(-0,1 - 20,0)	(6,3 - 15,9)	(3,6 - 10,9)	(4,1 - 11,0)	(5,0 - 11,6)	(8,2 - 13,5)	(13,6 - 19,4)	(1,4 - 4,1)
Valparaíso	15,9	4,5	4,5	5,8	8,3	3,4	5,0	11,5	7,8	14,5	5,3	9,3	12,9	6,8*
	(12,8 - 19,0)	(2,1 - 6,8)	(3,3 - 5,7)	(4,6 - 6,9)	(5,4 - 11,2)	(1,9 - 4,8)	(3,4 - 6,6)	(7,9 - 15,2)	(5,5 - 10,0)	(9,2 - 19,7)	(3,7 - 6,9)	(7,1 - 11,4)	(10,2 - 15,6)	(3,9 - 9,7)
O'Higgins	10,1	2,4	6,8	9,3	3,7	3,8	10,2	5,2	12,7	6,8	10,3	6,4	6,9	8,5
	(4,0 - 16,2)	(0,6 - 4,1)	(3,6 - 9,9)	(7,2 - 11,4)	(1,2 - 6,2)	(1,4 - 6,1)	(6,6 - 13,8)	(2,2 - 8,2)	(9,2 - 16,2)	(3,7 - 9,8)	(6,9 - 13,7)	(4,4 - 8,3)	(4,6 - 9,1)	(5,2 - 11,8)
Maule	27,9	8,3	3,1	6,2	6,5	2,8	7,7	2,2	6,1	6,6	10,0	18,7	10,4	6,1*
	(21,1 - 34,7)	(5,1 - 11,4)	(1,2 - 4,9)	(4,7 - 7,6)	(4,1 - 8,9)	(1,1 - 4,4)	(5,2 - 10,2)	(1,1 - 3,4)	(3,0 - 9,2)	(3,6 - 9,6)	(6,5 - 13,5)	(12,5 - 24,9)	(7,1 - 13,7)	(3,2 - 8,9)
Biobío	19,7	5,0	4,8	5,2	3,0	3,9	5,9	5,5	8,9	13,7	9,6	12,6	12,9	2,4*
	(16,1 - 23,3)	(3,5 - 6,5)	(3,4 - 6,2)	(4,3 - 6,0)	(1,8 - 4,1)	(2,5 - 5,3)	(4,2 - 7,7)	(3,8 - 7,2)	(6,6 - 11,3)	(11,0 - 16,4)	(7,4 - 11,8)	(9,2 - 16,0)	(10,2 - 15,7)	(0,9 - 3,8)
La Araucanía	4,8	3,1	5,6	3,8	6,0	2,4	5,3	8,6	10,8	15,2	9,8	3,5	10,1	3,7*
	(1,7 - 7,9)	(0,9 - 5,3)	(2,7 - 8,5)	(1,7 - 5,9)	(3,0 - 9,1)	(1,0 - 3,8)	(2,7 - 7,8)	(5,1 - 12,1)	(7,6 - 13,9)	(10,8 - 19,5)	(6,7 - 12,9)	(1,9 - 5,2)	(7,2 - 13,0)	(1,4 - 6,0)
Los Lagos	29,6	5,2	5,4	5,2	7,1	4,6	13,8	2,6	8,4	14,0	8,7	15,3	12,6	6,2
	(22,4 - 36,7)	(1,6 - 8,7)	(2,5 - 8,3)	(3,3 - 7,1)	(4,4 - 9,7)	(1,3 - 7,9)	(9,3 - 18,2)	(0,8 - 4,4)	(5,9 - 10,9)	(9,6 - 18,4)	(5,5 - 12,0)	(9,9 - 20,8)	(9,5 - 15,7)	(0,0 - 12,7)
Aysén	22,4	5,8	6,8	9,0	3,8	2,6	9,9	21,1	6,1	14,0	8,3	8,3	6,7	
	(5,7 - 39,2)	(3,6 - 8,1)	(3,1 - 10,6)	(5,6 - 12,3)	(2,0 - 5,6)	(1,1 - 4,1)	(7,1 - 12,6)	(15,6 - 26,5)	(1,2 - 11,1)	(8,6 - 19,4)	(4,2 - 12,4)	(5,3 - 11,4)	(4,0 - 9,4)	
Magallanes	26,2	1,9	3,3	5,3	3,6	2,7	4,9	5,4	9,6	3,5	10,0	11,2	19,7	12,1*
	(15,2 - 37,3)	(0,7 - 3,0)	(1,3 - 5,2)	(2,8 - 7,8)	(1,5 - 5,7)	(0,5 - 4,9)	(2,6 - 7,1)	(3,1 - 7,7)	(4,8 - 14,4)	(0,0 - 7,1)	(2,7 - 17,4)	(7,1 - 15,3)	(15,8 - 23,7)	(6,6 - 17,7)
Metropolitana	15,9	3,9	4,4	7,1	9,7	4,1	7,7	14,3	10,8	9,2	10,3	5,3	12,5	2,1*
	(13,1 - 18,8)	(2,6 - 5,2)	(3,7 - 5,0)	(6,4 - 7,8)	(8,0 - 11,4)	(3,0 - 5,2)	(6,1 - 9,3)	(11,7 - 17,0)	(9,0 - 12,7)	(7,6 - 10,8)	(8,0 - 12,5)	(3,3 - 7,2)	(10,2 - 14,8)	(1,1 - 3,0)
Los Ríos	17,0	3,3	6,9	4,6	3,6	0,5	9,0	10,1	5,5	9,9	5,7	9,8	12,9	6,2*
	(3,9 - 30,1)	(0,0 - 7,2)	(2,8 - 11,1)	(1,6 - 7,5)	(0,0 - 7,6)	(0,0 - 1,6)	(3,4 - 14,6)	(4,2 - 15,9)	(0,5 - 10,4)	(5,0 - 14,8)	(2,4 - 8,9)	(5,8 - 13,7)	(9,7 - 16,0)	(3,7 - 8,7)
Arica y Parinacota	22,7	2,0	5,1	7,1	8,2	3,8	4,1	3,3	7,0	13,5	10,9	10,6	11,7	8,0
	(15,4 - 30,1)	(0,4 - 3,7)	(2,8 - 7,4)	(3,5 - 10,7)	(4,5 - 12,0)	(0,9 - 6,8)	(1,6 - 6,6)	(1,1 - 5,5)	(2,2 - 11,8)	(6,6 - 20,5)	(5,8 - 16,1)	(7,1 - 14,0)	(7,7 - 15,8)	(0,0 - 16,8)
Ñuble													2,5	2,9
													(0,5 - 4,4)	(1,1 - 4,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

INCIDENCIA AÑO ALCOHOL

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional	29,3	13,6	11,8	21,8	28,1	15,0	24,3	25,4	18,9	19,0	21,7	21,9	28,3	9,9*
	(27,2 - 31,4)	(12,0 - 15,2)	(11,0 - 12,7)	(20,8 - 22,8)	(26,2 - 29,9)	(13,4 - 16,7)	(22,2 - 26,5)	(23,2 - 27,5)	(17,3 - 20,4)	(17,4 - 20,7)	(19,8 - 23,7)	(19,8 - 24,1)	(26,3 - 30,2)	(8,2 - 11,5)
Tarapacá	26,2	21,8	10,8	19,3	20,5	20,7	21,9	20,3	16,5	24,2	22,1	15,0	26,9	12,8*
	(19,3 - 33,2)	(13,0 - 30,7)	(6,4 - 15,2)	(13,6 - 24,9)	(12,8 - 28,1)	(10,4 - 31,0)	(16,0 - 27,8)	(14,2 - 26,5)	(11,5 - 21,5)	(17,6 - 30,7)	(13,7 - 30,5)	(10,8 - 19,2)	(21,3 - 32,6)	(7,8 - 17,8)
Antofagasta	32,9	22,9	11,1	32,8	32,7	13,5	30,0	27,5	18,6	16,7	17,9	17,2	33,1	4,5*
	(26,8 - 39,0)	(17,9 - 27,8)	(7,3 - 14,9)	(27,7 - 38,0)	(28,0 - 37,4)	(9,0 - 18,0)	(24,5 - 35,5)	(22,1 - 32,8)	(13,5 - 23,7)	(11,6 - 21,7)	(12,9 - 23,0)	(12,0 - 22,5)	(27,9 - 38,3)	(0,0 - 10,8)
Atacama	23,7	8,4	16,0	9,8	15,5	6,3	15,6	16,6	25,8	7,2	26,9	30,2	30,7	30,7
	(12,7 - 34,7)	(4,2 - 12,6)	(8,6 - 23,3)	(6,5 - 13,2)	(10,3 - 20,7)	(2,8 - 9,9)	(10,4 - 20,7)	(10,4 - 22,8)	(17,1 - 34,5)	(3,6 - 10,8)	(19,6 - 34,1)	(24,3 - 36,1)	(22,9 - 38,5)	(9,9 - 51,5)
Coquimbo	31,6	20,3	10,1	10,6	37,7	7,1	25,2	33,2	18,0	19,9	8,8	18,8	30,2	11,3*
	(25,9 - 37,3)	(12,4 - 28,1)	(5,6 - 14,6)	(7,3 - 13,9)	(30,8 - 44,6)	(3,1 - 11,2)	(12,2 - 38,2)	(24,8 - 41,6)	(12,0 - 24,0)	(13,8 - 26,0)	(5,6 - 12,0)	(15,1 - 22,5)	(25,6 - 34,7)	(4,8 - 17,8)
Valparaíso	34,0	11,2	9,9	22,4	28,6	14,1	15,2	24,4	22,1	19,1	15,9	24,6	26,6	13,1*
	(29,4 - 38,6)	(7,1 - 15,3)	(7,8 - 11,9)	(19,7 - 25,0)	(22,5 - 34,7)	(10,0 - 18,3)	(11,3 - 19,2)	(19,1 - 29,8)	(18,1 - 26,2)	(15,6 - 22,6)	(11,2 - 20,6)	(20,4 - 28,9)	(22,0 - 31,2)	(9,9 - 16,3)
O'Higgins	21,1	18,0	12,2	23,5	14,4	16,4	22,7	8,7	23,7	16,4	24,3	17,8	23,2	12,7*
	(11,1 - 31,0)	(9,6 - 26,3)	(7,1 - 17,3)	(19,6 - 27,4)	(8,5 - 20,3)	(8,8 - 24,1)	(16,2 - 29,2)	(4,0 - 13,3)	(18,5 - 28,8)	(10,5 - 22,3)	(18,1 - 30,5)	(12,4 - 23,3)	(18,3 - 28,2)	(8,6 - 16,8)
Maule	34,8	27,7	13,1	18,8	20,2	8,4	23,3	11,4	13,5	9,7	21,6	31,5	16,4	11,4
	(28,3 - 41,4)	(20,7 - 34,7)	(8,1 - 18,1)	(16,1 - 21,5)	(15,3 - 25,1)	(4,8 - 12,0)	(18,8 - 27,8)	(7,1 - 15,7)	(7,4 - 19,6)	(6,0 - 13,4)	(15,3 - 27,9)	(22,4 - 40,6)	(12,4 - 20,5)	(7,4 - 15,4)
Biobío	33,4	13,7	12,5	19,2	16,0	14,5	17,4	15,9	17,2	27,0	25,5	24,8	27,1	6,5*
	(29,4 - 37,4)	(10,7 - 16,7)	(9,1 - 16,0)	(17,3 - 21,2)	(12,4 - 19,7)	(11,0 - 18,0)	(13,8 - 21,0)	(12,5 - 19,3)	(13,7 - 20,7)	(23,2 - 30,7)	(21,1 - 29,9)	(21,2 - 28,4)	(23,0 - 31,3)	(2,5 - 10,4)
La Araucanía	22,1	12,8	11,7	19,7	22,1	14,1	29,8	26,4	28,5	34,7	30,5	17,6	27,0	5,8*
	(14,8 - 29,4)	(6,9 - 18,6)	(6,3 - 17,1)	(14,3 - 25,1)	(15,3 - 28,8)	(8,5 - 19,7)	(20,5 - 39,0)	(20,1 - 32,7)	(22,3 - 34,7)	(28,0 - 41,5)	(24,4 - 36,6)	(12,1 - 23,0)	(21,4 - 32,6)	(3,1 - 8,5)
Los Lagos	41,3	10,9	11,8	18,0	22,3	17,2	30,7	13,3	16,9	22,3	13,7	29,8	22,0	15,2
	(34,1 - 48,5)	(5,0 - 16,8)	(7,7 - 16,0)	(13,8 - 22,1)	(16,5 - 28,1)	(10,1 - 24,3)	(24,6 - 36,9)	(8,9 - 17,7)	(12,3 - 21,5)	(16,4 - 28,2)	(9,3 - 18,1)	(22,3 - 37,3)	(17,4 - 26,6)	(7,4 - 22,9)
Aysén	20,2	19,2	13,4	32,8	27,9	10,5	22,0	38,2	22,6	24,2	27,8	11,7	17,5	4,2*
	(8,6 - 31,9)	(14,2 - 24,2)	(7,1 - 19,6)	(26,4 - 39,3)	(22,7 - 33,1)	(5,5 - 15,6)	(17,5 - 26,5)	(31,3 - 45,2)	(13,1 - 32,1)	(16,6 - 31,7)	(17,9 - 37,6)	(7,0 - 16,3)	(12,9 - 22,2)	(0,0 - 9,5)
Magallanes	46,4	6,9	6,5	15,9	6,7	5,6	15,2	14,3	10,3	15,9	25,4	18,5	22,8	12,9*
	(34,2 - 58,5)	(4,2 - 9,6)	(2,9 - 10,2)	(11,1 - 20,7)	(3,3 - 10,2)	(2,6 - 8,6)	(10,7 - 19,7)	(10,0 - 18,6)	(3,4 - 17,1)	(3,7 - 28,2)	(8,1 - 42,7)	(12,8 - 24,1)	(17,2 - 28,3)	(9,0 - 16,8)
Metropolitana	25,9	11,1	12,2	22,9	32,9	17,6	26,9	29,6	18,5	16,9	23,8	19,5	31,0	8,3*
	(22,1 - 29,7)	(8,1 - 14,0)	(11,0 - 13,4)	(21,3 - 24,5)	(29,7 - 36,2)	(14,6 - 20,6)	(22,9 - 30,8)	(25,7 - 33,4)	(15,8 - 21,2)	(14,1 - 19,7)	(20,1 - 27,5)	(14,6 - 24,4)	(27,1 - 35,0)	(5,2 - 11,4)
Los Ríos	24,9	10,9	11,3	18,0	11,4	0,6	20,7	31,0	14,0	26,3	11,3	25,9	30,3	14,0*
	(13,7 - 36,0)	(4,6 - 17,2)	(5,1 - 17,5)	(11,0 - 24,9)	(4,0 - 18,7)	(0,0 - 1,9)	(10,3 - 31,1)	(18,4 - 43,6)	(7,9 - 20,1)	(16,8 - 35,8)	(5,5 - 17,1)	(18,6 - 33,2)	(24,9 - 35,7)	(7,5 - 20,5)
Arica y Parinacota	38,2	10,8	16,7	24,8	24,7	13,6	19,4	20,7	14,0	21,1	18,7	18,9	26,4	15,1*
	(28,8 - 47,6)	(4,6 - 16,9)	(11,0 - 22,5)	(18,1 - 31,4)	(16,8 - 32,6)	(7,4 - 19,8)	(12,3 - 26,4)	(14,0 - 27,5)	(6,8 - 21,3)	(13,6 - 28,6)	(11,7 - 25,7)	(14,6 - 23,1)	(20,8 - 32,1)	(6,0 - 24,2)
Ñuble													27,2	5,9*
													(15,6 - 38,7)	(1,9 - 9,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

INCIDENCIA AÑO MARIHUANA

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional	1,9	1,3	1,4	1,1	0,8	0,9	1,7	1,3	0,8	1,6	2,8	3,4	3,8	1,1*
	(1,4 - 2,4)	(0,9 - 1,8)	(1,2 - 1,6)	(1,0 - 1,3)	(0,6 - 1,0)	(0,7 - 1,2)	(1,1 - 2,2)	(0,9 - 1,7)	(0,6 - 1,1)	(1,3 - 1,9)	(2,3 - 3,4)	(2,7 - 4,1)	(3,1 - 4,5)	(0,7 - 1,4)
Tarapacá	1,7	0,9	0,9	0,3	0,1	1,1	1,7	1,5	2,9	0,9	4,3	2,1	1,5	1,1
	(0,0 - 4,1)	(0,0 - 2,0)	(0,1 - 1,6)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 0,3)	(0,0 - 2,6)	(0,4 - 3,1)	(0,3 - 2,7)	(0,9 - 5,0)	(0,2 - 1,6)	(0,5 - 8,1)	(0,9 - 3,4)	(0,8 - 2,3)	(0,6 - 1,6)
Antofagasta	0,7	0,4	0,7	1,1	0,7	0,7	1,4	1,6	0,4	1,0	2,2	2,5	2,7	0,4*
	(0,0 - 1,6)	(0,0 - 1,0)	(0,1 - 1,3)	(0,4 - 1,9)	(0,2 - 1,1)	(0,1 - 1,3)	(0,6 - 2,1)	(0,6 - 2,6)	(0,0 - 1,0)	(0,2 - 1,7)	(0,9 - 3,5)	(0,7 - 4,3)	(1,1 - 4,4)	(0,0 - 0,8)
Atacama	0,7	0,9	2,4	0,3	0,7	1,8	2,1	0,3	1,4	0,2	5,3	3,6	2,7	1,8
	(0,0 - 2,0)	(0,2 - 1,6)	(0,7 - 4,0)	(<0,1 - 0,5)	(0,1 - 1,4)	(0,1 - 3,4)	(0,4 - 3,7)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 3,1)	(0,0 - 0,5)	(1,7 - 8,8)	(1,9 - 5,4)	(1,4 - 3,9)	(1,0 - 2,7)
Coquimbo	1,7	0,5	2,5	0,9	0,9	0,5	3,8	1,5	1,3	2,8	0,5	2,4	4,8	1,2*
	(0,4 - 3,0)	(<0,1 - 1,0)	(0,5 - 4,5)	(0,3 - 1,5)	(<0,1 - 1,8)	(0,1 - 1,0)	(0,0 - 10,4)	(0,1 - 2,9)	(<0,1 - 2,6)	(0,9 - 4,7)	(0,0 - 1,2)	(1,0 - 3,8)	(3,0 - 6,5)	(0,2 - 2,2)
Valparaíso	2,5	0,7	0,8	1,0	1,6	0,8	2,0	0,9	0,9	1,5	1,6	5,0	4,5	1,3*
	(1,2 - 3,8)	(0,2 - 1,1)	(0,5 - 1,2)	(0,6 - 1,4)	(0,8 - 2,4)	(0,2 - 1,5)	(0,4 - 3,6)	(0,2 - 1,6)	(0,2 - 1,6)	(0,7 - 2,4)	(0,9 - 2,3)	(3,3 - 6,7)	(3,1 - 5,9)	(0,4 - 2,1)
O'Higgins		0,9	0,4	1,2	0,5	0,3	1,8	0,7	0,6	1,6	3,2	1,7	3,3	0,7*
		(0,0 - 2,2)	(0,0 - 0,9)	(0,5 - 1,9)	(0,0 - 1,1)	(0,0 - 0,7)	(0,4 - 3,1)	(0,0 - 1,5)	(0,0 - 1,2)	(0,2 - 2,9)	(1,3 - 5,2)	(0,9 - 2,5)	(2,1 - 4,6)	(0,1 - 1,3)
Maule	0,6	0,6	1,0	0,9	0,6	0,2	0,5	0,3	0,4	0,5	1,6	3,5	2,1	3,1
	(0,0 - 1,3)	(<0,1 - 1,2)	(0,4 - 1,6)	(0,4 - 1,3)	(0,1 - 1,1)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,9)	(0,0 - 0,7)	(0,0 - 1,2)	(0,0 - 1,1)	(0,7 - 2,4)	(0,5 - 6,6)	(0,5 - 3,8)	(1,2 - 5,0)
Biobío	1,4	1,2	0,9	0,9	0,7	0,7	0,8	0,3	0,6	1,5	1,9	4,0	3,2	1,0*
	(0,7 - 2,2)	(0,2 - 2,2)	(0,5 - 1,3)	(0,6 - 1,2)	(0,3 - 1,2)	(0,3 - 1,2)	(0,4 - 1,3)	(<0,1 - 0,5)	(0,1 - 1,0)	(0,5 - 2,5)	(1,0 - 2,9)	(3,0 - 5,0)	(2,0 - 4,4)	(0,0 - 2,2)
La Araucanía	1,6	0,5	0,9	0,9	0,4	0,7	1,8	0,7	0,4	2,0	2,9	1,5	3,6	1,2*
	(0,2 - 3,1)	(0,0 - 1,2)	(0,2 - 1,6)	(0,2 - 1,6)	(0,0 - 0,9)	(0,1 - 1,3)	(0,5 - 3,1)	(<0,1 - 1,3)	(0,0 - 1,0)	(0,4 - 3,5)	(1,3 - 4,6)	(0,6 - 2,4)	(1,9 - 5,3)	(0,4 - 2,0)
Los Lagos	0,7	0,2	0,8	0,7	0,2	0,3	1,0	1,5	1,0	1,5	0,8	3,3	3,6	2,1
	(0,0 - 1,8)	(0,0 - 0,6)	(0,3 - 1,3)	(0,2 - 1,2)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,7)	(0,2 - 1,8)	(0,4 - 2,6)	(0,1 - 1,9)	(0,3 - 2,7)	(0,1 - 1,5)	(1,2 - 5,5)	(1,7 - 5,4)	(0,5 - 3,8)
Aysén		0,4	0,7	0,4	0,7	0,8	0,7	1,7	1,6	0,4	2,0	1,3	2,7	0,3*
		(0,0 - 0,9)	(0,0 - 1,6)	(0,0 - 0,9)	(0,1 - 1,4)	(0,1 - 1,5)	(0,1 - 1,4)	(0,0 - 3,4)	(0,0 - 3,3)	(0,0 - 0,8)	(0,2 - 3,9)	(0,4 - 2,2)	(1,2 - 4,3)	(0,0 - 0,9)
Magallanes	1,7	0,2	0,8	1,0	0,5	0,7	0,3	1,9	0,6	1,5	7,0	3,3	3,9	1,2*
	(0,0 - 4,0)	(0,0 - 0,5)	(<0,1 - 1,6)	(0,2 - 1,9)	(0,0 - 1,1)	(0,1 - 1,4)	(0,0 - 0,8)	(0,4 - 3,4)	(0,0 - 1,5)	(0,0 - 3,3)	(0,0 - 17,5)	(1,7 - 5,0)	(2,1 - 5,7)	(0,4 - 2,0)
Metropolitana	2,2	1,9	1,7	1,4	0,9	1,2	1,8	1,7	0,8	1,7	3,6	3,4	4,3	0,9*
	(1,4 - 3,0)	(1,1 - 2,7)	(1,4 - 2,0)	(1,1 - 1,7)	(0,5 - 1,2)	(0,7 - 1,6)	(1,0 - 2,6)	(0,9 - 2,5)	(0,4 - 1,2)	(1,2 - 2,3)	(2,5 - 4,6)	(2,1 - 4,8)	(3,0 - 5,6)	(0,3 - 1,4)
Los Ríos	3,2		1,0	0,4	0,2	0,6	3,1	1,3	0,7	1,3	1,7	3,5	2,5	1,5
	(0,0 - 7,2)		(0,0 - 2,1)	(0,0 - 1,0)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 1,5)	(0,3 - 5,9)	(0,0 - 3,5)	(0,0 - 1,6)	(0,1 - 2,5)	(0,4 - 3,0)	(2,0 - 5,0)	(0,8 - 4,3)	(0,0 - 3,0)
Arica y Parinacota	1,6	0,9	0,2	0,4	0,8	0,3	0,2	1,6	1,3	2,2	2,4	3,2	3,1	1,2
	(0,0 - 3,9)	(0,0 - 1,9)	(0,0 - 0,5)	(<0,1 - 0,9)	(0,0 - 2,0)	(0,0 - 0,9)	(0,0 - 0,5)	(0,4 - 2,8)	(0,0 - 2,6)	(0,2 - 4,2)	(0,2 - 4,6)	(1,5 - 5,0)	(1,0 - 5,2)	(0,0 - 3,1)
Ñuble													3,2	0,7*
													(0,8 - 5,7)	(<0,1 - 1,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERCEPCIÓN DE RIESGO CONSUMO DIARIO DE TABACO

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional				85,5	84,7	82,1	82,0	83,1	83,0	85,6	85,7	84,0	79,4	80,8
				(85,1 - 86,0)	(83,9 - 85,6)	(81,1 - 83,0)	(80,7 - 83,4)	(81,9 - 84,3)	(81,7 - 84,4)	(84,5 - 86,7)	(84,7 - 86,7)	(82,9 - 85,1)	(78,1 - 80,7)	(78,5 - 83,0)
Tarapacá				81,4	82,9	83,8	84,4	82,1	65,0	88,6	89,6	85,0	83,0	84,1
				(78,2 - 84,7)	(78,6 - 87,2)	(79,4 - 88,2)	(80,8 - 87,9)	(78,1 - 86,1)	(58,5 - 71,5)	(84,6 - 92,7)	(85,5 - 93,7)	(80,7 - 89,3)	(79,8 - 86,2)	(79,0 - 89,2)
Antofagasta				88,7	89,9	85,2	85,1	80,8	81,9	87,4	82,3	74,4	71,3	89,4*
				(86,6 - 90,8)	(87,9 - 92,0)	(82,5 - 87,8)	(82,6 - 87,6)	(78,0 - 83,6)	(76,9 - 87,0)	(84,6 - 90,2)	(77,9 - 86,7)	(69,9 - 78,9)	(65,5 - 77,1)	(86,6 - 92,1)
Atacama				87,5	89,6	85,8	84,7	84,6	82,0	88,1	86,5	90,1	86,3	81,4
				(85,4 - 89,5)	(87,4 - 91,8)	(82,6 - 89,0)	(81,2 - 88,2)	(80,8 - 88,5)	(77,7 - 86,3)	(83,9 - 92,4)	(82,0 - 91,0)	(87,6 - 92,6)	(83,3 - 89,3)	(75,8 - 87,1)
Coquimbo				86,3	86,4	85,9	86,3	84,4	86,6	86,1	76,2	80,6	72,2	88,9*
				(84,4 - 88,3)	(83,3 - 89,4)	(82,5 - 89,3)	(79,9 - 92,8)	(80,7 - 88,0)	(82,4 - 90,8)	(82,5 - 89,6)	(70,9 - 81,5)	(74,7 - 86,6)	(67,5 - 76,8)	(83,8 - 94,0)
Valparaíso				82,8	86,2	82,4	82,9	88,1	79,3	88,9	83,6	84,8	80,5	82,0
				(81,4 - 84,1)	(83,9 - 88,4)	(80,0 - 84,8)	(80,2 - 85,6)	(85,9 - 90,4)	(76,1 - 82,5)	(86,3 - 91,5)	(80,1 - 87,1)	(82,6 - 87,1)	(77,6 - 83,4)	(78,9 - 85,2)
O'Higgins				84,3	85,8	78,7	82,2	85,2	86,3	84,8	82,2	88,6	79,8	81,9
				(82,1 - 86,5)	(82,6 - 89,0)	(74,2 - 83,1)	(78,6 - 85,8)	(82,1 - 88,3)	(83,3 - 89,3)	(80,1 - 89,6)	(78,0 - 86,4)	(86,4 - 90,7)	(76,4 - 83,1)	(76,5 - 87,3)
Maule				85,7	87,3	85,1	90,6	87,0	85,3	89,9	81,2	92,8	82,3	76,7
				(84,1 - 87,2)	(84,8 - 89,7)	(82,3 - 87,8)	(88,5 - 92,7)	(84,2 - 89,7)	(81,4 - 89,3)	(87,8 - 91,9)	(77,4 - 85,0)	(89,5 - 96,0)	(78,6 - 85,9)	(71,8 - 81,7)
Biobío				87,3	83,8	82,3	83,7	83,1	83,2	76,5	86,3	81,6	69,8	81,8*
				(86,2 - 88,3)	(81,6 - 85,9)	(80,3 - 84,4)	(81,6 - 85,8)	(80,9 - 85,4)	(80,1 - 86,3)	(73,0 - 79,9)	(84,0 - 88,6)	(78,8 - 84,4)	(65,3 - 74,2)	(76,7 - 86,9)
La Araucanía				84,5	87,2	78,9	83,1	79,8	81,4	83,5	81,1	86,9	82,5	85,8
				(82,1 - 87,0)	(84,6 - 89,8)	(75,3 - 82,6)	(78,9 - 87,2)	(76,2 - 83,3)	(77,5 - 85,4)	(79,7 - 87,4)	(76,4 - 85,9)	(83,9 - 89,9)	(79,1 - 85,9)	(83,8 - 87,7)
Los Lagos				83,9	84,6	82,1	81,6	82,7	80,7	83,6	78,9	79,3	61,6	64,8
				(81,6 - 86,2)	(81,5 - 87,7)	(78,8 - 85,4)	(78,4 - 84,8)	(79,3 - 86,1)	(77,5 - 83,9)	(79,9 - 87,3)	(74,0 - 83,8)	(75,2 - 83,5)	(55,5 - 67,6)	(55,1 - 74,4)
Aysén				84,3	81,2	76,9	78,4	81,4	78,9	77,0	86,3	78,9	78,5	87,4*
				(81,0 - 87,5)	(78,5 - 84,0)	(73,9 - 79,9)	(75,6 - 81,3)	(77,1 - 85,7)	(73,3 - 84,5)	(70,3 - 83,7)	(82,7 - 89,9)	(74,0 - 83,9)	(74,7 - 82,4)	(85,2 - 89,6)
Magallanes				76,7	78,1	67,8	76,5	80,7	81,3	84,8	88,5	88,5	79,9	77,1
				(73,4 - 80,0)	(74,9 - 81,2)	(64,1 - 71,5)	(72,7 - 80,4)	(77,5 - 83,9)	(75,6 - 87,0)	(78,6 - 90,9)	(83,3 - 93,6)	(85,4 - 91,7)	(76,5 - 83,3)	(68,1 - 86,1)
Metropolitana				85,9	83,8	81,8	80,3	81,9	84,0	86,7	88,2	83,8	82,8	79,8
				(85,2 - 86,7)	(82,3 - 85,3)	(80,2 - 83,5)	(77,9 - 82,7)	(79,9 - 84,0)	(81,6 - 86,4)	(84,9 - 88,5)	(86,7 - 89,8)	(81,7 - 85,8)	(80,5 - 85,1)	(75,7 - 83,9)
Los Ríos				86,5	81,1	79,5	80,1	84,7	85,9	78,7	85,1	88,3	70,6	83,2*
				(82,6 - 90,4)	(75,7 - 86,6)	(73,4 - 85,6)	(73,8 - 86,3)	(79,2 - 90,2)	(81,3 - 90,4)	(71,1 - 86,4)	(79,6 - 90,7)	(84,5 - 92,2)	(66,0 - 75,2)	(78,0 - 88,4)
Arica y Parinacota				84,8	90,3	80,6	84,1	87,7	89,0	86,2	82,5	83,2	80,0	75,1
				(81,8 - 87,7)	(87,4 - 93,2)	(76,3 - 84,8)	(80,1 - 88,1)	(84,5 - 90,9)	(82,9 - 95,2)	(81,2 - 91,2)	(75,3 - 89,7)	(76,2 - 90,1)	(75,3 - 84,8)	(57,7 - 92,4)
Ñuble													82,5	85,3
													(78,4 - 86,7)	(83,0 - 87,6)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERCEPCIÓN DE RIESGO CONSUMO DE CINCO O MÁS TRAGOS DE ALCOHOL AL DÍA

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional				86,4	85,7	84,9	83,0	85,4	85,3	87,9	86,9	88,0	85,9	85,6
				(85,9 - 86,8)	(84,9 - 86,5)	(84,1 - 85,8)	(81,7 - 84,3)	(84,3 - 86,6)	(83,9 - 86,7)	(86,9 - 88,9)	(85,9 - 87,9)	(87,1 - 89,0)	(84,9 - 86,9)	(83,5 - 87,7)
Tarapacá				84,5	83,0	86,1	85,5	81,6	71,8	88,7	87,9	86,8	89,3	89,8
				(81,7 - 87,3)	(78,8 - 87,2)	(82,0 - 90,1)	(82,0 - 89,0)	(77,6 - 85,5)	(65,5 - 78,1)	(84,8 - 92,6)	(83,8 - 91,9)	(82,6 - 90,9)	(86,3 - 92,3)	(87,4 - 92,2)
Antofagasta				90,1	90,9	86,8	85,2	84,7	83,2	85,9	84,4	79,1	76,5	95,4*
				(88,1 - 92,0)	(89,0 - 92,9)	(84,2 - 89,4)	(81,7 - 88,6)	(82,1 - 87,3)	(77,9 - 88,4)	(83,2 - 88,6)	(80,1 - 88,7)	(73,6 - 84,6)	(71,9 - 81,2)	(92,6 - 98,3)
Atacama				86,8	85,6	85,5	87,4	88,7	89,5	90,2	84,7	94,3	91,7	85,8*
				(84,7 - 88,9)	(83,0 - 88,3)	(82,4 - 88,5)	(84,5 - 90,4)	(85,7 - 91,8)	(85,6 - 93,5)	(86,1 - 94,4)	(79,9 - 89,4)	(91,3 - 97,2)	(88,7 - 94,7)	(82,3 - 89,3)
Coquimbo				83,2	85,7	87,1	88,9	89,4	86,8	89,3	70,2	84,3	79,1	93,4*
				(81,1 - 85,4)	(82,7 - 88,6)	(84,1 - 90,1)	(85,4 - 92,4)	(86,4 - 92,4)	(82,5 - 91,2)	(86,0 - 92,7)	(64,8 - 75,7)	(78,9 - 89,7)	(75,9 - 82,3)	(91,0 - 95,8)
Valparaíso				82,7	84,3	85,0	81,7	89,0	81,2	88,5	85,7	89,4	84,9	85,5
				(81,3 - 84,1)	(81,9 - 86,7)	(82,8 - 87,2)	(78,8 - 84,7)	(86,8 - 91,2)	(78,0 - 84,5)	(85,5 - 91,5)	(83,3 - 88,1)	(86,9 - 91,8)	(82,4 - 87,4)	(82,7 - 88,2)
O'Higgins				84,7	84,1	88,5	89,1	87,6	91,9	91,4	85,0	92,6	92,4	86,8*
				(82,7 - 86,8)	(80,6 - 87,7)	(85,3 - 91,6)	(86,1 - 92,0)	(84,6 - 90,6)	(89,2 - 94,5)	(88,9 - 94,0)	(80,6 - 89,3)	(90,8 - 94,4)	(90,3 - 94,6)	(82,7 - 90,9)
Maule				85,4	87,8	85,4	88,6	86,2	88,6	92,4	84,5	92,4	90,7	86,3
				(84,0 - 86,9)	(85,4 - 90,2)	(82,6 - 88,2)	(86,2 - 91,0)	(83,4 - 89,0)	(85,1 - 92,1)	(90,3 - 94,5)	(81,1 - 87,9)	(89,4 - 95,4)	(88,2 - 93,3)	(82,0 - 90,7)
Biobío				87,1	84,7	85,6	87,8	86,7	88,3	86,1	89,1	85,6	82,1	88,5*
				(86,1 - 88,1)	(82,6 - 86,7)	(83,8 - 87,5)	(85,9 - 89,6)	(84,8 - 88,6)	(85,7 - 90,9)	(83,5 - 88,7)	(86,5 - 91,7)	(82,9 - 88,4)	(78,8 - 85,3)	(83,3 - 93,8)
La Araucanía				87,0	87,6	84,5	84,2	85,7	87,1	87,6	87,4	89,8	90,5	91,1
				(84,6 - 89,3)	(85,0 - 90,2)	(81,5 - 87,4)	(81,1 - 87,2)	(82,8 - 88,5)	(84,2 - 90,0)	(84,2 - 91,0)	(84,5 - 90,2)	(86,3 - 93,3)	(88,1 - 92,9)	(87,7 - 94,6)
Los Lagos				83,1	87,1	78,0	80,5	86,5	84,5	87,2	80,4	79,4	68,5	82,7*
				(80,7 - 85,5)	(84,3 - 89,8)	(74,3 - 81,7)	(76,7 - 84,3)	(83,6 - 89,4)	(81,6 - 87,3)	(83,6 - 90,7)	(75,4 - 85,4)	(74,1 - 84,7)	(62,9 - 74,2)	(78,8 - 86,6)
Aysén				79,2	79,3	77,3	74,0	77,8	86,8	87,2	84,9	84,0	84,0	91,4*
				(75,5 - 82,8)	(76,5 - 82,0)	(74,3 - 80,4)	(70,9 - 77,2)	(73,2 - 82,4)	(81,9 - 91,8)	(83,1 - 91,3)	(80,4 - 89,5)	(79,8 - 88,1)	(80,0 - 87,9)	(87,3 - 95,5)
Magallanes				83,4	80,7	74,0	83,2	87,0	79,1	92,2	91,8	81,1	86,8	86,8
				(80,5 - 86,3)	(77,7 - 83,7)	(70,5 - 77,5)	(80,1 - 86,3)	(84,3 - 89,6)	(71,5 - 86,8)	(88,0 - 96,4)	(87,8 - 95,8)	(75,5 - 86,6)	(83,6 - 90,1)	(83,8 - 89,8)
Metropolitana				87,3	86,1	85,0	80,8	84,2	85,5	87,4	89,0	88,9	87,9	83,2*
				(86,6 - 88,1)	(84,7 - 87,5)	(83,6 - 86,4)	(78,5 - 83,2)	(82,1 - 86,2)	(82,9 - 88,0)	(85,6 - 89,2)	(87,3 - 90,8)	(87,3 - 90,5)	(86,1 - 89,7)	(79,3 - 87,0)
Los Ríos				89,5	78,7	86,0	87,3	82,3	76,9	91,4	88,3	91,2	78,7	88,1*
				(86,4 - 92,6)	(73,1 - 84,3)	(81,1 - 90,8)	(82,7 - 91,8)	(75,3 - 89,2)	(70,8 - 83,0)	(87,5 - 95,3)	(83,4 - 93,1)	(87,8 - 94,6)	(73,9 - 83,5)	(84,3 - 91,8)
Arica y Parinacota				85,0	84,3	82,2	83,2	88,0	88,4	88,2	80,1	86,1	89,3	79,5
				(81,8 - 88,2)	(80,6 - 88,1)	(78,2 - 86,2)	(78,4 - 88,0)	(84,6 - 91,5)	(83,0 - 93,9)	(82,8 - 93,6)	(72,5 - 87,7)	(79,0 - 93,3)	(86,0 - 92,5)	(59,7 - 99,3)
Ñuble													89,5	91,2
													(83,2 - 95,8)	(87,8 - 94,7)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERCEPCIÓN DE RIESGO CONSUMO DE TRES O MÁS TRAGOS EN UNA OCASIÓN

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional												36,0	41,0	37,6*
												(34,4 - 37,5)	(39,2 - 42,8)	(35,5 - 39,8)
Tarapacá												41,6	34,5	43,0*
												(36,7 - 46,6)	(28,9 - 40,0)	(35,4 - 50,6)
Antofagasta												32,0	53,3	31,0*
												(25,7 - 38,2)	(47,9 - 58,7)	(22,7 - 39,4)
Atacama												32,4	45,3	33,7*
												(26,6 - 38,1)	(35,3 - 55,2)	(27,8 - 39,6)
Coquimbo												39,4	41,5	34,7*
												(34,8 - 44,0)	(37,2 - 45,9)	(29,0 - 40,4)
Valparaíso												34,7	39,7	34,0*
												(30,7 - 38,6)	(36,7 - 42,7)	(29,8 - 38,2)
O'Higgins												33,7	42,0	55,6*
												(27,7 - 39,6)	(38,2 - 45,9)	(52,0 - 59,2)
Maule												52,0	44,4	38,7
												(44,1 - 59,8)	(38,3 - 50,6)	(33,9 - 43,5)
Biobío												29,1	36,0	39,1
												(25,2 - 33,0)	(31,8 - 40,1)	(34,5 - 43,6)
La Araucanía												33,7	39,2	41,6
												(27,9 - 39,5)	(34,6 - 43,8)	(36,0 - 47,3)
Los Lagos												36,0	32,3	31,1
												(31,7 - 40,4)	(26,6 - 38,0)	(25,9 - 36,2)
Aysén												30,4	51,3	21,7*
												(24,0 - 36,7)	(45,4 - 57,2)	(11,7 - 31,7)
Magallanes												20,2	44,0	35,7
												(15,1 - 25,2)	(39,2 - 48,7)	(21,5 - 50,0)
Metropolitana												36,3	41,6	37,0
												(33,7 - 38,9)	(38,1 - 45,0)	(33,1 - 40,8)
Los Ríos												29,9	33,2	46,5*
												(26,0 - 33,8)	(28,9 - 37,5)	(37,7 - 55,4)
Arica y Parinacota												42,0	50,4	39,4*
												(37,0 - 46,9)	(43,8 - 57,0)	(27,4 - 51,4)
Ñuble													42,4	53,1
													(33,4 - 51,4)	(45,3 - 60,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERCEPCIÓN DE RIESGO CONSUMO EXPERIMENTAL DE MARIHUANA

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional							46,6	51,8	48,1	46,8	34,4	29,2	35,3	31,4*
							(45,0 - 48,2)	(50,2 - 53,3)	(46,3 - 49,9)	(45,3 - 48,2)	(33,0 - 35,8)	(27,9 - 30,6)	(33,5 - 37,2)	(29,4 - 33,4)
Tarapacá							49,9	52,0	44,2	80,5	44,7	52,4	44,5	43,1
							(44,8 - 55,1)	(46,9 - 57,1)	(36,6 - 51,8)	(75,6 - 85,4)	(38,5 - 50,9)	(47,1 - 57,7)	(39,1 - 50,0)	(37,6 - 48,7)
Antofagasta							53,6	52,2	65,7	54,3	55,7	36,3	48,8	35,1*
							(49,5 - 57,8)	(48,1 - 56,3)	(60,4 - 71,0)	(49,0 - 59,6)	(48,9 - 62,5)	(29,3 - 43,3)	(43,5 - 54,1)	(25,9 - 44,4)
Atacama							60,0	50,8	59,0	53,5	44,8	39,8	44,6	35,7
							(55,1 - 64,8)	(45,9 - 55,8)	(51,4 - 66,7)	(45,0 - 61,9)	(39,7 - 49,9)	(35,3 - 44,2)	(34,9 - 54,3)	(26,9 - 44,5)
Coquimbo							62,8	58,5	58,3	38,8	33,4	43,6	36,2	37,6
							(57,3 - 68,3)	(53,4 - 63,6)	(53,1 - 63,5)	(33,4 - 44,1)	(28,1 - 38,7)	(39,1 - 48,0)	(30,9 - 41,5)	(33,3 - 41,9)
Valparaíso							42,2	51,7	38,8	41,6	30,8	27,4	30,7	26,6
							(38,8 - 45,6)	(48,1 - 55,3)	(35,3 - 42,4)	(37,7 - 45,5)	(27,5 - 34,1)	(24,0 - 30,8)	(27,5 - 33,9)	(23,3 - 29,9)
O'Higgins							41,8	46,1	68,3	39,4	30,8	28,7	32,7	48,1*
							(37,4 - 46,2)	(41,8 - 50,4)	(63,0 - 73,6)	(33,2 - 45,6)	(26,3 - 35,4)	(22,7 - 34,7)	(29,3 - 36,1)	(40,9 - 55,4)
Maule							63,8	62,8	39,0	39,0	41,5	49,7	43,7	40,6
							(60,2 - 67,4)	(58,8 - 66,8)	(33,1 - 44,9)	(34,0 - 44,0)	(36,7 - 46,4)	(40,9 - 58,6)	(38,7 - 48,8)	(34,6 - 46,6)
Biobío							55,9	59,6	48,7	52,1	38,1	27,6	36,1	29,5*
							(53,0 - 58,7)	(56,7 - 62,5)	(45,4 - 51,9)	(48,0 - 56,2)	(34,8 - 41,4)	(24,0 - 31,2)	(31,6 - 40,5)	(25,0 - 34,0)
La Araucanía							62,3	49,2	63,2	50,0	34,0	38,2	36,3	34,8
							(57,8 - 66,8)	(45,0 - 53,4)	(58,2 - 68,3)	(44,0 - 56,0)	(28,5 - 39,4)	(31,9 - 44,4)	(32,8 - 39,8)	(32,3 - 37,4)
Los Lagos							48,3	55,1	53,5	42,2	40,2	32,0	33,4	39,7*
							(43,7 - 52,8)	(50,9 - 59,3)	(49,1 - 57,9)	(36,4 - 48,1)	(34,7 - 45,7)	(24,9 - 39,1)	(28,4 - 38,4)	(35,7 - 43,6)
Aysén							58,4	65,0	59,6	45,8	49,3	43,6	46,1	23,0*
							(55,0 - 61,9)	(59,7 - 70,3)	(51,0 - 68,2)	(38,9 - 52,7)	(41,9 - 56,6)	(38,2 - 48,9)	(40,6 - 51,6)	(18,4 - 27,7)
Magallanes							58,2	57,9	44,9	57,2	34,9	26,2	39,5	34,5*
							(54,2 - 62,2)	(53,9 - 61,9)	(36,4 - 53,4)	(49,8 - 64,5)	(25,6 - 44,1)	(22,4 - 30,1)	(34,9 - 44,1)	(32,0 - 37,1)
Metropolitana							40,7	48,6	45,0	46,2	30,8	23,3	33,9	28,2*
							(38,0 - 43,4)	(45,8 - 51,3)	(41,8 - 48,2)	(43,7 - 48,7)	(28,5 - 33,2)	(21,2 - 25,4)	(30,3 - 37,4)	(24,7 - 31,6)
Los Ríos							56,6	55,2	49,3	36,2	42,0	30,0	38,2	39,8
							(49,6 - 63,5)	(47,6 - 62,8)	(42,1 - 56,6)	(28,4 - 43,9)	(33,7 - 50,3)	(25,6 - 34,4)	(34,2 - 42,2)	(34,0 - 45,6)
Arica y Parinacota							58,0	60,8	57,0	57,1	36,8	42,3	30,1	37,5
							(52,4 - 63,5)	(56,1 - 65,6)	(48,5 - 65,6)	(47,4 - 66,8)	(29,9 - 43,7)	(35,5 - 49,1)	(25,4 - 34,8)	(22,6 - 52,4)
Ñuble													27,6	38,4
													(19,3 - 35,9)	(28,6 - 48,2)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERCEPCIÓN DE RIESGO CONSUMO FRECUENTE DE MARIHUANA

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional							88,3	84,2	78,9	79,0	67,2	62,8	65,8	64,0
							(87,1 - 89,4)	(82,9 - 85,6)	(77,5 - 80,3)	(77,8 - 80,2)	(65,6 - 68,8)	(61,3 - 64,3)	(64,3 - 67,3)	(61,9 - 66,1)
Tarapacá							88,1	89,8	65,1	86,2	70,0	75,4	73,4	72,2
							(84,7 - 91,5)	(86,7 - 92,9)	(57,0 - 73,3)	(82,4 - 90,1)	(63,3 - 76,6)	(71,8 - 79,1)	(68,9 - 77,9)	(67,5 - 76,8)
Antofagasta							91,1	86,9	85,0	82,9	75,8	67,2	69,6	77,6*
							(88,9 - 93,4)	(83,2 - 90,5)	(80,7 - 89,4)	(79,9 - 85,8)	(70,4 - 81,2)	(61,5 - 73,0)	(64,6 - 74,6)	(71,3 - 83,8)
Atacama							93,8	89,5	91,2	79,4	75,0	80,5	76,0	68,8
							(91,5 - 96,2)	(86,3 - 92,6)	(88,1 - 94,4)	(73,0 - 85,8)	(69,1 - 81,0)	(75,5 - 85,4)	(69,6 - 82,3)	(62,3 - 75,2)
Coquimbo							92,0	84,7	84,5	77,9	67,4	81,6	56,5	69,8*
							(88,7 - 95,3)	(80,7 - 88,6)	(81,0 - 88,0)	(73,9 - 81,9)	(61,5 - 73,2)	(78,6 - 84,6)	(51,3 - 61,7)	(62,7 - 77,0)
Valparaíso							86,9	84,6	68,0	75,9	62,4	52,4	60,5	61,7
							(84,5 - 89,3)	(81,7 - 87,5)	(64,2 - 71,8)	(71,9 - 79,9)	(58,6 - 66,1)	(48,3 - 56,4)	(57,3 - 63,8)	(59,2 - 64,2)
O'Higgins							90,8	90,5	89,1	82,2	62,0	65,3	67,2	76,5*
							(88,0 - 93,6)	(88,1 - 92,8)	(85,4 - 92,7)	(78,2 - 86,1)	(56,9 - 67,1)	(60,3 - 70,3)	(63,5 - 70,9)	(71,6 - 81,3)
Maule							95,5	90,9	90,8	85,0	76,6	77,2	72,9	70,7
							(93,9 - 97,0)	(88,5 - 93,4)	(88,0 - 93,7)	(81,5 - 88,5)	(72,4 - 80,7)	(73,6 - 80,7)	(68,1 - 77,7)	(66,5 - 74,8)
Biobío							93,1	88,8	84,4	82,6	74,8	64,6	72,8	66,7*
							(91,7 - 94,6)	(86,4 - 91,2)	(81,7 - 87,1)	(79,7 - 85,5)	(72,2 - 77,4)	(61,1 - 68,2)	(69,2 - 76,3)	(63,0 - 70,5)
La Araucanía							95,1	87,3	88,1	84,8	70,4	73,1	69,1	78,5*
							(93,4 - 96,8)	(83,8 - 90,8)	(84,6 - 91,5)	(81,5 - 88,0)	(65,9 - 74,9)	(67,8 - 78,4)	(65,3 - 72,9)	(75,5 - 81,6)
Los Lagos							90,6	94,3	79,7	83,2	68,7	62,8	55,3	71,3*
							(88,0 - 93,3)	(92,4 - 96,2)	(75,9 - 83,5)	(79,6 - 86,8)	(63,6 - 73,8)	(56,9 - 68,8)	(49,5 - 61,0)	(63,0 - 79,7)
Aysén							93,9	89,6	90,1	81,0	84,4	76,8	70,9	54,7*
							(92,3 - 95,6)	(86,4 - 92,8)	(85,8 - 94,3)	(74,8 - 87,3)	(79,6 - 89,2)	(72,1 - 81,5)	(66,6 - 75,1)	(51,7 - 57,6)
Magallanes							92,2	87,5	76,5	84,0	57,7	56,6	66,8	68,6
							(90,0 - 94,5)	(84,7 - 90,4)	(69,1 - 84,0)	(78,0 - 90,0)	(47,4 - 67,9)	(53,1 - 60,1)	(62,7 - 71,0)	(65,1 - 72,0)
Metropolitana							85,4	80,5	76,2	76,7	64,6	58,6	65,2	58,9*
							(83,3 - 87,5)	(78,2 - 82,9)	(73,6 - 78,7)	(74,6 - 78,8)	(61,7 - 67,5)	(55,9 - 61,2)	(62,4 - 68,0)	(55,2 - 62,6)
Los Ríos							93,1	89,0	86,3	80,7	67,3	70,2	64,4	69,3
							(89,5 - 96,7)	(84,4 - 93,5)	(80,6 - 92,0)	(74,7 - 86,7)	(59,1 - 75,5)	(65,2 - 75,1)	(60,1 - 68,6)	(66,3 - 72,3)
Arica y Parinacota							93,7	91,6	90,3	78,4	73,9	71,5	67,8	68,1
							(91,6 - 95,8)	(88,7 - 94,4)	(86,1 - 94,5)	(68,5 - 88,4)	(67,9 - 79,9)	(63,9 - 79,1)	(62,6 - 72,9)	(53,7 - 82,5)
Ñuble													63,3	69,6
													(55,1 - 71,4)	(61,3 - 77,9)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERCEPCIÓN DE RIESGO CONSUMO EXPERIMENTAL DE COCAÍNA

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional							69,4	74,5	69,6	74,2	73,7	71,6	73,3	71,8
							(67,8 - 71,1)	(73,2 - 75,9)	(67,9 - 71,4)	(72,8 - 75,6)	(72,3 - 75,1)	(69,9 - 73,3)	(71,8 - 74,8)	(69,5 - 74,1)
Tarapacá							72,9	75,4	55,2	88,0	77,4	83,5	83,2	78,1*
							(68,2 - 77,6)	(71,1 - 79,7)	(48,1 - 62,3)	(84,1 - 92,0)	(71,5 - 83,3)	(80,3 - 86,7)	(79,7 - 86,6)	(73,8 - 82,4)
Antofagasta							74,9	76,6	80,5	82,9	80,4	66,6	76,1	76,9
							(71,5 - 78,4)	(73,4 - 79,9)	(75,9 - 85,1)	(79,1 - 86,7)	(75,7 - 85,0)	(60,6 - 72,5)	(71,5 - 80,7)	(70,6 - 83,2)
Atacama							78,7	75,7	81,8	84,9	74,4	70,3	84,6	80,8
							(74,5 - 82,9)	(71,4 - 80,0)	(76,2 - 87,3)	(79,7 - 90,1)	(69,1 - 79,7)	(65,6 - 74,9)	(80,1 - 89,2)	(75,2 - 86,3)
Coquimbo							80,8	80,8	81,0	73,9	72,8	79,2	72,4	79,8*
							(76,2 - 85,4)	(76,8 - 84,8)	(75,8 - 86,2)	(69,5 - 78,2)	(67,8 - 77,8)	(75,3 - 83,2)	(67,5 - 77,4)	(75,9 - 83,6)
Valparaíso							68,4	76,5	67,9	74,4	69,3	75,5	69,5	71,9
							(65,0 - 71,8)	(73,4 - 79,5)	(64,3 - 71,5)	(70,7 - 78,0)	(65,7 - 72,9)	(72,3 - 78,8)	(66,6 - 72,4)	(66,0 - 77,8)
O'Higgins							59,2	72,8	85,0	66,7	73,5	74,5	77,7	81,9
							(54,7 - 63,8)	(68,9 - 76,6)	(81,5 - 88,6)	(60,6 - 72,7)	(68,6 - 78,4)	(68,7 - 80,3)	(74,3 - 81,1)	(78,6 - 85,2)
Maule							81,6	79,6	56,2	67,1	70,2	78,8	73,8	79,9
							(78,6 - 84,6)	(76,2 - 82,9)	(49,2 - 63,3)	(62,3 - 71,8)	(66,0 - 74,4)	(71,9 - 85,7)	(69,4 - 78,2)	(73,5 - 86,3)
Biobío							72,9	78,4	74,0	77,8	73,4	75,0	71,9	72,9
							(70,3 - 75,5)	(75,8 - 81,0)	(71,1 - 76,9)	(74,7 - 80,8)	(69,6 - 77,1)	(72,2 - 77,7)	(67,2 - 76,6)	(66,7 - 79,1)
La Araucanía							76,6	72,2	79,4	70,3	70,5	75,7	77,4	71,5*
							(73,0 - 80,3)	(68,3 - 76,2)	(75,4 - 83,4)	(64,9 - 75,7)	(66,4 - 74,7)	(71,2 - 80,2)	(73,6 - 81,1)	(67,1 - 76,0)
Los Lagos							66,0	73,7	67,9	65,5	64,9	69,5	58,2	70,4*
							(61,7 - 70,4)	(70,1 - 77,3)	(63,0 - 72,8)	(59,8 - 71,1)	(59,7 - 70,2)	(65,3 - 73,7)	(53,0 - 63,4)	(61,7 - 79,2)
Aysén							66,7	77,3	77,4	73,5	71,8	71,1	71,3	70,2
							(63,5 - 70,0)	(72,6 - 82,0)	(70,5 - 84,4)	(67,4 - 79,6)	(64,0 - 79,7)	(66,7 - 75,6)	(66,7 - 75,9)	(65,3 - 75,1)
Magallanes							69,1	74,5	64,2	83,9	71,6	72,3	69,8	75,4
							(65,4 - 72,8)	(70,9 - 78,1)	(56,0 - 72,4)	(78,7 - 89,0)	(61,4 - 81,8)	(67,2 - 77,3)	(65,2 - 74,5)	(69,3 - 81,6)
Metropolitana							66,6	72,4	66,6	73,6	74,9	68,0	73,9	68,5*
							(63,7 - 69,5)	(70,0 - 74,9)	(63,4 - 69,8)	(71,1 - 76,2)	(72,5 - 77,3)	(64,8 - 71,2)	(71,2 - 76,6)	(64,5 - 72,4)
Los Ríos							73,1	72,7	73,2	75,2	80,5	78,6	76,7	78,5
							(66,9 - 79,2)	(66,1 - 79,3)	(66,7 - 79,7)	(68,0 - 82,4)	(74,5 - 86,5)	(74,3 - 83,0)	(72,6 - 80,8)	(73,8 - 83,2)
Arica y Parinacota							73,5	81,5	78,8	78,2	78,1	79,6	72,5	73,9
							(68,6 - 78,5)	(77,7 - 85,2)	(72,9 - 84,7)	(70,7 - 85,7)	(71,9 - 84,4)	(72,0 - 87,1)	(67,0 - 78,0)	(62,6 - 85,3)
Ñuble													69,7	80,1*
													(62,4 - 76,9)	(75,5 - 84,7)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERCEPCIÓN DE RIESGO CONSUMO FRECUENTE DE COCAÍNA

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional							97,2	95,3	94,0	94,8	94,5	93,7	93,3	90,9*
							(96,5 - 97,9)	(94,7 - 96,0)	(93,4 - 94,7)	(94,2 - 95,5)	(93,9 - 95,2)	(93,1 - 94,3)	(92,5 - 94,0)	(88,8 - 92,9)
Tarapacá							97,9	95,3	77,6	93,4	92,7	91,4	96,2	94,8
							(96,5 - 99,2)	(93,3 - 97,4)	(71,1 - 84,2)	(90,4 - 96,4)	(89,1 - 96,2)	(88,4 - 94,4)	(94,7 - 97,7)	(93,0 - 96,6)
Antofagasta							98,1	97,8	88,3	95,0	93,2	86,8	85,7	98,2*
							(97,1 - 99,1)	(96,9 - 98,7)	(84,8 - 91,8)	(93,5 - 96,6)	(89,6 - 96,7)	(82,8 - 90,8)	(82,3 - 89,0)	(97,3 - 99,1)
Atacama							99,0	96,8	95,6	97,4	93,9	95,8	97,1	92,7*
							(98,1 - 99,9)	(94,8 - 98,8)	(93,2 - 98,0)	(95,4 - 99,3)	(91,0 - 96,8)	(93,6 - 98,1)	(95,3 - 98,8)	(89,7 - 95,7)
Coquimbo							97,9	96,8	93,6	96,5	89,7	92,7	88,8	97*
							(96,5 - 99,3)	(94,9 - 98,8)	(91,0 - 96,1)	(94,7 - 98,3)	(86,9 - 92,4)	(89,3 - 96,0)	(85,6 - 92,0)	(94,3 - 99,7)
Valparaíso							96,2	97,4	93,9	95,7	94,7	95,0	94,8	96,8*
							(94,8 - 97,6)	(96,3 - 98,4)	(92,0 - 95,7)	(94,0 - 97,4)	(93,3 - 96,1)	(93,5 - 96,5)	(93,3 - 96,3)	(95,8 - 97,8)
O'Higgins							97,9	98,6	94,1	97,5	89,3	94,7	96,2	92,3*
							(96,7 - 99,1)	(97,7 - 99,5)	(91,5 - 96,7)	(96,0 - 99,1)	(85,4 - 93,2)	(93,3 - 96,1)	(94,7 - 97,7)	(89,8 - 94,7)
Maule							96,2	95,9	95,9	96,7	95,1	95,1	93,9	91,4
							(94,6 - 97,7)	(94,4 - 97,5)	(93,5 - 98,2)	(95,0 - 98,3)	(93,7 - 96,6)	(92,3 - 97,9)	(92,1 - 95,8)	(88,8 - 94,1)
Biobío							98,6	98,1	92,8	93,5	95,7	91,4	92,5	91,3
							(98,1 - 99,2)	(97,4 - 98,8)	(90,6 - 95,1)	(91,8 - 95,1)	(93,7 - 97,8)	(89,6 - 93,3)	(90,3 - 94,7)	(86,9 - 95,8)
La Araucanía							98,3	96,3	95,7	95,6	93,3	95,5	94,0	95,6
							(97,4 - 99,1)	(94,7 - 97,9)	(94,2 - 97,3)	(93,8 - 97,3)	(91,2 - 95,4)	(93,7 - 97,2)	(92,2 - 95,9)	(94,2 - 97,0)
Los Lagos							96,3	97,7	90,8	95,6	91,3	86,4	78,2	90,7*
							(94,7 - 98,0)	(96,5 - 98,9)	(88,5 - 93,2)	(93,6 - 97,5)	(88,5 - 94,1)	(82,7 - 90,1)	(72,6 - 83,8)	(87,8 - 93,6)
Aysén							95,5	93,9	95,5	93,5	93,7	84,9	88,1	93,5*
							(94,1 - 96,9)	(91,1 - 96,6)	(92,5 - 98,6)	(90,5 - 96,6)	(90,5 - 96,9)	(81,4 - 88,5)	(84,8 - 91,5)	(91,5 - 95,4)
Magallanes							97,2	97,8	86,1	97,6	93,4	92,7	88,4	85,7
							(95,9 - 98,5)	(96,7 - 99,0)	(79,5 - 92,8)	(95,5 - 99,8)	(89,4 - 97,5)	(90,2 - 95,3)	(85,3 - 91,6)	(82,8 - 88,6)
Metropolitana							96,9	93,5	95,4	94,3	95,5	94,8	94,7	88,0*
							(95,7 - 98,2)	(92,3 - 94,7)	(94,3 - 96,4)	(93,1 - 95,5)	(94,3 - 96,6)	(93,9 - 95,8)	(93,4 - 96,1)	(84,1 - 92,0)
Los Ríos							98,0	95,9	97,8	94,9	97,6	94,2	90,8	91,4
							(96,2 - 99,8)	(92,3 - 99,5)	(96,1 - 99,5)	(91,7 - 98,2)	(95,5 - 99,7)	(90,8 - 97,6)	(88,1 - 93,6)	(88,9 - 93,9)
Arica y Parinacota							96,7	98,8	93,7	95,1	92,6	91,7	94,6	87,7
							(94,9 - 98,6)	(97,7 - 100)	(90,5 - 96,9)	(91,1 - 99,2)	(88,7 - 96,5)	(84,5 - 98,9)	(91,8 - 97,4)	(73,5 - 100)
Ñuble													97,5	94,8*
													(95,9 - 99,2)	(92,5 - 97,1)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERCEPCIÓN DE RIESGO CONSUMO EXPERIMENTAL DE PASTA BASE

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional							77,2	81,1	78,2	81,6	82,7	82,8	83,1	80,0*
							(75,8 - 78,6)	(79,8 - 82,4)	(76,8 - 79,5)	(80,3 - 83,0)	(81,6 - 83,9)	(81,4 - 84,1)	(81,8 - 84,4)	(77,9 - 82,1)
Tarapacá							73,5	79,1	59,8	91,3	82,4	87,6	89,2	82,5*
							(68,7 - 78,3)	(74,9 - 83,2)	(52,7 - 66,8)	(87,8 - 94,8)	(76,9 - 88,0)	(84,2 - 91,0)	(86,1 - 92,3)	(78,4 - 86,6)
Antofagasta							78,8	80,0	83,6	88,8	85,6	73,2	83,4	88,6*
							(75,5 - 82,1)	(76,9 - 83,1)	(79,4 - 87,9)	(85,6 - 92,0)	(81,4 - 89,8)	(67,2 - 79,3)	(79,6 - 87,2)	(86,2 - 91,0)
Atacama							81,2	78,4	85,2	88,6	84,5	77,9	91,6	84,8*
							(77,4 - 85,1)	(74,2 - 82,6)	(80,4 - 90,0)	(83,9 - 93,4)	(80,0 - 89,0)	(74,3 - 81,5)	(88,5 - 94,7)	(80,0 - 89,6)
Coquimbo							85,8	86,1	84,9	77,0	83,0	83,3	79,9	87,2*
							(81,9 - 89,7)	(82,5 - 89,6)	(80,4 - 89,3)	(72,2 - 81,9)	(79,3 - 86,7)	(79,3 - 87,2)	(75,2 - 84,5)	(82,3 - 92,2)
Valparaíso							74,7	85,2	81,2	86,5	81,7	86,6	84,0	81,0
							(71,4 - 78,1)	(82,5 - 87,9)	(78,3 - 84,2)	(84,0 - 89,0)	(78,6 - 84,7)	(84,3 - 88,9)	(81,8 - 86,3)	(76,9 - 85,2)
O'Higgins							69,4	78,2	90,0	74,5	80,8	85,2	85,2	84,6
							(65,1 - 73,7)	(74,7 - 81,8)	(87,1 - 92,8)	(68,5 - 80,5)	(76,1 - 85,5)	(81,7 - 88,7)	(82,1 - 88,2)	(80,9 - 88,3)
Maule							83,2	85,1	63,1	72,4	74,8	83,2	84,6	83,8
							(80,4 - 86,1)	(82,1 - 88,1)	(56,3 - 69,9)	(68,0 - 76,9)	(70,9 - 78,8)	(77,4 - 88,9)	(81,3 - 87,9)	(78,5 - 89,2)
Biobío							79,0	83,9	77,9	83,3	80,4	82,0	78,8	79,0
							(76,7 - 81,3)	(81,7 - 86,1)	(75,1 - 80,7)	(81,0 - 85,6)	(76,5 - 84,4)	(79,3 - 84,8)	(73,9 - 83,7)	(72,9 - 85,0)
La Araucanía							79,2	76,7	84,9	74,5	78,3	82,9	86,4	79,5*
							(75,7 - 82,8)	(72,9 - 80,5)	(81,5 - 88,3)	(69,8 - 79,3)	(74,7 - 81,8)	(78,6 - 87,2)	(83,8 - 89,0)	(76,3 - 82,7)
Los Lagos							73,3	78,9	71,4	73,2	69,9	75,3	65,5	79,1*
							(69,0 - 77,5)	(75,5 - 82,2)	(66,5 - 76,3)	(67,9 - 78,6)	(64,2 - 75,6)	(70,3 - 80,3)	(60,2 - 70,8)	(74,2 - 84,0)
Aysén							70,0	80,9	81,2	78,6	78,5	73,4	78,2	81,1
							(66,8 - 73,1)	(76,5 - 85,4)	(74,1 - 88,3)	(72,5 - 84,7)	(71,4 - 85,5)	(68,4 - 78,4)	(73,5 - 82,8)	(75,5 - 86,8)
Magallanes							73,4	82,6	68,1	86,2	80,7	81,1	76,9	78,7
							(69,8 - 76,9)	(79,5 - 85,7)	(60,0 - 76,2)	(81,0 - 91,5)	(70,6 - 90,8)	(76,7 - 85,5)	(73,1 - 80,8)	(70,8 - 86,7)
Metropolitana							77,1	79,8	77,6	81,8	85,1	83,2	84,2	77,8*
							(74,7 - 79,6)	(77,6 - 82,1)	(75,2 - 80,0)	(79,4 - 84,1)	(83,2 - 87,1)	(80,8 - 85,5)	(81,9 - 86,6)	(74,0 - 81,6)
Los Ríos							73,6	81,2	79,1	82,7	86,1	83,1	88,0	83,2
							(67,4 - 79,8)	(75,8 - 86,6)	(73,8 - 84,4)	(76,1 - 89,2)	(81,1 - 91,2)	(78,7 - 87,5)	(84,6 - 91,4)	(78,3 - 88,2)
Arica y Parinacota							73,7	83,4	82,1	83,5	82,2	85,2	82,3	82,2
							(68,7 - 78,7)	(79,7 - 87,1)	(76,8 - 87,3)	(76,1 - 90,8)	(76,5 - 88,0)	(77,9 - 92,5)	(77,7 - 86,9)	(76,0 - 88,4)
Ñuble													82,9	85,7
													(76,7 - 89,1)	(84,1 - 87,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERCEPCIÓN DE RIESGO CONSUMO FRECUENTE DE PASTA BASE

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional							97,6	96,2	95,3	95,4	95,4	94,4	94,2	91,4*
							(96,8 - 98,5)	(95,5 - 96,9)	(94,8 - 95,9)	(94,7 - 96,0)	(94,8 - 96,0)	(93,8 - 95,0)	(93,4 - 94,9)	(89,3 - 93,5)
Tarapacá							98,2	96,7	81,4	93,0	94,0	92,1	96,4	94,7
							(96,8 - 99,6)	(94,7 - 98,6)	(75,4 - 87,3)	(90,0 - 96,1)	(90,5 - 97,6)	(89,0 - 95,2)	(94,6 - 98,1)	(92,5 - 96,9)
Antofagasta							98,2	97,9	91,6	94,8	93,3	88,0	88,1	99,0*
							(97,2 - 99,2)	(96,8 - 98,9)	(88,5 - 94,8)	(92,9 - 96,7)	(89,7 - 96,9)	(84,0 - 92,1)	(85,0 - 91,3)	(98,0 - 100)
Atacama							98,5	96,3	97,0	97,2	93,8	95,9	97,0	93,2*
							(97,5 - 99,5)	(94,2 - 98,4)	(95,2 - 98,9)	(95,2 - 99,2)	(90,9 - 96,6)	(94,0 - 97,9)	(95,0 - 99,0)	(90,6 - 95,7)
Coquimbo							97,2	98,6	95,8	96,1	94,0	93,5	89,5	96,8*
							(94,8 - 99,6)	(97,5 - 99,7)	(93,6 - 98,0)	(93,9 - 98,2)	(92,1 - 95,9)	(90,4 - 96,6)	(86,3 - 92,7)	(93,7 - 99,9)
Valparaíso							96,6	98,3	95,6	96,0	95,3	95,8	95,8	96,2
							(95,1 - 98,0)	(97,6 - 99,0)	(94,0 - 97,2)	(94,4 - 97,7)	(93,9 - 96,8)	(94,5 - 97,0)	(94,3 - 97,4)	(95,1 - 97,2)
O'Higgins							97,4	99,3	92,6	97,6	90,3	96,0	96,8	90,7*
							(96,0 - 98,8)	(98,8 - 99,9)	(87,8 - 97,3)	(96,0 - 99,2)	(86,3 - 94,2)	(94,5 - 97,5)	(95,6 - 98,1)	(87,6 - 93,8)
Maule							95,9	97,2	95,5	97,1	94,9	94,4	94,5	91,8
							(94,3 - 97,5)	(96,0 - 98,5)	(92,5 - 98,6)	(95,6 - 98,6)	(93,4 - 96,4)	(91,6 - 97,1)	(92,6 - 96,4)	(89,2 - 94,4)
Biobío							98,6	98,4	93,7	94,1	95,7	92,2	94,5	93,0
							(98,0 - 99,2)	(97,8 - 99,1)	(92,0 - 95,4)	(92,5 - 95,7)	(93,6 - 97,8)	(90,1 - 94,3)	(92,5 - 96,4)	(89,0 - 96,9)
La Araucanía							97,6	95,5	96,9	95,2	92,3	96,0	94,5	95,1
							(96,0 - 99,2)	(93,7 - 97,3)	(95,7 - 98,1)	(93,3 - 97,2)	(90,0 - 94,6)	(94,7 - 97,4)	(92,9 - 96,2)	(93,3 - 96,8)
Los Lagos							96,7	97,5	91,8	96,9	92,0	88,1	80,6	93,1*
							(95,2 - 98,2)	(96,4 - 98,6)	(89,5 - 94,2)	(95,7 - 98,1)	(89,3 - 94,7)	(84,0 - 92,3)	(75,3 - 85,9)	(91,0 - 95,2)
Aysén							95,2	93,6	98,4	94,7	92,1	84,9	89,1	94,6*
							(93,7 - 96,7)	(90,7 - 96,5)	(97,0 - 99,7)	(91,9 - 97,5)	(86,8 - 97,4)	(81,2 - 88,7)	(85,5 - 92,7)	(93,7 - 95,5)
Magallanes							96,7	97,4	84,9	94,4	94,2	93,3	89,6	86,6
							(95,2 - 98,1)	(96,0 - 98,8)	(78,4 - 91,5)	(89,9 - 99,0)	(90,2 - 98,3)	(90,8 - 95,9)	(86,5 - 92,7)	(81,8 - 91,4)
Metropolitana							97,8	94,6	96,8	95,0	96,6	95,6	95,3	88,8*
							(96,3 - 99,4)	(93,3 - 95,9)	(95,9 - 97,6)	(93,9 - 96,1)	(95,6 - 97,5)	(94,6 - 96,5)	(94,1 - 96,6)	(84,8 - 92,8)
Los Ríos							98,4	97,3	98,0	97,3	98,5	94,8	94,4	92,1
							(97,0 - 99,8)	(94,6 - 100)	(96,3 - 99,8)	(95,3 - 99,3)	(97,3 - 99,6)	(91,4 - 98,2)	(92,1 - 96,6)	(89,9 - 94,2)
Arica y Parinacota							97,7	99,6	96,6	97,2	92,9	90,8	96,0	90,0
							(96,3 - 99,2)	(99,0 - 100)	(94,5 - 98,7)	(94,0 - 100)	(88,8 - 97,0)	(83,4 - 98,3)	(93,8 - 98,2)	(79,6 - 100)
Ñuble													96,3	95,4
													(93,9 - 98,8)	(93,5 - 97,3)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

OFRECIMIENTO DE MARIHUANA ÚLTIMO AÑO

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional					13,9	15,1	16,0	15,8	10,3	15,7	18,6	22,9	21,4	17,6*
					(13,1 - 14,7)	(14,2 - 16,0)	(14,8 - 17,2)	(14,5 - 17,0)	(9,3 - 11,2)	(14,5 - 16,8)	(17,4 - 19,8)	(21,1 - 24,6)	(20,1 - 22,7)	(16,1 - 19,0)
Tarapacá					16,5	20,0	18,6	14,7	10,1	9,7	16,8	12,9	18,7	11,4*
					(12,2 - 20,9)	(14,7 - 25,3)	(14,1 - 23,1)	(11,3 - 18,2)	(5,8 - 14,5)	(6,0 - 13,4)	(13,2 - 20,3)	(9,9 - 15,9)	(14,6 - 22,8)	(8,1 - 14,7)
Antofagasta					12,2	12,7	15,6	15,4	10,8	16,0	13,9	12,4	16,4	14,7
					(10,0 - 14,5)	(10,1 - 15,2)	(12,8 - 18,4)	(11,4 - 19,4)	(7,2 - 14,4)	(12,9 - 19,2)	(9,9 - 17,8)	(10,3 - 14,4)	(12,0 - 20,9)	(10,6 - 18,7)
Atacama					14,5	9,5	15,6	15,6	9,4	10,8	13,3	13,5	18,2	11,0*
					(11,6 - 17,4)	(6,8 - 12,1)	(11,7 - 19,4)	(11,8 - 19,3)	(5,1 - 13,7)	(6,7 - 14,9)	(8,6 - 18,1)	(11,1 - 15,8)	(14,3 - 22,0)	(6,3 - 15,7)
Coquimbo					12,2	9,3	13,9	16,6	11,6	16,9	10,8	9,2	20,6	16,9
					(9,2 - 15,3)	(6,7 - 11,8)	(10,1 - 17,8)	(12,6 - 20,6)	(8,1 - 15,1)	(13,3 - 20,6)	(7,3 - 14,3)	(5,6 - 12,7)	(16,5 - 24,6)	(10,5 - 23,3)
Valparaíso					16,9	17,5	18,5	12,0	12,4	18,2	22,8	28,7	23,4	18,5*
					(14,3 - 19,5)	(15,2 - 19,9)	(15,5 - 21,5)	(9,8 - 14,2)	(9,9 - 15,0)	(14,0 - 22,3)	(19,6 - 26,0)	(23,9 - 33,5)	(20,7 - 26,1)	(15,0 - 22,1)
O'Higgins					13,4	11,6	16,9	14,7	9,1	13,3	18,5	18,0	19,8	14,6*
					(9,8 - 17,0)	(8,4 - 14,8)	(13,4 - 20,4)	(11,5 - 17,9)	(5,5 - 12,8)	(8,6 - 17,9)	(14,6 - 22,4)	(15,9 - 20,0)	(16,0 - 23,6)	(11,2 - 17,9)
Maule					10,9	9,9	9,7	9,2	6,9	12,1	11,6	13,3	19,9	13,8*
					(8,6 - 13,1)	(7,5 - 12,2)	(7,6 - 11,9)	(6,7 - 11,8)	(4,4 - 9,5)	(9,1 - 15,2)	(9,0 - 14,3)	(9,1 - 17,4)	(15,2 - 24,6)	(10,2 - 17,3)
Biobío					9,9	12,8	11,2	12,1	5,8	9,4	15,4	19,5	18,6	19,5
					(8,2 - 11,6)	(10,8 - 14,8)	(9,4 - 12,9)	(10,0 - 14,1)	(4,4 - 7,2)	(7,4 - 11,4)	(13,1 - 17,8)	(15,9 - 23,1)	(15,4 - 21,8)	(15,6 - 23,4)
La Araucanía					10,3	12,3	15,4	12,2	8,4	12,6	16,7	21,2	17,1	12,5*
					(7,9 - 12,8)	(9,5 - 15,0)	(11,4 - 19,5)	(9,0 - 15,3)	(5,9 - 11,0)	(9,0 - 16,2)	(13,2 - 20,2)	(16,5 - 25,9)	(14,6 - 19,6)	(10,6 - 14,3)
Los Lagos					9,6	8,1	12,2	10,4	4,4	11,8	19,9	16,9	12,9	13,1
					(6,6 - 12,5)	(5,8 - 10,5)	(9,3 - 15,1)	(7,6 - 13,3)	(2,8 - 5,9)	(8,7 - 14,9)	(14,7 - 25,0)	(10,7 - 23,1)	(9,3 - 16,4)	(9,5 - 16,6)
Aysén					5,8	7,2	6,7	5,4	6,5	10,3	10,7	9,1	12,7	19,5*
					(4,2 - 7,4)	(5,3 - 9,1)	(5,0 - 8,5)	(2,9 - 7,9)	(2,4 - 10,5)	(6,0 - 14,6)	(6,4 - 14,9)	(5,7 - 12,4)	(9,8 - 15,6)	(14,7 - 24,4)
Magallanes					7,2	9,8	8,2	11,8	4,0	14,3	13,4	13,1	11,3	8,1
					(5,2 - 9,2)	(7,4 - 12,2)	(5,9 - 10,4)	(8,5 - 15,1)	(1,1 - 6,8)	(8,9 - 19,7)	(8,0 - 18,8)	(8,8 - 17,3)	(8,5 - 14,0)	(3,1 - 13,1)
Metropolitana					15,4	17,2	17,5	18,7	11,6	17,9	20,8	27,6	24,0	19,4*
					(14,0 - 16,8)	(15,7 - 18,7)	(15,4 - 19,7)	(16,4 - 21,0)	(9,8 - 13,4)	(15,8 - 20,0)	(18,7 - 22,9)	(24,4 - 30,8)	(21,6 - 26,5)	(16,9 - 21,8)
Los Ríos					10,3	12,8	15,3	14,8	8,3	11,9	16,0	19,4	16,0	16,6
					(6,4 - 14,2)	(7,8 - 17,8)	(10,2 - 20,4)	(9,2 - 20,4)	(3,8 - 12,7)	(5,9 - 17,9)	(10,2 - 21,8)	(15,8 - 22,9)	(12,8 - 19,2)	(14,0 - 19,2)
Arica y Parinacota					12,5	12,8	11,7	10,4	14,7	12,9	10,8	14,0	26,5	12,0*
					(8,6 - 16,4)	(9,0 - 16,5)	(8,4 - 15,1)	(7,2 - 13,6)	(8,9 - 20,5)	(8,1 - 17,8)	(7,1 - 14,5)	(10,2 - 17,9)	(22,0 - 31,0)	(7,7 - 16,3)
Ñuble													18,7	13,0
													(12,9 - 24,5)	(9,0 - 17,1)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

OFRECIMIENTO DE COCAÍNA ÚLTIMO AÑO

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional					4,4	5,2	5,0	6,4	3,0	4,8	5,2	6,1	6,4	3,6*
					(3,9 - 4,9)	(4,6 - 5,8)	(4,3 - 5,6)	(5,5 - 7,2)	(2,5 - 3,4)	(4,2 - 5,3)	(4,5 - 5,9)	(5,3 - 6,9)	(5,6 - 7,1)	(2,9 - 4,3)
Tarapacá					2,8	5,9	4,2	2,7	3,8	4,7	6,3	4,4	5,4	3,0
					(0,6 - 5,0)	(2,3 - 9,6)	(2,4 - 6,0)	(1,2 - 4,1)	(1,6 - 6,1)	(1,8 - 7,6)	(3,8 - 8,8)	(2,3 - 6,4)	(2,5 - 8,4)	(1,7 - 4,3)
Antofagasta					2,5	3,3	3,8	4,0	3,0	7,0	4,0	5,4	6,1	3,5
					(1,5 - 3,5)	(2,1 - 4,6)	(2,6 - 5,1)	(2,5 - 5,5)	(1,3 - 4,7)	(4,9 - 9,2)	(1,5 - 6,6)	(1,8 - 8,9)	(3,5 - 8,7)	(2,2 - 4,9)
Atacama					1,7	1,1	1,1	2,6	0,7	4,0	1,9	2,2	5,3	2,3*
					(0,6 - 2,7)	(0,3 - 2,0)	(<0,1 - 2,1)	(0,9 - 4,3)	(0,0 - 1,6)	(0,8 - 7,2)	(0,1 - 3,7)	(0,5 - 3,8)	(3,3 - 7,3)	(1,1 - 3,6)
Coquimbo					2,3	2,7	5,2	4,8	1,7	3,2	2,6	2,3	6,7	3,2*
					(0,8 - 3,7)	(1,2 - 4,1)	(2,9 - 7,6)	(2,3 - 7,2)	(0,1 - 3,3)	(1,5 - 4,8)	(1,0 - 4,2)	(<0,1 - 4,6)	(4,6 - 8,8)	(0,2 - 6,2)
Valparaíso					4,7	6,2	6,7	5,5	2,9	5,2	4,3	7,0	5,1	3,9
					(3,3 - 6,0)	(4,6 - 7,8)	(5,1 - 8,3)	(3,8 - 7,1)	(1,4 - 4,4)	(3,2 - 7,3)	(3,1 - 5,5)	(5,2 - 8,8)	(3,9 - 6,2)	(0,7 - 7,1)
O'Higgins					4,9	2,8	4,6	4,4	2,8	2,9	3,5	4,2	5,4	3,1
					(2,5 - 7,3)	(1,1 - 4,6)	(2,6 - 6,6)	(2,7 - 6,2)	(1,4 - 4,3)	(1,4 - 4,4)	(1,8 - 5,2)	(2,6 - 5,8)	(2,9 - 7,8)	(1,6 - 4,7)
Maule					2,6	2,1	2,5	4,2	0,3	2,3	2,8	3,1	4,9	2,6*
					(1,4 - 3,8)	(1,0 - 3,1)	(1,4 - 3,7)	(2,6 - 5,9)	(0,0 - 0,5)	(1,1 - 3,6)	(1,6 - 3,9)	(1,3 - 4,9)	(3,0 - 6,8)	(1,7 - 3,4)
Biobío					1,9	2,3	2,5	3,2	1,4	1,9	3,0	3,3	4,9	4,2
					(1,1 - 2,6)	(1,5 - 3,2)	(1,4 - 3,5)	(2,1 - 4,3)	(0,7 - 2,1)	(0,9 - 2,9)	(2,0 - 4,1)	(2,0 - 4,5)	(3,0 - 6,8)	(2,4 - 6,0)
La Araucanía					1,3	3,0	2,8	3,6	1,3	3,2	2,4	5,6	3,5	4,4
					(0,4 - 2,2)	(1,6 - 4,3)	(1,3 - 4,3)	(1,9 - 5,4)	(0,5 - 2,2)	(1,5 - 4,9)	(1,0 - 3,8)	(3,3 - 7,9)	(2,4 - 4,7)	(3,3 - 5,5)
Los Lagos					0,8	0,8	1,6	2,1	1,1	2,1	3,7	4,0	3,6	4,1
					(0,2 - 1,4)	(0,2 - 1,4)	(0,7 - 2,6)	(0,8 - 3,4)	(0,2 - 1,9)	(0,9 - 3,2)	(1,2 - 6,2)	(2,4 - 5,7)	(1,9 - 5,2)	(1,6 - 6,7)
Aysén					0,6	0,9	1,6	1,6	0,5	0,3	2,7	1,8	2,6	2,9
					(<0,1 - 1,1)	(0,2 - 1,7)	(0,7 - 2,5)	(0,5 - 2,7)	(0,0 - 1,4)	(0,0 - 0,9)	(0,5 - 4,9)	(0,4 - 3,2)	(1,3 - 4,0)	(1,3 - 4,5)
Magallanes					1,1	0,7	1,0	1,5	0,7	1,2	2,5	3,5	2,3	1,5
					(0,3 - 1,9)	(<0,1 - 1,4)	(0,3 - 1,7)	(0,2 - 2,7)	(0,0 - 1,9)	(0,0 - 2,9)	(0,0 - 5,5)	(1,5 - 5,6)	(0,9 - 3,8)	(0,7 - 2,4)
Metropolitana					6,1	7,1	6,1	8,7	4,0	6,1	7,0	7,9	7,8	3,7*
					(5,2 - 7,0)	(6,1 - 8,2)	(4,9 - 7,3)	(7,2 - 10,3)	(3,1 - 4,8)	(5,0 - 7,1)	(5,7 - 8,3)	(6,4 - 9,4)	(6,3 - 9,2)	(2,6 - 4,8)
Los Ríos					1,8	1,5	2,0	3,0	1,1	1,9	0,6	2,5	6,0	2,1*
					(0,2 - 3,5)	(0,0 - 3,2)	(0,4 - 3,6)	(0,8 - 5,1)	(<0,1 - 2,2)	(0,0 - 3,9)	(0,1 - 1,1)	(0,8 - 4,2)	(3,6 - 8,4)	(0,6 - 3,6)
Arica y Parinacota					1,5	3,6	3,9	3,9	4,7	3,0	1,6	4,1	10,0	3,2*
					(0,3 - 2,7)	(1,7 - 5,5)	(1,9 - 5,8)	(1,8 - 6,0)	(1,4 - 7,9)	(0,3 - 5,7)	(0,4 - 2,8)	(1,3 - 6,8)	(6,1 - 13,9)	(1,5 - 4,9)
Ñuble													4,1	3,2
													(1,9 - 6,3)	(2,1 - 4,4)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

OFRECIMIENTO DE PASTA BASE ÚLTIMO AÑO

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional					2,8	3,9	4,0	3,9	2,6	2,8	2,7	2,8	3,0	1,5*
					(2,5 - 3,2)	(3,4 - 4,4)	(3,5 - 4,5)	(3,4 - 4,5)	(2,2 - 3,1)	(2,4 - 3,2)	(2,2 - 3,1)	(2,3 - 3,3)	(2,6 - 3,4)	(1,1 - 1,8)
Tarapacá					9,6	11,7	10,5	6,0	3,5	4,3	5,9	1,9	4,0	1,8
					(6,1 - 13,1)	(7,2 - 16,2)	(7,1 - 13,8)	(3,8 - 8,2)	(1,8 - 5,1)	(1,6 - 7,0)	(3,3 - 8,5)	(0,7 - 3,1)	(1,4 - 6,6)	(0,9 - 2,7)
Antofagasta					3,9	5,2	6,3	3,1	3,7	4,6	2,9	2,9	6,1	1,7*
					(2,7 - 5,2)	(3,6 - 6,8)	(4,6 - 8,0)	(2,0 - 4,2)	(1,8 - 5,5)	(2,9 - 6,2)	(1,4 - 4,4)	(0,9 - 4,9)	(3,2 - 9,0)	(0,1 - 3,4)
Atacama					1,9	2,5	5,9	4,3	2,0	4,0	4,3	2,5	4,0	1,4*
					(0,6 - 3,3)	(1,3 - 3,7)	(3,2 - 8,5)	(2,3 - 6,3)	(0,1 - 3,8)	(0,9 - 7,2)	(1,6 - 6,9)	(0,8 - 4,3)	(2,0 - 6,1)	(0,4 - 2,5)
Coquimbo					3,8	3,1	6,2	5,0	5,0	2,5	1,7	0,8	4,2	1,7
					(2,2 - 5,4)	(1,6 - 4,6)	(3,7 - 8,6)	(2,7 - 7,4)	(2,7 - 7,4)	(1,0 - 4,0)	(0,6 - 2,9)	(0,0 - 1,7)	(2,2 - 6,1)	(0,0 - 3,7)
Valparaíso					2,0	3,4	5,0	2,8	2,0	2,4	2,8	2,3	1,8	1,5
					(1,1 - 2,8)	(2,2 - 4,5)	(3,5 - 6,5)	(1,7 - 3,9)	(0,9 - 3,0)	(1,3 - 3,5)	(1,7 - 3,9)	(1,2 - 3,5)	(1,0 - 2,6)	(0,4 - 2,5)
O'Higgins					3,8	3,1	4,5	3,5	3,7	2,7	2,8	3,5	2,2	1,4
					(1,9 - 5,7)	(1,3 - 4,9)	(2,6 - 6,4)	(2,0 - 5,1)	(0,9 - 6,5)	(0,4 - 5,1)	(1,2 - 4,4)	(1,6 - 5,3)	(0,8 - 3,6)	(0,3 - 2,6)
Maule					1,7	1,8	1,9	2,0	0,4	1,5	0,3	1,5	3,7	1,2*
					(0,7 - 2,7)	(0,9 - 2,7)	(1,0 - 2,8)	(0,8 - 3,2)	(0,0 - 1,0)	(0,5 - 2,6)	(0,1 - 0,6)	(0,2 - 2,7)	(1,8 - 5,5)	(0,1 - 2,3)
Biobío					1,5	1,9	2,7	2,7	2,1	1,5	1,9	1,2	3,1	2,5
					(0,8 - 2,3)	(1,2 - 2,5)	(1,9 - 3,5)	(1,8 - 3,6)	(1,0 - 3,1)	(0,6 - 2,3)	(1,0 - 2,8)	(0,7 - 1,7)	(2,0 - 4,3)	(0,5 - 4,4)
La Araucanía					1,2	1,7	2,0	0,7	0,8	1,2	0,3	1,0	1,7	2,6
					(0,3 - 2,1)	(0,6 - 2,8)	(0,8 - 3,3)	(0,2 - 1,1)	(0,1 - 1,5)	(0,1 - 2,3)	(<0,1 - 0,5)	(0,4 - 1,6)	(0,9 - 2,5)	(1,2 - 3,9)
Los Lagos					0,4	1,0	1,4	0,7	0,4	1,3	1,4	1,6	3,0	2,4
					(0,0 - 0,9)	(0,3 - 1,6)	(0,6 - 2,3)	(0,1 - 1,4)	(0,0 - 1,0)	(0,4 - 2,2)	(0,4 - 2,5)	(0,2 - 2,9)	(1,4 - 4,5)	(0,8 - 4,0)
Aysén					0,1	0,4	1,0	0,4		0,3	0,6	0,4	0,2	0,4
					(0,0 - 0,4)	(<0,1 - 0,8)	(0,2 - 1,8)	(0,0 - 0,9)		(0,0 - 0,9)	(0,0 - 1,7)	(0,0 - 0,9)	(0,0 - 0,6)	(0,1 - 0,8)
Magallanes					1,5	0,4	0,8	0,7	0,2	1,1	2,2	1,1	0,1	0,1
					(0,4 - 2,7)	(0,0 - 0,9)	(0,2 - 1,4)	(0,0 - 1,7)	(0,0 - 0,6)	(0,0 - 2,5)	(0,0 - 5,1)	(0,0 - 2,3)	(0,0 - 0,4)	(0,0 - 0,5)
Metropolitana					3,3	4,7	3,8	4,9	3,1	3,3	3,3	3,9	3,0	1,3*
					(2,6 - 3,9)	(3,9 - 5,5)	(2,9 - 4,7)	(4,0 - 5,9)	(2,3 - 3,9)	(2,6 - 4,0)	(2,5 - 4,1)	(2,9 - 4,8)	(2,2 - 3,7)	(0,7 - 1,8)
Los Ríos					1,4	3,0	4,2	1,5	2,1	1,1	0,5	1,7	3,8	0,5*
					(0,1 - 2,7)	(0,2 - 5,9)	(1,6 - 6,7)	(0,0 - 3,1)	(0,0 - 4,6)	(0,1 - 2,0)	(0,1 - 0,8)	(0,7 - 2,7)	(1,8 - 5,8)	(0,0 - 1,3)
Arica y Parinacota					4,7	5,8	6,7	6,4	4,1	3,4	0,9	3,4	4,7	1,2*
					(2,5 - 6,9)	(3,5 - 8,2)	(3,0 - 10,3)	(3,6 - 9,2)	(1,1 - 7,2)	(0,8 - 5,9)	(0,0 - 2,0)	(0,6 - 6,2)	(1,8 - 7,6)	(0,5 - 1,9)
Ñuble													1,9	0,8
													(0,5 - 3,3)	(0,0 - 1,8)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERCEPCIÓN FACILIDAD DE ACCESO A MARIHUANA

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional	39,9	34,6	45,3	52,7	52,1	51,9	55,6	53,2	36,1	46,7	51,0	56,5	50,3	51,4
	(38,1 - 41,6)	(32,9 - 36,2)	(44,5 - 46,0)	(52,0 - 53,3)	(50,9 - 53,3)	(50,7 - 53,1)	(54,0 - 57,2)	(51,6 - 54,7)	(34,4 - 37,8)	(45,2 - 48,3)	(49,4 - 52,6)	(54,9 - 58,2)	(48,4 - 52,2)	(49,6 - 53,3)
Tarapacá	29,0	36,6	53,5	57,7	63,8	62,6	53,6	55,9	19,4	35,9	62,6	45,8	52,2	54,1
	(22,4 - 35,6)	(29,3 - 44,0)	(48,3 - 58,7)	(53,6 - 61,9)	(58,6 - 69,1)	(56,8 - 68,4)	(48,5 - 58,7)	(50,8 - 61,0)	(14,1 - 24,6)	(28,1 - 43,8)	(56,8 - 68,5)	(37,9 - 53,7)	(46,5 - 57,8)	(47,4 - 60,8)
Antofagasta	25,6	24,7	33,6	40,8	46,8	49,5	51,0	56,7	39,3	43,8	51,3	51,3	41,1	49,0
	(21,4 - 29,8)	(21,1 - 28,2)	(30,3 - 36,8)	(37,5 - 44,2)	(43,4 - 50,1)	(45,8 - 53,3)	(46,8 - 55,1)	(52,7 - 60,6)	(34,1 - 44,5)	(37,8 - 49,8)	(44,3 - 58,3)	(45,9 - 56,7)	(34,5 - 47,6)	(40,8 - 57,1)
Atacama	43,9	40,9	43,1	46,4	47,1	43,3	53,0	57,0	33,4	42,4	42,9	47,1	48,3	36,2*
	(34,8 - 53,1)	(36,0 - 45,7)	(37,2 - 49,0)	(43,2 - 49,6)	(43,2 - 50,9)	(38,6 - 48,0)	(48,1 - 57,9)	(52,1 - 61,9)	(25,6 - 41,3)	(34,4 - 50,4)	(35,6 - 50,3)	(39,7 - 54,4)	(42,4 - 54,1)	(26,6 - 45,8)
Coquimbo	35,4	30,6	34,4	55,0	47,8	47,9	55,4	56,1	44,9	51,4	54,1	47,1	43,6	51,8*
	(30,3 - 40,6)	(25,5 - 35,7)	(30,4 - 38,4)	(52,2 - 57,7)	(43,3 - 52,3)	(43,2 - 52,6)	(49,5 - 61,2)	(51,0 - 61,3)	(38,6 - 51,2)	(45,1 - 57,7)	(47,4 - 60,7)	(41,4 - 52,8)	(38,3 - 48,9)	(46,1 - 57,5)
Valparaíso	39,3	36,9	47,3	53,0	52,6	57,1	64,6	51,8	39,0	46,1	45,8	59,9	48,2	50,3
	(35,9 - 42,7)	(33,1 - 40,6)	(45,2 - 49,5)	(51,2 - 54,8)	(49,1 - 56,2)	(54,2 - 60,1)	(61,4 - 67,8)	(48,2 - 55,4)	(35,0 - 43,0)	(41,5 - 50,7)	(41,5 - 50,0)	(56,1 - 63,6)	(44,7 - 51,7)	(47,3 - 53,2)
O'Higgins	40,1	46,1	40,5	47,5	49,9	49,3	50,3	52,6	29,6	49,9	48,7	57,2	51,1	47,2
	(32,7 - 47,6)	(40,0 - 52,3)	(33,6 - 47,4)	(44,6 - 50,3)	(45,1 - 54,6)	(44,4 - 54,1)	(45,7 - 54,8)	(48,3 - 56,9)	(22,2 - 37,1)	(43,7 - 56,1)	(43,7 - 53,6)	(52,8 - 61,6)	(46,8 - 55,3)	(40,7 - 53,8)
Maule	19,7	22,5	26,2	37,8	37,8	37,0	37,9	27,8	20,4	34,4	38,7	36,2	35,1	42,5
	(15,5 - 24,0)	(18,6 - 26,4)	(22,6 - 29,7)	(35,6 - 39,9)	(34,3 - 41,3)	(33,3 - 40,8)	(34,3 - 41,6)	(24,0 - 31,5)	(15,3 - 25,4)	(28,9 - 39,9)	(34,1 - 43,4)	(29,6 - 42,7)	(29,3 - 40,8)	(37,1 - 47,9)
Biobío	35,9	28,3	31,4	46,2	41,4	46,3	47,0	47,7	36,0	40,3	46,0	51,2	42,3	51,0*
	(32,5 - 39,4)	(25,4 - 31,1)	(29,1 - 33,7)	(44,6 - 47,7)	(38,6 - 44,1)	(43,5 - 49,0)	(44,1 - 49,9)	(44,8 - 50,6)	(32,2 - 39,8)	(36,5 - 44,0)	(42,2 - 49,7)	(46,1 - 56,2)	(37,5 - 47,1)	(45,7 - 56,3)
La Araucanía	29,4	17,7	37,1	46,0	37,2	38,0	41,6	44,7	20,3	31,8	34,9	36,7	38,2	35,6
	(23,2 - 35,5)	(13,6 - 21,7)	(32,3 - 42,0)	(42,5 - 49,4)	(33,0 - 41,3)	(33,9 - 42,1)	(37,0 - 46,1)	(40,4 - 49,0)	(16,3 - 24,3)	(26,1 - 37,4)	(29,9 - 40,0)	(33,2 - 40,1)	(34,0 - 42,5)	(30,9 - 40,2)
Los Lagos	17,3	14,4	23,1	30,9	20,1	27,3	35,0	34,9	21,2	26,0	30,0	37,3	28,4	30,6
	(12,2 - 22,3)	(10,8 - 18,0)	(19,5 - 26,8)	(27,8 - 34,0)	(16,6 - 23,6)	(23,5 - 31,1)	(30,5 - 39,5)	(30,9 - 39,0)	(17,1 - 25,4)	(21,3 - 30,7)	(24,7 - 35,2)	(31,1 - 43,5)	(23,7 - 33,2)	(27,1 - 34,1)
Aysén	3,7	8,6	13,6	20,8	18,2	19,6	16,5	13,4	11,0	18,1	23,6	24,4	18,8	37,1*
	(0,0 - 8,4)	(6,5 - 10,6)	(10,1 - 17,0)	(17,3 - 24,3)	(15,5 - 20,9)	(16,8 - 22,4)	(13,8 - 19,2)	(9,5 - 17,3)	(5,6 - 16,4)	(13,0 - 23,1)	(17,7 - 29,5)	(18,6 - 30,2)	(14,8 - 22,7)	(32,8 - 41,4)
Magallanes	15,0	13,8	15,4	19,9	18,2	18,9	21,6	26,6	6,0	16,4	31,8	33,4	24,0	23,9
	(6,3 - 23,7)	(11,4 - 16,1)	(12,1 - 18,6)	(16,7 - 23,0)	(15,2 - 21,1)	(15,7 - 22,1)	(18,4 - 24,9)	(22,8 - 30,4)	(3,0 - 9,0)	(10,7 - 22,0)	(20,7 - 43,0)	(27,9 - 38,9)	(19,6 - 28,4)	(19,4 - 28,3)
Metropolitana	46,0	38,1	52,4	58,6	60,4	57,3	60,9	58,6	40,8	53,5	57,8	65,5	59,0	56,8
	(43,0 - 49,0)	(35,2 - 41,0)	(51,3 - 53,4)	(57,6 - 59,7)	(58,5 - 62,4)	(55,3 - 59,3)	(58,1 - 63,8)	(55,9 - 61,3)	(37,7 - 43,8)	(50,8 - 56,2)	(55,1 - 60,5)	(62,7 - 68,3)	(55,7 - 62,4)	(53,5 - 60,1)
Los Ríos	43,2	45,2	34,7	37,3	38,2	38,4	42,2	42,7	15,4	30,0	38,3	30,5	36,3	39,8
	(32,6 - 53,8)	(36,3 - 54,2)	(29,7 - 39,6)	(32,2 - 42,4)	(31,7 - 44,8)	(31,4 - 45,3)	(35,1 - 49,3)	(35,0 - 50,3)	(9,8 - 21,1)	(20,6 - 39,4)	(30,5 - 46,1)	(26,4 - 34,6)	(31,8 - 40,9)	(32,7 - 46,9)
Arica y Parinacota	41,4	46,5	46,6	55,6	47,9	52,4	53,9	54,7	37,0	39,7	33,9	51,6	58,4	44,2*
	(34,2 - 48,5)	(39,6 - 53,4)	(42,2 - 50,9)	(51,4 - 59,7)	(42,6 - 53,3)	(47,3 - 57,6)	(48,2 - 59,6)	(49,9 - 59,5)	(27,6 - 46,3)	(29,0 - 50,4)	(24,5 - 43,3)	(45,3 - 57,9)	(52,7 - 64,1)	(28,9 - 59,4)
Ñuble													46,5	43,5
													(40,1 - 52,9)	(40,3 - 46,7)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERCEPCIÓN FACILIDAD DE ACCESO A COCAÍNA

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional	14,2	12,0	25,6	29,3	24,2	27,1	30,8	32,8	21,3	31,8	31,0	28,8	27,6	29,1
	(12,9 - 15,5)	(10,9 - 13,1)	(24,9 - 26,3)	(28,7 - 29,9)	(23,1 - 25,2)	(25,9 - 28,2)	(29,2 - 32,3)	(31,3 - 34,3)	(20,0 - 22,7)	(30,3 - 33,3)	(29,3 - 32,6)	(27,0 - 30,6)	(25,7 - 29,5)	(27,0 - 31,2)
Tarapacá	19,2	21,0	36,1	31,7	29,2	27,8	28,1	28,5	8,9	31,5	50,2	26,1	29,4	36,0*
	(13,9 - 24,5)	(15,1 - 26,9)	(30,8 - 41,3)	(28,1 - 35,3)	(24,0 - 34,4)	(22,4 - 33,1)	(23,5 - 32,6)	(23,9 - 33,1)	(5,1 - 12,7)	(24,1 - 38,9)	(43,6 - 56,8)	(19,3 - 32,9)	(24,3 - 34,4)	(33,4 - 38,7)
Antofagasta	10,7	18,1	22,5	19,0	16,0	19,7	26,7	32,0	27,7	30,7	37,6	32,1	25,8	26,8
	(7,9 - 13,5)	(15,2 - 21,1)	(19,7 - 25,3)	(16,4 - 21,7)	(13,5 - 18,6)	(16,8 - 22,6)	(23,2 - 30,3)	(28,4 - 35,7)	(21,9 - 33,4)	(25,4 - 36,0)	(29,9 - 45,4)	(25,6 - 38,7)	(20,0 - 31,7)	(23,3 - 30,3)
Atacama	13,2	9,5	16,0	15,9	13,5	14,0	19,2	25,1	12,0	24,3	31,1	20,1	21,4	15,5
	(6,5 - 19,9)	(6,4 - 12,5)	(11,7 - 20,2)	(13,6 - 18,3)	(10,6 - 16,3)	(10,6 - 17,5)	(15,3 - 23,2)	(20,9 - 29,2)	(7,6 - 16,3)	(16,5 - 32,2)	(24,0 - 38,2)	(16,7 - 23,6)	(16,6 - 26,2)	(11,0 - 19,9)
Coquimbo	12,3	15,9	16,3	23,2	19,4	17,4	22,1	26,6	20,1	26,3	29,6	23,5	22,1	24,4
	(8,5 - 16,1)	(11,8 - 19,9)	(13,6 - 19,1)	(20,9 - 25,5)	(15,9 - 22,9)	(14,0 - 20,9)	(17,7 - 26,5)	(22,4 - 30,9)	(15,3 - 24,9)	(21,4 - 31,2)	(23,9 - 35,3)	(17,9 - 29,0)	(17,9 - 26,2)	(18,6 - 30,1)
Valparaíso	10,2	9,9	29,8	23,2	21,7	28,8	39,4	32,1	18,3	26,9	25,8	25,8	23,7	25,9
	(8,1 - 12,2)	(7,3 - 12,5)	(27,7 - 31,8)	(21,7 - 24,7)	(18,9 - 24,5)	(26,0 - 31,5)	(35,9 - 42,8)	(28,8 - 35,4)	(15,2 - 21,3)	(22,4 - 31,5)	(22,2 - 29,5)	(21,8 - 29,8)	(20,7 - 26,7)	(22,3 - 29,4)
O'Higgins	7,1	11,5	17,2	19,7	18,3	16,8	25,8	27,8	16,9	27,7	23,4	20,0	22,3	21,4
	(3,7 - 10,5)	(7,2 - 15,8)	(12,1 - 22,2)	(17,4 - 22,1)	(14,5 - 22,0)	(13,2 - 20,3)	(21,7 - 29,9)	(23,9 - 31,6)	(10,6 - 23,2)	(21,9 - 33,5)	(19,4 - 27,4)	(15,7 - 24,4)	(18,7 - 26,0)	(17,0 - 25,8)
Maule	7,0	8,5	11,6	12,0	9,0	13,8	14,7	11,8	7,0	18,2	17,3	14,1	17,5	20,9
	(4,3 - 9,6)	(6,0 - 11,0)	(9,4 - 13,8)	(10,7 - 13,4)	(7,0 - 11,0)	(11,2 - 16,4)	(12,1 - 17,4)	(9,2 - 14,3)	(3,9 - 10,2)	(13,8 - 22,5)	(13,8 - 20,8)	(8,7 - 19,6)	(11,5 - 23,4)	(14,9 - 26,9)
Biobío	6,8	8,8	13,2	18,7	13,1	16,1	18,3	22,3	14,0	27,3	22,9	20,6	18,1	21,3
	(5,0 - 8,5)	(6,8 - 10,9)	(11,6 - 14,7)	(17,5 - 20,0)	(11,1 - 15,1)	(13,9 - 18,3)	(15,9 - 20,7)	(20,1 - 24,6)	(11,8 - 16,3)	(23,8 - 30,9)	(19,4 - 26,4)	(17,2 - 24,0)	(14,3 - 21,8)	(17,6 - 24,9)
La Araucanía	7,5	5,5	11,9	18,7	11,5	13,2	12,7	21,0	7,4	13,1	11,6	13,6	12,7	14,1
	(3,8 - 11,2)	(3,1 - 7,9)	(8,6 - 15,1)	(16,0 - 21,4)	(8,9 - 14,2)	(10,6 - 15,9)	(10,1 - 15,4)	(17,4 - 24,6)	(5,1 - 9,7)	(8,5 - 17,7)	(9,1 - 14,2)	(10,4 - 16,8)	(9,7 - 15,6)	(10,6 - 17,6)
Los Lagos	4,8	2,9	9,5	10,2	4,5	6,3	10,7	12,9	6,3	12,7	9,6	11,6	12,2	17,3*
	(2,1 - 7,4)	(1,1 - 4,6)	(7,2 - 11,9)	(8,2 - 12,2)	(2,8 - 6,2)	(4,3 - 8,2)	(7,5 - 13,9)	(10,1 - 15,7)	(4,3 - 8,4)	(9,4 - 16,1)	(6,3 - 12,8)	(8,2 - 15,1)	(8,7 - 15,6)	(13,4 - 21,2)
Aysén	0,8	2,2	4,9	10,2	3,0	5,4	2,6	4,8	0,6	5,1	5,4	15,9	7,6	12,3*
	(0,0 - 2,3)	(1,2 - 3,3)	(2,4 - 7,4)	(7,6 - 12,7)	(1,9 - 4,2)	(3,8 - 7,0)	(1,6 - 3,5)	(2,4 - 7,1)	(0,0 - 1,4)	(1,8 - 8,3)	(2,9 - 7,9)	(11,8 - 20,0)	(5,0 - 10,2)	(8,6 - 16,0)
Magallanes	4,6	8,7	10,0	9,0	5,0	4,7	5,8	5,5	1,1	1,9	10,3	9,9	8,1	6,6
	(0,0 - 9,7)	(6,9 - 10,6)	(7,1 - 12,8)	(6,6 - 11,4)	(3,5 - 6,6)	(3,1 - 6,4)	(4,1 - 7,5)	(3,1 - 7,9)	(0,0 - 2,5)	(0,0 - 4,0)	(3,6 - 17,0)	(6,1 - 13,6)	(5,8 - 10,4)	(3,6 - 9,5)
Metropolitana	18,6	12,6	30,7	38,0	32,7	35,4	37,7	41,1	28,5	40,2	38,3	37,0	36,1	35,6
	(16,3 - 20,9)	(10,7 - 14,4)	(29,7 - 31,7)	(36,9 - 39,0)	(30,8 - 34,5)	(33,4 - 37,3)	(35,0 - 40,5)	(38,4 - 43,8)	(26,0 - 30,9)	(37,6 - 42,7)	(35,3 - 41,3)	(33,7 - 40,4)	(32,7 - 39,6)	(31,4 - 39,7)
Los Ríos	11,6	10,3	10,2	15,3	6,7	8,8	8,9	15,0	2,0	9,0	16,1	10,9	13,3	11,5
	(4,8 - 18,3)	(5,0 - 15,7)	(7,0 - 13,4)	(11,3 - 19,3)	(3,1 - 10,3)	(5,0 - 12,5)	(4,5 - 13,2)	(8,7 - 21,4)	(0,0 - 4,4)	(4,8 - 13,3)	(8,2 - 23,9)	(8,2 - 13,6)	(9,9 - 16,6)	(6,5 - 16,5)
Arica y Parinacota	23,9	39,2	36,9	36,4	23,4	29,2	29,8	29,0	22,7	28,5	19,5	31,1	31,3	27,3
	(17,7 - 30,1)	(32,2 - 46,1)	(32,7 - 41,1)	(31,9 - 40,9)	(19,0 - 27,8)	(24,6 - 33,8)	(24,1 - 35,5)	(24,7 - 33,4)	(15,2 - 30,2)	(17,8 - 39,3)	(12,9 - 26,1)	(27,1 - 35,2)	(24,7 - 38,0)	(15,9 - 38,6)
Ñuble													19,3	20,4
													(13,6 - 25,0)	(16,7 - 24,2)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

PERCEPCIÓN FACILIDAD DE ACCESO A PASTA BASE

Serie	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Nacional	21,7	20,2	33,5	36,1	32,9	34,6	37,2	35,2	24,6	32,1	31,2	27,2	27,4	28,0
	(20,2 - 23,2)	(18,8 - 21,5)	(32,8 - 34,2)	(35,5 - 36,8)	(31,8 - 34,1)	(33,4 - 35,7)	(35,7 - 38,8)	(33,7 - 36,7)	(23,2 - 26,0)	(30,5 - 33,6)	(29,5 - 32,9)	(25,1 - 29,2)	(25,5 - 29,3)	(25,8 - 30,2)
Tarapacá	48,1	42,6	52,3	50,7	53,6	55,7	46,1	45,5	13,5	30,5	53,1	28,7	32,1	35,6
	(41,0 - 55,1)	(35,1 - 50,1)	(47,0 - 57,5)	(46,6 - 54,9)	(48,1 - 59,1)	(49,7 - 61,7)	(41,0 - 51,3)	(40,4 - 50,5)	(8,7 - 18,2)	(23,3 - 37,8)	(46,4 - 59,8)	(21,7 - 35,7)	(26,9 - 37,2)	(32,2 - 39,0)
Antofagasta	21,5	22,3	28,3	27,1	31,9	34,1	39,7	42,8	31,9	32,6	38,5	33,5	29,9	28,0
	(17,6 - 25,5)	(18,9 - 25,7)	(25,2 - 31,4)	(24,1 - 30,1)	(28,8 - 35,1)	(30,6 - 37,7)	(35,8 - 43,6)	(38,8 - 46,7)	(26,6 - 37,2)	(26,8 - 38,5)	(30,6 - 46,5)	(26,1 - 40,9)	(24,3 - 35,6)	(21,3 - 34,7)
Atacama	25,5	16,0	26,7	24,0	24,7	22,2	31,5	34,4	19,7	29,9	33,4	26,5	26,3	16,4*
	(17,3 - 33,6)	(12,1 - 19,8)	(21,6 - 31,8)	(21,2 - 26,8)	(21,3 - 28,1)	(18,0 - 26,3)	(26,9 - 36,1)	(29,8 - 39,1)	(12,9 - 26,5)	(21,2 - 38,6)	(26,3 - 40,6)	(19,5 - 33,5)	(21,9 - 30,7)	(10,0 - 22,8)
Coquimbo	25,4	24,3	27,5	36,1	30,3	29,4	37,1	37,2	33,1	33,9	28,5	24,1	25,0	30,9
	(20,7 - 30,2)	(19,4 - 29,2)	(23,8 - 31,3)	(33,4 - 38,8)	(26,2 - 34,4)	(25,1 - 33,6)	(31,6 - 42,6)	(32,4 - 42,1)	(27,3 - 38,9)	(27,7 - 40,0)	(22,9 - 34,0)	(18,3 - 30,0)	(20,2 - 29,8)	(26,7 - 35,1)
Valparaíso	10,9	10,8	34,5	28,9	25,5	33,6	44,1	30,8	20,6	25,1	24,1	21,6	22,9	25,8
	(8,8 - 13,0)	(8,7 - 12,9)	(32,4 - 36,6)	(27,3 - 30,5)	(22,6 - 28,4)	(30,8 - 36,4)	(40,6 - 47,6)	(27,6 - 34,1)	(17,1 - 24,0)	(20,7 - 29,5)	(20,4 - 27,9)	(17,5 - 25,6)	(19,9 - 25,9)	(22,0 - 29,7)
O'Higgins	18,8	20,2	21,6	24,0	26,3	24,1	31,7	32,6	21,5	30,5	24,5	25,8	22,9	23,1
	(12,4 - 25,2)	(14,9 - 25,5)	(16,3 - 26,8)	(21,4 - 26,5)	(22,1 - 30,5)	(20,0 - 28,2)	(27,4 - 36,1)	(28,6 - 36,7)	(14,0 - 29,0)	(24,0 - 37,0)	(20,6 - 28,4)	(19,1 - 32,4)	(19,1 - 26,6)	(16,5 - 29,7)
Maule	7,7	10,0	12,6	13,7	13,1	15,4	15,3	10,5	8,5	17,0	15,6	15,2	15,5	14,9
	(4,9 - 10,5)	(7,3 - 12,7)	(10,4 - 14,8)	(12,1 - 15,3)	(10,7 - 15,4)	(12,6 - 18,2)	(12,6 - 17,9)	(8,0 - 13,0)	(5,0 - 12,1)	(13,1 - 20,9)	(12,0 - 19,1)	(10,8 - 19,6)	(9,3 - 21,8)	(11,8 - 18,0)
Biobío	8,2	13,5	17,6	25,3	20,1	23,3	26,6	28,1	24,5	31,3	27,3	22,4	20,3	26,1*
	(6,4 - 10,0)	(11,2 - 15,9)	(15,8 - 19,3)	(24,0 - 26,7)	(17,8 - 22,4)	(20,9 - 25,7)	(24,0 - 29,1)	(25,7 - 30,6)	(20,8 - 28,1)	(27,5 - 35,1)	(23,4 - 31,2)	(18,9 - 25,8)	(16,8 - 23,8)	(21,2 - 31,0)
La Araucanía	7,8	4,6	13,3	20,5	15,1	16,8	13,9	16,5	7,7	10,8	7,7	8,1	9,6	9,0
	(4,3 - 11,2)	(2,4 - 6,7)	(10,1 - 16,5)	(17,7 - 23,4)	(12,0 - 18,1)	(13,8 - 19,8)	(11,2 - 16,7)	(13,0 - 20,0)	(5,1 - 10,2)	(6,6 - 15,0)	(5,5 - 9,9)	(5,4 - 10,8)	(6,9 - 12,3)	(6,2 - 11,8)
Los Lagos	6,0	2,7	10,6	12,2	5,2	7,4	11,5	10,7	6,4	10,9	6,7	8,1	12,0	13,1
	(2,9 - 9,0)	(1,1 - 4,3)	(8,0 - 13,1)	(10,1 - 14,3)	(3,4 - 7,0)	(5,2 - 9,5)	(8,2 - 14,8)	(8,1 - 13,3)	(4,3 - 8,6)	(8,1 - 13,7)	(4,0 - 9,3)	(4,6 - 11,6)	(8,4 - 15,5)	(9,7 - 16,5)
Aysén	0,8	2,2	4,3	11,3	5,0	6,1	3,6	3,1	0,7	4,5	3,7	12,4	4,4	5,6
	(0,0 - 2,3)	(1,2 - 3,2)	(2,2 - 6,4)	(8,6 - 14,0)	(3,5 - 6,4)	(4,5 - 7,8)	(2,3 - 4,8)	(1,3 - 4,9)	(0,0 - 1,7)	(1,4 - 7,7)	(1,7 - 5,6)	(8,1 - 16,6)	(2,3 - 6,4)	(4,8 - 6,4)
Magallanes	3,8	9,6	10,2	8,8	5,7	4,7	6,7	5,5	1,1	1,7	6,9	6,6	5,0	3,7
	(0,0 - 8,6)	(7,6 - 11,6)	(7,4 - 13,1)	(6,5 - 11,0)	(3,9 - 7,4)	(3,0 - 6,4)	(4,8 - 8,5)	(3,5 - 7,5)	(0,0 - 2,5)	(0,0 - 3,8)	(2,3 - 11,5)	(3,1 - 10,2)	(2,9 - 7,2)	(0,0 - 7,6)
Metropolitana	28,6	24,0	40,6	45,1	42,9	42,9	43,3	42,1	30,1	39,7	38,7	33,9	35,1	33,2
	(25,8 - 31,3)	(21,6 - 26,5)	(39,5 - 41,6)	(44,0 - 46,1)	(41,0 - 44,8)	(40,9 - 44,9)	(40,5 - 46,1)	(39,4 - 44,8)	(27,6 - 32,6)	(37,0 - 42,3)	(35,6 - 41,7)	(30,1 - 37,8)	(31,5 - 38,7)	(28,8 - 37,5)
Los Ríos	12,1	20,5	14,6	16,2	13,2	10,8	15,5	17,3	4,4	8,2	15,1	11,7	14,0	13,9
	(5,3 - 18,9)	(12,7 - 28,3)	(10,9 - 18,3)	(12,2 - 20,2)	(8,4 - 18,0)	(6,4 - 15,2)	(10,1 - 20,9)	(10,6 - 23,9)	(1,0 - 7,8)	(4,4 - 12,0)	(7,7 - 22,5)	(8,0 - 15,3)	(10,0 - 17,9)	(9,6 - 18,2)
Arica y Parinacota	47,6	55,6	52,7	54,2	39,8	48,1	49,3	44,8	28,7	28,4	20,1	32,4	32,1	29,1
	(40,4 - 54,9)	(48,9 - 62,3)	(48,4 - 57,1)	(50,0 - 58,4)	(34,6 - 45,1)	(43,0 - 53,3)	(43,5 - 55,1)	(39,9 - 49,6)	(19,5 - 37,9)	(17,8 - 39,1)	(13,2 - 27,1)	(25,9 - 38,9)	(26,3 - 37,9)	(15,7 - 42,6)
Ñuble													19,5	18,9
													(12,2 - 26,7)	(15,4 - 22,5)

*Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.



ANEXO III

Cuestionario Aplicado

CUESTIONARIO

DÉCIMO CUARTO ESTUDIO NACIONAL DE DROGAS EN POBLACIÓN GENERAL DE CHILE

Año 2020

MÓDULO SALUD Y TABACO

ST_1) Hablando de su salud, ¿cómo calificaría Ud. su estado de salud, en general, durante los últimos 12 meses?

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Muy malo
- 2 ☐ Malo
- 3 ☐ Regular
- 4 ☐ Bueno
- 5 ☐ Muy bueno
- 6 ☐ Excelente
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

ST_2) ¿Ha fumado Ud. cigarrillos alguna vez en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. CE_1-MÓDULO CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

ST_3) ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. fumó cigarrillos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

ST_4) ¿Qué edad tenía cuando fumó cigarrillos por primera vez?

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

En años cumplidos

RANGO: 5 A EDAD_KISH

ST_5) ¿Cuándo fue la última vez que fumó cigarrillos? (Respuesta espontánea)SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 3, 88 o 99 PASE A PREG. CE_1-MÓDULO CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

ST_6) Piense solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días ha fumado cigarrillos?SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

Nº de días (de 1 a 30)

ST_7) ¿Más o menos cuántos cigarrillos diarios ha fumado Ud. en estos últimos 30 días? Si fuma irregularmente, considere un día típico

(Encuestador: Anote 888 No sabe, 999 No contesta)

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

RANGO: 0 A 999

Nº de cigarrillos al día

MÓDULO CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

CE_1) ¿Ud. conoce o ha escuchado hablar de los cigarrillos electrónicos? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: "e-cigarettes", vaporizadores o aparatos electrónicos que liberan vapor en vez de humo)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. OH_1-MÓDULO ALCOHOL

CE_2) ¿Ha usado Ud. cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. OH_1-MÓDULO ALCOHOL

CE_3) ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. usó cigarrillos electrónicos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

CE_4) ¿Cuándo fue la última vez que usó cigarrillos electrónicos? (Respuesta espontánea)

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año

Alternativas 2 o 3 PASE A CE_6

- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 88 o 99 PASE A PREG. OH_1-MÓDULO ALCOHOL

CE_5) Piense solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días ha usado cigarrillos electrónicos?

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

Nº de días (de 1 a 30)

CE_6) Respecto a la última vez que Ud. usó cigarrillos electrónicos, ¿sabía Ud. si el dispositivo contenía nicotina?

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 99 ☐ No contesta

CE_7) ¿Tiene Ud. actualmente algún dispositivo de cigarrillo electrónico? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MÓDULO ALCOHOL

OH_1) ¿Ha tomado Ud. alcohol alguna vez en su vida? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: cerveza/malta, chicha, vino/champaña, o licores fuertes)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. MAR_1-MÓDULO MARIHUANA

OH_2) ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. consumió alcohol en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

OH_3) ¿Qué edad tenía cuando consumió por primera vez alcohol? (No considere cuando le dieron a probar de niño)

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

En años cumplidos

RANGO: 5 A EDAD_KISH

OH_4) ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió alcohol? (Respuesta espontánea)

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año

Alternativa 2 PASE A PREG. OH_8

- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 3, 88 o 99 PASE A PREG. MAR_1-MÓDULO MARIHUANA

OH_5) Pensando solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días del mes ha tomado algún tipo de alcohol?SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

Nº de días (de 1 a 30)

OH_6) Durante los últimos 30 días, ¿qué tipo de bebida alcohólica tomó con más frecuencia?

(Respuesta espontánea, única)

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Cerveza
- 2 ☐ Vino, champaña u otros espumantes
- 3 ☐ Licores, destilados o combinados (Encuestador: pisco, ron, whisky, vodka, aguardiente u otro)
- 4 ☐ Otro
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

OH_7) Pensando en los últimos 30 días:SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año NuevoSI {SEXO_ENCUESTADO} = 1. Hombre: **¿Cuántas veces tomó 5 o más tragos en una sola ocasión?** Entendiendo que 5 tragos son:

- 5 latas de cerveza (Encuestador: 1.600 ml de cerveza aprox.)
- 5 copas de vino (Encuestador: 700 ml de vino aprox.)
- 5 combinados suaves o 3 combinados fuertes (Encuestador: 200 ml de ron, pisco, vodka u otro licor aprox.)

SI {SEXO_ENCUESTADO} = 2. Mujer: **¿Cuántas veces tomó 4 o más tragos en una sola ocasión?** Entendiendo que 4 tragos son:

- 4 latas de cerveza (Encuestador: 1.600 ml de cerveza aprox.)
- 4 copas de vino (Encuestador: 700 ml de vino aprox.)
- 4 combinados suaves o un poco menos de 3 combinados fuertes (Encuestador: 200 ml de ron, pisco, vodka u otro licor aprox.)

(Encuestador: Por "ocasión" nos referimos a un mismo momento, por ejemplo, en un período de dos horas) (Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

RANGO: 0 A 99

Nº de veces: **OH_8) ¿Qué tan seguido toma usted alguna bebida alcohólica?** (Respuesta espontánea)

Nunca	1 vez al mes o menos	2 a 4 veces al mes	2 a 3 veces a la semana	4 o más veces a la semana
0	1	2	3	4

OH_9) ¿Cuántos tragos suele tomar usted en un día típico de consumo de alcohol? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Leer)

POR UN TRAGO SE ENTENDERÁ

Una botella o lata individual de cerveza (Encuestador: 333 cc)

Un vaso de vino (Encuestador: 140 cc)

Un trago de licor solo o combinado (Encuestador: 40 cc, pisco, ron vodka, whisky)

POR 6 TRAGOS SE ENTENDERÁ

Una botella de vino (Encuestador: 750 cc)

POR 18 TRAGOS SE ENTENDERÁ

Una botella de licor (Encuestador: 750 cc)

0 a 2 tragos	3 a 4 tragos	5 a 6 tragos	7 a 9 tragos	10 o más tragos
0	1	2	3	4

OH_10) ¿Qué tan seguido toma usted 6 o más tragos en una sola ocasión?

(Encuestador: Leer escala)

Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	Todos o casi todos los días
0	1	2	3	4

OH_11) Y con la misma escala, ¿qué tan seguido, en el curso de los últimos 12 meses, usted no pudo parar de beber una vez que había empezado?

Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	Todos o casi todos los días
0	1	2	3	4

OH_12) ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos 12 meses, su consumo de alcohol alteró el desempeño de sus actividades normales?

Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	Todos o casi todos los días
0	1	2	3	4

OH_13) ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos 12 meses, usted necesitó beber en la mañana para recuperarse de haber bebido mucho el día anterior?

Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	Todos o casi todos los días
0	1	2	3	4

OH_14) ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos 12 meses, usted tuvo remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido?

Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	Todos o casi todos los días
0	1	2	3	4

OH_15) ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos 12 meses, usted no fue capaz de recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo?

Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	Todos o casi todos los días
0	1	2	3	4

OH_16) ¿Usted o alguna otra persona ha resultado físicamente herido debido a que usted había bebido alcohol?

(Respuesta espontánea)

(Encuestador: Si responde sí, sondear)

No	Sí, pero no en el último año	Sí, en el último año
0	2	4

OH_17) ¿Algún familiar, amigo, médico u otro profesional de la salud ha mostrado preocupación por la forma en que usted consume bebidas alcohólicas o le ha sugerido que deje de beber? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Si responde sí, sondear)

No	Sí, pero no en el último año	Sí, en el último año
0	2	4

OH_18) Pensando en los últimos 30 días, ¿ha comprado alcohol en alguno de los siguientes lugares?

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

1. Bares, pubs o discotecas	
2. Restaurantes	
3. Botillerías/licorerías	
4. Supermercados	
5. Servicentros	
6. Otro lugar	
7. Ninguno de los anteriores	

OH_19) Durante los últimos 30 días, ¿ha comprado alcohol en alguno de los siguientes lugares?

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

1. Ferias libres o mercados	
2. Fiestas particulares	
3. Locales "clandestinos"	
4. Delivery (Encuestador: reparto o entrega)	
5. Productores artesanales	
6. Otro lugar	
7. Ninguno de los anteriores	

OH_I. PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**OH_20) ¿Ha dejado de cumplir sus deberes en la casa, en el trabajo o donde estudia a causa del alcohol?** (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como descuidar a los niños, faltar al trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en el estudio, o perder el empleo)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

OH_21) ¿Ha puesto en peligro su integridad física a causa del consumo recurrente de alcohol? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como, por ejemplo, ha estado a punto de chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

OH_22) ¿Ha hecho algo bajo los efectos del alcohol que pudiera causarle problemas con la autoridad pública o con la ley? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como conducir vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

OH_23) ¿Ha tenido algún problema o han aumentado los problemas con su familia o amigos a causa de su consumo de alcohol? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Por ejemplo, discusiones serias o violencia)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MÓDULO MARIHUANA

MAR_1) ¿Ha probado Ud. marihuana alguna vez en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. PB_1-MÓDULO PASTA BASE

MAR_2) ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. consumió marihuana en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_3) ¿Qué edad tenía cuando probó marihuana por primera vez?

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

En años cumplidos

RANGO: 5 A EDAD_KISH

MAR_4) ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió marihuana? (Respuesta espontánea)

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año

Alternativa 2 PASE A PREG. MAR_7

- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 3, 88 o 99 PASE A PREG. PB_1 - MÓDULO PASTA BASE

MAR_5) Pensando solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días del mes ha consumido marihuana?

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

Nº de días (de 1 a 30)

MAR_6) ¿Cuántos cigarros de marihuana consume Ud. al mes? Considere su consumo habitual

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Anote 888 No sabe, 999 No contesta)

RANGO: 0 A 999

Nº de cigarros

MAR_7) ¿Qué tipo de marihuana consumió con mayor frecuencia? (Respuesta única)

(Encuestador: Leer alternativas)

- 1 ☐ Marihuana prensada o "paraguaya"
- 2 ☐ Marihuana verde o yerba
- 3 ☐ Marihuana verde o yerba de "autocultivo"
- 4 ☐ Marihuana *skunk* o de alta potencia (marihuana "cripy o creepy")
- 5 ☐ Marihuana *skunk* o de alta potencia de "autocultivo"
- 88 ☐ No sabe (No leer)
- 99 ☐ No contesta (No leer)

MAR_I. PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**MAR_8) Respecto a problemas como:**

- * Ansiedad, irritabilidad (Encuestador: inquietud)
- * Estrés (Encuestador: depresión)
- * Náuseas (Encuestador: vómitos)
- * Problemas de concentración, fatiga o insomnio (Encuestador: somnolencia/debilidad)
- * Percepción de cosas inexistentes (Encuestador: sentir, ver u oír)
- * Taquicardia o temblores

¿Ha consumido marihuana para eliminar problemas como estos o para evitar que se presentaran?

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_9) ¿Ha presentado estos problemas cuando suspendía o disminuía el consumo de marihuana?

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_10) ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar marihuana que no pudo resistir o pensar en nada más? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_11) ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con marihuana ha consumido mayor cantidad que antes? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_12) ¿Ha notado que la misma cantidad de marihuana tiene menos efecto en Ud. que antes? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_13) ¿Ha consumido marihuana a pesar de que tenía la intención de no hacerlo? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_14) ¿Ha terminado consumiendo marihuana en mayores cantidades de lo que Ud. pensó? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_15) ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de marihuana? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_16) ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir marihuana, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_17) ¿Ha continuado consumiendo marihuana a pesar de que le ocasione problemas de salud física, emocionales o nerviosos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_12. PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CONTINÚE PENSANDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

MAR_18) ¿Ha dejado de cumplir sus deberes en la casa, en el trabajo o donde estudia a causa de la marihuana?

(Encuestador: Como descuidar a los niños, faltar al trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en el estudio, o perder el empleo)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_19) ¿Ha puesto en peligro su integridad física a causa del consumo recurrente de marihuana?

(Encuestador: Como, por ejemplo, ha estado a punto de chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_20) ¿Ha hecho algo bajo los efectos de la marihuana que pudiera causarle problemas con la autoridad pública o con la ley?

(Encuestador: Como conducir vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_21) ¿Ha tenido algún problema o han aumentado los problemas con su familia o amigos a causa de su consumo de marihuana?

(Encuestador: Por ejemplo: discusiones serias o violencia)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_22) Piense en los últimos 12 meses, ¿ha consumido marihuana por una vía distinta a la fumada? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativa 2, 88 o 99 PASE A PREG. PB_1-MÓDULO PASTA BASE

MAR_23) Piense en los últimos 12 meses, ¿ha consumido marihuana por alguna de las siguientes vías (cigarrillos, pitos, pipas o bongs)? (Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

- 1 ☐ Fumada en cigarrillos, pitos, pipas o bongs
- 2 ☐ Vaporizada en dispositivos electrónicos
- 3 ☐ En pomadas en base de aceite de cáñamo o en base a semillas de cannabis (Encuestador: uso tópico)
- 4 ☐ En pomadas de aceite en base a planta de cannabis (Encuestador: uso tópico)
- 5 ☐ Uso oral o sublingual de aceite de cáñamo o de semillas de cannabis
- 6 ☐ Uso oral o sublingual de aceite en base a planta de cannabis
- 7 ☐ Comestible elaborado a partir de semillas de cannabis (Encuestador: queques, galletas, brownies u otros).
- 8 ☐ Comestible elaborado a partir de plantas de cannabis (Encuestador: queques, galletas, brownies u otros).
- 9 ☐ Ingerida en infusiones en agua, té, leche o derivados lácteos
- 10 ☐ Otro, especifique
- 88 ☐ No sabe (No leer)
- 99 ☐ No contesta (No leer)

MÓDULO PASTA BASE

PB_1) ¿Ha probado Ud. pasta base alguna vez en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. COC_1-MÓDULO COCAÍNA

PB_2) ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. consumió pasta base en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_3) ¿Qué edad tenía cuando probó pasta base por primera vez?

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

En años cumplidos

RANGO: 5 A EDAD_KISH

PB_4) ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió pasta base? (Respuesta espontánea)

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año

Alternativa 2 PASE A PREG. PB_6

- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 3, 88 o 99 PASE A PREG. COC_1-MÓDULO COCAÍNA

PB_5) Pensando solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días del mes ha consumido pasta base?

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

Nº de días (de 1 a 30)

PB_I. PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**PB_6) Respecto a problemas como:**

- * Ansiedad, irritabilidad (Encuestador: inquietud)
- * Estrés (Encuestador: depresión)
- * Náuseas (Encuestador: vómitos)
- * Problemas de concentración, fatiga o insomnio (Encuestador: somnolencia/debilidad)
- * Percepción de cosas inexistentes (Encuestador: sentir, ver u oír)
- * Taquicardia o temblores

¿Ha consumido pasta base para eliminar problemas como estos o para evitar que se presentaran?

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_7) ¿Ha presentado estos problemas cuando suspendía o disminuía el consumo de pasta base?

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_8) ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar pasta base que no pudo resistir o pensar en nada más? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_9) ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con pasta base ha consumido mayor cantidad que antes?

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_10) ¿Ha notado que la misma cantidad de pasta base tiene menos efecto en Ud. que antes? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_11) ¿Ha consumido pasta base a pesar de que tenía la intención de no hacerlo? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_12) ¿Ha terminado consumiendo pasta base en mayores cantidades de lo que Ud. pensó? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_13) ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de pasta base? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_14) ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir pasta base, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_15) ¿Ha continuado consumiendo pasta base a pesar de que le ocasione problemas de salud física, emocionales o nerviosos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_12. PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, CONTINÚE PENSANDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**PB_16) ¿Ha dejado de cumplir sus deberes en la casa, en el trabajo o donde estudia a causa de la pasta base?**

(Encuestador: Como descuidar a los niños, faltar al trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en el estudio, o perder el empleo)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_17) ¿Ha puesto en peligro su integridad física a causa del consumo recurrente de pasta base?

(Encuestador: Como, por ejemplo, ha estado a punto de chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_18) ¿Ha hecho algo bajo los efectos de la pasta base que pudiera causarle problemas con la autoridad pública o con la ley?

(Encuestador: Como conducir vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_19) ¿Ha tenido algún problema o han aumentado los problemas con su familia o amigos a causa de su consumo de pasta base?

(Encuestador: Por ejemplo, discusiones serias o violencia)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MÓDULO COCAÍNA

COC_1) ¿Ha probado Ud. cocaína alguna vez en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. TRANS_1-MÓDULO TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA

COC_2) ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. consumió cocaína en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_3) ¿Qué edad tenía cuando probó cocaína por primera vez?

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

En años cumplidos

RANGO: 5 A EDAD_KISH

COC_4) ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió cocaína? (Respuesta espontánea)

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año

Alternativa 2 PASE A PREG. COC_6

- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 3, 88 o 99 PASE A PREG. TRANS_1-MÓDULO TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA

COC_5) Pensando solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días del mes ha consumido cocaína?

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

Nº de días (de 1 a 30)

COC_I. PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**COC_6) Respecto a problemas como:**

- * Ansiedad, irritabilidad (Encuestador: inquietud)
- * Estrés (Encuestador: depresión)
- * Náuseas (Encuestador: vómitos)
- * Problemas de concentración, fatiga o insomnio (Encuestador: somnolencia/debilidad)
- * Percepción de cosas inexistentes (Encuestador: sentir, ver u oír)
- * Taquicardia o temblores

¿Ha consumido cocaína para eliminar problemas como estos o para evitar que se presentaran?

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_7) ¿Ha presentado estos problemas cuando suspendía o disminuía el consumo de cocaína?

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_8) ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar cocaína que no pudo resistir o pensar en nada más? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_9) ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con cocaína ha consumido mayor cantidad que antes?

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_10) ¿Ha notado que la misma cantidad de cocaína tiene menos efecto en Ud. que antes? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_11) ¿Ha consumido cocaína a pesar de que tenía la intención de no hacerlo? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_12) ¿Ha terminado consumiendo cocaína en mayores cantidades de lo que Ud. pensó? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_13) ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de cocaína? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_14) ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir cocaína, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_15) ¿Ha continuado consumiendo cocaína a pesar de que le ocasione problemas de salud física, emocionales o nerviosos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_12. PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, CONTINÚE PENSANDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**COC_16) ¿Ha dejado de cumplir sus deberes en la casa, en el trabajo o donde estudia a causa de la cocaína?**

(Encuestador: Como descuidar a los niños, faltar al trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en el estudio, o perder el empleo)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_17) ¿Ha puesto en peligro su integridad física a causa del consumo recurrente de cocaína?

(Encuestador: Como, por ejemplo, ha estado a punto de chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_18) ¿Ha hecho algo bajo los efectos de la cocaína que pudiera causarle problemas con la autoridad pública o con la ley?

(Encuestador: Como conducir vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_19) ¿Ha tenido algún problema o han aumentado los problemas con su familia o amigos a causa de su consumo de cocaína?

(Encuestador: Por ejemplo, discusiones serias o violencia)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MÓDULO TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA

TRANS_1) ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes tranquilizantes sin receta médica alguna vez en su vida?

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

- 1 ☐ Alprazolam, Zotrán, Ativán o Adox
- 2 ☐ Valium o Diazepam
- 3 ☐ Clonazepam, Ravotril o Valpax
- 4 ☐ Lorazepam o Amparax
- 5 ☐ Clordiazepóxido
- 6 ☐ Bromazepam
- 7 ☐ Zopiclona, Zolpidem o Somno
- 8 ☐ Dormonid o Midazolam
- 9 ☐ Rohypnol, Flunitrazepam o Ipnopen
- 10 ☐ Ninguna de las anteriores

TRANS_1: Alternativa 10 PASE A PREG. ANALG_1-MÓDULO ANALGÉSICOS SIN RECETA MÉDICA

TRANS_2) ¿Cuándo fue la última vez que consumiô sin receta médica...? (Respuesta espontánea)

SI LA FECHA ES ≥ A 01/01/2021 Y ≤ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LOS MEDICAMENTOS TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1. Alprazolam, Zotrán, Ativán o Adox					
2. Valium o Diazepam					
3. Clonazepam, Ravotril o Valpax					
4. Lorazepam o Amparax					
5. Clordiazepóxido					
6. Bromazepam					
7. Zopiclona, Zolpidem o Somno					
8. Dormonid o Midazolam					
9. Rohypnol, Flunitrazepam o Ipnopen					

TRANS_2: Si declara 1 o 2 en al menos una droga, PASE A TRANS_3

Si declara 3, 88 ó 99 en TODAS las drogas, PASE A ANALG_1

TRANS_3. Piense en la última vez que Ud. consumió tranquilizantes sin receta médica, ¿cómo lo consiguió? (Respuesta espontánea, única)

- 1 ☐ Lo compré en una farmacia con una receta médica de otra persona
- 2 ☐ Lo compré en una feria libre o mercado
- 3 ☐ Lo compré por internet
- 4 ☐ Me lo pasó mi conviviente/pareja, un familiar y/o amigo/a
- 5 ☐ Me lo pasaron en el consultorio
- 6 ☐ Estaba en mi casa y lo tomé
- 7 ☐ Lo conseguí de otra forma
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

TRANS_4) Piense en la última vez que Ud. consumió tranquilizantes sin receta médica, ¿por qué consumió estos fármacos? (Respuesta espontánea, única)

(Encuestador: Nombre razón principal)

- 1 ☐ Para inducir el sueño, problemas de insomnio
- 2 ☐ Para relajarme, bajar la ansiedad
- 3 ☐ Porque me he sentido triste o deprimido/a
- 4 ☐ Para hacer frente a estados de tensión y/o estrés
- 5 ☐ Para enfrentar momentos difíciles o situaciones de tensión
- 6 ☐ Para disminuir efectos secundarios de otro medicamento (me lo tomé para contrarrestar sus efectos)
- 7 ☐ Para probar o experimentar
- 8 ☐ Otra razón
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MÓDULO ANALGÉSICOS SIN RECETA MÉDICA

ANALG_1) ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes analgésicos sin receta médica alguna vez en su vida?

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

- 1 ☐ Tramal o Tramadol
- 2 ☐ Codeína
- 3 ☐ Morfina
- 4 ☐ Metadona
- 5 ☐ Petidina
- 6 ☐ Fentanilo
- 7 ☐ OxyContin
- 8 ☐ Vicodin
- 9 ☐ Ninguna de las anteriores

ANALG_1: Alternativa 9 PASE A PREG. OD_1-MÓDULO OTRAS DROGAS

ANALG_2) ¿Cuándo fue la última vez que consumió sin receta médica...? (Respuesta espontánea)

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LOS MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS SIN RECETA MÉDICA QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1. Tramal o Tramadol					
2. Codeína					
3. Morfina					
4. Metadona					
5. Petidina					
6. Fentanilo					
7. OxyContin					
8. Vicodin					

ANALG_2: Si declara 1 o 2 en al menos una droga, PASE A ANALG_3.

Si declara 3, 88 o 99 en TODAS las drogas, PASE A OD_1

ANALG_3) Piense en la última vez que Ud. consumió analgésicos sin receta médica, ¿cómo lo consiguió? (Respuesta espontánea, única)

- 1 ☐ Lo compré en una farmacia con una receta médica de otra persona
- 2 ☐ Lo compré en una feria libre o mercado
- 3 ☐ Lo compré por internet
- 4 ☐ Me lo pasó mi conviviente/pareja, un familiar y/o amigo/a
- 5 ☐ Me lo pasaron en el consultorio
- 6 ☐ Estaba en mi casa y lo tomé
- 7 ☐ Lo conseguí de otra forma
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

ANALG_4) Piense en la última vez que Ud. consumió analgésicos sin receta médica, ¿por qué consumió estos fármacos?

(Encuestador: Nombre razón principal) (Respuesta espontánea, única)

- 1 ☐ Para inducir el sueño, problemas de insomnio, relajarme o bajar la ansiedad
- 2 ☐ Porque me he sentido triste o deprimido/a
- 3 ☐ Para manejo de dolor agudo por una lesión muscular, articular y/o dental
- 4 ☐ Para manejo de dolor persistente por enfermedad crónica (por ejemplo, cáncer, artritis, etc.)
- 5 ☐ Para enfrentar momentos difíciles o situaciones de tensión y/o estrés
- 6 ☐ Para disminuir efectos secundarios de otro medicamento (me lo tomé para contrarrestar sus efectos)
- 7 ☐ Para probar o experimentar
- 8 ☐ Otra razón
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MÓDULO OTRAS DROGAS

OD_1) ¿Ha probado Ud. alguna de las siguientes drogas alguna vez en su vida?

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

- 1 ☐ Hachís
- 2 ☐ Marihuana sintética o cannabinoides sintéticos (Encuestador: Spice, K2)
- 3 ☐ Éxtasis o MDMA
- 4 ☐ Mefedrona, Metilona o Sales de baño (Encuestador: catinonas sintéticas o MDPV)
- 5 ☐ Heroína
- 6 ☐ DMT o Foxy (Encuestador: triptaminas o acetilpsilocina)
- 7 ☐ Crack
- 8 ☐ Ninguna de las anteriores

Alternativa 8 PASE A PREG. OD_3

OD_2) ¿Cuándo fue la última vez que consumió...? (Respuesta espontánea)

SI LA FECHA ES ≥ A 01/01/2021 Y ≤ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LAS DROGAS QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1. Hachís					
2. Marihuana sintética o cannabinoides sintéticos (Encuestador: Spice, K2)					
3. Éxtasis o MDMA					
4. Mefedrona, Metilona o Sales de baño (Encuestador: Catinonas sintéticas o MDPV)					
5. Heroína					
6. DMT o Foxy (Encuestador: Triptaminas o acetilpsilocina)					
7. Crack					

OD_3) ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes medicamentos estimulantes sin receta médica alguna vez en su vida?

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

- 1 ☐ Anfetaminas
- 2 ☐ Cidrín
- 3 ☐ Modafinilo o Mentix
- 4 ☐ Metilfenidato como Ritalin o Aradix (Encuestador: Concerta o Ritrocel)
- 5 ☐ Escancil
- 6 ☐ Pemolina (Encuestador: Cylert)
- 7 ☐ Anfeparamona o Fenproporex (Encuestador: Salcal)
- 8 ☐ Ninguna de las anteriores

Alternativa 8 PASE A PREG. OD_5

OD_4) ¿Cuándo fue la última vez que consumió sin receta médica...? (Respuesta espontánea)SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LOS MEDICAMENTOS ESTIMULANTES QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1. Anfetaminas					
2. Cidrín					
3. Modafinilo o Mentix					
4. Metilfenidato como Ritalin o Aradix (Encuestador: Concerta o Ritrocel)					
5. Escancil					
6. Pemolina (Encuestador: Cylert)					
7. Anfeparamona o Fenproporex (Encuestador: Salcal)					

OD_5) ¿Ha probado Ud. alguna de las siguientes metanfetaminas alguna vez en su vida?

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

- 1 ☐ Meth, Crystal o Speed (Encuestador: Hielo, Ice o Glass).
- 2 ☐ Cristina, Anteta o Crack Mexicano (Encuestador: Polvo amarillo, Batú, Cris, Tina, Ya-Ba)
- 3 ☐ Ninguna de las anteriores

Alternativa 3 PASE A PREG. OD_7

OD_6) ¿Cuándo fue la última vez que consumió...? (Respuesta espontánea)

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LAS METANFETAMINAS QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1. Meth, Crystal o Speed (Encuestador: Hielo, Ice o Glass)					
2. Cristina, Anteta o Crack Mexicano (Encuestador: Polvo amarillo, Batú, Cris, Tina, Ya-Ba)					

OD_7) ¿Ha probado Ud. alguna de las siguientes sustancias inhalables alguna vez en su vida?

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

- 1 ☐ Neoprén
- 2 ☐ Bencina o parafina
- 3 ☐ Tolueno
- 4 ☐ Desodorantes ambientales o corporales
- 5 ☐ Pinturas en spray
- 6 ☐ Acetona
- 7 ☐ Éter u otros solventes volátiles (Encuestador: como los usados en pinturas)
- 8 ☐ Poppers
- 9 ☐ Solventes para extintores de incendios
- 10 ☐ Cloruro de etilo
- 11 ☐ Ninguna de las anteriores

Alternativa 11 PASE A PREG. OD_9

OD_8) ¿Cuándo fue la última vez que consumió...? (Respuesta espontánea)

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LAS SUSTANCIAS INHALABLES QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1. Neoprén					
2. Bencina o parafina					
3. Tolueno					
4. Desodorantes ambientales o corporales					
5. Pinturas en spray					
6. Acetona					
7. Éter u otros solventes volátiles (Encuestador: como los usados en pinturas)					
8. Poppers					
9. Solventes para extintores de incendios					
10. Cloruro de etilo					

OD_9) ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes alucinógenos alguna vez en su vida?

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

- 1 ☐ LSD, tripi, sello u otros ácidos
- 2 ☐ Polvo de ángel
- 3 ☐ 25B-NBOMe o 25C-NBOMe
- 4 ☐ 2-CB o Tusi
- 5 ☐ Peyote, San Pedro
- 6 ☐ Floripondio
- 7 ☐ Hongos o Cucumelo
- 8 ☐ Mescalina
- 9 ☐ Belladona
- 10 ☐ Ayahuasca
- 11 ☐ Ninguna de las anteriores

Alternativa 11 PASE A PREG. OD_11

OD_10) ¿Cuándo fue la última vez que consumió...? (Respuesta espontánea)SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LOS ALUCINÓGENOS QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1. LSD, tripi, sello u otros ácidos					
2. Polvo de ángel					
3. 25B-NBOMe o 25C-NBOMe					
4. 2-CB o Tusi					
5. Peyote, San Pedro					
6. Floripondio					
7. Hongos o Cucumelo					
8. Mescalina					
9. Belladona					
10. Ayahuasca					

OD_11) ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes medicamentos sin receta médica alguna vez en su vida?

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

- 1 ☐ Fluoxetina (Encuestador: Pragmaten o Sostac)
- 2 ☐ Codetol, Tosilab o Flemex (Encuestador: Tusigen, Sedopec)
- 3 ☐ Clormezanona
- 4 ☐ Sedantol
- 5 ☐ Dietilpropión o Fentermina (Encuestador: Elvenir o Sentis)
- 6 ☐ Ninguna de las anteriores

Alternativa 6 PASE A PREG. OD_13

OD_12) ¿Cuándo fue la última vez que consumió sin receta médica...? (Respuesta espontánea)SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LOS MEDICAMENTOS SIN RECETA MÉDICA QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1. Fluoxetina (Encuestador: Pragmaten o Sostac)					
2. Codetol, Tosilab o Flemex (Encuestador: Tusigen, Sedopec)					
3. Clormezanona					
4. Sedantol					
5. Dietilpropión o Fentermina (Encuestador: Elvenir o Sentis)					

OD_13) ¿Ha probado Ud. alguna de las siguientes sustancias alguna vez en su vida?

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

- 1 ☐ Bebidas Energéticas (Encuestador: Battery, Red Bull, Dark Dog, etc.)
- 2 ☐ Bebida Energética combinada con Alcohol
- 3 ☐ Sibutramina
- 4 ☐ Tonaril sin receta médica (Encuestador: Trihexifenidilo)
- 5 ☐ Anabólicos
- 6 ☐ Esteroides
- 7 ☐ Ketamina (Encuestador: "el key", vitamina K o CK)
- 8 ☐ GHB o GLB
- 9 ☐ PCP (Encuestador: Fenciclidina)
- 10 ☐ BZP (Encuestador: Benzilpiperazina)
- 11 ☐ GBL (Encuestador: Gammabutirolactona)
- 12 ☐ Ninguna de las anteriores

Alternativa 12 PASE A PREG. OD_15

OD_14) ¿Cuándo fue la última vez que consumió...? (Respuesta espontánea)SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2021 Y $\leq$ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LAS SUSTANCIAS QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1. Bebidas Energéticas (Encuestador: Battery, Red Bull, Dark Dog, etc.)					
2. Bebida Energética combinada con Alcohol					
3. Sibutramina					
4. Tonaril sin receta médica (Encuestador: Trihexifenidilo)					
5. Anabólicos					
6. Esteroides					
7. Ketamina (Encuestador: "el key", vitamina K o CK)					
8. GHB o GLB					
9. PCP (Encuestador: Fenciclidina)					
10. BZP (Encuestador: Benzilpiperazina)					
11. GBL (Encuestador: Gammabutirolactona)					

OD_15) ¿Alguna vez en su vida se ha inyectado alguna droga o sustancia? ¿Cuál/es? (Respuesta múltiple, espontánea)

(Encuestador: Anote la droga en el espacio) (PREGUNTA ABIERTA)

- 1
- 2
- 3
- 4 ☐ Ninguna

Alternativa 4 PASE A PREG CC_1 MÓDULO CONSUMO Y CONDUCCIÓN

OD_16) ¿Cuándo fue la última vez que se inyectó esa droga o sustancia? (Respuesta espontánea)

SI LA FECHA ES ≥ A 01/01/2021 Y ≤ 31/01/2021, no considere celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LAS DROGAS INYECTADAS QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1.					
2.					
3.					

MÓDULO CONSUMO Y CONDUCCIÓN

RESPONDEN SÓLO PERSONAS DE 17 AÑOS O MÁS

CC_1) ¿Tiene licencia de conducir? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. VIO_1-MÓDULO VIOLENCIA EN LA PAREJA

CC_2) Durante los últimos 12 meses, ¿ha manejado algún vehículo después de haber consumido alcohol (independiente de la cantidad consumida)? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

CC_3) Durante los últimos 12 meses, ¿ha manejado algún vehículo después de haber consumido marihuana? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

CC_4) Durante los últimos 12 meses, ¿ha manejado algún vehículo después de haber consumido otra droga sea lícita o ilícita (como cocaína, éxtasis, tranquilizantes, estimulantes u otra)? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí, especifique droga
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MÓDULO VIOLENCIA EN LA PAREJA

VIO_1) ¿Tiene usted pareja actualmente?

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No

Alternativa 2 PASE A SG_1 MÓDULO SALUD GENERAL

VIO_2) ¿Alguna vez su pareja actual... (Respuesta espontánea)

	1. Sí	2. No	88. No sabe	99. No contesta
1. le ha gritado, insultado o humillado?				
2. controla o ha controlado la mayor parte de sus actividades?				
3. le ha amenazado con pegarle?				
4. le ha amenazado con matarlo/a?				
5. le ha empujado, arrinconado o tirado el pelo?				
6. le ha golpeado?				
7. le ha tirado cosas que pudiera herirla/o?				
8. no le ha permitido manejar dinero?				
9. se ha negado alguna vez a darle dinero para los gastos del hogar, aun cuando él/ella tiene dinero para otras cosas?				
10. no le ha permitido tomar decisiones respecto de los gastos de la casa, él/ella define en qué se gasta el dinero sin considerar su opinión?				

VIO_3) ¿Usted considera que su pareja tiene problemas con el consumo de...? (Respuesta única)

(Encuestador: Por ejemplo, si ha dejado de cumplir deberes en la casa, en el trabajo o donde estudia; si ha puesto en peligro su integridad física a causa del consumo recurrente; si ha hecho algo bajo los efectos de la sustancia que pudiera causarle problemas con la autoridad pública; si ha tenido algún problema o han aumentado los problemas con su familia o amigos a causa de su consumo)

(Encuestador: Leer alternativas)

- 1 ☐ Alcohol
- 2 ☐ Drogas como marihuana, cocaína, pasta base u otra droga ilícita
- 3 ☐ Alcohol y otras drogas
- 4 ☐ No tiene problemas de consumo

MÓDULO SALUD GENERAL

SG_1) Nos gustaría saber si usted ha tenido algunas molestias y/o trastornos y cómo ha estado de salud en las últimas semanas. Queremos saber los problemas recientes y actuales, no los del pasado.

Para las preguntas siguientes piense en las últimas semanas:

	Más que lo habitual [0]	Igual que lo habitual [1]	Menos que lo habitual [2]	Mucho menos que lo habitual [3]
2. ¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho sueño? (Encuestador: Leer escala)				
Y, utilizando la misma escala:				
3. ¿Ha sentido que está jugando un papel útil en la vida?				
4. ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones?				
7. ¿Ha sido capaz de disfrutar sus actividades normales cada día?				
8. ¿Ha sido capaz de hacer frente a sus problemas?				

	No, en absoluto [0]	No más que lo habitual [1]	Bastante más que lo habitual [2]	Mucho más [3]
5. Y, ¿se ha sentido constantemente agobiado/a o en tensión? (Encuestador: Leer escala)				
Y, utilizando la misma escala:				
6. ¿Ha sentido que no puede superar sus dificultades?				
9. ¿Se ha sentido poco feliz y deprimido/a?				
10. ¿Ha perdido confianza en sí mismo?				
11. ¿Ha pensado que usted es una persona que no vale para nada?				

	Mejor que lo habitual [0]	Igual que lo habitual [1]	Menos que lo habitual [2]	Mucho menos que lo habitual [3]
1. ¿Ha podido concentrarse bien en lo que hace? (Encuestador: Leer escala)				

	Más feliz que lo habitual [0]	Aproximadamente lo mismo que lo habitual [1]	Menos feliz que lo habitual [2]	Mucho menos que lo habitual [3]
12. ¿Se siente razonablemente feliz considerando todas las circunstancias? (Encuestador: Leer escala)				

MÓDULO COVID-19

COVID_1) Durante los últimos 6 meses, ¿ha estado en alguna de las siguientes situaciones como consecuencia de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19?

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

- 1 ☐ Trabaja/estudia desde casa
- 2 ☐ Niños que estudian en casa/mantener a los niños de preescolar, básica o media en casa fuera del jardín o colegio
- 3 ☐ Permanecer aislado/a en su vivienda debido a pertenecer a población de riesgo a COVID-19
- 4 ☐ Permanecer aislado/a en su vivienda debido a la vulnerabilidad de algún miembro de su vivienda al COVID-19
- 5 ☐ Cuarentena obligatoria
- 6 ☐ Ingresado/a en hospital o clínica
- 7 ☐ Salió de su vivienda para trabajar o a buscar trabajo
- 8 ☐ Otra, especifique
- 9 ☐ Ninguna

Alternativa 9 PASE A PREG TRATA_1

COVID_2) Respecto de aquellas situaciones mencionadas que ha estado como consecuencia de la emergencia originada por el COVID-19, ¿Podría indicarme cuanto tiempo duró aproximadamente esa situación?

(Encuestador: Si hubo interrupciones, por favor, sume el tiempo que duró dicha situación en los últimos seis meses y marque la alternativa que más se aproxime a su realidad.)

(Encuestador: Leer escala sólo para la primera afirmación)

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LAS SITUACIONES QUE HA VIVIDO.

	1. Unos pocos días	2. Una a dos semanas	3. Tres a cuatro semanas	4. Uno a dos meses	5. Tres a cuatro meses	6. Cinco a seis meses
1. Trabaja/estudia desde casa						
2. Niños que estudian en casa/mantener a los niños de preescolar, básica o media en casa fuera del jardín o colegio						
3. Permanecer aislado/a en su vivienda debido a pertenecer población de riesgo a COVID-19						
4. Permanecer aislado/a en su vivienda debido a la vulnerabilidad de algún miembro de su vivienda al COVID-19						
5. Cuarentena obligatoria						
6. Ingresado/a en hospital o clínica						
7. Salió de su vivienda para trabajar o a buscar trabajo						
8. Otra, especifique						

MÓDULO TRATAMIENTO

RESPONDEN TODAS LAS PERSONAS

TRATA_1) ¿Ha recibido Ud. alguna vez en su vida algún tipo de tratamiento por el consumo de alcohol u otras drogas? No incluya tratamientos para dejar de fumar

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No

Alternativa 2 PASE A PREG. TRATA_4

TRATA_2) ¿Durante los últimos 12 meses ha recibido Ud. algún tipo de tratamiento por el consumo de alcohol u otras drogas? No incluya tratamientos para dejar de fumar

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No

Alternativa 2 PASE A PREG. TRATA_4

TRATA_3) ¿Este tratamiento que Ud. recibió durante los últimos 12 meses fue sólo por consumo de alcohol, sólo por consumo de drogas o por consumo de alcohol y otras drogas? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sólo por consumo de alcohol
- 2 ☐ Sólo por consumo de drogas
- 3 ☐ Por consumo de alcohol y otras drogas

Alternativas 1, 2 o 3 PASE A PREG. PR_1-MÓDULO PERCEPCIÓN DE RIESGO

TRATA_4) Durante los últimos 12 meses, ¿ha sentido la necesidad de recibir algún tipo de ayuda o tratamiento para disminuir o dejar de consumir alcohol y/u otras drogas? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Si responde sí, sondear)

- 1 ☐ Sí, sólo por consumo de alcohol
- 2 ☐ Sí, sólo por consumo de drogas
- 3 ☐ Sí, por consumo de alcohol y otras drogas
- 4 ☐ No

Alternativa 4 PASE A PREG. PR_1-MÓDULO PERCEPCIÓN DE RIESGO

TRATA_5) Durante los últimos 12 meses, ¿ha intentado obtener algún tipo de ayuda o tratamiento para disminuir o dejar de consumir alcohol y/u otras drogas?

(Encuestador: Si responde sí, sondear)

- 1 ☐ Sí, sólo por consumo de alcohol
- 2 ☐ Sí, sólo por consumo de drogas
- 3 ☐ Sí, por consumo de alcohol y otras drogas
- 4 ☐ No

Alternativas 1, 2, 3 o 4 pase PR_1-MÓDULO PERCEPCIÓN DE RIESGO

MÓDULO PERCEPCIÓN DE RIESGO

PR_1) ¿Cuál cree Ud. que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas?

(Encuestador: Leer escala sólo para la primera afirmación)

	1. Ningún riesgo	2. Riesgo leve	3. Riesgo moderado	4. Riesgo grande	88. No sabe (No leer)
1. Fuma una o más de una cajetilla de cigarrillos al día					
2. Toma tres o más tragos por ocasión					
3. Toma cinco o más tragos diariamente					
4. Prueba marihuana una o dos veces (uso experimental)					
5. Fuma marihuana frecuentemente					
6. Prueba cocaína una o dos veces (uso experimental)					
7. Usa cocaína frecuentemente					
8. Prueba pasta base una o dos veces (uso experimental)					
9. Usa pasta base frecuentemente					
10. Prueba éxtasis una o dos veces (uso experimental)					
11. Usa éxtasis frecuentemente					

MÓDULO ENTORNO Y BARRIO

EB_1) Hasta donde Ud. sabe, ¿alguien en su casa, distinto de usted, ha tenido problemas con el consumo de alcohol y/u otras drogas durante los últimos 12 meses? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Si responde sí, sondear)

(Encuestador: Por ejemplo, si ha dejado de cumplir deberes en la casa, en el trabajo o donde estudia; si ha puesto en peligro su integridad física a causa del consumo recurrente; si ha hecho algo bajo los efectos de la sustancia que pudiera causarle problemas con la autoridad pública; si ha tenido algún problema o han aumentado los problemas con su familia o amigos a causa de su consumo)

- 1 ☐ Sí, sólo por consumo de alcohol
- 2 ☐ Sí, sólo por consumo de drogas
- 3 ☐ Sí, por consumo de alcohol y drogas
- 4 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

EB_2) En su casa, y hasta donde Ud. conoce, ¿alguien usa o consume alguna de estas drogas? Si Ud. lo hace, no se considere. (Respuesta espontánea)

	1. Sí	2. No	88. No sabe	99. No contesta
1. Marihuana				
2. Pasta base				
3. Cocaína				

EB_3) Hasta donde Ud. conoce, ¿cuánto hay de las siguientes cosas en su barrio?

(Encuestador: Leer escala sólo para la primera afirmación)

	1. Mucho	2. Bastante	3. Algo	4. Poco	5. Nada	88. No sabe (No leer)	99. No contesta (No leer)
1. Tráfico de drogas							
2. Robos en las casas							
3. Rayado en las paredes, daños al alumbrado o cosas parecidas							
4. Consumo de drogas ilícitas en lugares públicos como en la calle o plazas							
5. Asaltos o robos en las calles							
6. Jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas							
7. Balaceras y acciones violentas con armas de fuego							
8. Venta clandestina de alcohol							

EB_4) ¿Cuán difícil le sería a Ud. conseguir alguna de las siguientes drogas?

(Encuestador: Leer escala sólo para la primera afirmación)

	1. Le sería muy fácil	2. Le sería fácil	3. Le sería difícil	4. Le sería muy difícil	5. No podría conseguir	88. No sabe (No leer)	99. No contesta (No leer)
1. Marihuana							
2. Cocaína							
3. Pasta base							
4. Éxtasis							

EB_5) ¿Y cuándo fue la última vez que una persona, conocida o desconocida, le ofreció alguna de las siguientes drogas?

(Respuesta espontánea)

	1. En los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	0. Nunca me han ofrecido Pregunte por cada droga. CUANDO EL ENTREVISTADO DECLARE 0, PASE A LA SIGUIENTE DROGA. SI DECLARA NUNCA PARA TODAS, PASE A PREG. OP_1-MÓDULO OPINIÓN PÚBLICA
1. Marihuana				
2. Cocaína				
3. Pasta base				
4. Éxtasis				

EB_6) La última vez que le ofrecieron, ¿en qué lugar se la ofrecieron? (Respuesta espontánea, única)

(Encuestador: Sondear, leer drogas)

	1. En la casa	2. En los alrededores de la casa, barrio o comuna	3. En lugar de estudios o trabajo	4. En alrededores lugar de estudios o trabajo	5. En una fiesta, junta, discoteca, recitales	6. Por internet, mail o chat	7. En otro lugar
1. Marihuana							
2. Cocaína							
3. Pasta base							
4. Éxtasis							

MÓDULO OPINIÓN PÚBLICA

OP_1) Respecto al tema drogas, ¿cuán de acuerdo estás con las siguientes frases? (Encuestador: Leer escala sólo para la primera afirmación)

	1. Muy de acuerdo	2. De acuerdo	3. En desacuerdo	4. Muy en desacuerdo	88. No sabe (No leer)	99. No contesta (No leer)
1. La mayoría de los jóvenes fuma marihuana						
2. La marihuana produce menos daño que el alcohol						
3. El consumo y el tráfico de drogas es el principal responsable de la delincuencia en este país						
4. La marihuana debería ser legal para los mayores de 18 años						
5. Las drogas han hecho más violentos a los delincuentes						
6. Se debería dejar tranquilos a los que consumen drogas: después de todo es asunto de cada cual hacerlo o no						

OP_2) Pensando ahora en drogas como marihuana, cocaína o pasta base, ¿cuán de acuerdo está Ud. con las siguientes medidas?

(Encuestador: Leer escala sólo para la primera afirmación)

	1. Muy de acuerdo	2. De acuerdo	3. En desacuerdo	4. Muy en desacuerdo	88. No sabe (No leer)	99. No contesta (No leer)
1. Suspender el juicio de quienes han delinquido por primera vez a cambio de que ingresen a un programa de tratamiento						
2. Dar la misma pena a quienes trafican con marihuana que los que trafican con cocaína o pasta base						
3. Permitir el uso de marihuana para fines terapéuticos						
4. Autorizar que se registre a los alumnos/as a la entrada de sus colegios para averiguar si portan alguna droga						
5. Penalizar el porte y consumo de marihuana, aunque sea en pequeñas cantidades y para uso personal						

MÓDULO TRABAJO

CO_1) La semana pasada, ¿trabajó al menos una hora, sin considerar los quehaceres del hogar? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
2 ☐ No

Alternativa 1 PASE A PREG. CO_6

CO_2) Aunque no trabajó la semana pasada, ¿realizó alguna actividad por lo menos durante una hora?

(Respuesta espontánea)

(Encuestador:

- ... por un salario o remuneración?
- ... en su empresa o negocio?
- ... para la empresa o negocio de un familiar (con o sin remuneración)?
- ... por pago en especies?
- ... como aprendiz o realizando una práctica?
- ... de venta, sin incluir bienes del hogar?
- ... agrícola, minera o artesanal para la venta?)

- 1 ☐ Sí
2 ☐ No

Alternativa 1 PASE A PREG. CO_6

CO_3) Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tenía empleo del cual estuvo ausente temporalmente por licencia, huelga, enfermedad, vacaciones, suspensión temporal u otra razón? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
2 ☐ No

Alternativa 1 PASE A PREG. CO_6

CO_4) ¿Buscó trabajo remunerado o realizó alguna gestión para iniciar una actividad por cuenta propia (negocio o empresa) en las últimas cuatro semanas? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
2 ☐ No

Alternativa 1 PASE A PREG. CO_6

CO_5) ¿Cuál es la razón por la que no buscó trabajo o realizó alguna gestión para iniciar una actividad por cuenta propia en las últimas cuatro semanas? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: No lea las alternativas, registre la razón que el entrevistado considera más importante. Anote SÓLO 1 de las razones)

Posibilidad de empezar a trabajar pronto

- 1 ☐ Consiguió trabajo que empezará pronto o iniciará una actividad por cuenta propia
- 2 ☐ Está esperando resultado de gestiones ya emprendidas

Limitaciones de condiciones familiares o personales

- 3 ☐ No tiene con quien dejar a los niños
- 4 ☐ No tiene con quien dejar a adultos mayores
- 5 ☐ No tiene con quien dejar a otro familiar
- 6 ☐ Está enfermo o tiene una discapacidad
- 7 ☐ Percepción de limitaciones personales
- 8 ☐ Piensa que nadie le dará trabajo (porque no cuenta con la capacitación requerida, por su edad, etc.)

Condiciones laborales no se adecuan a expectativas

- 9 ☐ Las reglas, horarios y distancias de los trabajos no le acomodan
- 10 ☐ Ofrecen sueldos muy bajos

Tiene otra actividad o renta

- 11 ☐ Quehaceres del hogar
- 12 ☐ Estudiante
- 13 ☐ Jubilado(a), pensionado(a) o montepiada
- 14 ☐ Tiene otra fuente de ingreso (seguro de cesantía, mesadas, rentas transferencias del Estado, etc.)

Otros

- 15 ☐ Se cansó de buscar o cree que no hay trabajo disponible
- 16 ☐ Busca cuando realmente lo necesita o tiene trabajo esporádico
- 17 ☐ No tiene interés en trabajar
- 18 ☐ Otra razón

PASE A PREG. DP_1-MÓDULO DATOS PERSONALES DEL ENCUESTADO

CO_6) En su trabajo o negocio principal, ¿usted trabaja como? (Respuesta única)

(Encuestador: Leer alternativas)

- 1 ☐ Patrón o empleador/a
- 2 ☐ Trabajador/a por cuenta propia
- 3 ☐ Empleado/a u obrero/a del sector público (gobierno central o municipal)
- 4 ☐ Empleado/a u obrero/a de empresas públicas
- 5 ☐ Empleado/a u obrero/a del sector privado
- 6 ☐ Servicio doméstico puertas adentro
- 7 ☐ Servicio doméstico puertas afuera
- 8 ☐ FF.AA. y del Orden
- 9 ☐ Familiar no remunerado

MÓDULO DATOS PERSONALES DEL ENCUESTADO

DP_1) ¿Cuántas personas viven en este hogar? Un hogar está compuesto por una o más personas que unidas o no por un vínculo de parentesco, residen en una misma vivienda o parte de ella y se benefician de un mismo presupuesto, principalmente para alimentación.

(Encuestador: Anote 99 No contesta)

RANGO: 1 A 99

personas

DP_2) ¿Cuál es su estado civil actual (legal)? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Soltero/a
- 2 ☐ Casado/a
- 3 ☐ Divorciado/a
- 4 ☐ Viudo/a
- 5 ☐ Anulado/a
- 6 ☐ Conviviente civil

DP_3) Actualmente, ¿cuál es su estado de hecho? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Casado/a vive con su esposo/a
- 2 ☐ Conviviente o pareja de distinto sexo
- 3 ☐ Conviviente o pareja del mismo sexo
- 4 ☐ No convive con pareja

DP_4) En Chile, la ley reconoce nueve pueblos indígenas (originarios), ¿pertenece usted o es descendiente de alguno de ellos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Aymara
- 2 ☐ Rapa Nui
- 3 ☐ Quechua
- 4 ☐ Mapuche
- 5 ☐ Atacameño (Likán Antai)
- 6 ☐ Colla
- 7 ☐ Kawésqar (Alacalufes)
- 8 ☐ Yagán (Yámana)
- 9 ☐ Diaguita
- 10 ☐ No pertenece a ningún pueblo indígena

DP_5) ¿Cuál es su religión o credo? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Católica
- 2 ☐ Evangélica o protestante
- 3 ☐ Judía
- 4 ☐ Musulmana
- 5 ☐ Mormón
- 6 ☐ Ortodoxa
- 7 ☐ Budista
- 8 ☐ Fe Bahá'í
- 9 ☐ Testigo de Jehová
- 10 ☐ Espiritualidad indígena
- 11 ☐ Otra
- 12 ☐ Ninguna

DP_6) ¿Cuál es su nacionalidad? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Chilena (exclusivamente)
- 2 ☐ Chilena y otra (doble nacionalidad)
- 3 ☐ Otra nacionalidad (extranjeros), especifique:

DP_7 Y DP_8 RESPONDEN SÓLO PERSONAS DE 18 AÑOS O MÁS**DP_I. A continuación, le voy a hacer unas preguntas relacionadas con su orientación sexual e identidad de género:****DP_7) ¿Cuál de estas alternativas define mejor su orientación sexual?**

(Encuestador: Leer alternativas)

(Encuestador: Se entiende por Orientación Sexual la atracción que una persona puede tener hacia el sexo opuesto [heterosexual], el mismo sexo [homosexual] o hacia ambos [bisexual])

- 1 ☐ Heterosexual (atracción hacia el sexo opuesto)
- 2 ☐ Gay/Lesbiana (atracción hacia el mismo sexo)
- 3 ☐ Bisexual (atracción hacia ambos sexos)
- 4 ☐ Otro, especifique
- 88 ☐ No sabe (No leer)
- 99 ☐ No contesta (No leer)

DP_8) En cuánto a su género, ¿usted se identifica como? (Encuestador: Leer alternativas)

(Encuestador: La Identidad de Género hace referencia a cómo la persona se siente o se identifica respecto de su género [masculino o femenino], y esto puede concordar o no con su sexo biológico)

- 1 ☐ Masculino
- 2 ☐ Femenino
- 3 ☐ Transgénero (trans masculino y femenino)
- 4 ☐ Otro, especifique
- 99 ☐ No contesta (No leer)

DP_9) ¿A qué sistema previsional de salud pertenece usted? (Respuesta espontánea, sondear)

- 1 ☐ Sistema público grupo A
- 2 ☐ Sistema público grupo B
- 3 ☐ Sistema público grupo C
- 4 ☐ Sistema público grupo D
- 5 ☐ Sistema público no sabe grupo
- 6 ☐ FF. AA. y del Orden
- 7 ☐ ISAPRE
- 8 ☐ Ninguno (particular)
- 9 ☐ Otro sistema
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

DP_10) ¿Qué relación de parentesco tiene con el/la jefe/a de hogar? Jefe de hogar se define como la persona, hombre o mujer, reconocida como tal por los integrantes del hogar (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Jefe/a de hogar
- 2 ☐ Espos/a o pareja
- 3 ☐ Hijo/a de ambos
- 4 ☐ Hijo/a sólo del jefe
- 5 ☐ Hijo/a sólo del espos/a o pareja
- 6 ☐ Padre o madre
- 7 ☐ Suegro/a
- 8 ☐ Yerno o nuera
- 9 ☐ Nieto/a
- 10 ☐ Hermano/a
- 11 ☐ Cuñado/a
- 12 ☐ Otro familiar
- 13 ☐ No familiar

DP_11) Actualmente, ¿asiste a algún establecimiento educacional? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

DP_12) ¿Cuál es el nivel educacional más alto alcanzado o el nivel educacional actual de usted? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Nunca asistió
- 2 ☐ Educación Especial (Diferencial)
- 3 ☐ Primaria o preparatoria (Sistema antiguo)
- 4 ☐ Educación Básica
- 5 ☐ Humanidades (Sistema antiguo)
- 6 ☐ Educación Media Científico Humanista
- 7 ☐ Técnica Comercial, Industrial o Normalista (Sistema antiguo)
- 8 ☐ Educación Media Técnico Profesional
- 9 ☐ Técnico de Nivel Superior
- 10 ☐ Profesional
- 11 ☐ Postítulo
- 12 ☐ Magíster
- 13 ☐ Doctorado
- 88 ☐ No sabe

DP_13) ¿Completó el nivel educacional anteriormente declarado? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 77 ☐ No aplica

DP_14) En este nivel educacional, ¿cuál fue el último curso que aprobó? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sin estudios
- 2 ☐ Primer año
- 3 ☐ Segundo año
- 4 ☐ Tercer año
- 5 ☐ Cuarto año
- 6 ☐ Quinto año
- 7 ☐ Sexto año
- 8 ☐ Séptimo año
- 9 ☐ Octavo año
- 77 ☐ No aplica
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

DP_15) ¿Cuál de estas situaciones se aplica mejor a su caso?

(Encuestador: Leer alternativas)

- 1 ☐ Ud. aporta ingreso único
- 2 ☐ Ud. aporta el ingreso principal, pero existen otros ingresos
- 3 ☐ Ud. aporta la mitad del ingreso del hogar
- 4 ☐ Ud. aporta ingreso, pero no es el principal del hogar
- 5 ☐ Ud. no aporta ingresos al hogar
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

DP_16) Aproximadamente y considerando un mes normal, ¿a cuánto asciende el ingreso total del hogar al mes?

(Respuesta espontánea)

(Encuestador: Si hay más de un hogar en la vivienda, preguntar por el hogar del entrevistado. Si es menor de edad, intente conseguir esta información con algún adulto)

- 1 ☐ Menos de \$100.000
- 2 ☐ Entre \$100.001 y 200.000
- 3 ☐ Entre \$200.001 y 300.000
- 4 ☐ Entre \$300.001 y 400.000
- 5 ☐ Entre \$400.001 y 500.000
- 6 ☐ Entre \$500.001 y 750.000
- 7 ☐ Entre \$750.001 y 1.000.000
- 8 ☐ Entre \$1.000.001 y 1.500.000
- 9 ☐ Entre \$1.500.001 y 2.000.000
- 10 ☐ Más de \$2.000.000
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

OBSERVACIÓN FINAL

Encuestador: Anote cualquier observación acerca de la aplicación de la encuesta.


Para las preguntas DP_17 y DP_18 Ud. sólo debe observar y no preguntarle al entrevistado.

DP_17) Calidad de la vivienda

- 1 ☐ Tipo 1. Casas o departamentos de gran lujo y muy espaciosos.
- 2 ☐ Tipo 2. Casas o departamentos espaciosos y confortables.
- 3 ☐ Tipo 3. Casas o departamentos de construcción sólida, pero de apariencia modesta y en buen estado de conservación.
- 4 ☐ Tipo 4. Tres casos típicos:
 - i) Construcción sólida, pero en mal estado de conservación.
 - ii) Construcción sólida, buen estado de conservación, buena iluminación, pero existe hacinamiento.
 - iii) Casa prefabricada, aunque tenga cocina y baño independiente.
- 5 ☐ Tipo 5. Se presentan tres casos:
 - i) Mejoras: casas de madera con pozos negros y sin suministro de agua potable dentro del hogar.
 - ii) Pocilga: habitación sucia y sin ventilación ni baño. La cocina, el comedor y dormitorio están dentro de la misma habitación.
 - iii) Subterráneos insalubres con hacinamiento y/o promiscuidad.

DP_18) Calidad del barrio

- 1 ☐ Tipo 1. Barrio residencial elegante, donde el valor del terreno y el monto de los arriendos es alto.
- 2 ☐ Tipo 2. Barrio residencial, todavía acomodado, de calles amplias, pero sin tanta área verde; casas confortables y bien mantenidas.
- 3 ☐ Tipo 3. Barrios de comercio o calles estrechas, antiguas, sin áreas verdes, de menos agrado para vivir y de valores medios de arrendamiento.
- 4 ☐ Tipo 4. Barrio obrero o barrio populoso o mal ventilado. El valor de las viviendas está disminuido por la proximidad a talleres, fábricas, estaciones de ferrocarriles, basurales, etc.
- 5 ☐ Tipo 5. Barrio de mejoras y pocilgas desaseadas, sin pavimentación, de mal aspecto y sin condiciones sanitarias.



 **BSERVATORIO**
Nacional de Drogas

FONO DROGAS Y ALCOHOL



1412

DESDE RED FIJA Y CELULARES

www.senda.gob.cl