



Observatorio Chileno de Drogas

Décimo Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile 2024

Principales Resultados



Observatorio Chileno de Drogas

Décimo Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile 2024

Principales Resultados

Décimo Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile 2024
Principales Resultados

Observatorio Chileno de Drogas
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)
Ministerio del Interior
Gobierno de Chile
Santiago, Chile
2026

© SENDA
Registro de Propiedad Intelectual N°
ISBN:

Equipo Responsable
Observatorio Chileno de Drogas

Producción Editorial
Área de Comunicaciones

Edición
Marly Mora Neumann

Diagramación
Bethânia Rodrigues Alfaro

Contenido

5	PRINCIPALES ASPECTOS METODOLÓGICOS
7	Serie de estudios nacionales de drogas en población general
8	Objetivos del estudio
8	Objetivos generales
8	Objetivos específicos
8	Metodología
8	Marco Muestral de Viviendas (MMV 2021)
9	Marco muestral ENPG 2024
12	Muestra y diseño muestral
16	Factores de expansión
20	Antecedentes previos al inicio del trabajo de terreno
21	Metodología de aplicación de las encuestas
26	Prevalencia y drogas estudiadas
26	Consideraciones para el análisis de la información
29	PRINCIPALES RESULTADOS
31	Tendencias del consumo de alcohol y otras drogas
31	Consumo de marihuana
32	Consumo de clorhidrato de cocaína
33	Consumo de pasta base
34	Consumo de alcohol
35	Consumo de bebidas energéticas
35	Consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos
37	Prevalencias de otras drogas
39	Incidencias de consumo en el último año
40	Percepción de uso de drogas
40	Percepción de riesgo
40	Oferta y disponibilidad de alcohol y otras drogas
40	Disponibilidad de alcohol
41	Percepción de facilidad de acceso a drogas
42	Disponibilidad de drogas
46	Frecuencia de consumo y trastornos por uso de sustancias
46	Frecuencia en el uso de alcohol y otras drogas
48	Consumo problemático de drogas
49	Embriaguez y consumo de riesgo de alcohol

50	Conducción de vehículos y consumo de sustancias
51	Otros indicadores asociados al consumo
51	Consumo de drogas en el hogar
52	Percepción de problemas en el barrio de residencia
53	Opinión pública
53	Evaluación de medidas para la regulación y control de drogas
55	Escenario en regiones
59	ANEXO: Cuestionario Aplicado



Principales Aspectos Metodológicos

Principales Aspectos Metodológicos

SERIE DE ESTUDIOS NACIONALES DE DROGAS EN POBLACIÓN GENERAL

SENDA ha realizado el *Décimo Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile 2024* en conformidad con el compromiso de observar las tendencias en el uso de alcohol y otras drogas en el país a través de un estudio sistemático, metodológicamente consistente y a escala nacional. La serie de estudios en población general se realiza cada dos años, durante el segundo semestre de los años pares.

La serie en población general consta de dieciséis estudios: los nueve primeros (1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 y 2010) se llevaron a cabo bajo la responsabilidad del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE); los siete últimos (2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 y 2024) se han realizado bajo formato, procedimientos y responsabilidad del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).

El trabajo de campo del *Décimo Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile 2024* (ENPG 2024) se realizó entre los meses de diciembre de 2024 y mayo de 2025. La encuesta se aplicó a un total de 18.668 personas de entre 12 y 65 años, de ambos sexos y distintos niveles socioeconómicos, pertenecientes a las 16 regiones del país.

La cobertura del ENPG 2024 (viviendas particulares de los sectores urbanos de 109 comunas del país con población de 30.000 o más habitantes) corresponde aproximadamente al 70% del total de la población nacional. La aplicación de la encuesta fue realizada por Ipsos Chile, un organismo externo a SENDA, convocado mediante licitación pública.

La serie en población general ha conservado sus características fundamentales: está basada en un cuestionario que se aplica por medio de entrevistas cara a cara en hogares contenidos en viviendas, en población de ambos sexos de entre 12 y 64 años

en todas las regiones del país. El formato de las preguntas que registran consumo de drogas (prevalencias, edad de inicio, incidencia, frecuencia, entre otras) ha sido siempre el mismo. Las muestras no han variado sustancialmente en tamaño y cobertura de las comunas seleccionadas. El número de comunas que configuran el universo del estudio ha permanecido estable desde el año 2000 en adelante, con aumentos derivados de la subdivisión de comunas antiguas, del crecimiento de aquellas que han sobrepasado los 30.000 habitantes o de la creación de nuevas regiones.

1 En el *Séptimo Estudio Nacional de Drogas en Población General* se amplió el límite de edad de la población entrevistada hasta 65 años para cumplir con normas de comparabilidad internacional. El examen de tendencias nacionales considera solamente la población de entre 12 y 64 años.

TABLA 1
Serie de Estudios Nacionales de Drogas en Población General de Chile. 1994–2024.

Año	Estudio	Número de comunas	Tamaño muestral	Universo
1994	Primer Estudio Nacional de Drogas en Población General	66	8.271	6.186.528
1996	Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General	72	12.421	6.917.182
1998	Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General	62	31.665	6.940.727
2000	Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General	86	44.421	7.779.905
2002	Quinto Estudio Nacional de Drogas en Población General	87	16.476	8.392.058
2004	Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General	87	16.366	8.715.567
2006	Séptimo Estudio Nacional de Drogas en Población General	91	17.192	8.876.262
2008	Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población General	95	17.113	8.954.639
2010	Noveno Estudio Nacional de Drogas en Población General	108	16.000	9.738.623
2012	Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población General	108	17.154	9.940.512
2014	Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población General	108	20.113	10.088.247
2016	Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General	108	19.147	10.356.863
2018	Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General	109	19.427	10.992.349
2020	Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General	109	16.662	11.159.046
2022	Décimo Quinto Estudio Nacional de Drogas en Población General	109	17.454	12.941.545
2024	Décimo Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General	109	18.668	11.396.772

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivos generales

- Describir la magnitud del consumo de alcohol y otras drogas y su distribución geográfica, de acuerdo con variables psicosociales del individuo, su familia y su entorno, en la población de 12 a 65 años de edad que reside en sectores urbanos de las 16 regiones del país.
- Describir las tendencias del consumo de alcohol y otras drogas a nivel nacional y regional, tomando como base la serie de Estudios Nacionales de Drogas en Población General de Chile (CONACE, 1994–2010; SENDA, 2012–2024).

Objetivos específicos

- Determinar las tasas y tendencias de prevalencia e incidencia del consumo de drogas según las principales características sociodemográficas: sexo, edad y nivel socioeconómico.
- Describir las principales características del uso de alcohol y otras drogas, tales como edad de inicio, policonsumo y frecuencia e intensidad de uso.
- Determinar las prevalencias de dependencia declaradas en drogas ilícitas y consumo de riesgo de alcohol.
- Conocer la magnitud y las características del consumo de drogas en poblaciones específicas.
- Describir la relación del consumo de alcohol y otras drogas con las características del entorno: uso en el medio social inmediato, interacción con personas que consumen, consumo de alcohol y otras drogas en el grupo de pares, percepción de disponibilidad de drogas, opinión y actitud respecto de las drogas.
- Determinar el nivel de conocimiento y evaluación de distintas políticas vinculadas al consumo de alcohol y otras drogas.

METODOLOGÍA

La muestra del *Décimo Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile 2024* fue proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sobre la base de una selección aleatoria de unidades primarias de muestreo y viviendas, que se completa con un procedimiento de selección, también aleatorio, de personas dentro de las viviendas. Se excluye la población que vive o se encuentra en situación de calle y en instituciones como hospitales y cárceles, entre otras.

En los estudios de 1994 a 2008 la encuesta se aplicó con cuestionarios de papel. A partir de 2010 la encuesta se aplica en modalidad *CAPI* (*Computer-Assisted Personal Interviewing*, o, en español, Entrevista Personal Asistida por Computadora). En ambas modalidades se disponía de un apartado autoaplicado que entregaba la opción a la persona entrevistada de registrar por sí misma respuestas de los módulos de drogas. En el ENPG 2020, además de CAPI, se dispuso de la modalidad telefónica *CATI* (*Computer-Assisted Telephones Interviewing*) para aplicar el cuestionario en casos en que las condiciones sanitarias no permitan la modalidad CAPI. En el ENPG 2022 y 2024, la aplicación de la encuesta fue realizada íntegramente en modalidad CAPI.

Marco Muestral de Viviendas (MMV 2021)

El marco muestral utilizado en este estudio es generado a partir de la cartografía digital proveniente del Censo de Población y Vivienda de 2017 (Censo 2017), y del Marco Muestral de Viviendas 2021 (MMV 2021) que corresponde a una actualización del Marco Muestral de Viviendas 2020 (MMV 2020). El MMV 2021 está constituido por unidades primarias de muestreo, en adelante, UPM. La información del marco se actualizó con base en enumeraciones en terreno de unidades geográficas priorizadas y en verificaciones de gabinete. Las UPM corresponden a áreas geográficas homogéneas en términos

del número de "viviendas marco"², observadas en el Censo 2017 o en su actualización más reciente, haciendo distinción del área urbana y rural. Dichas UPM están conformadas según el área (urbana-rural) a la que pertenecen.

El MMV 2021 cubre 345 comunas de las 346 que conforman el territorio nacional, continental e insular. La comuna que queda excluida corresponde a la Antártica Chilena perteneciente a la Región de Magallanes. Así, el MMV 2021 contiene variables que permiten la identificación de la división político-administrativa del país³, así como también la identificación de las áreas urbanas y rurales en cada comuna. En el nuevo marco sólo se diferencia la parte urbana de la rural. Así, para el ENPG 2024 y al igual que su versión anterior, se considera el área urbana de 109 comunas del país.

ESTRATIFICACIÓN DEL MARCO MUESTRAL DE VIVIENDAS

ESTRATIFICACIÓN GEOGRÁFICA

A nivel geográfico, el marco muestral está compuesto por variables que permiten la identificación de la división político-administrativa del país, así como también la identificación de las áreas urbanas y rurales de cada comuna.

De esta manera, el concepto de entidad urbana adoptado en el Censo 2017 se define como asentamiento humano con continuidad y concentración de construcciones en un amanzanamiento regular con población mayor a 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, donde menos del 50% de la población que declara haber trabajado se dedica a actividades primarias. Por su parte, entidad rural se entiende como un asentamiento humano concentrado o disperso que posee 1.000 o menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, donde más del 50% de la población que declara haber trabajado se dedica a actividades primarias.

Así, las UPM del MMV 2021 están conformadas según el área (urbana-rural) a la que pertenecen. Para el área urbana, el tamaño medio de las UPM es de 200 viviendas, con un intervalo de 20%, es decir, la cantidad de viviendas por UPM se encuentra en el rango [160-240] en promedio. Por otra parte, el área rural tiene un tamaño medio de 90 viviendas y un intervalo de 20%, quedando la cantidad de viviendas por UPM en el intervalo [70-110], con algunas excepciones⁴.

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

El MMV 2021, de igual forma que el MMV 2020, cuenta con una estratificación socioeconómica que se realiza a nivel de UPM y se basa en un análisis de diversas variables recopiladas en el Censo 2017. El principal objetivo de realizar esta estratificación es inducir mayor eficiencia y precisión en las estimaciones de las estadísticas oficiales, además de servir como fuente de información para encuestas de hogares que requieren mayor análisis de carácter socioeconómico.

Así, se emplea una variable de estratificación con tres categorías de nivel socioeconómico, señalada en el MMV 2021 como clasificación socioeconómica de la UPM⁵.

ÁREAS ESPECIALES

De forma complementaria, se incorpora la categoría de áreas de tratamiento especial o áreas especiales, lo que permite identificar áreas susceptibles de exclusión a nivel de UPM. Estas áreas especiales suelen ser afectadas por factores que dificultan su levantamiento, los cuales pueden ser climáticos, de transporte, costo de acceso y de acceso restringido, entre otros.

Marco muestral ENPG 2024

El marco muestral del ENPG 2024 se conforma desde el MMV 2021 según los objetivos de la encuesta, la cobertura geográfica considerada y las áreas especiales.

COBERTURA GEOGRÁFICA DEL MARCO MUESTRAL ENPG 2024

La cobertura es una propiedad estadística que caracteriza al marco muestral. Para el ENPG 2024, al igual que en sus tres versiones anteriores, se considera el área urbana de 109 comunas del país. Para calcular la cobertura se debe tener presente la información del marco muestral completo.

La Tabla 2 muestra el total de viviendas y el total de UPM, según el MMV 2021 y el marco de selección del ENPG 2024. Según el MMV 2021, el total de viviendas y el total de UPM a nivel nacional es 5.529.044 y 26.770, respectivamente. Por su parte, según el marco de selección del ENPG 2024, el total de viviendas y el total de UPM es 4.775.741 y 23.086, respectivamente.

2 Viviendas marco es la denominación empleada para las viviendas particulares con moradores presentes o ausentes.

3 Región, provincia y comuna.

4 Estas excepciones se definen con base a límites que fueron determinados en el contexto de la definición de umbrales de crecimiento y decrecimiento para la actualización del MMV. Sus valores pueden ser utilizados de forma referencial.

5 Para mayores antecedentes consultar: Documentos de trabajo. Estratificación socioeconómica del marco muestral de viviendas 2017 (MMV 2017)-Implementación en R.

TABLA 2
Total de viviendas y UPM en el área urbana, según el MMV 2021 y el marco de selección del ENPG 2024.

Región	Total viviendas		Total UPM	
	MMV 2021	Marco ENPG 2024	MMV 2021	Marco ENPG 2024
Nacional	5.529.044	4.775.741	26.770	23.086
Tarapacá	105.761	100.312	519	492
Antofagasta	186.540	166.698	915	818
Atacama	95.384	70.696	473	350
Coquimbo	230.403	188.523	1.126	918
Valparaíso	628.409	505.246	3.049	2.453
O'Higgins	254.384	186.085	1.226	887
Maule	291.612	198.967	1.416	965
Biobío	505.084	408.312	2.429	1.963
La Araucanía	260.408	184.169	1.258	888
Los Lagos	232.993	164.282	1.129	791
Aysén	31.941	26.998	155	131
Metropolitana	2.349.947	2.306.136	11.313	11.099
Magallanes	58.057	47.153	290	235
Los Ríos	102.588	79.653	511	396
Arica y Parinacota	68.123	67.632	342	340
Ñuble	127.410	74.879	619	360

La Tabla 3 muestra la cobertura de la encuesta (109 comunas) según el total de viviendas y UPM presentes en el MMV 2021. La cobertura nacional del ENPG 2024, en relación con el número de viviendas, alcanza un 86,4%; y, respecto al número de UPM, un 86,2%.

TABLA 3
Cobertura Marco Muestral ENPG 2024 de 109 comunas para el total de viviendas y UPM, según el MMV 2021.

Región	Cobertura marco ENPG 2024 según MMV 2021 (%)	
	Viviendas	UPM
Nacional	86,4	86,2
Tarapacá	94,8	94,8
Antofagasta	89,4	89,4
Atacama	74,1	74,0
Coquimbo	81,8	81,5
Valparaíso	80,4	80,6
O'Higgins	73,2	72,3
Maule	68,2	68,1
Biobío	80,8	81,0
La Araucanía	70,7	70,6
Los Lagos	70,5	70,0
Aysén	84,5	84,5
Magallanes	98,1	98,1
Metropolitana	81,2	81,0
Los Ríos	77,6	77,5
Arica y Parinacota	99,3	99,4
Ñuble	58,8	58,1

ESTRATIFICACIÓN DEL MARCO MUESTRAL ENPG 2024

La estratificación consiste en agrupar los elementos de la población según su homogeneidad respecto a características determinadas. Con el propósito de mejorar la precisión estadística de los estimadores, esta agrupación debe contener unidades homogéneas internamente y heterogéneas entre sí, además de ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas, es decir, cada elemento en la población debe ser asignado sólo a un estrato y ningún elemento de la población puede quedar excluido.

El marco de selección del ENPG 2024 contiene el listado de las UPM pertenecientes al área urbana de 109 comunas del territorio nacional. Estas UPM están organizadas de forma jerárquica de acuerdo con la división político-administrativa del país, identificando la región, provincia y comuna correspondientes. Como resultado, en el presente estudio se definen como estratos cada una de las 109 combinaciones de comuna-urbanas cubiertas por el marco de selección.

SELECCIÓN DE UNIDADES MUESTRALES

La selección de unidades muestrales se realiza en tres etapas. En una primera etapa se seleccionan UPM o conglomerados (unidades de primera etapa); luego, se seleccionan viviendas particulares ocupadas (unidades de segunda etapa) y, finalmente, se selecciona

la persona informante de 12 a 65 años (unidad de tercera etapa) que responde en representación de sí misma.

SELECCIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES DE PRIMERA ETAPA

Para la selección de las UPM o conglomerados, en el diseño muestral del ENPG 2024 se utiliza una selección aleatoria sistemática con probabilidad proporcional al tamaño, según el número de viviendas que cada una contiene.

La selección de UPM dentro de cada estrato (comuna) es implementada considerando un diseño de muestra compleja. El procedimiento realiza una selección sistemática de UPM a partir de una semilla aleatoria. Previo a la selección, se ordenan las UPM según región, comuna, nivel socioeconómico y vector orden (variable de ordenamiento geográfico de cada UPM al interior de los estratos).

La probabilidad de inclusión de la i -ésima UPM, dentro de cada comuna h , se obtiene a partir de la Ecuación 1:

Ecuación 1

$$P_h(i) = \frac{M_{hi} \cdot n_h}{M_h}$$

Donde:

n_h es el número de UPM seleccionadas en la comuna h .

M_{hi} es el número de viviendas en el marco en la UPM i de la comuna h .

M_h es el número de viviendas en el marco en la comuna h .

Después de la selección de UPM, se realiza el proceso de verificación de viviendas, en gabinete, donde se revisan y se ajustan geográficamente las UPM, además de actualizar los directorios que corresponden a cada una de ellas.

Este procedimiento de actualización reemplaza el trabajo de enumeración en terreno, manteniéndose protocolos e instancias de supervisión con el objetivo de corroborar la completitud y la coherencia de los datos. En este sentido, el trabajo vela por la calidad de la información a través de las siguientes acciones: revisar y corregir direcciones mal registradas, ingresar o complementar la descripción de viviendas sin identificación domiciliaria, revisar la completitud y la cobertura geográfica, verificar y actualizar el trazado de UPM, seleccionar directorios actualizados, y vincular registros de direcciones con puntos georreferenciados.

Así, la actualización de gabinete considera la incorporación de registros de viviendas particulares y otros usos al directorio institucional del INE, con base en diferentes fuentes de información. Los insumos y las fuentes de información para realizar el proceso de verificación provienen de:

1. Directorio y base cartográfica de otras muestras: todos aquellos directorios institucionales que estén disponibles en procesos de enumeración provenientes de otras muestras, correspondientes a UPM que hayan sido seleccionadas para muestras de encuestas

sociales o económicas, enumeradas por el INE y que sean coincidentes con la selección de la muestra que se esté trabajando en el período 2024.

2. Directorio y base cartográfica del Precenso 2016: refiere al Directorio del Precenso 2016 correspondiente a las UPM que hayan sido seleccionadas para muestras de encuestas sociales o económicas, enumeradas por el INE y que sean coincidentes con la selección de la muestra que se esté trabajando en el período 2024. En este sentido, se debe considerar que el Precenso 2016 dio origen a la primera versión del MMV2017, donde MMV2020 y MMV2021 constituyen actualizaciones de la versión original.
3. Directorio y base cartográfica de la Actualización Precensal 2023: corresponde al levantamiento previo al Censo 2024, cuyo objetivo fue cuantificar la cantidad de viviendas presentes a nivel subcomunal.
4. Base cartográfica de edificaciones georreferenciada de 311 comunas: se asocia a directorios de viviendas y otros usos mediante el trabajo de terreno y de gabinete, lo que permite optimizar la gestión, el uso y la disposición de la información a distintos usuarios, facilitando la interoperabilidad.

Por último, el proceso de actualización del número de viviendas dentro de cada UPM se realiza con el fin de garantizar una efectiva selección de viviendas elegibles para el levantamiento de la encuesta, ya que eventualmente —debido al proceso de desactualización del marco muestral con el paso del tiempo— el número de viviendas reportado en el marco, al interior de la UPM, podría ser distinto al encontrado en el terreno al momento del levantamiento. En este proceso, se efectúa un conteo del número de viviendas elegibles (particulares ocupadas) y se anota el número actualizado de viviendas, registrándolo bajo la denominación M'_{hi} . En caso de no haber cambios, $M'_{hi} = M_{hi}$ (número de viviendas en el MMV 2021).

SELECCIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES DE SEGUNDA ETAPA

La selección de viviendas al interior de cada UPM seleccionada se realiza de forma sistemática con igual probabilidad de selección para todas las viviendas particulares ocupadas. Al igual que la selección de UPM, la selección de viviendas es implementada fijando una semilla aleatoria, a fin de que dicho procedimiento pueda ser replicado en cualquier momento. Previo a la selección, se filtra el directorio de viviendas según el "uso de la edificación" y la "situación de la vivienda". El "uso de la edificación" debe corresponder a "vivienda particular" y la "situación de la vivienda", a "moradores presentes o ausentes".

Para calcular la probabilidad de inclusión de la j -ésima vivienda dentro de la i -ésima UPM de la comuna h (Ecuación 2), se definen las siguientes variables:

MM'_{hi} es el número actualizado de viviendas, en la UPM i de la comuna h .

m_{hi} es el número de viviendas a seleccionar en la UPM i de la comuna h .

Para la selección de las viviendas (m_{hi}), se realizan los siguientes pasos:

- a. Se ordenan geográficamente las viviendas dentro de cada UPM, en forma independiente y ascendente, según el número de orden de vivienda dentro de la manzana.

- b. Al interior de cada UPM se calcula el período (k) que corresponde al redondeo de $k = MM'_{hi}/m_{hi}$.
- c. Luego se determina el arranque " A " o primera selección, que corresponde a una semilla aleatoria propia para la encuesta.
- d. Posteriormente, se suma de manera sucesiva el período " k " al arranque " A " para obtener distintos valores, los que dan origen a la selección de unidades de la siguiente forma:

$$"A", "A + k", "A + 2k", "A + 3k", \dots, "A + (m_{hi} - 1)k"$$

La primera vivienda seleccionada es " A ", la segunda es el redondeo de " $A + k$ ", la tercera es el redondeo de " $A + 2k$ ", y así sucesivamente hasta la m_{hi} selección, dada por el redondeo de " $A + (m_{hi} - 1)k$ ".

Luego, la probabilidad de inclusión de la j -ésima vivienda dentro de la i -ésima UPM de la comuna h , es igual a:

Ecuación 2

$$P_h(j/i) = \frac{m_{hi}}{MM'_{hi}}$$

Una vez realizada la selección de viviendas, se elabora el directorio con la selección de viviendas en formato electrónico, la letra Kish para la selección del informante por vivienda seleccionada, la cartografía de apoyo en formato digital y los mapas móviles para dispositivos móviles.

SELECCIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES DE TERCERA ETAPA

En esta última etapa, la selección del informante para recolectar los datos del estudio está basada en el método Kish, que asigna la misma probabilidad de ser elegido como informante a todos aquellos miembros de la vivienda que están dentro del rango de edad de la encuesta y no tienen impedimento físico o mental para comprender la entrevista.

La asignación de la letra Kish se realiza en cada comuna, a través de las UPM que las conforman y que han sido seleccionadas en la muestra. Dentro de cada comuna, se comienzan a distribuir las letras (en un ordenamiento predefinido) en las viviendas que fueron seleccionadas, terminando la asignación cuando la última vivienda a encuestar —dentro de la última UPM seleccionada, de la última comuna— ha recibido una letra. Este proceso se repite por cada comuna que conforma la muestra y, cada vez que se cuente con una nueva comuna, se retoma la secuencia inicial, independiente de la letra en que se haya terminado en la comuna anterior. De esta manera, una vez asignada la letra Kish a cada vivienda seleccionada, el procedimiento de selección del informante se puede realizar.

Al llegar a la vivienda, el encuestador debe anotar el número de personas que residen habitualmente en ella. A continuación, registra a todas las personas que habitan la vivienda, independiente del hogar al que pertenecen.

Luego del ordenamiento de las personas dentro de la vivienda, se debe realizar una enumeración de los potenciales informantes de la encuesta, es decir, personas de entre 12 y 65 años que no forman

parte del servicio doméstico puertas adentro ni poseen alguna situación de discapacidad que les impida comprender las preguntas⁶.

La enumeración es a nivel de vivienda. Se deben ordenar sus integrantes según sexo y edad; primero los hombres de mayor a menor y, luego, las mujeres de mayor a menor. Los menores de 12 años y mayores de 65 no son considerados en la enumeración.

Finalmente, al interior de la tabla se encuentran distribuidos una serie de números que guardan relación con el número de personas que habitan la vivienda y que cumplen las características para ser consideradas como posibles informantes. Estos números determinan la persona que será seleccionada en la vivienda, según el ordenamiento previo de ellas; por su parte, la letra Kish asignada a la vivienda asegura la aleatoriedad de la selección del informante.

Muestra y diseño muestral

El diseño muestral del ENPG 2024 corresponde a un muestreo probabilístico, estratificado y trietápico, con selección de conglomerados⁷, viviendas e informantes. Según lo anterior, se puede afirmar que el diseño muestral del estudio es un diseño complejo⁸.

El marco muestral está compuesto de unidades muestrales caracterizadas por tener límites geográficos fijos. A su vez, únicamente se puede llegar a la persona entrevistada mediante la identificación de la vivienda en que reside, la cual está inserta en sólo una UPM. Las viviendas particulares ocupadas son identificadas como las unidades secundarias de muestreo. Para llegar al informante se realiza una selección aleatoria dentro de la vivienda, donde el individuo seleccionado es quien proporciona la información referente a las características del hogar que constituye y sobre sí mismo. Los individuos seleccionados de manera probabilística mediante la tabla de Kish son denominados unidades terciarias de muestreo.

TAMAÑO DE LA MUESTRA Y PRECISIÓN MUESTRAL

La determinación del tamaño de la muestra del ENPG 2024 se sustenta en la información obtenida en la última versión de la encuesta. Con ello se logra optimizar el tamaño muestral a nivel regional y nacional sobre la base del área urbana de las comunas consideradas en el estudio.

6 Ejemplos de estos casos son personas con Alzheimer, síndrome de Down, etc. Individuos con trastornos por uso de alcohol y otras drogas son considerados. Sin embargo, si han sido seleccionados y no se encuentran en condiciones de responder la encuesta, se debe volver a la vivienda hasta cuatro veces para lograrla; en caso contrario, se omite la vivienda y se categoriza como elegible no responde, por impedimento propio de la persona.

7 Conjuntos de unidades muestrales o UPM.

8 Entiéndase como diseño complejo, todo procedimiento aleatorio para seleccionar una muestra a partir de una población, en el cual intervienen distintas estructuras poblacionales (estratos, conglomerados y/o subpoblaciones), ya sean naturales (según las características propias del marco), artificiales (como, por ejemplo, cruces de variables), de tipo administrativo que tengan alguna característica especial, entre otras.

El procedimiento de cálculo de tamaño y distribución muestral debía permitir obtener estimaciones con márgenes de precisión adecuados a nivel regional para la variable de interés "Proporción de la población que ha consumido algún tipo de droga ilícita⁹ al menos una vez en la vida". El procedimiento considera los siguientes requerimientos técnicos dispuestos por el INE:

- Niveles de estimación: nacional y regional para el área urbana de 109 comunas del país.
- Variable de diseño *I*: si la persona ha consumido drogas ilícitas, alguna vez en la vida, donde:

$$I = \{ 0, \text{ si no ha consumido drogas ilícitas alguna vez en la vida} \\ 1, \text{ si ha consumido drogas ilícitas alguna vez en la vida} \}$$
- Medida poblacional o parámetro a estimar: proporción de la población que ha consumido algún tipo de droga ilícita al menos una vez en la vida.
- Errores de muestreo admisibles tomando como referencia el ENPG 2022.
- Parámetros de los resultados del trabajo de campo del ENPG 2022.
- Distribución de la muestra objetivo del ENPG 2022.
- Conformar el marco de selección *ad hoc* a partir del MMV 2021.
- Aplicar las tasas de no logro promedio del ENPG 2018, ENPG 2020 y ENPG 2022.
- Ajustar el total de UPM a seleccionar considerando un número fijo de 12 viviendas por UPM.

Luego de la aplicación del procedimiento, se determinó que el tamaño muestral objetivo fuese de 23.509 viviendas y un tamaño con sobremuestreo de 43.750 viviendas.

A continuación, se describe en detalle cada una de las etapas realizadas para definir el número de viviendas a encuestar en cada región *r*, considerando las siguientes definiciones:

p_r	es el parámetro de interés en la región <i>r</i> . Corresponde a la proporción de la población que ha consumido algún tipo de droga ilícita al menos una vez en la vida en el ENPG 2022.
m_{r0}	es el número promedio de viviendas encuestadas o logradas por unidad primaria de muestreo en la región <i>r</i> en el ENPG 2022.
$SE(p_r)$	es el error estándar de la estimación del parámetro <i>p</i> en la región <i>r</i> . Corresponde a la raíz cuadrada de la varianza de la estimación.

$Def f(p_r)$ es el efecto del diseño asociado al parámetro de interés *p* en la región *r*.

Por definición, el efecto del diseño es $Def f(p) = \sigma^2(p)_{MC} / \sigma^2(p)_{MAS}$ donde $\sigma^2(p)_{MC}$ es la varianza bajo un diseño complejo y $\sigma^2(p)_{MAS}$ es la varianza bajo un muestreo aleatorio simple.

$S(p_r)^2$ es la cuasivarianza poblacional del parámetro *p* en la región *r*. Para variables cualitativas y en un muestreo aleatorio simple, corresponde aproximadamente a $(M_r / (M_r - 1)) \times (P \times Q)$, siendo *P* la proporción de la población que ha consumido algún tipo de droga ilícita al menos una vez en la vida, con $Q = (1 - P)$ y M_r el total de viviendas en la región *r*.

$t_{1-\frac{\alpha}{2}}^v$ es el cuantil de una distribución *t* de Student con nivel de confianza $1-\alpha$ (para efectos de la simulación se utiliza un valor fijo $t=2$).

MM_r es el número de viviendas en la región *r* que contiene el marco de selección.

m_{ih} es el número de viviendas a encuestar en la unidad de primera etapa *i* (UPM) en el estrato *h*.

n_h es el número de unidades primarias de muestreo (UPM) resultantes en la comuna *c*.

tnl_c es la tasa de no logro comunal¹⁰ obtenida como un promedio entre las tasas de no logro de los ENPG 2018, ENPG 2020 y ENPG 2022.

Primero, se obtienen estimaciones a nivel regional de la proporción de la población que consumido algún tipo de droga ilícita al menos una vez en la vida y sus estadísticos asociados (error estándar y efecto del diseño), usando los resultados del trabajo de campo del ENPG 2022. La cuasivarianza poblacional $S(p_r)^2$ se calcula a partir del error estándar obtenido, utilizando la Ecuación 3:

Ecuación 3

$$S(p_r)^2 = \frac{n \cdot m_{r0}}{Def f(p_r)} \cdot SE(p_r)^2$$

A partir del error estándar, se obtienen los errores absolutos por región (d_{0r}) y luego, los errores relativos (e_{0r}). Posteriormente, se establece el nivel de confianza de 95% para obtener el cuantil de una distribución *t* de Student. Con estos y la cuasivarianza del parámetro de interés derivada en la Ecuación 3, se obtienen los tamaños muestrales iniciales a nivel regional, considerando un muestreo aleatorio simple monoetápico m_{0r} .

9 Para efectos del cálculo del tamaño de la muestra, se definió "droga ilícita" como aquel consumo en una unidad determinada de tiempo de marihuana, cocaína y/o pasta base.

10 La tasa de no logro se utiliza a nivel comunal, cuando ya se ha distribuido la muestra regional entre las comunas.

Ecuación 4

$$m_{0r} = \frac{t_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \cdot S(p_r)^2}{d_{0r}^2}$$

Posteriormente, se estima el tamaño muestral considerando el efecto del diseño al aplicar un muestreo complejo. El efecto del diseño representa el ajuste del tamaño muestral; así, los valores que se utilizan como efectos del diseño consideran los efectos obtenidos en el levantamiento del ENPG 2022. La Ecuación 5 presenta la fórmula utilizada para el cálculo del tamaño muestral m_{1r} que incorpora el efecto del diseño:

Ecuación 5

$$m_{1r} = m_{0r} \cdot Deff(p_r)$$

Donde:

m_{0r} representa el número de viviendas estimadas a encuestar en la región r bajo un muestreo aleatorio simple.

m_{1r} representa el número de viviendas a encuestar en la región r ; ajustado por efecto de diseño, es decir, bajo un diseño complejo.

Así, a partir del tamaño bajo muestreo aleatorio simple y de la cuasivarianza poblacional obtenida en la Ecuación 5, se obtiene el error absoluto asociado según la Ecuación 6:

Ecuación 6

$$d_{1r} = 2 * \frac{\sqrt{S(p_r)^2}}{\sqrt{m_{0r}}}$$

Luego, los tamaños muestrales regionales obtenidos se corrigen por un ponderador que da cuenta de la condición de población finita (fracción de muestreo, FRm_r). Esta fracción se obtiene a partir de la Ecuación 7:

Ecuación 7

$$FRm_r = \frac{m_{1r}}{MM_r}$$

Obtenida la fracción de muestreo a nivel regional, se determina el tamaño muestral "corregido por finitud", según la Ecuación 8:

Ecuación 8

$$m_{2r} = \frac{Z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \cdot S(p_r)^2 \cdot Deff(p_r)}{d_{0r}^2 + Z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \cdot Deff(p_r) \cdot \frac{S(p_r)^2}{MM_r}} = \frac{m_{1r}}{1 + \frac{m_{1r}}{MM_r}}$$

Donde:

m_{2r} representa el total de viviendas estimadas a encuestar en la región r mediante un diseño muestral complejo que incorpora el efecto del diseño y el ajuste por finitud.

MM_r corresponde al total de viviendas de la población en la región r .

Una vez obtenidos los tamaños corregidos por finitud a nivel regional, se distribuyeron entre las comunas que forman parte de la muestra (m_{h1}). Esta distribución se realiza en forma proporcional a la distribución de la muestra objetivo del ENPG 2022.

Una vez distribuido el tamaño muestral en las 109 comunas, se aplica un factor que corresponde al promedio entre las tasas de no logro (tnl_h) obtenidas en los ENPG 2018, ENPG 2020 y ENPG 2022 a nivel comunal, con la finalidad de salvaguardar la precisión de la estimación del parámetro de interés¹¹. De esta forma, la Ecuación 9 define el tamaño con sobremuestreo que considera el ajuste por no logro a nivel comunal:

Ecuación 9

$$m_{h2} = \frac{m_{h1}}{1 - tnl_h}$$

El tamaño comunal con sobremuestreo m_{h2} es dividido por el número de viviendas a seleccionar por UPM (m_{ih}) para obtener el número de UPM a seleccionar por comuna¹², como se muestra en la Ecuación 10:

Ecuación 10

$$n_h = \frac{m_{h2}}{m_{h1}}$$

Dado el número de UPM a seleccionar por comuna según la Ecuación 10, el tamaño con sobremuestreo de viviendas a nivel comunal puede variar. Así, se calcula el tamaño comunal con sobremuestreo m_{h3} como el producto entre el número de UPM a seleccionar por comuna y el total de viviendas a seleccionar por UPM, como se muestra en la Ecuación 11:

Ecuación 11

$$m_{h3} = n_h * m_{ih}$$

11 Los motivos pueden ser los siguientes: rechazos, incompletitud de respuesta a los ítems, moradores ausentes, edificaciones que no forman parte de la población objetivo, imposibilidad para ubicar la unidad muestral, imposibilidad para la recogida de datos, pérdida accidental de estos, entre otros.

12 Para la determinación del número definitivo de UPM a seleccionar, se establece la siguiente regla: si al dividir el tamaño (en número de viviendas) por el número de viviendas a seleccionar por UPM (12), el residuo es mayor o igual a 4 viviendas, se agrega una UPM adicional.

Finalmente, el tamaño regional con sobremuestreo m_{r3} se calcula como la agregación regional del total de viviendas determinado en cada una de las comunas presentes en la muestra. Esto se observa en la Ecuación 12:

Ecuación 12

$$m_{r3} = \sum_{h \in r} m_{h3}$$

Con los tamaños muestrales regionales propuestos se obtienen errores absolutos asociados a la variable de interés, que fluctúan entre 4,0% (Región de Antofagasta) y 2,1% (Región Metropolitana).

TABLA 4
Errores esperados para la estimación de la variable de interés sobre la muestra teórica, según regiones. Chile, 2022.

Región	Prevalencia de vida ENPG 2022 (%)	Efecto diseño esperado	Error absoluto esperado (%)	Error relativo esperado (%)	Tamaño objetivo ajustado ENPG 2024	Tamaño sobremuestreo ENPG 2024
	p_r	$Deff(p_r)_{propuesto}$	d_r	e_r	$m_{2r(ajust)}$	m_{3r}
Nacional	35,4	2,4	0,8	2,3	23.509	43.750
Tarapacá	34,8	1,7	3,3	9,4	1.393	2.292
Antofagasta	31,4	1,7	4,0	12,8	915	1.464
Atacama	30,4	1,7	3,5	11,4	1.218	1.918
Coquimbo	30,8	1,7	3,9	12,8	912	1.308
Valparaíso	32,6	1,8	2,7	8,4	2.049	3.804
O'Higgins	28,3	1,7	3,1	11,0	1.382	2.760
Maule	19,5	2,5	3,4	17,7	1.339	2.076
Biobío	29,5	1,9	3,1	10,4	1.678	3.048
La Araucanía	29,5	2,1	3,3	11,3	1.599	3.248
Los Lagos	27,6	1,7	3,2	11,6	1.310	2.448
Aysén	35,0	1,7	3,9	11,3	940	1.536
Magallanes	15,2	2,5	3,2	20,7	1.270	2.240
Metropolitana	42,3	1,7	2,1	4,9	3.790	8.712
Los Ríos	36,3	1,8	3,8	10,5	1.125	1.820
Arica y Parinacota	33,0	1,7	3,7	11,3	1.092	2.004
Ñuble	29,8	1,8	3,2	10,6	1.497	3.072

Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Así, se obtiene una muestra objetivo de 23.509 viviendas que, al considerar la tasa de no logro promedio de los últimos tres estudios, da como resultado un tamaño muestral con sobremuestreo de 43.750 viviendas.

El nivel de logro del ENPG 2024 fue de 79,4%, con un total de 18.668 casos levantados entre personas de 12 a 65 años. La Región de Atacama mostró un menor nivel de logro con un 55,7%, mientras que la Región del Biobío presentó el mayor nivel de logro con un 119,0%.

TABLA 5
Distribución de la muestra teórica y efectiva por regiones.
Chile, 2024.

Región	Muestra teórica	Muestra efectiva	Porcentaje de logro (%)
Nacional	23.509	18.668	79,4
Tarapacá	1.393	1.143	82,1
Antofagasta	915	740	80,9
Atacama	1.218	679	55,7
Coquimbo	912	581	63,7
Valparaíso	2.049	1.360	66,4
O'Higgins	1.382	966	69,9
Maule	1.339	1.019	76,1
Biobío	1.678	1.996	119,0
La Araucanía	1.599	1.403	87,7
Los Lagos	1.310	1.089	83,1
Aysén	940	685	72,9
Magallanes	1.270	712	56,1
Metropolitana	3.790	3.345	88,3
Los Ríos	1.125	755	67,1
Arica y Parinacota	1.092	771	70,6
Ñuble	1.497	1.424	95,1

Considerando la muestra efectiva de 18.668 viviendas, se presentan en la Tabla 6 los errores efectivos absolutos y relativos a nivel regional, asociados a la variable “Consumo de cualquier droga ilícita alguna vez en la vida”.

TABLA 6
Errores observados sobre la muestra efectiva para la estimación de la variable de interés, según regiones.
Chile, 2024.

Región	Muestra efectiva	Prevalencia vida ENPG 2024 (%)	Error estándar	Error absoluto (%)	Error relativo (%)
Nacional	18.668	33,2	0,8	1,5	4,4
Tarapacá	1.143	20,4	1,5	3,0	14,5
Antofagasta	740	14,4	1,6	3,2	22,3
Atacama	679	26,4	3,1	6,2	23,4
Coquimbo	581	30,1	3,1	6,1	20,2
Valparaíso	1.360	30,9	2,4	4,7	15,1
O'Higgins	966	29,1	2,3	4,5	15,4
Maule	1.019	23,3	1,6	3,1	13,3
Biobío	1.996	25,7	1,5	2,9	11,2
La Araucanía	1.403	35,3	1,8	3,6	10,1
Los Lagos	1.089	26,7	2,2	4,4	16,5
Aysén	685	32,7	2,5	4,9	14,9
Magallanes	712	36,7	2,5	4,9	13,4
Metropolitana	3.345	38,8	1,3	2,6	6,7
Los Ríos	755	37,2	1,9	3,7	10,0
Arica y Parinacota	771	26,2	2,0	4,0	15,1
Ñuble	1.424	24,2	1,3	2,6	10,8

Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Factores de expansión

El factor de expansión se obtiene según el diseño muestral. Por lo tanto, para esta encuesta dicho factor corresponde al aplicado a una muestra en tres etapas y su cálculo depende del número total de personas elegibles dentro de la vivienda encuestada, el número de viviendas que tiene la UPM y el número de UPM que tiene cada comuna.

Los componentes del factor de expansión se obtienen como el producto de los inversos de las probabilidades de selección de las unidades de primera etapa (UPM), de las probabilidades de selección de las unidades de segunda etapa (viviendas) seleccionadas desde las UPM que forman parte de la muestra, y de las probabilidades de selección de las unidades de tercera etapa (personas) seleccionadas en las viviendas encuestadas, conformándose según los siguientes parámetros:

- Número de UPM seleccionadas en la muestra y número de UPM en el marco muestral (MMV 2021) dentro de cada estrato *h* (comuna).
- Número de viviendas seleccionadas y existentes según actualización de los listados de viviendas de la UPM seleccionada *i*.
- Número de personas elegibles en la vivienda *j* perteneciente a la UPM seleccionada *i*.

Dado que para el ENPG 2024 las unidades de análisis son la personas de entre 12 y 65 años que residen en viviendas particulares ocupadas —con base en las proyecciones de población basadas en los censos de población y vivienda—, se corrigen también posibles desbalances de los totales poblacionales en variables como edad y sexo, mediante un ajuste de calibración. En consecuencia, la metodología de cálculo de los factores de expansión consiste en la aplicación secuencial de ocho ponderadores o ajustes:

- Ponderador de selección de unidades de primera etapa (UPM)
- Ponderador de selección de unidades de segunda etapa (viviendas)
- Ajuste por omisión de viviendas en UPM que han sido seleccionadas en otras encuestas
- Ajuste por elegibilidad
 - Ajuste por elegibilidad desconocida de unidades de segunda etapa
 - Ajuste por no elegibilidad de unidades de segunda etapa
- Ajuste por no respuesta de unidades de segunda etapa
- Ponderador de selección de unidades de tercera etapa
- Suavizamiento del factor de expansión de tercera etapa
- Calibración a totales poblacionales según proyecciones de población estimadas por el INE, con fecha correspondiente a la mitad del periodo de levantamiento

PONDERADOR DE SELECCIÓN DE UNIDADES DE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA

La selección de una UPM i al interior de cada estrato de muestreo h se realiza con probabilidad proporcional al tamaño, según el número de viviendas particulares que contienen en el marco muestral. La forma de cálculo se observa en la Ecuación 13:

Ecuación 13

$$P_h(i) = \frac{n_h \cdot M_{hi}}{M_h}$$

Donde:

- i es el índice de la unidad primaria de muestreo.
- h es el índice del estrato de muestreo.
- n_h es el número de UPM seleccionadas del estrato h .
- M_{hi} es el número de viviendas en la UPM i del estrato h según el MMV 2021.
- M_h es el número de viviendas en el estrato h según el MMV 2021.

Una vez obtenidas las probabilidades de selección de los conglomerados (UPM), se obtiene el ponderador de selección como el inverso de esta probabilidad, tal como se indica en la Ecuación 14:

Ecuación 14

$$w_{hi} = \frac{1}{P_h(i)} = \frac{M_h}{n_h \cdot M_{hi}}$$

Donde:

w_{hi} es el ponderador de selección base de la unidad primaria de muestreo o conglomerado.

El ponderador de selección de conglomerados se interpreta como el total de conglomerados en el marco muestral que representa una unidad seleccionada en la muestra.

Al interior de cada conglomerado, las viviendas son seleccionadas bajo un algoritmo de selección sistemático con igual probabilidad. Así, la probabilidad $P_{hi}(j/i)$ de incluir la j -ésima vivienda, condicional a que el i -ésimo conglomerado (UPM) fue seleccionado en la muestra en el estrato h , está dada por la Ecuación 15:

Ecuación 15

$$P_{hi}(j/i) = \frac{m_{hi}}{M'_{hi}}$$

Donde:

- j es el índice de la vivienda.
- M'_{hi} es el número de viviendas particulares ocupadas en la UPM i , del estrato h disponibles para seleccionar, según enumeración o verificación previa a la recolección de datos.
- m_{hi} es el número de viviendas seleccionadas en la UPM i , del estrato h .

Una vez obtenidas las probabilidades de selección de las viviendas, se obtiene el ponderador de selección como el inverso de esta probabilidad, tal como se indica en la Ecuación 16:

Ecuación 16

$$w_{hij/i} = \frac{1}{P_{hi}(j/i)} = \frac{M'_{hi}}{m_{hi}}$$

Finalmente, el factor de selección de unidades de primera y segunda etapa queda definido como se muestra en la Ecuación 17:

Ecuación 17

$$w_{hij} = w_{hi} \cdot \frac{1}{P_{hi}(j/i)} = \frac{M_h}{M_{hi} \cdot n_h} \cdot \frac{M'_{hi}}{m_{hi}}$$

El factor w_{hij} se interpreta como el número de viviendas en la población que representan las viviendas seleccionadas en la muestra del ENPG 2024.

AJUSTE POR OMISIÓN DE VIVIENDAS EN UPM PERTENECIENTES A OTRAS MUESTRAS

La selección de UPM considera todas las UPM que conforman el marco de selección para el ENPG 2024, independiente de si estas han sido seleccionadas en el marco de la realización de otras encuestas.

En algunos casos, esto indica que el trabajo de campo de estas encuestas coincide con el trabajo de campo del ENPG 2024 y, en otros, no ha pasado suficiente tiempo desde la última vez que las viviendas seleccionadas en el ENPG 2024 fueron levantadas en otras encuestas. Por este motivo, es necesario realizar un ajuste al directorio de viviendas previo a la selección, que le otorgue probabilidad igual a 0 a aquellas que ya han sido seleccionadas en otras encuestas. Este ajuste afecta las probabilidades originales de selección de las viviendas, por cuanto se reduce el número de viviendas. De esta forma, y con el propósito de conservar el stock original de viviendas, se estima una razón entre la cantidad total de viviendas particulares ocupadas desde el directorio original y la cantidad de viviendas disponibles en dicho directorio, es decir, con probabilidad de selección mayor que cero. Esta razón se observa en la Ecuación 18:

Ecuación 18

$$\hat{R}_i = \frac{\text{Total viviendas en la UPM}}{M'_{hi}}$$

Donde:

Total viviendas en la UPM es el número total de viviendas particulares ocupadas en la UPM *i*, del estrato *h*, según enumeración o verificación previa a la recolección de datos.

M'_{hi} es el número de viviendas particulares ocupadas en la UPM *i*, del estrato *h*, disponibles para seleccionar, según enumeración o verificación previa a la recolección de datos.

El factor w_{hij} es ponderado por la razón $\hat{R}_i$, como se muestra en la Ecuación 19:

Ecuación 19

$$w_{hij_ajust} = w_{hij} \cdot \hat{R}_i$$

AJUSTE POR ELEGIBILIDAD

La población objetivo del ENPG 2024 considera a personas que residen en forma habitual en viviendas particulares ocupadas. Estas viviendas son obtenidas desde un marco de selección definido para este propósito; sin embargo, siempre existe la posibilidad de tener errores de inclusión (o de exclusión) al momento de emplear el marco muestral, por ejemplo, fallas en el proceso de enumeración y/o verificación, cambios en el uso de la vivienda entre el momento de enumeración y aplicación de la encuesta, entre otros.

En ese sentido, se hace necesario ajustar las probabilidades de selección de las viviendas seleccionadas para incorporar el hecho de

que una proporción de las viviendas podría resultar como no elegible y, en otros casos, podría desconocerse su estado de elegibilidad.

Al término del trabajo de campo, todas las viviendas seleccionadas inicialmente para el ENPG 2024 son clasificadas en tres grandes grupos. Estos son:

- **Elegibles:** corresponde a edificaciones en las que el encuestador pudo determinar que se trataban de viviendas particulares ocupadas (incluye entrevistas completas, entrevistas parciales y no entrevistadas).
- **No elegibles:** son edificaciones identificadas como negocios, viviendas colectivas, viviendas deshabitadas, viviendas de veraneo, viviendas destruidas, etc.; en síntesis, edificaciones que no pertenecen al universo de estudio.
- **Elegibilidad desconocida:** corresponde a edificaciones en las que no se pudo determinar su estado. Este es el caso, por ejemplo, de unidades que nunca fueron enviadas a terreno, viviendas a las cuales no se pudo llegar o encontrar, y otros casos similares.

El ponderador de selección de viviendas tiene valores válidos para las viviendas elegibles, no elegibles y de elegibilidad desconocida. En lo que sigue del proceso, sólo se dejan valores válidos para las viviendas elegibles.

De esta manera, el ajuste por elegibilidad desconocida consiste en la estimación de los pesos a redistribuir, calculado como la razón entre dos estimaciones realizadas con base en el factor de selección ajustado por omisión de viviendas.

Así, el numerador corresponde a la estimación del total de viviendas en la población y el denominador corresponde a la estimación del total de viviendas con elegibilidad conocida (viviendas elegibles y no elegibles). Esto se observa en la Ecuación 20:

Ecuación 20

$$\hat{R}_{h, know} = \frac{\sum_{i \in \Omega_h} \sum_{j \in \theta_i} w_{hij_ajust}}{\sum_{i \in \Omega_h} \sum_{j \in \theta_{i, know}} w_{hij_ajust}}$$

Donde:

θ_i es el conjunto de viviendas *j* seleccionadas en la UPM *i*.

$\theta_{i, know}$ es el conjunto de viviendas *j* seleccionadas en la UPM *i* y clasificadas como elegibilidad conocida (elegibles o no elegibles).

Ω_h es el conjunto de estratos *h* (áreas urbanas de las comunas seleccionadas para el ENPG 2024).

w_{hij_ajust} es el ponderador de selección ajustado por omisión de viviendas.

La razón antes descrita se realiza a nivel de estrato de muestreo. Luego, el factor de selección de viviendas corregido por elegibilidad desconocida está dado por la Ecuación 21:

Ecuación 21

$$w'_{hij} = \hat{R}_{h,known} \cdot w_{hij_ajust}$$

Respecto a la no elegibilidad, consiste en asignar un valor blanco (*missing*) en el factor de selección de viviendas corregido por elegibilidad a las viviendas con clasificación no elegible.

AJUSTE POR NO RESPUESTA

Una vez que se realiza el ajuste por elegibilidad de las viviendas, se deben considerar sólo las viviendas en condición de elegibles. Sin embargo, podrían ocurrir, entre otras, las siguientes situaciones: que los residentes manifiesten no querer participar en la encuesta, que exista imposibilidad de seleccionar un informante Kish o ausencia de moradores en el momento del levantamiento. Dichas situaciones originan la no respuesta.

El ajuste por no respuesta busca corregir los pesos para que la encuesta, a partir de las unidades que responden, sea representativa de toda la población. Como resultado, los pesos de las unidades que respondieron a la encuesta se incrementan para compensar el peso de las unidades que no respondieron.

Para predecir la participación en la encuesta (tasa de respuesta) a nivel de UPM, se implementa un modelo de regresión lineal que utiliza un conjunto de variables auxiliares con información a ese mismo nivel y a niveles más agregados como las comunas. Las fuentes de información corresponden al Censo de Población y Vivienda 2017 y a registros administrativos. Las unidades son ordenadas en orden creciente de acuerdo con esta tasa estimada. Luego, todas las unidades primarias de muestreo (UPM) son agrupadas en veintiles (20 grupos de igual tamaño), siendo asignadas a un mismo veintil las viviendas pertenecientes a la misma unidad.

Así, los ponderadores correspondientes a las viviendas elegibles que no respondieron pueden ser redistribuidos entre las viviendas elegibles que sí respondieron. Para estos efectos, se debe calcular una razón de ajuste, formalizada en la Ecuación 22:

Ecuación 22

$$\hat{R}_{g,R} = \frac{\sum_{i \in \Phi_g} \sum_{j \in \theta_{i,eleg}} w'_{hij}}{\sum_{i \in \Phi_g} \sum_{j \in \theta_{i,eleg,R}} w'_{hij}}$$

Donde:

- g es el índice del grupo para la corrección de no respuesta (veintil).
- Φ_g es el conjunto de UPM asignadas al veintil g .
- $\theta_{g,eleg}$ es el conjunto de viviendas pertenecientes al veintil g y catalogadas como elegibles.
- $\theta_{g,eleg,R}$ es el conjunto de viviendas pertenecientes al veintil g , catalogadas como elegibles y que responden la encuesta.
- w'_{hij} es el ponderador de selección de viviendas corregido por elegibilidad.

Una vez calculada la razón de ajuste, el ponderador de selección corregido por no respuesta queda expresado según la Ecuación 23:

Ecuación 23

$$w_{hij}^{NR} = \hat{R}_{g,R} \cdot w'_{hij}$$

Donde:

w_{hij}^{NR} corresponde al factor ajustado por No respuesta.

Este ponderador se asigna a las 18.668 viviendas elegibles entrevistadas. Por su parte, las viviendas elegibles no entrevistadas obtienen un valor blanco (*missing*) como ponderador.

PONDERADOR DE SELECCIÓN DE UNIDADES DE TERCERA ETAPA (PERSONAS)

Luego de obtener el ponderador de viviendas ajustado por no respuesta se debe incorporar un tercer componente que da cuenta de la selección de las unidades de tercera etapa, es decir, de las personas seleccionadas al interior de cada vivienda. Dado que la selección se realiza mediante el método Kish —que asigna la misma probabilidad de ser elegido como informante de la encuesta a todos aquellos miembros de la vivienda que cumplen determinadas características—, la probabilidad condicional de selección de la persona queda determinada por la Ecuación 24:

Ecuación 24

$$p_k = \frac{1}{n_k}$$

Donde:

- p_k es la probabilidad condicional de seleccionar a la persona k .
- n_k es el total de personas seleccionables en la vivienda.

Una vez que se ha obtenido el ponderador de tercera etapa, el factor de expansión queda determinado según la Ecuación 25:

Ecuación 25

$$w'''_{hijk} = w''_{hij} \cdot n_k$$

Donde:

w'''_{hijk} es el factor de expansión correspondiente a la selección de tercera etapa.

SUAVIZAMIENTO DEL FACTOR DE EXPANSIÓN DE SELECCIÓN DE UNIDADES DE TERCERA ETAPA

Debido a la incorporación de diferentes ajustes a los ponderadores iniciales de las unidades, se identifican unidades con factores de expansión con valores diferentes a los esperados. Por ello, es

necesario incorporar un procedimiento de suavizado de los factores con el objetivo de compensar la variabilidad introducida. Dicho procedimiento consiste en trincar los factores de expansión que se ubican por encima de un umbral definido para luego redistribuir, en forma proporcional, la diferencia resultante entre los factores que se encuentran por debajo de este umbral.

En el ENPG 2024, para el suavizamiento del factor de expansión se ha utilizado un método mixto (MM) que está conformado por el método de contracción a la media (CM) y el método R-K.

AJUSTE A STOCKS POBLACIONALES (CALIBRACIÓN)

El ENPG 2024 se realiza a partir de una muestra de viviendas donde, una vez establecido el contacto, es seleccionada la tercera unidad de muestreo (personas) según la composición de cada vivienda. Dado el diseño muestral, los factores de expansión calculados sirven para llevar estas unidades muestrales a sus respectivos stocks poblacionales (totales de viviendas y personas). Sin embargo, al no contar a priori con un universo para la selección de personas¹³, se requiere incorporar a los factores de expansión un ponderador proveniente de fuentes externas que refleje cuántas personas representa en la población una unidad en la muestra.

Este ponderador se obtiene con información actualizada dada por las proyecciones de población generadas por el INE a partir del Censo de Población y Vivienda 2017, con referencia al periodo de realización de la encuesta (30 de marzo de 2025). Estas proyecciones se utilizan en los diseños de todas las encuestas de hogares encargadas al INE. El ajuste o ponderación se realiza a nivel regional urbano considerando, además, desagregaciones por sexo y tramos etarios, las que se abordan más adelante.

Este es el último ajuste aplicado al factor de expansión y se denomina "calibración". En el ENPG 2024 se utiliza el método Raking que permite incorporar información auxiliar relacionada con la variable de interés del estudio, considerando el cumplimiento de tres propósitos: el primero de ellos es que la encuesta, a partir de los pesos calibrados, sea capaz de reproducir totales poblacionales conocidos; el segundo propósito es alcanzar mejoras en la precisión de los parámetros de interés por medio de la obtención de estimaciones con un menor error de muestreo, y el tercer propósito es obtener una mayor precisión en las estimaciones.

Para realizar la calibración se evalúa el factor de expansión en su última etapa (suavizado) donde la suma a nivel nacional alcanza 10.358.624 personas. Luego de calibrar, se obtiene un total de 11.396.772 personas, coincidente con el stock de personas provenientes de las proyecciones de población.

Esta información auxiliar se utiliza como un vector de totales poblacionales —llamados marginales de calibración—, y para el ENPG 2024 fueron consideradas las siguientes desagregaciones:

- A nivel nacional: población total según sexo y 3 grupos etarios [12-24], [25-40] y [41-65].
- A nivel regional: población total según sexo, para la suma de las comunas en el estudio.
- A nivel regional: población total y 3 grupos de edad [12-24], [25-40] y [41-65], para la suma de las comunas en el estudio.

Como se mencionó anteriormente, antes de calibrar el factor se deben evaluar los coeficientes de variación resultantes para cada marginal definida, los que son obtenidos con el factor suavizado. Esto corresponde a un criterio inicial de calidad estadística, y se espera que estos valores sean menores a 15% para todas las categorías; de lo contrario, se reduce el número de categorías.

En el ENPG 2024 fueron revisadas las marginales descritas en el párrafo anterior y ningún coeficiente de variación supera el 15% por lo que no fue necesario colapsar características.

Antecedentes previos al inicio del trabajo de terreno

Durante el levantamiento de información, el trabajo de terreno del ENPG 2024 fue estructurado a partir de una Jefatura Nacional de Terreno que delegaba funciones en un Coordinador de Terreno, quien se relacionaba directamente con un grupo de Coordinadores de Sedes y estos, a su vez, con los encuestadores. Paralelamente existía un equipo de supervisión independiente para monitorear el levantamiento de información.

En cada una de las sedes definidas para la realización de este estudio existía una oficina debidamente acondicionada para coordinar el trabajo de campo y la recepción del material asociado al trabajo de campo.

PRETEST DE LA ENCUESTA

La realización del pretest de la encuesta busca mejorar tanto el diseño de los instrumentos a utilizar como los procedimientos a seguir en el trabajo de campo, entre ellos, los protocolos de aplicación y el manejo de instrumentos.

ETAPA CUANTITATIVA

Antes de iniciar el trabajo de terreno fue necesario evaluar el cuestionario, el formato de aplicación (*tablet*) y el protocolo del estudio con el fin de prevenir y detectar problemas en la implementación del instrumento. En esta etapa de prueba se evalúa el diseño, la comprensión de las preguntas, el tiempo de aplicación y otros aspectos asociados al procedimiento de contacto con los encuestados.

A partir de la información recabada del pretest, y en caso de ser necesarias, se proponen mejoras para la aplicación del instrumento y el proceso de capacitación de los encuestadores.

La muestra del pretest estuvo conformada por 80 viviendas, distribuidas en las regiones de Tarapacá, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Los Ríos y Metropolitana, seleccionadas en conglomerados de cinco viviendas por manzanas censales previamente empadronadas y seleccionadas de forma aleatoria. En cada vivienda, el encuestador

13 La selección de personas ocurre en el momento del trabajo de campo y es recién ahí cuando se puede estimar un total poblacional a partir de la muestra.

seleccionó —entre todas las personas elegibles de la vivienda— un individuo de 12 a 65 años mediante la tabla de selección aleatoria de Kish empleada en el estudio anterior. El trabajo de campo se desarrolló entre los días 6 y 10 de noviembre de 2024.

Se seleccionaron 13 comunas¹⁴ de las 6 regiones a nivel nacional, tomando en consideración el NSE preponderante de cada una de ellas. Se decide distribuir la muestra en los distintos NSE bajo el supuesto de que distintos NSE pueden tener distintos grados de comprensión de las preguntas del cuestionario.

La realización del pretest involucró todos los aspectos contemplados en los protocolos de contacto y aplicación que serían parte del trabajo de terreno del estudio. De manera específica, se evaluaron los siguientes aspectos:

- Cartas de presentación del estudio
- Protocolos de contacto con el entrevistado
- Hoja de ruta digital del encuestador y registro de incidencia en las viviendas (Códigos de Disposición Final de viviendas)
- Diseño del cuestionario en la *tablet* y contenido (nivel de comprensión de las preguntas)
- Tiempo de aplicación
- Implementación en la *tablet* del cuestionario y la tabla de Kish (programación, usabilidad y posibles errores)
- Diseño e implementación en la *tablet* de la pauta de supervisión

Las personas que aplicaron el pretest fueron seleccionadas de un grupo de entrevistadores con experiencia en la realización de estudios de carácter probabilístico en viviendas y/u hogares, quienes contaban también con experiencia en la aplicación de versiones previas de estudios sociales y en temáticas afines. Los encuestadores seleccionados tuvieron dedicación exclusiva a este trabajo. Asimismo, se privilegió aquellos encuestadores que contaban con una buena evaluación de desempeño en estudios anteriores de características similares, tanto en términos metodológicos como en temáticas relacionadas al ENPG 2024.

Para la realización de la etapa de pretest se definió la intervención de 24 encuestadores, coordinados por un Jefe de Terreno. Todo el equipo de terreno que participó del estudio en esta etapa piloto fue capacitado por el personal técnico de la empresa ejecutora del trabajo de campo, además de contar con la asistencia del equipo de supervisión y de SENDA en este proceso.

La capacitación del personal de trabajo del pretest se realizó con base en las mismas características y lineamientos de esta actividad previstas para el terreno definitivo del ENPG 2024.

JORNADAS DE CAPACITACIÓN

Las jornadas de capacitación enfocadas en encuestadores, jefes de terreno y supervisores se realizaron de manera *online* y simultáneamente por zona de aplicación. La duración de cada jornada fue de 4 a 5 horas durante la mañana, en cada uno de los días definidos.

Junto a esta instancia formativa, cada miembro del equipo de terreno recibió un manual con el detalle de todos los puntos abordados en la capacitación y con diversas instancias de conexión directa con las jefaturas de campo para resolver dudas o problemáticas previas al trabajo de campo. A nivel nacional se capacitaron 221 encuestadores.

TABLA 7
Distribución de jornadas de capacitación de encuestadores según regiones. Chile, 2024.

Región	Nº encuestadores	Fecha
Tarapacá	8	04-dic-2024
Antofagasta	10	04-dic-2024
Atacama	6	04-dic-2024
Coquimbo	21	04-dic-2024
Valparaíso	17	27-nov-2024
O'Higgins	9	27-nov-2024
Maule	12	27-nov-2024
Biobío	13	28-nov-2024
La Araucanía	13	28-nov-2024
Los Lagos	9	03-dic-2024
Aysén	4	28-nov-2024
Magallanes	12	28-nov-2024
Metropolitana	3	28-nov-2024
Metropolitana	36	02-dic-2024
Los Ríos	16	03-dic-2024
Arica y Parinacota	15	04-dic-2024
Ñuble	17	03-dic-2024

Metodología de aplicación de las encuestas

ESTÁNDARES DE APLICACIÓN

El cuestionario aprobado a partir de los resultados del pretest se compuso de 18 módulos. No se consideró en ninguna instancia la opción de entregar respuestas del tipo autoaplicada; vale decir, el encuestador debía aplicar toda la encuesta y, sin excepción, debía leer la totalidad de las preguntas.

El cuestionario final fue aplicado por medio del dispositivo electrónico en modalidad CAPI. La selección del informante Kish se realizó presencialmente en cada una de las viviendas en modalidad CAPI.

El uso de dispositivos electrónicos para aplicar encuestas permite reducir los errores de aplicación, ya que sus campos son programados a partir de una malla de validación siguiendo los saltos lógicos de la encuesta; esto sucede en tiempo real, a medida que se avanza en el cuestionario. Cada vez que se comete un error en el ingreso

14 Las comunas seleccionadas fueron Iquique, Alto Hospicio, Valparaíso, Quillota, San Felipe, Cerro Navia, Puente Alto, Rancagua, Graneros, Talca, Curicó, Parral y Valdivia.

de la información aparece un mensaje que le indica la situación al encuestador; de esta forma, el encuestador sólo debe preocuparse de leer adecuadamente las preguntas, aclarar conceptos y seguir el protocolo de aplicación de forma correcta.

Bajo esta modalidad de aplicación se mantuvo el control de los datos ingresados, ya que diariamente las encuestas realizadas se sincronizaban y almacenaban en un servidor web dispuesto para este estudio, lo que permitió hacer un seguimiento en línea de la cantidad de encuestas aplicadas. Todos los instrumentos del estudio —es decir, hoja de ruta, tabla de Kish, cuestionario y pauta de supervisión— fueron programados en la *tablet* a través de la plataforma Ipsos IField.

A continuación, se describen algunas medidas diseñadas para asegurar una correcta relación con los distintos agentes en el proceso de encuestaje —esto es, el informante idóneo y el encuestado— con el fin de proporcionar la información requerida para el estudio:

- Se describe de manera clara y convincente el tipo de estudio que se está llevando a cabo, con el objetivo de que los participantes entiendan su importancia para futuras políticas públicas en torno al tema. Se recalca que se trata de un estudio de salud pública y que la selección de quien responde la encuesta (informante Kish) es aleatoria entre las personas que residen habitualmente en la vivienda.
- El encuestador debe transmitirle confianza al encuestado, entregando seguridad respecto a la información que se recolectará. En este sentido, se le señala que toda la información reportada se maneja con absoluta reserva, siendo inaccesible para otros individuos o entidades que quieran hacer uso indebido de ella. Esto plantea que el estudio es confidencial y anónimo, por lo que no se solicitan nombres completos ni otros datos de identificación que puedan comprometer la identificación de los residentes de la vivienda.
- Se le informa al entrevistado que los datos del estudio serán entregados de forma agregada, no siendo posible la identificación de los encuestados. Se hace hincapié en el uso adecuado de la información para garantizar confidencialidad y anonimato, a fin de acceder a información fidedigna del encuestado.
- Dadas las características del estudio, es importante mantener un comportamiento neutro ante el entrevistado, cuidando de no manifestar opiniones, sugerencias ni visiones respecto a los temas consultados en el cuestionario. De igual manera, y como fue transmitido en las jornadas de capacitación, el encuestador debe mostrar total disposición y conocimiento para resolver cualquier duda respecto a las preguntas del cuestionario.
- En ausencia de informante Kish o en el caso de que el informante idóneo indique que no está disponible para responder a las preguntas iniciales, se debe agendar una nueva fecha donde sí exista disponibilidad para continuar el proceso.

SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS

En el ENPG 2024 participaron personas de entre 12 a 65 años de las viviendas seleccionadas.

Al acceder a la vivienda, el encuestador debe identificar primeramente a un informante que se denomina informante idóneo. Esta es la persona de 18 años o más que entregará la información de todos

los integrantes de la vivienda, por lo que debe tener el conocimiento necesario para ello. Esta persona deberá ser capaz de entregar información sociodemográfica de todos los integrantes de la vivienda, como nombre¹⁵, edad y sexo.

Para seleccionar a un miembro de la vivienda de entre 12 a 65 años, el encuestador emplea la tabla de Kish, previamente programada en el dispositivo electrónico. El encuestador debe ingresar a todos los miembros residentes habituales de la vivienda y el dispositivo entrega de forma automática al individuo seleccionado. Es importante señalar que debe ingresarse a la totalidad de los miembros de la vivienda, incluyendo adultos mayores y niños menores de 12 años.

MÉTODO DE CAPTURA DE ENCUESTA

Para el ENPG 2024, de igual manera que en la anterior versión del estudio, la totalidad de los casos se aplicó en el dispositivo electrónico. El cuestionario se diagramó en papel únicamente para las jornadas de capacitación y para la elaboración del presente informe.

El modo de aplicación del instrumento tiene la ventaja de que permite validar —al momento de la entrevista— los flujos de respuestas y los saltos dentro del flujo del cuestionario, además de reducir el tiempo de entrevista y mejorar la calidad de la encuesta, ya que evita errores producidos por el encuestador.

Otra ventaja es que optimiza el monitoreo del trabajo de terreno. Este sistema permite llevar un registro diario de los Códigos de Disposición Final (CDF) de casos, información que es relevante para tomar decisiones durante el trabajo de campo y evaluar oportunamente las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de cobertura del estudio. Finalmente, se disminuyen los tiempos de procesamiento de las bases de datos, toda vez que la información queda guardada automáticamente en medios magnéticos, en servidores debidamente adecuados para la realización de este estudio. De esta forma, se evitan las tareas de digitación y validación posteriores, y los errores no muestrales vinculados a cada una de estas etapas.

En suma, la captura de datos a través de dispositivos electrónicos permite incorporar sintaxis de validación al instrumento que no son posibles de implementar en formularios de papel; por ejemplo, sintaxis de flujo de preguntas o de contenidos específicos del cuestionario. Esto, además de reducir los tiempos de aplicación, evita errores no muestrales que pueda realizar el encuestador al momento de aplicar el instrumento.

Para la programación del cuestionario, el protocolo de recolección de respuestas es adaptado y parametrizado para ingresar los datos luego de aplicar cada módulo. El dispositivo electrónico, una vez conectado a internet, envía los datos recopilados y, en caso de existir actualizaciones, en la misma instancia se actualiza la información en las bases de datos de la plataforma.

15 Frente a la posibilidad de que el informante idóneo no quiera entregar nombres, se consignó a cada integrante de la vivienda con una identificación que permita saber quién es, por ejemplo, hijo 1, hijo 2, mamá, papá, otros.

TRABAJO DE TERRENO

El trabajo de terreno se desarrolló a través de una entrevista presencial con el uso del dispositivo electrónico. La entrevista se realizó a un participante seleccionado a través de la tabla de Kish, que cumpliera con los criterios de inclusión para el estudio. Ante la eventualidad de que la persona seleccionada no estuviera presente en ese momento, se solicitó información respecto al horario en que se le podía encontrar en la vivienda o información para poder contactarlo directamente e invitarlo a participar en el estudio.

Para este estudio se consideró un límite de cinco visitas a la vivienda; por tanto, el coordinador debía enviar al encuestador a la vivienda hasta en cinco oportunidades para identificar a la persona seleccionada a través de la tabla de Kish. Según la progresión de los CDF observados por cada coordinador de sede, por protocolo se estableció que contaba con la autoridad para cambiar al encuestador y reasignarlo a otra zona, posibilitando que otro encuestador acudiera a la vivienda.

El trabajo de terreno se inició en distintas fechas dependiendo de las sedes y la región. Esta fecha fue determinada por diversos factores: fecha de la capacitación de encuestadores, elección de una oficina sede para recibir el material y a los encuestadores, recepción del material para los encuestadores y la recepción de la muestra proveniente de la coordinación de terreno.

El trabajo de campo del estudio se coordinó a través de 20 sedes que corresponden a agrupaciones de comunas bajo la dirección de una jefatura zonal: dos en la Región de Arica y Parinacota, dos en la Región de Atacama, dos en la Región del Biobío, dos en la Región Metropolitana y una en el resto de las regiones. En el estudio trabajaron efectivamente 366 encuestadores durante la totalidad del trabajo de campo en las 16 regiones del país. El trabajo de terreno se inició el 10 de diciembre de 2024, luego de capacitar a todas las personas involucradas en la ejecución del estudio, despachar todo el material del estudio a las sedes a nivel nacional y distribuirlo entre los distintos encuestadores. El trabajo de terreno finalizó el 01 de junio de 2025.

Las primeras regiones en comenzar el trabajo de terreno fueron la Región de Valparaíso y la Región de Los Ríos (10 de diciembre de 2024), tras cumplir todos los requisitos y con la aprobación del cuestionario en medio digital, el protocolo de trabajo y la carta de presentación del estudio de parte del equipo de SENDA.

La descripción del trabajo de terreno de todas las sedes se presenta en la Tabla 8.

TABLA 8
Descripción del trabajo en terreno según regiones.
Chile, 2024.

Región	Número de sedes	Días de terreno	Fecha de inicio de terreno	Muestra lograda
Tarapacá	1	105	20-dic-2024	1.143
Antofagasta	1	132	03-ene-2025	740
Atacama	2	163	18-dic-2024	679
Coquimbo	1	151	17-dic-2024	581
Valparaíso	1	170	10-dic-2024	1.360
O'Higgins	1	168	14-dic-2024	966
Maule	1	139	16-dic-2024	1.019
Biobío	2	133	17-dic-2024	1.996
La Araucanía	1	150	16-dic-2024	1.403
Los Lagos	1	153	13-dic-2024	1.089
Aysén	1	140	18-dic-2024	685
Magallanes	1	168	14-dic-2024	712
Metropolitana	2	169	11-dic-2024	3.345
Los Ríos	1	158	10-dic-2024	755
Arica y Parinacota	2	167	14-dic-2024	771
Ñuble	1	142	13-dic-2024	1.424
Nacional	20	172	10-dic-2024	18.668

TASAS DE RESPUESTA, RECHAZO, CONTACTO Y COOPERACIÓN

Para registrar el resultado de las visitas hechas a las direcciones pertenecientes a la muestra, se utilizó un listado de códigos de disposición, que se basa en la codificación elaborada por The American Association for Public Opinion Research (AAPOR)¹⁶.

La tasa de respuesta, rechazo, contacto y cooperación se calculan con base en los Códigos de Disposición Final (CDF) registrados por los encuestadores en el dispositivo electrónico, en el apartado de la Hoja de Ruta. Dichos códigos siguen la clasificación establecida por la AAPOR y establecen cuatro grandes grupos: entrevistados; elegibles que no son entrevistados (no encuestado); casos de elegibilidad desconocida, no entrevistados, y casos que no son elegibles.

Los entrevistados se dividen en dos grupos: completos y parciales.

Con relación a los elegibles no entrevistados, estos se obtienen a partir de tres tipos de no respuesta: aquellos que rechazaron la encuesta o aquellos en donde la encuesta fue interrumpida, no contactos y otros. El primer tipo corresponde a los casos en los cuales existió algún tipo de contacto con la unidad, pero el informante declinó de realizar la entrevista o la aplicación del instrumento, o cuando se

16 The American Association for Public Opinion Research. (2016). *Standard Definitions: Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys* (9 ed.). http://www.aapor.org/AAPOR_Main/media/publications/Standard-Definitions20169theditionfinal.pdf

logró iniciar, pero esta fue interrumpida repentinamente. El segundo tipo corresponde a situaciones en las que se impide el acceso al hogar o en las que el informante no se encuentra o no está disponible para responder la encuesta. Por último, los otros casos representan instancias en las cuales, a pesar de no haber rechazado la encuesta, la entrevista no puede llevarse a cabo debido a que el informante se encuentra impedido física o mentalmente o existen problemas de lenguaje, muerte del informante u otras razones de diversa índole.

Los casos de elegibilidad desconocida y no entrevistados incluyen situaciones en las cuales se desconoce si la unidad (por ejemplo, hogar) elegida existe o no, y aquellos casos en los cuales, si bien existe la unidad, se desconoce si en ella hay presente un informante elegible.

Por último, los no elegibles corresponden a los siguientes casos: unidades fuera de muestra, estructuras que no son hogares, hogares que no poseen los niveles a evaluar y situaciones en que los cupos ya han sido llenados.

TABLA 9
Número de casos según Códigos de Disposición Final para muestra total. Chile, 2024.

Clasificación AAPOR	Categoría	Número de casos
[E] Entrevista completa	Entrevista completa	18.668
[P] Entrevista parcial	Entrevista incompleta/parcial	43
[UH] Se desconoce si existe hogar (vivienda) elegible	No visitada	868
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	No tiene tiempo	1.393
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	La familia o pareja le prohíbe contestar encuestas	79
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	No tiene beneficios por contestar la encuesta	102
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	Se niega sin dar razones	2.301
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	Otra razón de rechazo	237
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	No está interesado/a o es una pérdida de tiempo	3.906
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	Rechazo a nivel vivienda	46
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	Por su privacidad no quiere entregar información personal ni familiar	1.781
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	Por su seguridad no quiere entregar información personal ni familiar	950
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	Nunca responde encuestas	898
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	Está aburrido de contestar encuestas	139
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	No confía en las encuestas en general	533
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	No confía en las características oficiales	164
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	Ha tenido malas experiencias por responder encuestas	45
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	La familia o pareja le prohíbe contestar encuestas	62

[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	Rechazo a nivel vivienda	225
[R] Entrevistado rechazó la entrevista o quiebre en la entrevista	Rechazo informante Kish	7
[NC] Unidades no contactadas	Vivienda ocupada, sin moradores presentes	5.287
[NC] Unidades no contactadas	Se impide el acceso a la vivienda	1.257
[NC] Unidades no contactadas	Informante Kish no ubicable o sin dato de contacto	203
[NC] Unidades no contactadas	Informante Kish ausente en periodo de levantamiento de encuesta	177
[O] Otro motivo de no entrevista	Informante Kish impedido física y/o mentalmente para contestar	26
[O] Otro motivo de no entrevista	Informante Kish no habla idioma español	2
[O] Otro motivo de no entrevista	Muerte de informante Kish o algún familiar	1
[O] Otro motivo de no entrevista	Concertó cita con el informante Kish	85
[O] Otro motivo de no entrevista	Otra razón de no entrevista	29
[UH] Se desconoce si existe hogar (vivienda) elegible	No fue posible localizar la dirección	368
[UH] Se desconoce si existe hogar (vivienda) elegible	Inaccesibilidad por razones climáticas o desastres naturales	5
[UH] Se desconoce si existe hogar (vivienda) elegible	Área peligrosa	221
[UO] Se desconoce si entrevistado es elegible	Otra razón de elegibilidad desconocida	92
[NE] No elegible	Establecimiento, oficina de gobierno u otra organización	77
[NE] No elegible	Institución (por ejemplo: hospital, cárcel, asilo de ancianos, etc.)	23
[NE] No elegible	Dormitorio colectivo (por ejemplo: militar, de trabajo, internado, hostales, residenciales, etc.)	40
[NE] No elegible	Vivienda en demolición, incendiada, destruida o erradicada	85
[NE] No elegible	Vivienda desocupada (por ejemplo: en venta, arriendo, etc.)	498
[NE] No elegible	Vivienda de veraneo o de uso temporal	54
[NE] No elegible	Edificación no calificable (por ejemplo: en construcción, en reparaciones, etc.)	61
[NE] No elegible	No existe informante Kish elegible entre 12 y 65 años	1.930
[NE] No elegible	Otra razón para ser considerado Kish no elegible	225
[O] Otro motivo de no entrevista	Informante indica que vuelva en otro momento	557
Total		43.750

Considerando lo anterior, la Tabla 10 presenta las tasas de respuesta (TRR1), de cooperación (TCC1), de rechazo (TR1) y de contacto (TC1).

TABLA 10

Resultados de visita según tasas de resultados. Chile, 2024.

Tasa	Definición	Porcentaje (%)
TRR1	Proporción de entrevistas realizadas de todos los casos elegibles	45,8
TCC1	Proporción del número de entrevistas realizadas de aquellos casos que han sido contactados durante el período de trabajo de campo	57,8
TC1	Proporción de todos los casos en los que algún miembro de la vivienda ha sido contactado por el encuestador, aunque después se haya negado a responder o no haya podido dar ningún tipo de información	79,2
TR1	Proporción de todos los casos elegibles estimados que se niegan a contestar	31,6

A nivel regional se observa una relativa heterogeneidad en los resultados para las tasas obtenidas a partir de los Códigos de Disposición Final. La tasa de respuesta más alta se observó en la Región del Biobío con un 72,1%, mientras que la menor fue en la Región de Magallanes, con un 33,8%. Las tasas de rechazo variaron entre 9,0% (Región de Aysén) y 51,6% (Región de Los Ríos).

TABLA 11

Resultados de visita según tasas de resultados por región. Chile, 2024.

Tasas de resultados				
	TRR1	TCC1	TR1	TC1
Tarapacá	59,3	67,2	28,2	88,1
Antofagasta	53,0	62,5	31,4	84,8
Atacama	38,9	51,2	35,1	75,9
Coquimbo	47,6	73,0	14,9	65,2
Valparaíso	38,4	54,0	29,8	71,0
O'Higgins	36,0	42,9	46,8	83,9
Maule	50,5	70,8	19,0	71,3
Biobío	72,1	79,5	18,3	90,7
La Araucanía	48,0	68,2	19,9	70,4
Los Lagos	45,8	49,4	45,3	92,7
Aysén	45,6	77,6	9,0	58,8
Magallanes	33,8	50,0	30,6	67,6
Metropolitana	40,9	50,4	38,2	81,2
Los Ríos	42,1	44,7	51,6	94,2
Arica y Parinacota	41,1	55,5	31,0	74,0
Ñuble	52,8	62,8	30,3	84,1
Nacional	45,8	57,8	31,6	79,2

SUPERVISIÓN

La etapa de supervisión permite garantizar la correcta ejecución de la metodología del estudio. Su enfoque se basa en el aseguramiento de la calidad de las encuestas aplicadas, es decir, confirmar por un lado la efectiva aplicación de las preguntas del cuestionario

y, por otro, velar también por el acceso a la vivienda adecuada, el correcto ingreso de la totalidad de los integrantes de la vivienda y, consecuentemente, la correcta selección del informante.

La supervisión se dividió en tres etapas:

- Supervisión de la selección de la vivienda por parte del encuestador
- Supervisión del correcto ingreso de todos los integrantes de la vivienda en el listado asociado a la tabla de Kish
- Supervisión de la correcta aplicación del cuestionario (duración, supervisión de ítems)

La supervisión aplicada en el estudio se realizó a través de las siguientes técnicas: georreferenciación, escucha y reaplicación de aspectos claves (vía cuestionario de supervisión). Se supervisó al 100% de los encuestadores por medio de las distintas técnicas de control de calidad. La supervisión fue vía telefónica y presencial.

El proceso de supervisión fue realizado por un supervisor externo al equipo de encuestadores a cargo del trabajo de terreno. A nivel regional, se dispuso de 28 supervisores.

El trabajo de supervisión se organizó de manera centralizada: un Coordinador de Supervisión, a cargo de todo el país, organizó un equipo paralelo de encuestadores y asignó la muestra a supervisar. Se estableció como protocolo la supervisión de al menos una encuesta para todos los encuestadores y la inclusión de al menos una encuesta por segmento. Junto con la selección aleatoria, también era posible que el coordinador solicitara de forma intencionada la supervisión de folios de encuestas únicas al equipo central. Tal como se indicó antes, las supervisiones se realizaron tanto de manera presencial como telefónica.

La supervisión se realizó en paralelo al levantamiento de datos en terreno y completó un 47,1% de la muestra total cubierta por este estudio. Los siguientes casos fueron identificados como encuestas con problemas:

- Encuestas donde no se registraron todos los integrantes de la vivienda.
- Encuestas donde la persona que respondió no correspondía al seleccionado Kish.
- Encuestas de supervisión donde se declaró que no se habían aplicado encuestas en la dirección.
- Encuestas donde no coincidía la dirección con la del directorio asignado por el INE.

La Tabla 12 muestra la distribución del proceso de supervisión efectivo según regiones.

TABLA 12
Distribución del proceso de supervisión efectivo del
trabajo de campo, según regiones. Chile, 2024.

Región	Encuestas logradas	Total supervisadas	Supervisión (%)
Tarapacá	1.143	591	51,7
Antofagasta	740	308	41,6
Atacama	679	295	43,4
Coquimbo	581	269	46,3
Valparaíso	1.360	831	61,1
O'Higgins	966	487	50,4
Maule	1.019	387	38,0
Biobío	1.996	849	42,5
La Araucanía	1.403	459	32,7
Los Lagos	1.089	628	57,7
Aysén	685	302	44,1
Magallanes	712	386	54,2
Metropolitana	3.345	1.545	46,2
Los Ríos	755	408	54,0
Arica y Parinacota	771	390	50,6
Ñuble	1.424	665	46,7
Nacional	18.668	8.800	47,1

SITUACIONES DE TERRENO

Desde que se dio inicio al trabajo de campo del *Décimo Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile 2024*, el nivel de logro se vio afectado por diversas situaciones que se detallan a continuación:

- Producto de la percepción de temor que existe en la ciudadanía, las personas tienden a negarse en atender a alguien o a un desconocido en la puerta de la vivienda. En este caso, la experiencia por parte de los encuestadores ayudó a revertir la situación, utilizando el material que llevan al momento de la aplicación de la encuesta, como credencial y carta de presentación. Sin embargo, esta situación dificultó que las personas aceptaran entregar información y, en definitiva, responder una encuesta.
- El uso de las redes sociales, como los chats comunitarios, posibilitó que las personas informen la aplicación del instrumento a sus vecinos, generando que muchos se negaran a abrir su puerta o a responder la encuesta. Esta situación se generó principalmente en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Valparaíso, Maule y La Araucanía. Tal como se menciona en el punto anterior, esto llevó a que los encuestadores debieran destinar más tiempo en revertir estas situaciones, explicando en mayor detalle la importancia de responder la encuesta. Por la experiencia de muchos encuestadores, se transmitió a todo el personal de campo que, al momento de lograr aplicar una encuesta, se le pidiera al encuestado comunicar a las personas del sector —a través de estos mismos chats— que respondió una encuesta y que no le reportó ningún problema en la aplicación.

- También relacionado a las situaciones anteriores, se constata el mayor nivel de desconfianza de las personas que residen habitualmente en la vivienda seleccionada al momento de entregar la información. En este caso, las personas finalmente acceden a entregar información de los residentes, pero solicitan volver en otro momento para la aplicación del instrumento; sin embargo, al momento de volver muchos declaran no estar presentes, lo que en suma —y después de varios intentos— se transforma en una negación encubierta.
- Aparte de las situaciones que se relacionan con el informante Kish, se presentan situaciones donde los encuestadores han sido víctimas de actos delictuales como, por ejemplo, el robo de teléfonos. Esta situación se presentó en las regiones Metropolitana, Tarapacá, Valparaíso y Los Ríos.
- La aplicación de la tabla Kish ha presentado mayor dificultad en la disposición de los residentes habituales de la vivienda a entregar información respecto a versiones pasadas del estudio. Esto llevó a los encuestadores a destinar una mayor cantidad de tiempo a explicar, entregar los antecedentes y mostrar materiales que ayudaran a la apertura de la vivienda.
- Así también, siempre existe mayor dificultad en la aplicación de encuestas en sectores de edificios de departamentos o condominios, donde la existencia de un conserje o administrador impide el acceso a las viviendas o a los departamentos.

PREVALENCIA Y DROGAS ESTUDIADAS

Para describir la magnitud del uso de drogas ilícitas, SENDA utiliza como medida de referencia la prevalencia de consumo en el último año, es decir, individuos que declaran haber consumido al menos una vez la droga señalada en los últimos doce meses. Este informe describe, en particular, el comportamiento frente a las drogas ilícitas de uso más frecuente, tales como marihuana, pasta base, cocaína (clorhidrato de cocaína) y medicamentos sin receta médica. Pasta base y clorhidrato de cocaína se analizan también bajo el formato de cocaína total (cocaína y/o pasta base) que describe el uso global de cocaína sin contar el *crack*. También se informa acerca del uso de otras drogas de menor prevalencia, así como del consumo de alcohol, donde la medida de referencia es la proporción de individuos que ha consumido alcohol al menos una vez en los últimos 30 días. Para el consumo de tabaco se toma como referencia la proporción de personas que ha fumado al menos un cigarrillo en 20 o más días en el último mes.

CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La inferencia estadística de los datos del *Décimo Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile 2024* y de las versiones anteriores se efectuó a un nivel de significancia del 5%.

Todos los análisis estadísticos se realizaron empleando los factores de expansión ajustados a la población representada y a las etapas de muestreo para obtener una estimación insesgada de la varianza.

Como se mencionó anteriormente, el levantamiento de información de este estudio fue realizado en población de 12 a 65 años, y la

presentación de resultados del informe se hará considerando el tramo de 12 a 64 años, tal como se ha realizado desde 1994.

El análisis comparado respecto a estudios pasados considera la dimensión de nivel socioeconómico. Esta variable se construye a partir de dos ítems que completa el encuestador al inicio de la aplicación de la encuesta en cada vivienda (en ausencia del entrevistado)¹⁷. Estas preguntas hacen referencia a la calidad del barrio y de la vivienda, a partir de las cuales se elabora un índice sumatorio con el que se establecen tres categorías de nivel socioeconómico (bajo, medio y alto).

La Tabla 13 muestra la distribución de la población representada por nivel socioeconómico.

TABLA 13
Distribución del total de la población estimada de 12 a 64 años, según nivel socioeconómico. Chile, 1994–2024.

Serie	Total población	Nivel socioeconómico		
		Bajo (%)	Medio (%)	Alto (%)
1994	6.186.528	50,8	23,3	25,9
1996 ¹⁸	6.917.182			
1998	6.940.727	27,9	23,6	48,5
2000	7.779.667	43,8	28,3	27,9
2002	8.392.058	45,3	28,8	26,0
2004	8.715.567	42,0	33,0	25,0
2006	8.761.229	37,6	34,8	27,6
2008	8.954.639	35,9	39,5	24,6
2010	9.536.602	21,6	41,9	36,4
2012	9.731.731	22,2	36,6	41,2
2014	9.828.181	21,5	37,0	41,5
2016	10.115.249	21,0	36,1	42,9
2018	10.598.556	25,5	39,0	35,5
2020	10.893.883	27,1	41,5	31,4
2022	12.469.063	22,7	37,5	39,8
2024	10.938.055	16,3	38,6	45,1

Por su parte, y respecto a la información presentada a nivel regional, los indicadores principales se desagregan por sexo y tramos de edad (de 12 a 34 años y de 35 a 64 años). La distribución de la muestra a nivel regional se presenta en la tabla a continuación:

TABLA 14
Distribución de la muestra por región, según sexo y edad. Chile, 2024.

Región	Muestra	Sexo (%)		Tramos de edad (%)	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Tarapacá	1.089	39,4	60,6	43,2	56,8
Antofagasta	727	44,8	55,2	31,4	68,6
Atacama	641	39,6	60,4	38,1	61,9
Coquimbo	549	40,1	59,9	35,0	65,0
Valparaíso	1.303	41,1	58,9	36,7	63,3
O'Higgins	916	39,5	60,5	33,1	66,9
Maule	962	31,4	68,6	32,0	68,0
Biobío	1.827	38,1	61,9	28,5	71,5
La Araucanía	1.345	41,2	58,8	36,4	63,6
Los Lagos	1.052	41,0	59,0	34,3	65,7
Aysén	642	43,3	56,7	28,2	71,8
Magallanes	679	44,0	56,0	34,0	66,0
Metropolitana	3.120	41,3	58,7	34,5	65,5
Los Ríos	720	45,4	54,6	35,7	64,3
Arica y Parinacota	729	39,1	60,9	37,6	62,4
Ñuble	1.375	39,7	60,3	35,1	64,9

Respecto a la población representada de 12 a 64 años, se presenta la distribución de la población representada para cada una de las regiones.

17 Respecto a las mediciones anteriores, en esta versión del estudio este proceso se realizó al inicio de la aplicación debido a la modalidad mixta de aplicación del cuestionario.

18 En la medición de 1996 no se disponía de los ítems dispuestos para la elaboración del índice sumatorio de la variable de nivel socioeconómico.

TABLA 15
Distribución de la población representada por región,
según sexo y edad. Chile, 2024.

Región	Muestra	Sexo (%)		Tramos de edad (%)	
		Hombre	Mujer	12 a 34	35 a 64
Tarapacá	263.206	130.566	132.639	131.599	131.606
Antofagasta	471.260	236.712	234.547	223.465	247.795
Atacama	155.408	79.106	76.302	74.284	81.125
Coquimbo	423.247	204.482	218.765	199.130	224.117
Valparaíso	1.024.059	507.759	516.300	458.390	565.669
O'Higgins	388.610	192.584	196.025	173.714	214.896
Maule	400.586	194.112	206.474	176.401	224.185
Biobío	840.830	416.412	424.418	356.205	484.625
La Araucanía	374.241	181.570	192.671	171.370	202.871
Los Lagos	351.179	174.014	177.165	151.221	199.958
Aysén	54.022	26.243	27.780	22.607	31.415
Magallanes	97.232	47.999	49.233	40.980	56.252
Metropolitana	5.610.110	2.820.633	2.789.477	2.640.938	2.969.172
Los Ríos	165.179	81.802	83.377	77.712	87.467
Arica y Parinacota	166.002	83.366	82.636	79.770	86.232
Ñuble	152.885	71.461	81.424	67.451	85.433



Principales Resultados

Principales Resultados

TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Consumo de marihuana

La prevalencia de uso de marihuana alguna vez en la vida muestra una variación significativa a la baja por segundo estudio consecutivo, pasando de 35,3% en 2022 a 33,2% en 2024, mientras que la prevalencia de uso en el último mes se mantiene estable respecto a la medición pasada y llega a 7,3%.

Las declaraciones de uso de marihuana en el último año marcaron una tendencia ascendente en la década de los 90, para establecerse en una prevalencia máxima de 7,2% en 2006 y luego descender en 2010 con prevalencias bajo el 5,0%. Posteriormente, los reportes desde 2010 hasta 2016 mostraron un aumento sistemático del consumo de esta droga en el país ubicándose en valores superiores al 10%. Los últimos estudios publicados confirman esta tendencia.



La medida principal que emplea SENDA para caracterizar el consumo de marihuana en Chile es la prevalencia de uso en el último año. En la presente versión del estudio, la proporción de usuarios de marihuana en el último año muestra una estabilización respecto a 2022 con un 10,1%, reafirmando el descenso observado desde 2018.

La desagregación por sexo de los resultados en la medición actual se mantiene sin cambios en hombres (14,0% en 2024) y en mujeres muestra un descenso significativo de 7,6% en 2022 a 6,3% en 2024. Al igual que en mediciones anteriores, la brecha de 7,7 puntos porcentuales entre hombres y mujeres en la prevalencia de uso de último año es estadísticamente significativa en 2024.

Las declaraciones de uso de marihuana en adolescentes de 12 a 18 años muestran un descenso significativo respecto al estudio pasado y llegan a 2,4% en 2024. Por su parte, en jóvenes de 19 a 25 años las declaraciones de uso se mantienen estables respecto a la medición anterior en un 21,2%, confirmando así la baja observada en la medición pasada. Con relación a los tres tramos de mayor edad, ninguna de las variaciones reportadas respecto al estudio anterior es estadísticamente significativa, con excepción del grupo de 45 a 64 años que muestra un descenso de 3,7% en 2022 a 2,6% en 2024. El análisis de brechas en esta medición muestra que la prevalencia del tramo de 19 a 25 años es significativamente mayor a la observada en los demás grupos, a excepción del tramo de 26 a 34 años. A su vez, y de igual manera que en la medición pasada, la prevalencia de uso del grupo de 26 a 34 años es mayor a los restantes tramos, con excepción del tramo de 19 a 25 años.

Según nivel socioeconómico (NSE), las tres prevalencias presentadas en 2024 se mantienen estables respecto al estudio anterior, con valores de 11,8% (NSE Bajo), 10,3% (NSE Medio) y 9,4% (NSE Alto). Por otra parte, respecto a las brechas, no se observan en 2024 diferencias estadísticamente significativas entre los tres niveles socioeconómicos.

TABLA 16
Evolución de la prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994–2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	4,0	6,1	1,9	5,6	8,7	4,7	1,6	0,2	3,6	3,2	5,2
1996	4,0	5,9	2,2	6,7	10,6	3,5	1,1	0,2			
1998	4,8	7,2	2,4	7,6	12,1	4,8	1,7	0,3	5,4	5,0	4,2
2000	5,7	8,5	3,1	8,1	14,7	6,7	2,4	0,4	5,7	4,9	6,6
2002	5,0	7,9	2,3	6,2	13,0	6,7	2,0	0,5	5,5	4,3	5,0
2004	5,4	7,6	3,2	6,2	14,7	6,5	2,4	0,7	5,0	4,5	7,0
2006	7,2	9,7	4,7	7,4	18,5	9,8	3,8	1,3	5,8	6,0	10,3
2008	6,4	8,8	4,2	9,1	17,9	6,7	2,8	0,9	7,4	5,6	6,4
2010	4,6	7,1	2,1	5,3	12,3	6,7	2,6	0,5	6,1	3,3	5,1
2012	7,1	9,8	4,4	6,7	17,5	10,3	4,4	1,9	7,4	6,9	7,1
2014	11,3	14,6	8,1	13,5	24,0	17,1	9,0	4,2	10,6	10,4	12,5
2016	14,5	18,4	10,6	12,6	33,8	23,4	9,4	5,5	14,4	12,1	16,6
2018	12,7	18,1	7,4	10,1	32,1	20,0	9,3	3,9	12,4	12,3	13,3
2020	11,4	16,0	6,8	5,8	27,2	18,1	11,0	3,7	9,4	12,6	11,5
2022	10,9	14,2	7,6	6,7	19,6	19,0	9,5	3,7	11,2	10,5	11,1
2024	10,1	14,0	6,3	2,4	21,2	18,3	10,3	2,6	11,8	10,3	9,4

Desde el estudio de 2012 se pregunta por el tipo de marihuana usada con mayor frecuencia en los últimos 12 meses entre quienes declararon haber consumido marihuana en el último año: prensada (tipo paraguaya), verde y de alta potencia. En el estudio de 2016, a esas tres opciones de respuestas, se agregaron otras dos para pesquisa de “marihuana verde o yerba” y “marihuana de alta potencia o *skunk*”; a cada una se le agregó la palabra “autocultivo”. Para efectos de este informe, se reagruparon las categorías de respuesta a fin de hacer comparables las proporciones obtenidas y hacer el análisis de tendencia.

Para el informe actual no se aprecian cambios en las declaraciones de uso de marihuana prensada, con un 2,4% en 2024. Respecto a la marihuana verde, se observa estabilización desde 2020 con una declaración de uso del 81,2% en 2024 y, además, presenta la mayor proporción de uso entre los tipos de marihuana consumida. Por último, un 4,2% de consumidores de marihuana año declaró consumir en mayor medida la marihuana *skunk* o de alta potencia, lo que confirma la estabilidad reportada en los estudios anteriores.

Respecto a la medición previa, en marihuana prensada no se aprecian variaciones estadísticamente significativas. En el caso de marihuana verde, sólo se observa un descenso en el NSE Medio, que pasa de 87,8% en 2022 a 80,1% en 2024. Finalmente, el análisis comparado con el estudio de 2022 del uso de marihuana de alta potencia muestra variaciones significativas a la baja en mujeres, en el tramo de 35 a 44 años y en el NSE Bajo.

El análisis de brechas por sexo muestra diferencias estadísticamente significativas sólo para marihuana de alta potencia. Por tramos de edad, y tal como en el estudio anterior, la marihuana consumida con

mayor frecuencia por adolescentes (de 12 a 18 años) y jóvenes (de 19 a 25 años) es la verde, con 57,6% y 76,7%, respectivamente. A pesar de lo anterior, la proporción de usuarios de marihuana verde de los tres tramos superiores de edad es significativamente mayor al grupo de adolescentes.

Por nivel socioeconómico, no se observan diferencias estadísticamente significativas para los tres tipos de marihuana.

TABLA 17
Evolución del consumo de tipos de marihuana entre prevalentes en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012–2024.


Porcentaje que declara haber consumido con mayor frecuencia un tipo de marihuana (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
Marihuana prensada (paraguaya)											
2012	32,1	36,4	22,6	42,4	31,9	26,1	26,3	36,2	39,6	36,9	23,7
2014	15,9	17,7	12,6	30,9	12,6	14,7	12,1	13,2	25,7	20,4	8,3
2016	8,1	9,4	5,9	13,8	6,4	7,4	11,7	6,3	16,0	10,6	3,3
2018	3,8	4,1	3,3	4,4	3,5	3,2	2,7	7,4	6,3	4,4	1,2
2020	2,2	2,3	1,9	2,3	1,8	3,4	1,5	1,4	3,0	2,4	1,4
2022	3,1	3,0	3,2	1,1	1,6	2,2	7,0	5,0	6,6	2,4	1,8
2024	2,4	2,2	2,9	5,5	2,8	2,0	2,6	1,8	3,7	2,4	1,9
Marihuana verde											
2012	54,4	50,0	64,1	49,4	50,7	60,5	63,0	55,4	53,8	49,7	58,8
2014	68,9	65,7	74,5	54,4	78,3	62,1	73,9	69,0	64,6	70,3	69,8
2016	72,9	70,9	76,4	65,2	75,3	76,1	66,7	72,3	65,4	75,6	74,5
2018	74,4	72,7	78,4	54,0	72,2	81,0	84,4	71,3	69,5	71,2	81,1
2020	83,1	81,9	85,8	84,6	76,7	87,7	85,8	86,9	82,2	84,1	82,2
2022	83,1	82,3	84,4	67,4	82,1	88,0	80,9	82,0	79,9	87,8	80,7
2024	81,2	80,7	82,2	57,6	76,7	83,9	84,6	84,4	83,8	80,1	81,0
Marihuana skunko de alta potencia											
2012	6,2	7,4	3,5	2,2	10,2	4,2	4,0	2,7	0,9	4,3	10,8
2014	5,7	6,9	3,8	4,4	3,2	13,5	3,0	3,1	1,5	4,2	8,8
2016	9,7	11,6	6,3	8,7	11,9	9,9	9,9	4,3	7,7	6,4	12,5
2018	12,1	14,5	6,4	25,1	15,0	10,1	6,2	3,2	16,9	14,8	6,1
2020	8,3	9,1	6,4	4,8	13,3	5,9	6,4	3,5	7,1	7,7	10,2
2022	6,2	7,1	4,5	1,7	6,3	7,5	4,9	6,4	7,9	4,8	6,6
2024	4,2	5,3	1,6	7,1	5,1	4,8	1,3	4,6	1,6	5,3	4,3

Consumo de clorhidrato de cocaína

En el caso de clorhidrato de cocaína, la prevalencia de uso alguna vez en la vida desciende respecto a la medición previa, pasando de 6,3% en 2022 a 5,3% en 2024. Por otro lado, la prevalencia de uso durante los últimos 30 días muestra una estabilización respecto a lo observado en el estudio anterior, llegando a 0,2% en 2024.

GRÁFICO 2
Evolución de las prevalencias (%) de consumo de clorhidrato de cocaína. Chile, 1994-2024.



Las declaraciones de uso de cocaína en el último año se mantienen estables en 0,8% en 2024, luego del aumento observado en la medición pasada. Pese a lo anterior, la magnitud del consumo de cocaína permanece entre los menores valores observados de la serie.

La desagregación de la prevalencia por sexo —como ha sido tendencia a lo largo de la serie de estudios— muestra una brecha estadísticamente significativa entre hombres (1,4%) y mujeres (0,1%) en 2024. Respecto a la medición anterior, no se aprecian cambios significativos por sexo.

TABLA 18
Evolución de la prevalencia (%) de consumo de clorhidrato de cocaína en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	0,9	1,5	0,3	0,8	1,7	1,5	0,6	-	0,8	0,9	1,2
1996	0,9	1,4	0,4	0,9	2,4	1,2	0,1	<0,1			
1998	1,4	2,3	0,5	0,9	3,4	2,0	0,9	0,1	1,5	1,5	1,3
2000	1,5	2,5	0,5	1,1	3,6	2,3	1,0	0,1	1,6	1,6	1,3
2002	1,5	2,6	0,5	0,8	4,0	2,8	0,8	0,1	1,9	1,6	0,9
2004	1,3	2,2	0,5	0,7	3,5	2,1	0,7	0,3	1,6	1,2	1,1
2006	1,3	2,0	0,6	0,7	2,8	1,8	1,5	0,3	1,6	1,3	0,7
2008	1,8	3,2	0,6	1,0	3,8	2,4	1,7	0,9	2,4	1,6	1,5
2010	0,7	1,2	0,1	0,4	1,3	1,3	0,7	0,2	1,0	0,3	0,8
2012	0,9	1,3	0,5	0,3	2,0	1,6	0,7	0,3	1,5	0,6	0,7
2014	1,4	2,2	0,6	1,6	1,9	2,7	1,5	0,6	2,1	1,3	1,1
2016	1,1	1,6	0,5	0,3	1,8	2,1	1,4	0,3	2,0	0,9	0,7
2018	1,0	1,8	0,3	0,1	2,0	1,9	1,3	0,4	1,6	1,0	0,7
2020	0,5	1,0	0,1	<0,1	0,9	0,8	0,8	0,3	0,8	0,4	0,4
2022	0,9	1,5	0,3	0,1	1,2	1,5	1,0	0,5	1,2	1,1	0,6
2024	0,8	1,4	0,1	<0,1	0,8	1,6	0,8	0,4	1,8	0,6	0,5


Por edad, la menor prevalencia de consumo se observa entre los 12 y 18 años (<0,1%), siendo esta brecha estadísticamente significativa respecto al resto de los tramos, con excepción del tramo de 19 a 25 años. Con relación al estudio anterior y por segundo estudio consecutivo, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas en las prevalencias de uso de los distintos tramos etarios.

Por nivel socioeconómico, sólo se observa una variación significativa a la baja en el NSE Medio, que pasa de 1,1% en la medición anterior a 0,6% en la actual, volviendo a los niveles observados en 2020. El análisis de brechas en 2024 no muestra variaciones entre los distintos niveles socioeconómicos.

Consumo de pasta base

La prevalencia de uso alguna vez en la vida de pasta base se mantiene estable respecto a la medición previa, con un 1,7% en 2024. Por su parte, las prevalencias de último año y último mes tampoco reportan cambios significativos respecto al estudio pasado.

GRÁFICO 3
Evolución de las prevalencias (%) de consumo de pasta base. Chile, 1994-2024.



La desagregación por sexo de la prevalencia de último año no muestra una brecha estadísticamente significativa entre lo declarado por hombres y mujeres en 2024, con 0,5% y 0,2%, respectivamente. No se registran variaciones estadísticamente significativas por sexo respecto a la medición anterior.

Por edad, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto a 2022. Respecto al tramo de 12 a 18 años, por segundo estudio consecutivo no se registran casos para el año 2024. Por su parte, el análisis de brechas no muestra diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad.


Por nivel socioeconómico, y por cuarto estudio consecutivo, no se reportan variaciones estadísticamente significativas respecto a la medición pasada. El análisis de brechas muestra que la prevalencia observada en el NSE Bajo (1,1%) es estadísticamente significativa respecto a los NSE Medio (0,3%) y Alto (0,1%), no así entre estos dos últimos niveles.

TABLA 19
Evolución de la prevalencia (%) de consumo de pasta base en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	0,9	1,6	0,3	1,2	1,2	1,7	0,5	-	1,2	0,7	0,5
1996	0,7	1,0	0,3	0,8	1,5	1,1	0,1	<0,1			
1998	0,8	1,4	0,3	1,0	1,8	1,1	0,5	0,1	1,5	1,0	0,4
2000	0,7	1,2	0,2	0,7	1,4	1,3	0,4	0,1	1,1	0,6	0,2
2002	0,5	0,9	0,1	0,2	1,3	0,8	0,4	<0,1	0,8	0,5	0,1
2004	0,6	1,1	0,2	0,7	1,3	1,0	0,5	0,1	1,3	0,3	0,1
2006	0,6	1,1	0,2	0,6	1,1	1,2	0,5	0,1	1,1	0,4	0,1
2008	0,7	1,1	0,4	0,4	1,9	0,8	0,8	0,1	1,4	0,2	0,5
2010	0,4	0,7	0,1	0,3	0,9	0,8	0,3	0,1	1,1	0,2	0,2
2012	0,4	0,8	0,1	0,2	0,5	1,0	0,4	0,2	0,9	0,5	<0,1
2014	0,5	0,8	0,1	0,3	0,5	1,0	0,6	0,2	1,4	0,3	0,1
2016	0,4	0,7	0,1	0,3	0,6	0,7	0,6	0,1	0,7	0,4	0,2
2018	0,4	0,7	0,2	<0,1	0,4	0,8	0,7	0,3	0,9	0,4	0,2
2020	0,3	0,5	0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,8	0,2	0,5	0,3	0,2
2022	0,3	0,5	0,1	-	0,4	0,3	0,3	0,3	0,8	0,1	0,2
2024	0,3	0,5	0,2	-	0,2	0,2	0,6	0,4	1,1	0,3	0,1

Consumo de alcohol

Al igual que en el estudio anterior, la prevalencia vida de consumo de alcohol registra un descenso significativo de 76,4% en 2022 a 71,1% en 2024. Respecto al uso de alcohol en el último año, se reporta una disminución en esta prevalencia, alcanzando el valor más bajo de toda la serie: 49,9% en 2024 (53,6% en 2022).



Por su parte, la prevalencia de uso de alcohol en el último mes descendiendo por segundo estudio consecutivo, pasando de 39,2% en 2022 a 34,6% en 2024. Este valor es el más bajo reportado en

toda la serie de estudios, siendo esta disminución una variación estadísticamente significativa respecto a la medición anterior.

La desagregación de la prevalencia de último mes muestra descensos en las declaraciones de ambos sexos respecto al estudio anterior; en hombres descendiendo de 45,1% en 2022 a 41,7% en 2024 y en mujeres baja de 33,3% en 2022 a 27,6% en 2024. A su vez, la brecha de 14,1 puntos porcentuales en la prevalencia observada entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa, tal como ha sido tendencia en la serie de estudios.

Según edad, se aprecian descensos estadísticamente significativos respecto al estudio anterior para los tramos de 26 a 34 años (de 50,1% en 2022 a 42,5% en 2024) y de 45 a 64 años (de 37,0% en 2022 a 31,7% en 2024). El análisis de brechas muestra que la prevalencia de uso de alcohol en adolescentes (8,2%) es significativamente menor que en el resto de los tramos de edad, mientras que las declaraciones del tramo de 45 a 64 años (31,7%) son significativamente distintas a las reportadas en los tres tramos de edad previos.

La desagregación según nivel socioeconómico muestra un descenso estadísticamente significativo para el NSE Alto, que pasa de 44,5% en 2022 a 34,9% en 2024, y se aprecia estabilidad en los NSE Bajo (33,5%) y Medio (34,8%). Respecto al análisis de brechas, no se observan diferencias entre los tres tipos de nivel socioeconómico para el presente estudio.

TABLA 20
Evolución de la prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 1994-2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
1994	40,4	50,6	31,0	24,4	49,4	46,7	43,7	36,5	38,1	38,1	47,0
1996	48,1	56,9	39,8	31,4	56,7	52,3	51,5	46,6			
1998	53,0	64,0	42,5	30,9	60,3	58,3	57,9	54,4	49,1	52,8	55,3
2000	54,4	63,4	45,8	30,6	61,1	60,5	59,8	57,2	51,6	53,2	60,2
2002	59,6	66,8	52,8	35,5	65,8	66,6	65,9	61,7	58,2	59,3	62,5
2004	57,9	66,6	49,4	31,5	65,4	65,3	63,0	61,2	55,3	57,1	63,2
2006	58,1	65,9	50,5	32,3	64,0	65,9	63,9	61,0	53,9	58,1	64,2
2008	49,8	60,0	39,9	27,2	60,8	60,8	53,7	47,1	46,2	49,3	55,9
2010	40,5	48,9	32,2	18,4	55,4	47,7	44,4	39,0	35,2	37,3	47,1
2012	40,8	49,2	32,5	18,1	50,2	51,8	45,0	40,4	39,9	37,7	44,0
2014	48,9	55,3	42,5	22,9	53,8	57,3	54,4	49,5	46,5	46,1	52,5
2016	46,0	52,6	39,3	18,7	56,7	58,1	50,2	44,1	41,0	42,5	51,3
2018	43,3	52,5	34,2	18,7	53,2	52,7	48,5	40,5	39,7	42,7	46,7
2020	44,3	51,5	37,2	13,6	54,8	50,4	52,6	43,8	40,5	45,3	46,3
2022	39,2	45,1	33,3	11,5	40,3	50,1	45,8	37,0	33,9	36,7	44,5
2024	34,6	41,7	27,6	8,2	39,0	42,5	42,4	31,7	33,5	34,8	34,9

Consumo de bebidas energéticas

Las medidas de prevalencias de uso de bebidas energéticas de año y mes muestran cambios estadísticamente significativos a la baja respecto al estudio anterior, volviendo así a los niveles de 2020. De esta forma, la prevalencia de último año disminuye de 30,5% en 2022 a 28,0% en 2024 y la prevalencia de último mes baja significativamente y llega a 16,7% en 2024. Por su parte, la prevalencia de uso alguna vez en la vida no varía y se mantiene en 41,3% en la presente medición.

Por otro lado, y por segundo estudio consecutivo, el consumo de bebidas energéticas combinadas con bebidas alcohólicas muestra estabilidad respecto a 2022 en las tres medidas reportadas. Así, para 2024 la prevalencia vida llega a 10,7%, la prevalencia último año a 5,0% y la prevalencia último mes a 1,5%, manteniéndose así entre los menores valores de la serie de estudios.

TABLA 21
Evolución de las prevalencias de consumo de bebidas energéticas y bebidas energéticas combinadas con alcohol. Chile, 2006–2024.

Serie	Prevalencias de consumo de bebidas energéticas (%)			Prevalencias de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol (%)		
	Vida	Año	Mes	Vida	Año	Mes
2006	19,4	12,9	4,1			
2008						
2010	15,3	11,1	4,0			
2012	30,1	20,7	8,9	8,9	5,7	2,1
2014	45,3	29,3	12,8	13,4	8,8	3,1
2016	47,8	29,7	13,1	13,8	7,9	2,7
2018	48,9	29,7	14,1	15,0	7,7	2,6
2020	42,1	27,3	16,4	11,2	4,9	1,6
2022	42,0	30,5	19,3	10,1	5,1	1,7
2024	41,3	28,0	16,7	10,7	5,0	1,5

Al desagregar la prevalencia de último año de uso de bebidas energéticas combinadas con alcohol por sexo, se observa estabilidad en hombres (6,4%) y mujeres (3,7%) respecto al estudio anterior. Por su parte, la brecha de 2,7 puntos porcentuales entre hombres y mujeres es significativa en la actual medición.

Respecto al estudio anterior, no se reportan cambios significativos por edad, con excepción del tramo de 12 a 18 años que muestra un descenso de 3,3% en 2022 a 1,3% en 2024. Siguiendo la tendencia desde el inicio de la serie, los tramos de 19 a 25 años y de 26 a 34 años presentan las más altas prevalencias de consumo (10,8% y 9,5%, respectivamente); estas diferencias son significativamente mayores respecto a lo declarado en los demás tramos. Por otra parte, los tramos de 12 a 18 años y de 45 a 64 años tienen la prevalencia más baja, con una brecha estadísticamente significativa respecto a los otros grupos etarios.

Por nivel socioeconómico, a diferencia del estudio anterior, no se reportan brechas en 2024. Por otro lado, no se observan variaciones estadísticamente significativas por nivel socioeconómico respecto al estudio anterior.


TABLA 22
Evolución de la prevalencia (%) de consumo de bebidas energéticas combinadas con alcohol en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012–2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	5,7	8,1	3,4	3,9	15,6	10,9	2,4	1,1	4,4	5,2	7,0
2014	8,8	11,5	6,2	6,7	19,9	14,3	6,6	3,8	7,6	7,7	10,4
2016	7,9	9,7	6,1	7,0	21,6	13,5	4,9	1,3	6,1	6,6	9,9
2018	7,7	11,4	4,1	5,6	19,1	12,4	5,8	2,4	6,3	7,8	8,6
2020	4,9	6,9	2,9	4,1	10,6	8,2	3,8	1,6	5,7	4,2	4,9
2022	5,1	6,7	3,6	3,3	10,6	8,8	4,6	1,1	4,0	5,0	5,9
2024	5,0	6,4	3,7	1,3	10,8	9,5	4,7	1,2	5,1	5,0	5,1

Consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos

Las prevalencias de uso de tabaco en población general confirman la tendencia a la baja iniciada en 2018. En 2024 se aprecian descensos estadísticamente significativos en tres de las cuatro medidas de uso reportadas en el presente informe. La prevalencia de uso alguna vez en la vida baja 4,0 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, llegando a 54,9% en 2024. Por su parte, la medida de uso en el último año pasa de 31,2% en 2022 a 28,6% en 2024 y la prevalencia de uso en el último mes registra un 24,6% en el estudio actual. Estos valores son los más bajos de toda la serie.

GRÁFICO 5
Evolución de las prevalencias (%) de consumo de tabaco. Chile, 1994–2024.



La prevalencia de uso diario de tabaco muestra una estabilización y se sitúa en 16,5% en 2024. La desagregación por sexo no muestra variaciones significativas respecto al estudio anterior. La brecha observada entre hombres y mujeres (16,8% frente a 16,1%) no es estadísticamente significativa en la medición actual.

Por tramos de edad —y por cuarto estudio consecutivo—, no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto al estudio anterior en cuatro tramos de edad; únicamente el tramo

de 45 a 64 años muestra un descenso de 22,7% en 2022 a 20,3% en 2024. Tal como ha sido tendencia desde 2014, las prevalencias de uso de los tramos de 19 a 25 años (12,6%) y de 12 a 18 años (2,6%) son significativamente menores a las reportadas en los otros grupos de edad.

Tal como se observa desde 2014, la desagregación por nivel socioeconómico muestra que la prevalencia de consumo diario de tabaco en el NSE Bajo (17,7%) es significativamente mayor que la reportada en el NSE Alto (14,7%); además, la prevalencia de este último es significativamente menor que en el NSE Medio (18,0%). No se registran variaciones estadísticamente significativas respecto a 2022 por nivel socioeconómico.

TABLA 23
Evolución de la prevalencia (%) de consumo diario de tabaco, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	30,6	33,3	28,0	14,1	36,9	34,0	38,9	28,4	32,1	29,7	28,9
2004	30,5	32,1	28,9	14,8	38,6	35,7	35,5	28,1	31,8	30,1	28,7
2006	28,8	31,8	25,8	12,7	30,1	34,2	31,4	32,3	29,6	29,5	26,9
2008	28,2	29,9	26,5	12,7	31,8	33,2	30,9	30,0	30,3	28,3	25,0
2010	24,5	26,4	22,8	11,1	27,4	29,0	27,4	26,4	27,4	22,9	24,8
2012	21,9	23,8	20,1	6,4	21,0	25,6	26,7	26,1	24,2	21,5	21,0
2014	22,7	23,2	22,2	8,4	18,9	25,3	26,5	26,3	27,4	22,5	20,5
2016	21,2	22,7	19,7	5,5	16,5	25,6	27,2	24,3	26,5	20,6	19,2
2018	19,6	20,4	18,8	3,5	16,6	21,6	25,4	22,5	22,0	20,6	16,8
2020	19,5	20,1	19,0	2,4	15,1	20,5	25,4	24,2	21,3	20,3	17,0
2022	17,7	17,9	17,5	2,6	12,6	18,1	21,6	22,7	20,4	19,1	15,0
2024	16,5	16,8	16,1	1,5	12,5	17,6	20,1	20,3	17,7	18,0	14,7

Desde 2014, se incorporó en el instrumento de población general un módulo dedicado a la caracterización del uso de dispositivos de cigarrillos electrónicos. Dicho módulo se inicia preguntando al entrevistado si conoce o ha escuchado hablar de estos dispositivos. En caso de ser positiva la respuesta, se formula la pregunta de uso alguna vez en la vida y el resto de las preguntas que componen el módulo.

Respecto al total de la población, un 71,2% declaró conocer los cigarrillos electrónicos en 2024, lo que representa una estabilización respecto al estudio anterior (71,1%). No se observan variaciones por sexo, tramos de edad y NSE respecto a 2022.

Con respecto a las brechas en el nivel de conocimiento del dispositivo por sexo, se aprecian diferencias entre hombres y mujeres, con un 73,4% y un 69,1%, respectivamente. Por tramos de edad, el conocimiento es significativamente mayor en los tramos de 19 a 25 años y de 26 a 34 años, con un 79,8% y un 77,6%, respectivamente); a la vez, es significativamente menor en el tramo de 45 a 64 años, con un 62,0%. Según nivel socioeconómico, y de igual forma que en el estudio anterior, el conocimiento es significativamente mayor en

el NSE Alto (71,9%) respecto a los NSE Bajo (66,6%) y Medio (72,5%), y mayor en este último en comparación con el NSE Bajo.


Entre quienes declararon usar cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida se consultó si sabían que el dispositivo contenía nicotina. En esta versión del estudio, un 54,7% declaró saberlo, lo que representa una estabilización respecto a las declaraciones de 2022 (51,6%). Respecto al estudio anterior, se reporta un aumento estadísticamente significativo en el tramo de 35 a 44 años, pasando de 47,6% en 2022 a 61,3% en 2024; en el resto de las categorías de edad no se reportan variaciones. Respecto a las brechas en el conocimiento de presencia de nicotina en el dispositivo, en 2024 se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres (60,1% frente a 48,7%). Por tramos de edad, el conocimiento en el tramo de 45 a 64 años (39,7%) es significativamente menor a lo observado a los demás grupos. Finalmente, por niveles socioeconómicos se aprecia una diferencia significativa entre los NSE Alto (61,3%) y Bajo (49,8%).

TABLA 24
Evolución de conocimiento de cigarrillos electrónicos y presencia de nicotina en el dispositivo, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2014-2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
Conoce cigarrillos electrónicos											
2014	46,9	48,8	45,0	38,2	56,4	55,3	48,7	41,6	35,8	43,5	55,6
2016	66,5	67,1	66,0	63,7	76,2	73,8	70,0	58,4	59,0	63,2	72,9
2018	66,1	68,0	64,2	65,7	73,8	74,8	67,9	57,7	62,2	66,5	68,8
2020	73,9	77,1	70,7	72,0	85,2	79,6	76,9	65,5	72,8	70,4	79,3
2022	71,1	72,0	70,3	70,0	76,1	78,1	73,9	63,0	66,2	71,1	74,0
2024	71,2	73,4	69,1	69,9	79,8	77,6	74,1	62,0	66,6	72,5	71,9
Presencia de nicotina en cigarrillos electrónicos											
2014	30,7	32,8	28,3	25,9	29,8	33,9	35,5	27,1	24,8	27,7	35,1
2016	39,4	42,2	36,2	34,0	45,5	42,0	36,1	36,3	30,4	37,2	43,7
2018	38,3	38,7	37,8	29,5	46,9	37,9	40,3	33,1	28,7	32,9	48,6
2020	43,2	49,8	33,5	40,7	43,8	37,3	51,9	43,8	35,8	43,4	48,5
2022	51,6	56,0	46,6	53,9	57,0	55,3	47,6	40,6	53,3	46,6	55,1
2024	54,7	60,1	48,7	57,8	59,2	53,4	61,3	39,7	49,8	48,7	61,3

Las prevalencias de consumo de cigarrillos electrónicos son calculadas a partir del total de la población y muestran —por cuarto estudio consecutivo— una estabilización en la medida alguna vez en la vida, pasando de 15,1% en 2022 a 14,8% en 2024. Asimismo, se aprecia un aumento significativo para la prevalencia de consumo en el último mes, de 1,1% en 2022 a 1,7% en 2024.

GRÁFICO 6
Evolución de las prevalencias (%) de consumo de cigarrillos electrónicos. Chile, 2014-2024.



La prevalencia de uso de cigarrillos electrónicos en el último año muestra un aumento estadísticamente significativo con una diferencia de 1,0 punto porcentual respecto al estudio anterior, llegando a 4,6% en 2024. Respecto a 2022, se observan variaciones estadísticamente significativas al alza en mujeres (por segundo estudio consecutivo), en los tramos de 19 a 25 años y de 26 a 34 años, y en el NSE Alto. Respecto a las brechas, en esta medición no se aprecian diferencias por sexo. Por edad, se observan mayores prevalencias en el tramo de 19 a 25 años comparadas con los otros grupos de edad, a excepción del tramo de 12 a 18 años; por su parte, el tramo de 45 a 64 años tiene una prevalencia significativamente menor que el resto de los grupos etarios. Por nivel socioeconómico, se observa una mayor prevalencia en el NSE Alto (5,5%) respecto al NSE Medio (3,4%).

TABLA 25
Evolución de la prevalencia (%) de consumo último año de cigarrillos electrónicos, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2014-2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2014	3,6	3,9	3,3	3,6	5,4	4,1	3,9	2,5	3,1	2,7	4,6
2016	6,5	7,0	6,0	8,3	12,0	7,6	5,3	3,6	4,9	6,7	7,2
2018	5,3	6,1	4,4	8,5	9,8	6,7	4,0	2,2	5,1	5,1	5,7
2020	2,8	4,1	1,4	2,8	6,5	3,6	1,1	1,5	1,6	3,4	2,9
2022	3,6	3,7	3,4	4,7	6,4	4,5	3,3	1,4	3,3	3,2	4,0
2024	4,6	4,4	4,8	5,3	9,5	6,5	4,3	1,2	5,2	3,4	5,5

Prevalencias de otras drogas

El instrumento de población general también pesquiza el uso de drogas menos frecuentes, con prevalencias de último año que normalmente son cercanas al error muestral del estudio. La mayoría de estas prevalencias se construyen a partir de reportes de distintos medicamentos o sustancias asociadas a un grupo específico (por ejemplo, inhalables o estimulantes sin receta médica), mientras que otras prevalencias responden a categorías de drogas en sí mismas (por ejemplo, hachís).

Por tal motivo, se presenta el grupo de drogas sintéticas construido a partir de los reportes de distintas sustancias y/o grupos de sustancias; este grupo incluye drogas tales como Tusi, marihuana sintética y éxtasis, entre otras¹⁹. A su vez, para mayor precisión se incorpora una nueva serie para los grupos de analgésicos y alucinógenos, considerando cambios en las sustancias que componen ambos grupos. Así, se excluye el fentanilo del grupo de analgésicos y se incorpora en drogas sintéticas, mientras que las sustancias Nbome y Tusi se excluyen del grupo de alucinógenos y son incluidas en el grupo de drogas sintéticas.

En otras drogas, se indaga sobre el uso alguna vez en la vida de tranquilizantes sin receta médica, alucinógenos y analgésicos sin receta médica. Respecto al estudio anterior, tranquilizantes (5,6%) y analgésicos sin receta médica (2,6%) muestran variaciones significativas en 2024. El resto de los grupos de drogas o drogas del listado no muestran variaciones en la prevalencia alguna vez en la vida respecto a la medición pasada.

TABLA 26
Evolución de las prevalencias de otras drogas alguna vez en la vida. Chile, 2002-2024.

Serie	Tranquilizantes s/r	Inhalables	Estimulantes s/r	Alucinógenos	Analgésicos s/r	Hachís	Drogas sintéticas
2002	8,5	2,3	3,1	0,6	1,0		
2004	7,0	2,2	2,8	0,6	1,0		
2006	8,0	1,4	2,6	0,9	1,0		
2008	6,6	1,9	2,3	0,7	1,1	1,1	
2010	2,5	0,7	1,6	0,5	0,6	0,7	0,6
2012	3,1	0,8	1,8	1,4	0,6	1,1	0,9
2014	3,9	1,0	1,8	0,9	1,0	2,0	2,3
2016	4,2	1,3	2,0	1,4	2,2	2,7	4,0
2018	3,7	1,5	1,4	1,1	2,5	2,1	4,7
2020	5,3	1,7	1,7	2,4	3,4	1,7	4,0
2022	4,5	1,1	1,2	2,6	3,5	1,7	3,7
2024	5,6	1,0	0,8	2,6	2,6	1,9	3,6

s/r: sin receta médica.

Con relación a las prevalencias de uso en el último año de otras drogas, y de igual forma que en las declaraciones de uso de alguna vez en la vida, se observa un descenso significativo en analgésicos sin receta médica (de 1,5% en 2022 a 1,0% en 2024) y una estabilización en las declaraciones de tranquilizantes con un 2,2% en la medición actual. Por su parte, el uso de hachís aumenta 0,5 puntos porcentuales volviendo a niveles observados en 2018 (1,0% en 2024). En el resto de las drogas presentadas no se aprecian variaciones estadísticamente significativas respecto al estudio anterior.

19 LSD, Polvo de ángel, Ketamina, 2-CB o Tusi, éxtasis, metanfetamina, Poppers, catinonas sintéticas (Mefedrona, Metilona, MDPV o Sales de baño), marihuana sintética, 25B-NBOMe o 25C-Nbome, Fenciclidina (PCP), Benzilpiperazina (BZP), fentanilo, GHB, GBL y Triptaminas (DMT, Foxy o acetilpsilocina).

TABLA 27
Evolución de las prevalencias de otras drogas en el último año. Chile, 2002-2024.

Serie	Tranquilizantes s/r	Inhalables	Estimulantes s/r	Alucinógenos	Analgésicos s/r	Hachís	Drogas sintéticas
2002	3,3	0,3	0,5	<0,1	0,4		
2004	3,0	0,2	0,4	0,1	0,4		
2006	3,5	0,1	0,4	0,3	0,3		
2008	3,2	0,2	0,4	0,2	0,6	0,3	
2010	1,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1
2012	1,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,3	0,2
2014	1,2	0,1	0,2	0,1	0,6	0,8	1,1
2016	1,7	0,2	0,4	0,1	1,2	1,2	1,5
2018	1,4	0,2	0,3	0,2	1,2	1,0	1,4
2020	2,0	0,3	0,2	0,6	1,2	0,5	1,1
2022	1,8	0,2	0,1	0,8	1,5	0,5	1,2
2024	2,2	0,2	0,1	0,6	1,0	1,0	0,9

s/r: sin receta médica.

Respecto a la medición pasada, no se observan variaciones en el uso de tranquilizantes y drogas sintéticas en el último año. En analgésicos sin receta médica, en cambio, se observa una disminución significativa en la prevalencia total (de 1,5% en 2022 a 1,0% en 2024). A su vez, también se observan descensos significativos en mujeres, en los tramos de 12 a 18 años y de 19 a 25 años, y en los NSE Bajo y Medio. Asimismo, en drogas sintéticas se observa una disminución significativa en el tramo de 19 a 25 años (de 2,6% en 2022 a 0,9% en 2024) y en NSE Alto (de 1,4% en 2022 a 0,6% en 2024).

Respecto al análisis de brechas, y de manera consistente con los estudios anteriores, no se observan diferencias estadísticamente significativas por sexo para tranquilizantes y analgésicos sin receta médica en el último año. En drogas sintéticas, en cambio, la prevalencia de uso es significativamente mayor en hombres que en mujeres.

Por edad, la prevalencia de uso de tranquilizantes y analgésicos sin receta en los tramos de 12 a 18 años y de 19 a 25 años es significativamente menor que el resto de los grupos de edad. En drogas sintéticas, la prevalencia es mayor en el tramo de 26 a 34 años en comparación con los tramos de 35 a 44 años y de 45 a 64 años.

Por nivel socioeconómico, la prevalencia de uso de tranquilizantes sin receta médica es mayor en los NSE Bajo y Medio en comparación con el NSE Alto, mientras que la prevalencia de uso de drogas sintéticas es mayor en el NSE Bajo que en el NSE Alto; en analgésicos no se reportan brechas por NSE.

TABLA 28
Evolución de la prevalencia (%) de consumo de tranquilizantes sin receta médica en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2010-2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2010	1,3	0,6	1,9	0,4	1,0	1,2	1,7	1,6	1,2	1,3	1,4
2012	1,4	1,2	1,6	0,5	1,7	1,9	1,2	1,6	1,3	1,1	1,8
2014	1,2	0,9	1,4	0,2	1,3	1,0	1,3	1,4	1,5	0,8	1,3
2016	1,7	1,5	1,9	0,8	1,3	1,8	2,3	1,8	1,2	1,5	2,1
2018	1,4	1,1	1,6	0,8	1,9	1,6	1,3	1,3	1,1	1,4	1,5
2020	2,0	2,2	1,7	1,7	3,7	1,6	1,4	1,7	2,9	1,6	1,6
2022	1,8	1,7	1,9	0,6	2,4	2,3	1,9	1,6	2,0	1,7	1,8
2024	2,2	2,0	2,3	0,6	0,8	3,0	2,5	2,7	2,8	2,6	1,6

TABLA 29
Evolución de la prevalencia (%) de consumo de analgésicos sin receta médica en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2010-2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2010	0,3	0,1	0,4	<0,1	0,5	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,5
2012	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,7	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2
2014	0,6	0,5	0,6	0,3	1,1	0,6	0,5	0,4	0,8	0,4	0,6
2016	1,2	0,9	1,5	0,7	0,8	1,2	1,8	1,3	1,3	1,2	1,2
2018	1,2	1,2	1,1	1,4	1,9	1,1	0,8	1,0	1,1	1,0	1,3
2020	1,2	1,3	1,0	<0,1	2,1	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	1,5
2022	1,5	1,3	1,7	0,8	1,1	1,9	2,1	1,3	1,9	1,6	1,2
2024	1,0	0,9	1,0	0,1	0,4	1,3	1,3	1,1	1,1	1,0	0,9

TABLA 30
Evolución de la prevalencia (%) de consumo de drogas sintéticas en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2010-2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2010	0,1	0,1	0,1	<0,1	0,2	0,2	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1
2012	0,2	0,4	0,1	0,1	0,8	0,3		<0,1	0,2	0,2	0,3
2014	1,1	1,7	0,5	2,8	1,8	1,1	0,2	0,6	1,0	0,9	1,2
2016	1,5	2,1	0,9	2,2	5,2	1,6	0,5	0,1	0,9	1,3	1,9
2018	1,4	2,2	0,7	1,3	4,5	2,8	0,5	0,1	1,2	1,3	1,7
2020	1,1	1,8	0,5	1,2	4,0	1,8	0,3	0,1	1,5	1,1	0,9
2022	1,2	1,7	0,7	0,8	2,6	2,7	0,3	0,2	1,5	0,8	1,4
2024	0,9	1,3	0,5	0,4	0,9	2,6	0,8	0,1	1,9	0,9	0,6

INCIDENCIAS DE CONSUMO EN EL ÚLTIMO AÑO

Otro indicador para monitorear la demanda de uso de drogas en Chile es la tasa de incidencia en el último año, definida como la proporción de individuos que declaran iniciar el consumo de una droga durante los últimos 12 meses, respecto a la población que no ha declarado uso alguna vez en la vida.

En este informe se observa estabilidad para todas las sustancias medidas, con excepción de alcohol que bajó significativamente respecto a 2022.

TABLA 31
Evolución de la tasa de incidencia de consumo de sustancias principales en el último año. Chile, 1994-2024.

Incidencias de consumo último año (%)					
Serie	Tabaco	Alcohol	Marihuana	Pasta base	Cocaína
1994	17,5	29,3	1,9	0,5	0,5
1996	4,7	13,6	1,3	0,3	0,4
1998	4,5	11,8	1,4	0,3	0,5
2000	6,6	21,8	1,1	0,2	0,4
2002	8,3	28,1	0,8	0,1	0,3
2004	3,8	15,0	0,9	0,1	0,2
2006	8,0	24,3	1,7	0,2	0,3
2008	11,4	25,4	1,3	0,2	0,5
2010	9,9	18,9	0,8	0,1	0,1
2012	10,2	19,0	1,6	0,1	0,1
2014	9,5	21,7	2,8	0,1	0,4
2016	8,7	21,9	3,4	0,1	0,2
2018	12,5	28,3	3,8	0,2	0,3
2020	3,6	9,9	1,1	<0,1	0,1
2022	5,8	13,5	2,0	0,1	0,2
2024	6,5	11,3	1,8	0,1	0,1

La desagregación de la incidencia para el caso de tabaco muestra estabilidad en todas las categorías respecto al estudio anterior. El análisis de brechas de la incidencia de último año de tabaco muestra diferencias significativas por sexo, con un 7,2% en hombres frente a 5,8% en mujeres. En el tramo de 12 a 18 años (2,7%) la prevalencia es significativamente menor que todos los otros grupos de edad. Por su parte, la brecha reportada entre los NSE Medio y Alto (5,5% frente a 7,0%) es estadísticamente significativa por segundo estudio consecutivo.

En el caso de alcohol, respecto a 2022 se observan variaciones significativas a la baja en la incidencia de uso de mujeres, en los tramos de 26 a 34 años y de 35 a 44 años, y en el NSE Alto. Por sexo, la brecha de 5,3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres sí es estadísticamente significativa. Por edad, la incidencia reportada de adolescentes (7,4%) es significativamente menor que en el resto de los grupos etarios en 2024, con excepción del tramo de 45 a 64 años. Por último, y por quinto estudio consecutivo, la incidencia de último año de alcohol en el NSE Alto (13,9%) es significativamente mayor a lo apreciado en los NSE Bajo (10,7%) y Medio (8,3%).

En el caso de marihuana, y respecto al estudio anterior, se aprecian cambios estadísticamente significativos en los tramos de 12 a 18 años y de 45 a 64 años; el resto de las categorías se mantienen sin variación. Por sexo, la brecha observada entre hombres y mujeres en 2024 es significativa (2,2% frente a 1,4%). La tasa de incidencia en el tramo de 19 a 25 años (6,4%) es significativamente mayor a la reportada en los restantes grupos etarios por segunda versión seguida. Además, la tasa de incidencia en el tramo de 45 a 64 años (0,4%) es significativamente menor que en el resto de los grupos, con excepción del tramo de 12 a 18 años (0,5%). Finalmente, a diferencia del estudio anterior, por nivel socioeconómico se aprecian brechas significativas, con una prevalencia en el NSE Medio (0,9%) menor a los NSE Bajo (2,9%) y Alto (2,1%).

En el caso de cocaína y pasta base, es necesario aclarar que la incidencia se mantiene en valores bajo el error muestral de la encuesta con 0,1%. De todas maneras, la incidencia no varía para ambas sustancias con respecto a 2022.

TABLA 32
Evolución de la tasa de incidencia (%) de consumo de sustancias principales en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2022-2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
Tabaco											
2022	5,8	5,9	5,6	3,6	5,4	5,4	8,3	5,6	5,6	4,1	7,3
2024	6,5	7,2	5,8	2,7	8,1	6,2	7,6	6,8	7,1	5,5	7,0
Alcohol											
2022	13,5	15,9	11,5	7,7	14,3	16,3	19,4	11,8	11,1	8,1	20,4
2024	11,3	14,2	8,9	7,4	14,9	12,0	14,0	10,1	10,7	8,3	13,9
Marihuana											
2022	2,0	2,5	1,6	2,7	3,9	2,0	2,2	0,9	1,7	1,3	2,9
2024	1,8	2,2	1,4	0,5	6,4	1,9	1,6	0,4	2,9	0,9	2,1
Cocaína											
2022	0,2	0,4	<0,1	-	0,3	0,5	0,3	<0,1	0,3	0,2	0,2
2024	0,1	0,1	0,1	<0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
Pasta base											
2022	0,1	0,2	<0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	<0,1	0,1
2024	0,1	0,1	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	<0,1

PERCEPCIÓN DE USO DE DROGAS

Percepción de riesgo

La percepción de riesgo respecto al consumo diario de tabaco disminuye en comparación con la medición anterior, luego del aumento observado en el estudio previo. En 2024, la proporción de personas que percibe un gran riesgo asociado a este comportamiento alcanza un 79,2%.

En relación con el consumo de alcohol, un 89,8% de la población considera que ingerir cinco o más tragos de alcohol al día implica un gran riesgo, cifra que se mantiene estable respecto al estudio pasado. Del mismo modo, la percepción de gran riesgo frente al consumo ocasional de alcohol (tres o más tragos en una ocasión) no presenta variaciones significativas, con un 45,8% en 2024.

La percepción de riesgo frente al consumo experimental de marihuana (probar una o dos veces) muestra un aumento estadísticamente significativo por segundo estudio consecutivo, pasando de 41,8% en 2022 a 44,0% en 2024. De igual forma, la percepción de gran riesgo asociada al consumo frecuente de marihuana también aumenta significativamente y llega a un 74,9% en la medición actual.

En el caso de cocaína, la percepción de gran riesgo frente al consumo experimental no presenta variaciones significativas respecto a 2022, situándose en un 80,0% en 2024. De igual manera, la percepción de riesgo frente al consumo frecuente de cocaína se mantiene estable en esta versión de estudio (95,0%).

Finalmente, la percepción de riesgo frente al consumo experimental de pasta base no muestra cambios estadísticamente significativos y

se ubica en un 88,4% en 2024. De forma similar, la percepción de gran riesgo asociada al consumo frecuente de pasta base se mantiene estable, alcanzando un 95,9% en la medición actual.

TABLA 33
Evolución de la percepción de riesgo. Chile, 2000-2024.
Proporción que declara gran riesgo respecto al consumo (%)

Serie	Diario de tabaco	Cinco o más tragos de alcohol al día	Tres o más tragos de alcohol por ocasión	Experimental de marihuana	Frecuente de marihuana	Experimental de cocaína	Frecuente de cocaína	Experimental de pasta base	Frecuente de pasta base
2000	85,5	86,4							
2002	84,7	85,7							
2004	82,1	84,9							
2006	82,0	83,0		46,6	88,3	69,4	97,2	77,2	97,6
2008	83,1	85,4		51,8	84,2	74,5	95,3	81,1	96,2
2010	83,0	85,3		48,1	78,9	69,6	94,0	78,2	95,3
2012	85,6	87,9		46,8	79,0	74,2	94,8	81,6	95,4
2014	85,7	86,9		34,4	67,2	73,7	94,5	82,7	95,4
2016	84,0	88,0	36,0	29,2	62,8	71,6	93,7	82,8	94,4
2018	79,4	85,9	41,0	35,3	65,8	73,3	93,3	83,1	94,2
2020	80,8	85,6	37,6	31,4	64,0	71,8	90,9	80,0	91,4
2022	83,7	89,3	44,5	41,8	72,2	78,9	95,7	87,3	96,1
2024	79,2	89,8	45,8	44,0	74,9	80,0	95,0	88,4	95,9

OFERTA Y DISPONIBILIDAD DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Disponibilidad de alcohol

Con el propósito de caracterizar el acceso a bebidas alcohólicas por parte de la población, el cuestionario busca pesquisar los lugares más frecuentes de compra de alcohol entre quienes han consumido bebidas alcohólicas en el último año. Para la pregunta *Pensando en los últimos 30 días, ¿ha comprado alcohol en alguno de los siguientes lugares?*, los encuestados disponían de un listado de lugares establecidos y otro de lugares no establecidos sobre los cuales declarar haber realizado alguna compra durante los últimos 30 días antes de la fecha de encuesta. En 2020 se sustituyó la categoría "A la entrada de conciertos, estadios, eventos" por "delivery".

Entre los lugares establecidos, y tal como ha sido tendencia, las botillerías (39,9%) y los supermercados (38,1%) son utilizados mayoritariamente para comprar alcohol. Un 7,0% de los entrevistados declara comprar en restaurantes y un 12,2% en bares, pubs o discotecas. Respecto a la medición pasada se reporta una variación estadísticamente significativa para la categoría de supermercados por segunda medición consecutiva, pasando de 41,3% en 2022 a 38,1% en 2024. Las otras categorías se mantienen estables respecto al estudio anterior.

Entre las declaraciones de compra en lugares no establecidos, en la medición actual las vías de acceso más comunes son fiestas particulares (3,6%) y ferias libres o mercados (3,1%). La variación

observada para ferias libres o mercados es estadísticamente significativa respecto a la medición pasada, al igual que lo observado en 2022. El resto de las categorías no muestra cambios.

TABLA 34
Evolución de lugares de compra de alcohol.
Chile, 2012-2024.
Proporción que declara lugares de compra de alcohol en los últimos 30 días (%)

Lugares de compra de alcohol							
	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2024
Locales establecidos							
Bares, pubs o discotecas	18,6	12,4	12,3	12,4	3,4	13,2	12,2
Restaurantes	8,9	6,1	7,1	6,5	2,1	7,4	7,0
Botillerías/licorerías	36,3	34,7	34,0	37,0	40,1	40,5	39,9
Supermercados	42,9	40,1	43,1	40,4	46,5	41,3	38,1
Servicentros	1,4	0,8	0,8	0,7	0,2	0,8	1,0
Otros	2,5	1,8	1,6	0,8	1,3	1,3	1,3
Locales no establecidos							
Ferias libres o mercados	1,3	1,4	1,7	2,1	1,0	1,9	3,1
Fiestas particulares	8,3	5,7	4,2	4,8	0,7	3,4	3,6
Locales clandestinos	2,8	2,4	2,1	2,6	1,7	1,4	1,3
Delivery					4,3	3,1	2,7
Productores artesanales	1,5	1,6	1,7	1,9	1,3	1,4	1,2
Otros	2,6	2,9	2,2	0,7	1,6	1,6	1,5

Dentro de los locales establecidos, según nivel socioeconómico se observan descensos significativos en el NSE Alto respecto a bares, pubs o discotecas y supermercados en la actual medición. En el NSE Medio se aprecian descensos para botillerías/licorerías y supermercados, mientras que el NSE Bajo no muestra cambios respecto a 2022. Por su parte, la compra en supermercado es significativamente menor en el NSE Bajo (29,6%) respecto a los NSE Medio (33,3%) y Alto (45,4%). En el caso de botillerías, la compra de alcohol es mayor en el NSE Bajo (50,8%) respecto al NSE Medio (41,2%) y este, a su vez, respecto al NSE Alto (34,8%).

Sobre locales no establecidos, se observa respecto a 2022 una variación significativa a la baja en el NSE Medio para locales clandestinos y en el NSE Alto para productores artesanales; el resto de las categorías por NSE no muestran cambios respecto al estudio anterior. En cuanto a las brechas observadas en este estudio, la compra en locales clandestinos es significativamente mayor en el NSE Bajo respecto al NSE Medio; en el resto de las categorías no se aprecian otras brechas por NSE.

TABLA 35
Evolución de lugares de compra de alcohol, según nivel socioeconómico. Chile, 2022-2024.
Proporción que declara lugares de compra de alcohol en los últimos 30 días (%)

Lugares de compra de alcohol							
Locales establecidos				Locales no establecidos			
Serie	Bajo	Medio	Alto	Serie	Bajo	Medio	Alto
Bares, pubs o discotecas				Ferias libres o mercados			
2022	10,0	8,8	18,4	2022	2,8	1,4	1,8
2024	8,3	10,4	15,1	2024	5,4	2,9	2,6
Restaurantes				Fiestas particulares			
2022	4,6	5,0	10,6	2022	2,3	3,6	3,7
2024	3,8	5,1	9,8	2024	3,4	3,3	4,0
Botillerías/licorerías				Locales clandestinos			
2022	44,5	47,7	32,8	2022	3,0	1,3	0,8
2024	50,8	41,2	34,8	2024	2,5	0,7	1,3
Supermercados				Delivery			
2022	29,6	37,9	49,5	2022	2,0	2,2	4,2
2024	29,6	33,3	45,4	2024	2,3	2,1	3,4
Servicentros				Productores artesanales			
2022	0,3	0,9	0,9	2022	0,7	1,1	2,1
2024	0,4	0,5	1,6	2024	0,6	1,4	1,2
Otros				Otros			
2022	1,7	1,0	1,2	2022	2,5	1,1	1,6
2024	0,8	1,5	1,3	2024	1,2	1,3	1,8

Percepción de facilidad de acceso a drogas

Entre los factores de riesgo asociados al consumo de drogas se encuentra la percepción de facilidad de acceso, entendida como la proporción de individuos que declaran que les sería fácil conseguir droga.

La percepción de facilidad de acceso muestra descensos estadísticamente significativos en los casos de marihuana (49,3%), cocaína (30,8%) y pasta base (28,0%), volviendo a los niveles de 2020.

TABLA 36
Percepción de facilidad de acceso a drogas.
Chile, 1994-2024.
Proporción de individuos que declaran que sería fácil conseguir droga (%)

Serie	Marihuana	Cocaína	Pasta base
1994	39,9	14,2	21,7
1996	34,6	12,0	20,2
1998	45,3	25,6	33,5
2000	52,7	29,3	36,1
2002	52,1	24,2	32,9
2004	51,9	27,1	34,6
2006	55,6	30,8	37,2
2008	53,2	32,8	35,2
2010	36,1	21,3	24,6
2012	46,7	31,8	32,1
2014	51,0	31,0	31,2
2016	56,5	28,8	27,2
2018	50,3	27,6	27,4
2020	51,4	29,1	28,0
2022	53,7	34,2	30,8
2024	49,3	30,8	28,0

En cuanto a la percepción de facilidad de acceso a marihuana, la desagregación muestra variaciones significativas respecto al estudio anterior en mujeres (de 52,2% en 2022 a 45,4% en 2024), en los tramos de 26 a 34 años, de 35 a 44 años y de 45 a 64 años, y en los NSE Bajo y Medio. El análisis de brechas muestra que esta es significativamente mayor en hombres que en mujeres (53,1% frente a 45,4%). Este análisis muestra, además, que la totalidad de las brechas por tramos de edad son significativas, excepto entre los tramos de 19 a 25 años y de 26 a 34 años (por segundo estudio consecutivo). A su vez, por nivel socioeconómico la facilidad de acceso es significativamente menor en el NSE Alto (45,5%) respecto a los NSE Medio (52,3%) y Bajo (52,5%).

Respecto a cocaína, la percepción de facilidad de acceso muestra un descenso significativo en hombres y mujeres, así como en los tramos de 12 a 18 años (de 22,1% en 2022 a 16,6% en 2024) y de 45 a 64 años (de 31,8% en 2022 a 28,6% en 2024). Asimismo, se registra una reducción significativa en el NSE Bajo, que pasa de 44,3% en el estudio pasado a 35,5% en el actual. Respecto al análisis de brechas, la percepción de facilidad de acceso es significativamente mayor en hombres que en mujeres (33,2% frente a 28,3%). Por edad, el tramo de 12 a 18 años presenta una percepción significativamente menor que el resto de los grupos de edad; excluyendo este último tramo, y por segunda medición consecutiva, la percepción de facilidad de acceso es significativamente menor en el grupo de 45 a 64 años en comparación con los tramos de 19 a 25 años, de 26 a 34 años y de 35 a 44 años. Por nivel socioeconómico, se mantiene en esta versión del estudio una gradiente en la percepción de facilidad de acceso, con valores significativamente menores en el NSE Alto en comparación con los NSE Bajo y Medio.

Finalmente, para la percepción de facilidad de acceso a pasta base, la desagregación muestra un descenso significativo en mujeres (de 29,3% en 2022 a 26,1% en 2024), y en los tramos de 35 a 44 años

(de 33,2% en 2022 a 29,2% en 2024) y de 45 a 64 años (de 31,4% en 2022 a 28,2% en 2024). Asimismo, se registra una reducción significativa de este indicador en el NSE Bajo, que pasa de 42,1% en la medición anterior a 35,4% en la actual. Respecto al análisis de brechas, la percepción de facilidad de acceso a pasta base es significativamente mayor en hombres que en mujeres (29,8% frente a 26,1%). Por edad, y al igual a lo observado en cocaína, el tramo de 12 a 18 años presenta valores significativamente menores que el resto de los grupos de edad. Por nivel socioeconómico, se observa en 2024 una gradiente en la percepción de facilidad de acceso, con valores significativamente menores en el NSE Alto en comparación con los NSE Bajo y Medio.

TABLA 37
Percepción (%) de facilidad de acceso de drogas en el
último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico.
Chile, 2022-2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
Marihuana											
2022	53,7	55,1	52,2	41,9	62,5	63,2	55,7	46,1	59,1	55,8	48,6
2024	49,3	53,1	45,4	36,1	62,3	57,8	50,0	42,1	52,5	52,3	45,5
Cocaína											
2022	34,2	36,3	32,2	22,1	36,7	39,9	37,0	31,8	44,3	36,9	25,9
2024	30,8	33,2	28,3	16,6	35,5	36,2	33,2	28,6	35,5	34,8	25,7
Pasta base											
2022	30,8	32,4	29,3	18,2	29,5	35,4	33,2	31,4	42,1	33,9	21,5
2024	28,0	29,8	26,1	17,6	28,9	31,3	29,2	28,2	35,4	31,5	22,2

Disponibilidad de drogas

MARIHUANA

La proporción que declara haber recibido algún ofrecimiento de marihuana durante el último año muestra un descenso estadísticamente significativo de 20,1% en 2022 a 16,3% en 2024. Respecto a la medición pasada, se observan descensos significativos en hombres y mujeres, así como en los tramos de 12 a 18 años, de 26 a 34 años y de 45 a 64 años. Asimismo, se registra una disminución de este indicador en los NSE Medio y Alto.

El análisis de brechas muestra que la proporción de ofrecimientos es significativamente mayor en hombres que en mujeres (21,1% frente a 11,4%). Por edad, el tramo de 12 a 18 años presenta valores significativamente menores que el resto de los grupos de edad. Así también, la totalidad de las brechas observas por tramos de edad son estadísticamente significativas. Por nivel socioeconómico, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los distintos niveles en la medición actual.

TABLA 38
Exposición a oferta de marihuana en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2024.
Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de marihuana en el último año (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	13,9	19,9	8,1	19,9	31,1	17,1	7,2	2,2	14,3	12,5	14,6
2004	15,1	20,0	10,4	21,7	35,3	17,4	7,9	2,8	15,6	13,2	16,7
2006	16,0	20,9	11,1	21,5	33,2	20,1	10,6	3,9	14,7	14,8	19,1
2008	15,8	21,0	10,6	25,2	34,7	18,6	7,3	3,8	17,1	13,9	16,9
2010	10,3	13,9	6,7	13,6	25,2	12,8	6,7	2,3	12,4	8,5	11,1
2012	15,7	20,7	10,7	22,9	32,7	18,9	8,3	5,8	16,5	15,8	15,1
2014	18,6	22,2	15,2	25,3	35,4	27,5	13,9	8,2	20,2	17,7	18,7
2016	22,9	28,2	17,6	26,2	47,7	32,0	16,2	10,2	21,9	20,2	25,6
2018	21,4	27,4	15,5	24,0	45,8	30,4	19,0	7,3	20,9	20,2	23,1
2020	17,6	23,0	12,2	11,9	41,8	25,7	16,7	5,9	17,0	17,9	17,6
2022	20,1	24,5	15,7	17,7	35,5	30,3	18,1	8,0	19,7	19,7	20,6
2024	16,3	21,1	11,4	11,5	32,5	24,0	15,7	6,1	17,9	15,8	16,1

COCAÍNA

El porcentaje de la población que declara haber recibido ofrecimientos de cocaína en el último año muestra un descenso significativo respecto a la medición previa, pasando de 4,8% en 2022 a 4,0% en 2024. Sin embargo, no se observan variaciones estadísticamente significativas por sexo, edad ni nivel socioeconómico en comparación con el estudio anterior.

El análisis de brechas muestra que la proporción de ofrecimientos es significativamente mayor en hombres que en mujeres (5,9% frente a 2,1%). Asimismo, los ofrecimientos son significativamente menores en los tramos de 12 a 18 años y de 45 a 64 años en comparación con el resto de los grupos de edad. Por nivel socioeconómico, la prevalencia de ofrecimientos es significativamente mayor en el NSE Bajo en comparación con los NSE Medio y Alto.

TABLA 39
Exposición a oferta de cocaína en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2024.
Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de cocaína en el último año (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	4,4	7,1	1,8	3,1	9,6	7,1	3,3	0,9	4,6	4,5	3,8
2004	5,2	7,7	2,9	3,7	12,2	8,4	3,7	1,1	5,6	4,6	5,3
2006	5,0	7,4	2,6	3,6	8,6	8,5	5,1	1,4	5,5	5,2	4,0
2008	6,4	9,6	3,2	6,2	12,1	9,0	4,3	3,1	7,5	6,0	5,5
2010	3,0	4,8	1,1	2,2	6,0	5,4	2,6	1,0	4,5	2,3	2,8
2012	4,8	7,1	2,5	3,9	9,8	7,5	2,6	2,6	6,3	5,2	3,5
2014	5,2	7,2	3,2	4,7	9,1	7,9	4,9	2,7	7,5	5,6	3,6
2016	6,1	9,0	3,2	3,8	11,6	9,5	5,6	3,3	8,1	6,4	4,9
2018	6,4	9,6	3,1	3,2	12,6	10,1	7,4	2,6	7,4	6,7	5,0
2020	3,6	5,9	1,4	0,8	7,7	4,6	4,2	2,1	4,5	3,6	2,9
2022	4,8	7,0	2,6	2,6	7,7	6,6	5,5	2,5	6,7	4,7	3,7
2024	4,0	5,9	2,1	1,4	6,0	5,7	4,8	2,3	6,0	4,0	3,3

PASTA BASE

El porcentaje de la población que declara haber recibido algún ofrecimiento de pasta base en los últimos doce meses muestra un descenso significativo respecto a la medición anterior, pasando de 2,2% en 2022 a 1,6% en 2024, volviendo así a los niveles observados en 2020. Esta disminución se observa en hombres, así como en los tramos de 26 a 34 años y de 35 a 44 años. Asimismo, se registra una reducción significativa en el NSE Bajo.

El análisis de brechas muestra que los ofrecimientos son significativamente mayores en hombres que en mujeres (2,2% frente a 1,1%). Por edad, los ofrecimientos son significativamente menores en el tramo de 12 a 18 años en comparación con el resto de los grupos de edad. Por nivel socioeconómico, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre los distintos niveles en 2024.

TABLA 40
Exposición a oferta de pasta base en el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2024.
Proporción de individuos que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento de pasta base en el último año (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	2,8	4,7	1,0	2,8	5,7	3,9	2,4	0,7	4,1	2,1	1,4
2004	3,9	5,7	2,2	4,8	7,9	4,7	3,1	1,0	5,6	3,1	2,0
2006	4,0	6,1	2,0	3,5	6,0	5,4	4,3	2,0	5,5	3,9	2,0
2008	3,9	5,8	2,1	4,7	7,7	4,4	3,3	1,5	5,4	3,4	2,7
2010	2,6	4,2	1,2	2,5	5,5	3,6	1,9	1,3	4,9	2,1	1,9
2012	2,8	4,4	1,2	2,6	5,0	4,1	1,7	1,8	4,5	3,1	1,5
2014	2,7	4,0	1,4	2,7	3,8	3,7	2,6	1,8	4,7	2,8	1,5
2016	2,8	4,4	1,2	2,6	4,8	3,3	3,0	1,7	5,2	3,2	1,3
2018	3,0	4,3	1,7	2,4	4,4	3,9	3,9	1,7	4,0	3,4	1,7
2020	1,5	2,5	0,4	0,3	2,5	1,4	2,5	1,0	2,2	1,6	0,7
2022	2,2	3,3	1,2	0,5	3,1	2,8	2,9	1,7	4,3	2,0	1,3
2024	1,6	2,2	1,1	0,6	2,6	1,4	1,7	1,7	2,7	1,8	1,1

Entre las variables asociadas a la oferta de marihuana, cocaína y pasta base se encuentra el último lugar donde el entrevistado recibió ofrecimiento de droga, entre quienes declararon haber recibido algún ofrecimiento en el último año. Para las tres drogas bajo análisis, y por quinto estudio consecutivo, los lugares que concentran la mayor proporción de últimos ofrecimientos son el barrio o comuna y en una fiesta, junta, discoteca o recitales.

En el caso de marihuana, en la medición actual un 24,6% de los ofrecimientos se realizaron en el barrio o comuna y un 40,5% en fiestas, juntas, discotecas o recitales. En comparación con la medición anterior, no se observan variaciones estadísticamente significativas en las distintas categorías de lugar de ofrecimiento.

Para cocaína, en la actual versión de la encuesta la proporción de ofrecimientos en el barrio o comuna y en una fiesta, junta, discoteca o recitales alcanza 39,1% y 33,1%, respectivamente. Respecto a la medición anterior, se observa un descenso estadísticamente significativo en la proporción de ofrecimientos en fiesta, junta, discoteca o recitales, mientras que las demás categorías muestran estabilidad.

En el caso de pasta base, el barrio o comuna concentra la mayor proporción de ofrecimientos, llegando a un 58,0% en 2024, seguido por fiesta, junta, discoteca o recitales con un 15,5%. En comparación con el estudio previo, se observa un descenso estadísticamente significativo en la proporción de ofrecimientos en fiesta, junta, discoteca o recitales, mientras que las demás categorías se mantienen sin variaciones significativas.

TABLA 41
Evolución de lugar de último ofrecimiento de droga en los últimos 12 meses. Chile, 2012-2024.
Proporción que declara lugar de último ofrecimiento de marihuana, cocaína y pasta base en últimos 12 meses (%)

Lugares de ofrecimiento de droga							
	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2024
Marihuana							
En la casa	7,7	6,5	9,8	7,5	12,8	11,0	9,1
En el barrio o comuna	32,7	29,6	25,8	31,0	31,3	22,4	24,6
En lugar de estudio o trabajo	15,2	16,9	18,8	17,4	8,0	12,8	11,7
En alrededores de lugar de estudios o trabajo	6,3	4,7	7,1	6,3	4,5	5,8	5,3
En una fiesta, junta, discoteca, recitales	31,2	31,0	31,7	29,3	33,3	41,0	40,5
Por internet, mail o chat	1,7	1,2	0,7	1,4	2,3	1,2	1,4
En otro lugar	5,1	7,6	6,0	7,2	7,8	5,7	7,4
Cocaína							
En la casa	2,1	1,2	1,2	1,4	1,5	3,7	4,1
En el barrio o comuna	48,8	44,0	38,5	38,8	34,0	31,9	39,1
En lugar de estudio o trabajo	10,5	12,0	10,0	11,3	10,0	10,3	7,5
En alrededores de lugar de estudios o trabajo	4,2	4,6	5,3	4,6	3,1	6,5	4,5
En una fiesta, junta, discoteca, recitales	30,6	29,3	39,0	35,9	42,7	41,7	33,1
Por internet, mail o chat	0,4	0,4	0,9	1,3	3,6	1,4	1,7
En otro lugar	3,5	5,9	5,1	6,7	5,1	4,6	10,1
Pasta base							
En la casa	3,4	0,7	0,3	3,1	1,8	4,7	2,8
En el barrio o comuna	64,8	57,1	56,3	53,0	63,0	46,7	58,0
En lugar de estudio o trabajo	8,3	12,0	6,9	8,5	10,9	8,1	7,4
En alrededores de lugar de estudios o trabajo	2,3	3,3	6,9	7,2	4,8	6,6	5,6
En una fiesta, junta, discoteca, recitales	17,9	18,7	15,7	14,9	12,9	26,3	15,5
Por internet, mail o chat	0,3	0,6	0,3	1,9	3,0	0,5	1,0
En otro lugar	3,0	5,0	13,8	11,4	3,6	7,2	9,6

TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA

En el instrumento del presente estudio existe una pregunta que contestan sólo aquellas personas que declararon consumir tranquilizantes sin receta médica alguna vez en el último año, con el fin de identificar la última vía de acceso al medicamento.

En la medición actual, la forma más frecuente a través de la cual los consumidores de tranquilizantes sin receta médica declaran adquirirlos es la compra en ferias libres o mercados (32,3%), seguida por la obtención a través de conviviente/pareja, un familiar y/o amigo/a (29,0%). En tercer lugar aparece la entrega en consultorio (13,3%), seguida por otras formas de acceso (10,7%) y la compra en farmacia con receta médica de otra persona (9,3%). Un aspecto que debe ser considerado en el análisis es la exclusión de las categorías “No sabe” y “No contesta”.

Respecto a la medición anterior, se observan variaciones estadísticamente significativas en varias categorías de acceso. En particular, disminuye la compra en ferias libres o mercados (de 42,1% en 2022 a 32,3% en 2024), así como la compra por internet, que se reduce a 0,4% en 2024. Por el contrario, aumenta significativamente la proporción de personas que declara haber obtenido el medicamento en consultorio, pasando de 2,7% en 2022 a 13,3% en 2024.

Por nivel socioeconómico, no se observan diferencias estadísticamente significativas en 2024. No obstante, se aprecian patrones relevantes en la distribución de las vías de acceso. La compra en ferias libres o mercados continúa siendo una de las principales vías en todos los niveles, aunque con mayor presencia relativa en el NSE Medio (40,3%) y menor en el NSE Alto (21,8%). Asimismo, el acceso a través del conviviente/pareja, familiares o amigos muestra una mayor proporción en el NSE Alto (36,7%) en comparación con los NSE Medio (25,1%) y Bajo (25,8%). Por su parte, la obtención de tranquilizantes sin receta médica en consultorios presenta valores relativamente más altos en el NSE Alto (17,2%) y Bajo (12,8%) que en el NSE Medio (10,7%).

TABLA 42
Vías de acceso a tranquilizantes sin receta médica, según nivel socioeconómico. Chile, 2016–2024.
Proporción de individuos que declaran última vía de acceso a tranquilizantes sin receta médica (%)

Serie	Total	Nivel socioeconómico		
		Bajo	Medio	Alto
Lo compré en una farmacia con una receta médica de otra persona				
2016	15,7	6,8	10,0	21,4
2018	5,7	1,4	6,8	5,6
2020	5,3	2,0	9,8	5,0
2022	13,1	0,7	6,7	26,9
2024	9,3	11,3	8,0	9,9
Lo compré en una feria libre o mercado				
2016	20,5	20,2	30,0	14,9
2018	21,7	26,9	13,9	27,4
2020	30,0	24,9	28,0	40,7
2022	42,1	65,4	37,0	31,4
2024	32,3	31,1	40,3	21,8
Lo compré por internet				
2016	-	-	-	-
2018	4,6	4,3	9,3	0,2
2020	2,5	5,8	0,3	-
2022	2,1	2,2	2,9	1,4
2024	0,4	-	0,6	0,5
Me lo pasó mi conviviente/pareja, un familiar y/o amigo/a				
2016	49,7	52,5	47,8	50,1
2018	36,4	24,0	34,9	45,0
2020	24,8	18,4	29,1	29,5
2022	24,7	16,3	33,5	22,5
2024	29,0	25,8	25,1	36,7
Me lo pasaron en el consultorio				
2016	2,8	1,7	4,8	1,9
2018	2,4	1,6	4,2	1,0
2020	5,1	8,9	1,1	4,1
2022	2,7	0,5	3,6	3,3
2024	13,3	12,8	10,7	17,2
Estaba en mi casa y lo tomé				
2016	6,3	3,8	6,5	6,8
2018	17,7	14,2	20,0	17,4
2020	18,5	21,7	14,7	18,1
2022	6,1	8,7	2,9	7,2
2024	4,9	8,4	2,3	6,3
Lo conseguí de otra forma				
2016	5,0	15,0	0,9	4,9
2018	11,6	27,5	11,0	3,4
2020	13,8	18,2	17,1	2,5
2022	9,1	6,2	13,5	7,3
2024	10,7	10,6	13,0	7,6


FRECUENCIA DE CONSUMO Y TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS

Frecuencia en el uso de alcohol y otras drogas

Las prevalencias de consumo —es decir, la proporción de individuos que ha consumido una determinada droga en un período de tiempo— son indicadores útiles para conocer la magnitud de la población que usa una droga. Sin embargo, estos indicadores no permiten establecer con certeza el patrón de consumo ni otros factores asociados a él. En este sentido, para medir la intensidad de uso se emplea el número de días en que se ha consumido droga en los últimos 30 días, calculado sobre aquellos individuos que reportaron consumo en el último mes.

MARIHUANA Y COCAÍNA

Los resultados del presente estudio muestran que quienes han consumido marihuana en los últimos 30 días lo han hecho, en promedio, 15,9 días; por su parte, aquellos que han consumido cocaína en el último mes la han usado en promedio 10,2 días. La variación observada para cocaína respecto a 2022 es estadísticamente significativa.



Para marihuana, en la medición actual el promedio de días de consumo en el último mes es levemente mayor en hombres que en mujeres (16,4 frente a 14,5 días), aunque esta diferencia no alcanza a ser estadísticamente significativa. Por edad, el tramo de 12 a 18 años presenta valores menores que el resto de los grupos etarios, aunque las diferencias entre tramos no resultan estadísticamente significativas en la medición actual. Por nivel socioeconómico, se observa una significativamente menor frecuencia de consumo en el NSE Alto (13,6 días) en comparación con los NSE Medio (16,9 días) y Bajo (18,6 días).

Respecto al estudio anterior, no se observan variaciones estadísticamente significativas en el número promedio de días de consumo entre 2022 y 2024, en las distintas categorías analizadas.

TABLA 43

Evolución del promedio de días de consumo de marihuana en el último mes, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002–2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	8,8	9,1	7,8	6,8	9,1	9,8	9,5	6,6	9,9	9,2	6,1
2004	9,6	10,6	6,3	8,2	9,8	11,8	6,0	5,1	10,5	8,9	8,9
2006	10,5	11,8	6,5	7,2	12,3	11,6	9,3	5,2	11,8	10,1	9,8
2008	11,7	12,7	8,5	11,4	11,6	13,3	8,0	15,5	14,5	7,2	12,1
2010	10,1	10,6	8,4	8,9	9,4	10,0	12,5	15,4	13,7	8,9	8,1
2012	10,9	12,3	7,4	9,8	12,0	9,9	7,0	14,4	11,6	11,6	10,0
2014	9,9	10,9	8,2	12,4	9,5	10,8	8,2	8,7	12,1	9,8	9,1
2016	11,0	11,6	9,5	10,5	10,8	13,9	8,9	7,0	11,8	12,6	9,6
2018	12,4	13,1	10,2	12,5	13,1	12,9	10,2	10,3	14,6	12,2	10,6
2020	13,8	15,0	10,9	16,5	15,5	12,9	12,3	11,5	17,8	11,7	13,9
2022	15,2	15,9	13,9	9,0	13,4	16,2	16,0	18,0	16,4	16,2	13,6
2024	15,9	16,4	14,5	13,3	15,6	16,1	16,5	14,6	18,6	16,9	13,6

Para cocaína, en la medición actual se observa una mayor frecuencia de consumo en mujeres que en hombres (15,3 frente a 10,0 días), siendo esta una brecha significativa. Por edad y NSE no se observan brechas estadísticamente significativas. Respecto al estudio anterior, se registra un aumento significativo en el NSE Medio, que pasa de 3,0 días en 2022 a 9,0 días en 2024. Para el resto de las categorías no se observan variaciones estadísticamente significativas.

TABLA 44


Evolución del promedio de días de consumo de cocaína en el último mes, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002–2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	3,8	3,7	4,0	6,4	2,6	4,0	3,0	24,2	3,6	4,7	2,9
2004	4,1	4,1	3,8	1,1	2,0	3,1	10,2	7,2	3,6	6,3	1,6
2006	3,4	3,8	2,4	2,6	2,3	5,4	3,4	2,6	4,1	3,0	1,6
2008	4,7	3,5	11,2	4,6	6,5	4,8	4,4	2,2	4,9	2,4	7,9
2010	5,1	5,0	6,0	1,5	3,4	6,5	5,8	1,3	8,1	4,8	2,0
2012	6,3	7,2	5,0	6,2	6,7	7,9	3,2	4,9	4,6	4,4	8,3
2014	5,1	4,4	6,9	2,2	5,5	2,6	2,9	14,7	5,5	3,9	6,8
2016	3,8	4,0	1,9	1,2	1,7	3,8	4,2	6,8	3,5	4,2	3,8
2018	6,2	3,0	15,3	1,0	2,1	4,5	9,7	3,5	8,9	3,5	3,4
2020	8,7	9,7	3,0	-	1,2	1,5	11,5	13,5	9,7	6,6	9,4
2022	7,1	7,2	6,7	1,0	3,9	7,4	7,6	10,7	9,9	3,0	6,3
2024	10,2	10,0	15,3	5,0	1,0	8,4	7,7	14,7	14,2	9,0	4,7

TABACO Y ALCOHOL

Sobre aquellos individuos que declararon consumir tabaco durante los últimos 30 días, se observa que el uso promedio es de 21,9 días en 2024, lo que representa una estabilización respecto a 2022. En el caso de alcohol, el número de días de uso ha permanecido sin variaciones en los últimos estudios, con un promedio de 4,3 días en 2024, lo que no representa un cambio significativo respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 8
Evolución del promedio de días de consumo de tabaco y alcohol en el último mes. Chile, 2002-2024.



Respecto a los días de consumo de tabaco, se aprecian diferencias significativas entre hombres (21,3 días) y mujeres (22,6) en la medición actual. Por edad, el mayor promedio de días se observa entre 45 y 64 años con 24,4 días, seguido por el tramo de 35 a 44 años, lo que representa en 2024 una brecha significativa respecto al resto de los grupos etarios. Por nivel socioeconómico, no se observan brechas significativas en el presente estudio. Respecto a la medición anterior, es estadísticamente significativa la disminución observada en el NSE Alto, que pasa de 20,0 días en 2022 a 21,5 días en 2024.

TABLA 45
Evolución del promedio de días de consumo de tabaco en el último mes, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	22,7	22,7	22,7	18,9	21,8	22,3	23,9	24,4	23,2	22,0	22,6
2004	22,3	22,1	22,5	19,1	21,7	21,8	22,7	24,4	22,7	22,2	21,7
2006	22,1	22,6	21,5	17,6	19,7	21,5	22,5	26,0	21,9	22,7	21,5
2008	22,2	21,9	22,7	17,3	20,7	21,3	23,1	25,4	22,3	22,7	21,3
2010	22,3	22,4	22,2	20,4	20,0	21,6	22,5	24,6	22,9	21,9	22,3
2012	21,4	21,3	21,4	17,4	19,1	19,7	22,0	24,1	21,6	21,0	21,6
2014	21,6	21,5	21,7	18,4	18,5	21,0	21,2	23,9	22,8	21,6	20,8
2016	21,0	20,9	21,2	15,5	17,6	20,5	21,7	23,2	22,7	20,6	20,4
2018	20,8	20,2	21,4	14,7	17,5	19,0	22,2	23,1	22,1	20,6	20,0
2020	22,0	21,7	22,4	18,9	17,9	20,6	22,5	24,2	23,6	21,8	20,8
2022	21,6	21,6	21,6	14,4	18,0	19,6	22,5	24,4	22,9	22,4	20,0
2024	21,9	21,3	22,6	17,4	19,5	19,7	22,1	24,4	22,0	22,4	21,5

El uso de alcohol es significativamente mayor en hombres (4,7 días) que en mujeres (3,5 días) en 2024. Según tramos de edad, el número de días de consumo en adolescentes (2,4 días) es significativamente menor respecto al resto de los tramos. Por otro lado, y de igual manera que en 2022, no se observan brechas según nivel socioeconómico en el número de días promedio de consumo. Respecto al estudio anterior, no se observan variaciones para ninguna de las categorías.

TABLA 46
Evolución del promedio de días de consumo de alcohol en el último mes, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2002-2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2002	4,2	5,0	3,1	2,7	3,8	3,6	3,9	5,6	3,7	3,7	5,3
2004	3,9	4,7	2,9	2,9	3,8	3,8	3,3	5,0	3,6	3,8	4,6
2006	4,4	5,1	3,5	3,2	4,5	3,8	4,5	4,9	3,7	4,0	5,5
2008	3,6	4,2	2,8	2,8	3,6	3,6	3,4	4,1	3,4	3,7	3,8
2010	4,2	4,8	3,3	3,4	4,2	4,2	4,0	4,5	4,8	4,1	4,1
2012	4,1	4,6	3,4	3,3	4,1	4,2	3,6	4,6	4,3	4,0	4,1
2014	4,2	4,8	3,3	3,5	4,0	4,3	3,9	4,4	4,2	3,8	4,4
2016	4,4	4,9	3,8	3,0	4,4	4,5	4,2	4,8	4,5	4,0	4,8
2018	4,4	5,1	3,3	3,1	4,7	4,3	4,4	4,5	4,2	4,4	4,5
2020	4,6	5,0	3,9	3,1	4,1	4,5	4,6	5,0	4,7	4,6	4,4
2022	4,4	5,0	3,6	2,3	4,1	4,6	4,3	4,7	4,6	4,3	4,5
2024	4,3	4,7	3,5	2,4	4,2	4,0	4,3	4,6	5,4	4,0	4,1

Consumo problemático de drogas

Los criterios utilizados para pesquisar consumo problemático de drogas ilícitas son definidos en el *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV)*²⁰ para abuso, y en la *Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)*²¹ para dependencia. Estas prevalencias se estiman sobre aquellos que declararon consumo en los últimos 12 meses. La definición de consumo problemático de drogas considera a quienes presentan abuso y/o dependencia de una droga (o de más de una), de acuerdo con los sistemas de clasificación antes mencionados.

La tasa de dependencia se calcula a partir de la presencia de tres o más de los seis criterios establecidos en el CIE-10: deseo intenso (o vivencia de una compulsión a consumir), disminución de la capacidad para controlar el consumo, abstinencia, tolerancia, abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversión (o aumento del tiempo necesario para obtener la sustancia o para recuperarse de sus efectos) y persistencia en el consumo de la sustancia.

En el caso de la tasa de abuso, la estimación se realiza a partir de la presencia de uno de los cuatro criterios establecidos en el DSM-IV: uso recurrente de la sustancia con el consiguiente fracaso en obligaciones laborales, escolares o domésticas; uso recurrente de la sustancia en situaciones en las cuales es físicamente peligroso; problemas legales recurrentes como consecuencia del uso de la sustancia, y uso continuo de la sustancia a pesar de tener problemas sociales o interpersonales provocados o exacerbados por esta.

Los resultados del actual estudio muestran estabilidad en los indicadores para marihuana, cocaína y pasta base al medir dependencia, abuso y consumo problemático.

En el caso de pasta base, el consumo problemático se mantiene estable y llega a 88,3% en 2024. En el caso de marihuana, los reportes muestran que la proporción de consumidores en el último año que declaran síntomas de dependencia ha oscilado entre 14% y 20% en casi toda la serie; no obstante, en la medición actual y por segundo estudio consecutivo, los valores superan el 20%. Por otro lado, las tasas de dependencia de cocaína no han sufrido variaciones estadísticamente significativas.

Al observar el agregado de los reportes de abuso y dependencia (consumo problemático) para cada droga, y de igual manera que en los últimos cinco estudios, no se aprecian variaciones significativas respecto a 2022 en ninguna de las drogas analizadas. En el caso de marihuana, la proporción de consumo problemático entre prevalentes de último año en 2024 es de 25,5%, mientras que en el caso de cocaína es 38,3% y en pasta base, 90,2%.

TABLA 47

Evolución de indicadores de severidad del consumo de drogas. Chile, 2006-2024.

Proporción de prevalentes con algún trastorno por consumo de drogas (%)

Serie	Trastorno por uso según drogas								
	Marihuana			Cocaína			Pasta base		
	Dependencia	Abuso	Problemático	Dependencia	Abuso	Problemático	Dependencia	Abuso	Problemático
2006	19,8	18,9	28,0	29,4	25,5	40,2	52,2	65,4	70,2
2008	24,2	22,3	33,5	20,5	29,7	33,6	50,2	66,5	67,5
2010	16,2	16,6	23,8	24,7	31,7	39,6	54,6	50,8	61,9
2012	19,4	15,3	24,9	33,8	33,0	46,8	57,7	64,6	70,3
2014	16,4	10,2	21,7	22,1	21,8	35,2	65,6	54,8	68,2
2016	14,8	11,5	20,3	29,6	23,6	37,9	44,6	47,6	54,8
2018	20,3	10,2	24,7	25,6	31,8	37,4	57,4	59,1	64,4
2020	20,2	9,6	23,5	33,2	44,2	50,7	69,2	59,0	75,7
2022	21,3	11,1	25,3	26,7	31,2	38,8	86,4	76,9	86,8
2024	23,1	9,9	25,5	26,9	30,4	38,3	88,3	66,5	90,2

A continuación, se presentan los mismos indicadores de severidad pero respecto al total de la población de entre 12 y 64 años. El comportamiento observado en este conjunto de indicadores es similar a lo reportado en la tabla previa, puesto que mide la magnitud del problema en la totalidad de la población, mientras que la anterior da cuenta de características y condiciones propias de los usuarios de drogas de último año.

En la actual medición, un 2,3% de la población general presenta síntomas de dependencia de marihuana y un 1,0% presenta síntomas de abuso de marihuana; no se observan variaciones estadísticamente significativas respecto a 2022. En el caso de pasta base, las prevalencias de dependencia y abuso son de 0,3% y 0,2% para ambos indicadores; por su parte, las prevalencias de dependencia y abuso para cocaína son de 0,2%. En 2024, la prevalencia de consumo problemático de marihuana (2,6%), cocaína (0,3%) y pasta base (0,3%) no presenta variaciones significativas respecto al estudio anterior, manteniéndose estable durante las últimas mediciones.

20 American Psychiatric Association. (1994). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (4a ed.). Masson.

21 Organización Mundial de la Salud. (2003). *CIE-10. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico*. Mediator.

TABLA 48
Evolución de indicadores de severidad del consumo de drogas sobre población general. Chile, 2006-2024.
Proporción de individuos con algún trastorno por consumo de drogas (%)

Trastorno por uso sobre población general según droga									
Serie	Marihuana			Cocaína			Pasta base		
	Dependencia	Abuso	Problemático	Dependencia	Abuso	Problemático	Dependencia	Abuso	Problemático
2006	1,4	1,4	2,0	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,4
2008	1,6	1,4	2,2	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5
2010	0,7	0,8	1,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
2012	1,4	1,1	1,8	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3
2014	1,9	1,2	2,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
2016	2,1	1,7	2,9	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
2018	2,6	1,3	3,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
2020	2,3	1,1	2,7	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
2022	2,3	1,2	2,8	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
2024	2,3	1,0	2,6	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3

Embriaguez y consumo de riesgo de alcohol

EMBRIAGUEZ (BINGE DRINKING)

Entre los entrevistados que reportaron consumo de alcohol en el último mes, la proporción que declaró haber bebido cinco o más tragos en una sola ocasión (cuatro o más para mujeres) durante los últimos 30 días fue de 47,2% en 2024, prevalencia que muestra un descenso estadísticamente significativo respecto a 2022 (50,7%). Así también, la desagregación del indicador muestra cambios significativos a la baja en hombres y en el NSE Medio en comparación al estudio anterior.

El análisis de brechas muestra que un 48,7% de los hombres y un 45,1% de las mujeres que han usado alcohol en el último mes han tenido a lo menos un episodio de embriaguez; la brecha observada entre hombres y mujeres en 2024 no es estadísticamente significativa. Según edad, no se observan brechas significativas. Por nivel socioeconómico, la brecha entre el NSE Bajo (59,4%) respecto a los NSE Medio (43,9%) y Alto (45,9%) es estadísticamente significativa.

TABLA 49
Evolución de la prevalencia de embriaguez, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2024.
Proporción de prevalentes de último mes que declaran haber bebido 5 tragos o más (4 o más en mujeres) en una ocasión (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	52,1	59,3	41,4	57,6	63,7	57,9	44,9	44,4	60,6	50,9	48,8
2014	43,7	51,3	34,0	38,4	58,5	48,3	45,5	34,9	47,9	44,2	41,4
2016	51,1	55,4	45,3	57,7	60,2	59,1	50,2	40,7	58,6	50,3	48,7
2018	56,3	59,5	51,4	54,3	60,3	62,2	57,3	50,0	59,3	56,3	53,9
2020	50,2	55,2	43,3	57,5	59,2	55,0	49,0	42,7	54,4	51,1	45,9
2022	50,7	55,2	44,6	37,3	52,4	57,1	51,1	45,1	53,8	51,6	48,5
2024	47,2	48,7	45,1	48,3	47,9	52,5	47,5	42,1	59,4	43,9	45,9

Al analizar el indicador sobre el total de la población, se observa que la prevalencia de embriaguez desciende respecto al último estudio —por segunda medición consecutiva—, pasando de 19,8% en 2022 a 16,4% en 2024. Respecto al estudio anterior se observan descensos significativos en hombres (de 24,9% en 2022 a 20,3% en 2024), mujeres (de 14,9% en 2022 a 12,5% en 2024), en los tramos de 26 a 34 años (de 28,6% en 2022 a 22,3% en 2024) y de 45 a 64 años (de 16,7% en 2022 a 13,4% en 2024), y en los NSE Medio (de 19,0% en 2022 a 15,3% en 2024) y Alto (de 21,6% en 2022 a 16,0% en 2024).

La desagregación por sexo muestra que el consumo intenso de alcohol es significativamente mayor en hombres (20,3%) que en mujeres (12,5%) en 2024. Por edad, tal como en las dos mediciones anteriores, la prevalencia de embriaguez sobre el total de la población es significativamente menor en adolescentes (de 12 a 18 años) respecto al resto de los tramos de edad; de igual forma, la prevalencia de este indicador es menor en el tramo de 45 a 64 años respecto al resto (exceptuando adolescentes). El análisis por nivel socioeconómico muestra brechas significativas en el NSE Alto (16,0%) respecto a los NSE Bajo y Medio (19,9% y 15,3%, respectivamente).

TABLA 50
Evolución de la prevalencia de embriaguez sobre el total de población general, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2012-2024.
Proporción de prevalentes de último mes que declaran haber bebido 5 tragos o más (4 o más en mujeres) en una ocasión sobre el total de la población (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2012	21,2	29,2	13,5	10,4	32,0	30,0	20,2	17,9	24,2	19,2	21,5
2014	21,3	28,4	14,5	8,8	31,5	27,7	24,7	17,3	22,2	20,4	21,8
2016	23,5	29,2	17,8	10,8	34,2	34,3	25,2	18,0	24,1	21,4	25,0
2018	24,4	31,2	17,6	10,1	32,1	32,8	27,8	20,2	23,5	24,0	25,2
2020	22,2	28,4	16,1	7,8	32,4	27,7	25,7	18,7	22,1	23,1	21,2
2022	19,8	24,9	14,9	4,3	21,1	28,6	23,4	16,7	18,2	19,0	21,6
2024	16,4	20,3	12,5	4,0	18,7	22,3	20,2	13,4	19,9	15,3	16,0

CONSUMO DE RIESGO DE ALCOHOL

El puntaje del “Test de Identificación de Trastornos debido al Consumo de Alcohol” (AUDIT, por sus siglas en inglés) posee un rango de 0 a 40, que deriva de la sumatoria de diez ítems, donde ocho o más puntos identifican el consumo de riesgo. El indicador de consumo de riesgo de alcohol (puntaje AUDIT mayor o igual a 8) se calcula sobre los consumidores de último año, vale decir, aquellas personas que respondieron el instrumento AUDIT.

La prevalencia de consumo de riesgo de alcohol no ha mostrado variaciones significativas respecto al estudio anterior, manteniéndose estable en 8,6% en 2024. Por sexo, el consumo de riesgo es significativamente mayor en hombres (11,6%) que en mujeres (4,7%). Según edad, la prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en población adolescente es significativamente menor al resto de los tramos. Finalmente, la prevalencia en el NSE Bajo (14,4%) es significativamente mayor que en los NSE Medio (7,0%) y Alto (7,8%).

En términos generales, no se observan variaciones significativas de este indicador respecto al estudio anterior.

TABLA 51
Evolución de la prevalencia del consumo de riesgo de alcohol durante el último año, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2008-2024.
Proporción de prevalentes de último año que presentan consumo de riesgo de alcohol (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2008	9,2	14,0	3,4	9,0	12,8	12,2	6,9	6,4	12,6	7,8	6,3
2010	8,7	13,9	2,4	8,1	14,0	10,3	6,2	6,4	12,5	8,0	7,2
2012	9,2	14,2	3,1	6,1	14,5	9,1	5,6	9,1	13,5	9,5	6,8
2014	8,7	12,2	4,7	8,0	11,1	11,1	7,9	7,2	13,1	6,4	8,6
2016	9,3	13,8	4,1	6,0	15,3	12,1	7,8	6,3	13,6	8,3	8,3
2018	9,3	13,3	4,3	3,5	14,7	11,1	8,9	6,8	12,1	8,5	7,8
2020	9,8	14,9	3,6	3,0	14,3	10,9	11,9	6,8	12,0	9,6	8,6
2022	8,7	13,0	3,5	3,4	8,4	10,8	8,7	7,7	13,0	7,9	7,2
2024	8,6	11,6	4,7	1,1	7,5	12,1	9,1	7,0	14,4	7,0	7,8

Al analizar el indicador de consumo de riesgo sobre la población total, se confirma la baja significativa observada desde la medición anterior, manteniéndose estable en 4,3% en 2024. Según sexo, el consumo de riesgo en hombres (6,5%) es significativamente mayor que en mujeres (2,0%), lo que representa una brecha significativa en 2022. Según edad, la brecha de la prevalencia observada en población adolescente es significativamente menor respecto al resto de los tramos en esta medición. Al evaluar por nivel socioeconómico, la brecha del NSE Bajo (7,0%) es significativamente mayor en comparación con los NSE Medio (3,6%) y Alto (3,9%).

Respecto al estudio anterior, no se reportan cambios significativos en la totalidad de las categorías de la tabla.

TABLA 52
Evolución de la prevalencia de consumo de riesgo de alcohol durante el último año sobre población general, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2008-2024.
Proporción de consumidores de último año que presentan consumo de riesgo de alcohol sobre el total de la población (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2008	6,3	10,6	2,1	4,1	10,0	9,5	5,0	4,4	8,2	5,4	4,5
2010	5,0	8,9	1,2	2,5	10,0	6,7	3,9	3,7	7,4	4,4	4,3
2012	5,1	8,8	1,6	2,0	9,5	6,2	3,4	5,0	7,5	5,0	4,0
2014	5,5	8,4	2,8	2,9	7,7	8,1	5,6	4,5	8,1	3,9	5,7
2016	6,0	9,5	2,4	2,1	11,3	9,0	5,6	3,9	8,0	5,0	5,7
2018	5,6	9,0	2,3	1,1	10,3	7,9	6,0	4,1	7,1	5,1	5,0
2020	5,8	9,6	1,9	0,7	10,0	7,3	7,9	4,0	6,3	5,7	5,3
2022	4,6	7,6	1,7	0,7	4,9	7,0	5,3	3,9	6,3	4,0	4,3
2024	4,3	6,5	2,0	0,2	4,3	7,0	5,4	3,2	7,0	3,6	3,9

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS Y CONSUMO DE SUSTANCIAS

En atención al desarrollo de políticas públicas que buscan regular el uso de alcohol y otras drogas, SENDA indaga desde el año 2012 sobre el consumo de sustancias cuando los entrevistados se encuentran frente al volante. A este módulo del cuestionario accedieron todas aquellas personas mayores de 17 años que declararon tener licencia de conducir.

Los resultados muestran que un 7,3% de los entrevistados condujo bajo la influencia del alcohol alguna vez en el último año, lo que representa un descenso estadísticamente significativo de 3,6 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, volviendo así a los niveles observados en 2020. Este resultado se explica por descensos en ambos sexos, en los tramos de 26 a 34 años y de 35 a 44 años, y en los NSE Bajo y Alto. El análisis de brechas por sexo muestra que esta conducta es significativamente mayor en hombres (9,2%) que en mujeres (3,9%) en 2024. Respecto a los tramos de edad, esta conducta es menor en personas de los tramos de 17 a 25 años y de 26 a 34 años respecto al grupo de 45 a 64 años. Finalmente, la brecha también es significativa entre los NSE Bajo (5,2%) y Medio (8,8%) en la medición actual.

En el caso de marihuana, el 2,5% de los conductores mayores de 17 años con licencia en 2024 manejaron bajo los efectos de esta droga, lo que representa un descenso de 1,0 punto porcentual respecto al estudio anterior, es decir, una variación no significativa. Por otro lado, sólo se reportan variaciones estadísticamente significativas en mujeres (de 2,2% en 2022 a 0,7% en 2024) y en el tramo de 26 a 34 años (de 3,4% en 2022 a 1,9% en 2024) respecto a la medición previa. El análisis de brechas muestra por sexo una prevalencia significativamente mayor en hombres que en mujeres, con 3,5% frente a 0,7%. Por edad, la prevalencia del tramo de 45 a 64 años es significativamente menor que en los demás grupos etarios. Según nivel socioeconómico, no se observan brechas en la conducta en esta medición.

Las declaraciones de uso de otras drogas antes de conducir —tales como cocaína, éxtasis, pasta base o algún medicamento— llegan a 0,3% en 2024, lo que representa un cambio significativo respecto al estudio anterior (de 0,8% en 2022 a 0,3% en 2024). En la presente encuesta, se aprecian variaciones significativas a la baja en mujeres, en los tramos de 17 a 25 años y de 26 a 34 años, y en el NSE Alto. Finalmente, en el análisis por brechas se observa que las personas del NSE Bajo presentan esta conducta en menor medida que aquellas del NSE Medio (brecha significativa).

TABLA 53
Evolución de la prevalencia de drogas al momento de conducir, según sexo, edad y nivel socioeconómico.
Chile, 2012-2024.

Proporción que declara haber conducido bajo la influencia de la droga especificada en los últimos 12 meses (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad				Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	17 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
Alcohol										
2012	15,5	16,5	13,2	22,1	18,5	14,8	11,9	13,6	14,1	16,7
2014	14,2	16,2	10,0	13,8	22,9	15,4	10,2	13,9	10,9	16,2
2016	13,5	16,0	8,5	11,5	19,5	14,5	10,3	14,1	10,3	15,1
2018	13,8	17,4	6,2	21,0	18,4	11,8	10,8	8,8	11,6	17,2
2020	8,2	9,8	5,3	10,2	9,8	9,1	6,6	8,4	7,2	9,1
2022	10,9	13,1	6,7	8,1	12,2	13,9	8,7	10,1	8,8	12,7
2024	7,3	9,2	3,9	4,0	6,5	8,8	7,5	5,2	8,8	6,6
Marihuana										
2012	2,8	3,1	2,0	5,6	4,1	2,8	1,0	3,2	3,1	2,5
2014	3,2	3,8	2,0	4,4	9,1	2,5	0,9	2,9	1,8	4,1
2016	3,5	4,5	1,6	10,1	7,9	2,0	0,5	3,7	2,6	4,0
2018	4,1	5,3	1,7	10,5	9,0	2,3	1,1	4,8	3,2	4,6
2020	2,6	3,6	0,8	6,3	4,8	2,5	0,9	3,1	2,7	2,4
2022	3,5	4,1	2,2	4,4	6,3	3,4	1,5	3,2	3,8	3,3
2024	2,5	3,5	0,7	4,2	5,7	1,9	0,8	2,8	3,1	2,1
Otra droga										
2012	0,6	0,8	0,2	0,5	0,6	1,1	0,4	1,1	0,5	0,6
2014	1,0	0,9	1,0	0,4	2,0	1,6	0,3	2,1	0,4	1,0
2016	1,0	1,1	0,8	1,7	1,1	1,9	0,2	2,6	0,2	1,0
2018	0,4	0,5	0,1	0,3	0,5	0,7	0,1	0,4	0,5	0,2
2020	0,7	0,6	0,7	0,1	1,5	1,1	0,1	0,1	0,9	0,8
2022	0,8	0,8	0,8	1,9	1,7	0,6	0,2	0,3	1,0	0,9
2024	0,3	0,3	0,1	<0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,5	0,2


OTROS INDICADORES ASOCIADOS AL CONSUMO

Consumo de drogas en el hogar

Numerosas investigaciones señalan al hogar como factor protector o de riesgo para el consumo de drogas, principalmente en población joven y adolescente. El consumo de sustancias en el hogar se asocia a una mayor disponibilidad y a una disminución de la percepción de riesgo frente al uso de alcohol y otras drogas.

En este estudio, el consumo de drogas en el hogar —es decir, la proporción de individuos que declara que algún miembro del hogar consume alguna droga— presenta variaciones estadísticamente significativas para marihuana, que pasa de 8,5% en 2022 a 6,7% en 2024, confirmando la baja observada desde 2020 en este indicador. En los casos de cocaína y pasta base, no se aprecian variaciones significativas respecto a 2022, con diferencias de 0,2 puntos porcentuales en ambas sustancias respecto a la medición pasada.

GRÁFICO 9
Evolución del porcentaje que declara consumo de drogas en el hogar. Chile, 2000-2024.



En el caso del uso de marihuana en el hogar, y respecto al estudio anterior, se reportan descensos significativos en mujeres, en los tramos de 12 a 18 años y de 45 a 64 años, y en el NSE Bajo. Se observa una brecha entre hombres (7,6%) y mujeres (5,8%). Al igual que en la medición pasada, los entrevistados con edades entre 19 y 34 años reconocen significativamente en mayor proporción que viven con una persona que consumió marihuana en el último año, en comparación con entrevistados de 35 a 64 años. Sin embargo, si no se considerara el grupo entre 19 y 25 años, el tramo de 26 a 34 años presentaría reportes significativamente mayores que el resto de los tramos de edad. Por último, no se aprecian brechas entre los distintos niveles socioeconómicos para 2024.

TABLA 54
Evolución de la prevalencia (%) de marihuana en el hogar,
según sexo, edad y nivel socioeconómico.
Chile, 2000–2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2000	6,1	6,8	5,4	7,0	10,7	6,2	4,6	3,6	7,0	4,8	6,0
2002	4,1	3,2	4,9	4,9	7,9	3,9	2,3	2,7	4,5	4,5	2,8
2004	4,3	3,8	4,7	5,6	7,8	4,0	3,3	2,1	5,1	4,0	3,2
2006	6,8	5,8	7,8	5,3	15,4	8,1	5,2	3,1	6,3	6,6	7,7
2008	5,4	5,2	5,5	6,8	9,0	6,4	3,1	3,4	7,1	4,3	4,3
2010	4,2	5,0	3,3	3,0	7,3	5,1	2,5	3,8	6,1	4,0	3,2
2012	5,2	5,8	4,6	5,4	8,3	5,3	3,8	4,2	6,4	4,7	5,0
2014	5,9	6,1	5,8	6,0	8,9	8,4	4,2	4,5	7,6	6,4	4,6
2016	9,8	9,2	10,3	8,7	17,0	13,0	6,2	7,3	10,0	7,5	11,5
2018	11,7	13,6	9,8	12,6	19,6	16,1	9,8	7,0	12,1	10,7	12,3
2020	9,7	10,0	9,3	7,4	18,1	11,0	6,7	7,7	11,7	9,1	8,7
2022	8,5	8,4	8,5	7,7	10,5	10,6	7,8	6,7	11,5	7,4	7,7
2024	6,7	7,6	5,8	3,8	9,2	9,9	6,7	4,7	7,0	7,1	6,3

En el caso de cocaína, si bien no se observan cambios significativos respecto a 2022 a nivel total, se aprecian aumentos significativos en hombres, en el tramo de 19 a 25 años y en el NSE Alto. Respecto a las brechas, sólo se observan por nivel socioeconómico, con un reporte mayor entre entrevistados del NSE Bajo en comparación con los NSE Medio y Alto.

TABLA 55
Evolución de la prevalencia (%) de cocaína en el hogar,
según sexo, edad y nivel socioeconómico.
Chile, 2000–2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2000	1,6	1,8	1,5	1,8	2,7	1,6	1,4	1,0	1,7	1,3	1,8
2002	0,7	0,6	0,7	1,0	1,3	0,8	0,3	0,4	0,9	0,6	0,5
2004	0,9	0,9	0,9	1,0	1,6	1,0	0,9	0,4	1,2	0,8	0,6
2006	1,6	1,2	2,1	1,5	2,6	2,6	1,3	0,7	1,7	1,9	1,2
2008	1,4	1,4	1,4	1,5	2,0	1,1	1,2	1,3	2,5	1,0	0,4
2010	0,8	1,1	0,5	0,5	0,8	1,0	0,5	0,9	1,1	0,9	0,4
2012	1,2	0,9	1,5	1,0	1,1	1,3	1,2	1,3	1,4	1,6	0,7
2014	1,1	1,1	1,2	0,7	2,0	1,2	1,1	0,9	2,2	1,3	0,5
2016	1,5	1,1	1,9	0,8	2,7	1,9	1,6	1,1	2,3	1,3	1,3
2018	1,7	1,9	1,6	1,4	2,2	2,7	1,3	1,4	2,0	2,1	1,1
2020	0,9	0,8	1,0	0,6	1,3	0,6	0,6	1,2	1,7	0,6	0,7
2022	1,1	0,9	1,2	0,7	1,1	1,0	1,3	1,1	2,7	0,6	0,6
2024	1,3	1,5	1,1	0,8	2,4	1,7	0,8	1,2	1,8	1,1	1,4

De igual forma que para cocaína, si bien no se observan a nivel total variaciones del indicador de vivir con una persona que consume pasta base respecto a 2022, se reportan alzas significativas en hombres, en el tramo de 19 a 25 años y en los NSE Medio y Alto. En el análisis de brechas, no se observan diferencias de este indicador por sexo; por edad se aprecia que el reporte es menor en el tramo de 12 a 18 años respecto a los grupos de mayor edad. Por nivel socioeconómico, y al igual que en las últimas mediciones, las personas del NSE Bajo señalan más este fenómeno en comparación con los NSE Medio y Alto.

TABLA 56
Evolución de la prevalencia (%) de pasta base en el hogar,
según sexo, edad y nivel socioeconómico.
Chile, 2000–2024.

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
2000	2,0	2,1	1,9	2,0	2,5	1,9	2,1	1,7	2,7	1,6	1,3
2002	0,8	0,5	1,1	0,8	1,1	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,4
2004	1,2	1,2	1,2	1,5	1,6	0,9	1,2	0,9	2,0	0,9	0,3
2006	1,6	1,2	1,9	1,4	1,5	3,0	1,3	0,9	2,4	1,3	0,6
2008	1,3	1,4	1,2	1,3	2,7	1,2	0,7	0,9	2,3	0,8	0,6
2010	1,5	2,1	1,0	1,4	2,3	0,9	1,0	1,8	2,6	2,0	0,4
2012	1,5	1,2	1,7	1,3	1,4	1,7	1,7	1,4	2,4	1,8	0,7
2014	1,4	1,4	1,5	0,9	1,7	1,3	1,2	1,6	3,0	1,6	0,5
2016	1,4	1,2	1,6	0,6	1,5	1,3	1,7	1,6	3,0	1,1	0,9
2018	1,7	1,7	1,6	1,5	1,6	1,9	1,2	1,9	2,9	1,5	0,9
2020	1,0	1,0	1,1	0,7	0,8	0,9	0,6	1,5	1,8	0,9	0,5
2022	0,9	0,7	1,1	0,5	0,6	0,7	0,6	1,4	2,4	0,4	0,4
2024	1,1	1,2	1,1	0,4	1,7	1,2	1,0	1,1	1,9	0,9	1,0


Percepción de problemas en el barrio de residencia

A continuación, se presenta un conjunto de reportes asociados a la percepción de fenómenos que ocurren en los barrios de las personas que fueron entrevistadas. El propósito de esta caracterización es medir la ocurrencia de estos hechos y monitorear su tendencia en el tiempo.

En la actual medición y tal como en 2022, las conductas que tienen una mayor percepción en los barrios de residencia son “consumo de drogas en lugares públicos” (38,2%), seguido por “jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas” (33,2%) y “asaltos o robos en las calles” (32,7%).

Respecto al estudio anterior, se observa un descenso estadísticamente significativo en la percepción de las declaraciones asociadas a “robos en las casas” (de 28,2% en 2022 a 25,2% en 2024). El resto de las categorías se mantienen en niveles similares a los reportados en 2022.

GRÁFICO 10
Evolución de la percepción (%) de problemas en el barrio de residencia.
Chile, 2020–2024.



Un aspecto que se debe considerar al momento de reportar fenómenos de esta índole tiene relación con la dimensión socioeconómica: la totalidad de los indicadores presenta una marcada gradiente socioeconómica, es decir, se aprecian valores significativamente mayores en el NSE Bajo respecto a los NSE Medio y Alto, con excepción de “asaltos o robos en las calles” que la brecha entre NSE Bajo y Medio no es significativa en 2024. A la vez, se observan diferencias significativas entre los NSE Medio y Alto en este tipo de indicadores para todas las categorías de la tabla.

Para los tres niveles socioeconómicos, únicamente se reporta un aumento estadísticamente significativo en la “venta clandestina de alcohol” para NSE Medio respecto al estudio anterior, que pasa de 12,1% en 2022 a 14,7% en 2024; a la vez, se aprecia un descenso en el NSE Alto respecto a “robos en las casas” de 26,2% en 2022 a 22,1% en 2024. El resto de las categorías no muestra cambios respecto a la medición pasada.

En 2018, la percepción de ocurrencia de “tráfico de drogas” era cuatro veces mayor en el NSE Bajo (48,1%) respecto al NSE Alto (12,2%); en la medición de 2022 era dos veces mayor, lo que se mantiene en la presente versión del estudio, con un reporte de 43,3% en el NSE Bajo y 22,2% en el NSE Alto. La percepción de “balaceras y acciones violentas con armas de fuego” en 2018 era cinco veces mayor en el NSE Bajo respecto al NSE Alto; en el actual estudio es 31,0% frente a 16,6%, es decir, alrededor de dos veces mayor.

TABLA 57
Evolución de la percepción de problemas en el barrio de
residencia, según nivel socioeconómico. Chile, 2022–2024.
Proporción que declara mucho/bastante ocurrencia de los fenómenos de la lista (%)

Problemas en barrio de residencia							
Serie	Bajo	Medio	Alto	Serie	Bajo	Medio	Alto
Tráfico de drogas				Asaltos o robos en las calles			
2022	46,3	32,3	23,5	2022	39,1	34,4	31,6
2024	43,3	35,1	22,2	2024	38,7	34,6	28,9
Robos en las casas				Jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas			
2022	33,0	27,4	26,2	2022	48,4	36,9	24,4
2024	33,8	25,3	22,1	2024	44,0	37,0	26,1
Rayado en las paredes, daños al alumbrado				Balaceras y acciones violentas con armas de fuego			
2022	32,4	26,4	22,0	2022	35,3	24,1	15,8
2024	34,9	25,8	20,0	2024	31,0	23,6	16,6
Consumo de drogas en lugares públicos				Venta clandestina de alcohol			
2022	50,9	41,5	30,9	2022	21,9	12,1	9,5
2024	48,8	43,3	30,1	2024	22,3	14,7	11,1

OPINIÓN PÚBLICA

Evaluación de medidas para la regulación
y control de drogas

En el estudio se plantean preguntas que tienen por finalidad captar la opinión de los encuestados respecto a medidas de control vinculadas al fenómeno de las drogas distintas del alcohol.

Frente a las preguntas sobre políticas de drogas, se mantienen estables respecto al estudio anterior las opiniones sobre “suspender el juicio a quienes han delinquido por primera vez a cambio de ingresar a tratamiento” con un 52,5% y “dar la misma pena a quienes trafican con marihuana que los que trafican con cocaína o pasta base” (61,8%).

La medida de “penalizar el porte y consumo de marihuana aunque sea en pequeñas cantidades y para uso personal” muestra una variación estadísticamente significativa al alza, pasando de 55,2% en 2022 a 60,1% en 2024. El aumento en esta medición se explica

por aumentos en ambos sexos, en cuatro de los cinco tramos de edad (excepto en el tramo de 35 a 44 años) y en los NSE Bajo y Alto.

Asimismo, la medida que plantea que “la marihuana debería ser legal para mayores de 18 años” muestra un descenso estadísticamente significativo de 48,0% en 2022 a 43,1% en 2024, volviendo a los valores observados en 2014. Este descenso se reporta en mujeres, en tres de los cinco tramos de edad (excepto en los tramos de 12 a 18 años y de 35 a 44 años) y en los NSE Medio y Alto.

Respecto a las brechas por sexo, en 2024 la única medida que no muestra brechas por sexo es “suspender el juicio a quienes han delinquido por primera vez a cambio de ingresar a tratamiento”; en el resto de las medidas estas diferencias son significativas.

Por edad, el grado de aprobación de las medidas que plantean que “la marihuana debería ser legal para mayores de 18 años” y “penalizar el porte y consumo de marihuana aunque sea en pequeñas cantidades y para uso personal” es significativamente distinto en los tramos de 12 a 18 años y de 45 a 64 años respecto al resto. Por su parte, la menor aprobación de la medida de “suspender el juicio a quienes han delinquido por primera vez a cambio de ingresar a tratamiento” se observa en el tramo de 35 a 44 años respecto a los tramos de 12 a 18 años, de 19 a 25 años y de 45 a 64 años.

Por último, respecto a las brechas observadas por nivel socioeconómico, los NSE Bajo (54,3%) y Medio (55,5%) muestran grados de acuerdo significativamente mayores respecto al NSE Alto (49,3%) en la medida de “suspender el juicio a quienes han delinquido por primera vez a cambio de ingresar a tratamiento”. Por su parte, respecto a “penalizar el porte y consumo de marihuana aunque sea en pequeñas cantidades y para uso personal”, la aprobación de esta medida es mayor en el NSE Bajo (63,9%) respecto a los NSE Medio y Alto (59,7% y 59,1%, respectivamente). Por otro lado, no se aprecian brechas significativas por NSE respecto a las medidas de “dar la misma pena a quienes trafican con marihuana que los que trafican con cocaína o pasta base” y “la marihuana debería ser legal para mayores de 18 años”.

TABLA 58
Evolución de la aprobación de políticas de regulación y control de drogas, según sexo, edad y nivel socioeconómico. Chile, 2008–2022.
Proporción que declara estar muy de acuerdo/de acuerdo con las políticas del encabezado (%)

Serie	Total	Sexo		Tramos de edad					Nivel socioeconómico		
		Hombre	Mujer	12 a 18	19 a 25	26 a 34	35 a 44	45 a 64	Bajo	Medio	Alto
Suspender el juicio a quienes han delinquido por primera vez a cambio de ingresar a tratamiento											
2008	59,8	60.1	59.4	62.4	55.1	57.5	61.1	61.3	61.0	61.2	55.7
2010	64,6	65.0	64.2	65.1	64.8	62.4	64.9	65.1	63.6	65.8	63.8
2012	61,5	61.6	61.4	62.6	58.3	58.2	62.0	63.8	64.3	63.1	58.5
2014	64,0	64.0	64.0	65.1	65.7	63.0	62.8	64.0	62.6	64.7	64.2
2016	62,1	63.0	61.3	65.5	57.8	60.4	60.2	64.5	60.8	62.3	62.6
2018	56,1	56.3	55.9	56.7	57.4	50.4	52.8	59.8	56.8	55.4	56.6
2020	60,6	61.5	59.7	70.7	62.6	54.9	56.0	61.3	64.7	58.9	59.5
2022	53,8	53.7	53.8	62.9	56.1	51.7	48.0	54.4	56.7	55.4	50.6
2024	52,5	52.9	52.1	54.8	55.1	50.6	48.4	54.5	54.3	55.5	49.3
Dar la misma pena a quienes trafican con marihuana que los que trafican con cocaína o pasta base											
2008	71,1	69.5	72.7	70.0	68.4	69.4	71.8	73.7	69.9	73.4	69.1
2010	67,5	66.9	68.2	67.3	64.9	67.2	66.6	69.6	71.4	68.4	64.3
2012	63,6	62.2	64.9	65.3	59.0	64.7	63.4	64.5	63.3	65.8	61.7
2014	51,6	52.3	50.9	53.7	46.5	46.7	54.5	53.5	55.5	51.5	49.6
2016	57,0	55.8	58.1	57.1	48.2	56.8	60.6	59.0	61.4	60.2	52.1
2018	54,7	52.7	56.8	56.1	48.6	50.3	56.1	58.3	60.3	56.1	49.4
2020	55,0	54.7	55.3	57.3	45.8	49.6	59.0	58.7	58.6	55.4	51.3
2022	60,4	59.6	61.2	63.5	51.6	56.4	63.2	64.6	62.3	64.3	55.6
2024	61,8	60.1	63.5	61.6	56.8	59.6	62.9	64.8	64.7	61.4	61.1
Penalizar el porte y consumo de marihuana aunque sea en pequeñas cantidades y para uso personal											
2008	74,6	71.2	78.0	74.4	64.3	71.1	79.7	79.2	75.2	77.7	68.7
2010	72,6	71.1	74.1	71.2	62.3	68.6	74.9	78.9	74.5	74.5	69.4
2012	65,0	61.0	68.9	64.8	53.9	61.1	67.6	71.0	67.5	67.4	61.5
2014	51,6	51.0	52.2	52.7	44.1	47.2	53.3	55.3	55.3	53.8	47.7
2016	50,3	48.1	52.6	53.5	39.2	46.7	51.6	54.9	53.8	54.6	45.1
2018	53,8	50.4	57.2	56.4	38.8	45.4	56.7	61.7	57.5	57.3	47.4
2020	46,0	44.7	47.2	51.3	31.5	39.3	46.5	53.2	50.7	44.7	43.6
2022	55,2	54.1	56.3	58.0	44.8	48.5	57.5	62.2	57.7	58.1	51.0
2020	46,0	44.7	47.2	51.3	31.5	39.3	46.5	53.2	50.7	44.7	43.6
2024	60,1	57.2	63.0	67.1	52.5	54.5	57.7	66.2	63.9	59.7	59.1
La marihuana debería ser legal para mayores de 18 años											
2008	26,5	30.3	22.7	26.5	34.4	29.3	23.2	22.5	26.9	26.0	26.6
2010	25,6	28.4	22.8	23.6	36.0	30.4	24.4	20.1	27.2	23.7	26.8
2012	34,6	40.0	29.5	33.5	44.0	37.8	30.4	31.4	35.4	36.6	32.5
2014	45,7	48.6	42.9	45.0	56.7	51.3	41.6	41.1	48.8	44.9	44.8
2016	50,6	53.5	47.6	45.2	62.1	57.5	48.0	45.8	49.5	51.4	50.4
2018	47,0	51.3	42.8	42.5	59.9	50.6	46.5	41.8	47.9	46.9	46.4
2020	47,9	51.2	44.6	42.5	62.9	57.6	46.9	39.2	48.8	48.2	46.7
2022	48,0	51.0	45.1	42.4	58.8	56.4	46.1	40.4	46.8	47.2	49.4
2024	43,1	49.5	36.8	38.4	50.2	50.1	44.3	36.4	44.0	42.6	43.2

ESCENARIO EN REGIONES

La situación del consumo de drogas a nivel regional muestra ciertos cambios respecto al estudio anterior, lo que hace que se observen variaciones particulares asociadas a cada región. De igual manera que a nivel nacional, el análisis de significancia estadística se efectuó a un 95% de confianza, ajustado por el diseño muestral.

En el caso de tabaco, a nivel nacional se observa estabilidad respecto a la medición pasada, sin embargo, a nivel regional se aprecia un descenso significativo en la prevalencia de uso diario en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Aysén. Por otro lado, se observa un aumento en la Región de Magallanes.

Respecto a la prevalencia de uso en el último mes de alcohol, se observa un descenso a nivel nacional y se registran bajas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, Biobío, Los Lagos y Aysén. Sin embargo, en las regiones de Magallanes y O'Higgins se observa un aumento significativo.

En el caso de la prevalencia de uso de marihuana en el último año, se aprecian descensos significativos en las regiones de Ñuble, Los Ríos y Aysén. Por otra parte, se observan aumentos en las regiones de Magallanes y Antofagasta.

El consumo de cocaína total se presenta agregando los consumos de clorhidrato de cocaína y pasta base. A nivel nacional, se observa una estabilización en 1,0% en 2024, y a nivel regional se aprecian descensos en las regiones de Valparaíso y Aysén. En la Región de Atacama no se registraron casos de cocaína total en la medición actual.

Respecto al consumo de otras drogas, a nivel nacional se aprecia una estabilización en la prevalencia de último año de tranquilizantes y un descenso en analgésicos sin receta médica. En el caso de tranquilizantes sin receta médica, a nivel regional se registra un aumento significativo en las regiones de Antofagasta y Magallanes. Por su parte, para analgésicos sin receta médica se observa un descenso estadísticamente significativo en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío, y un aumento en la Región de Magallanes.

GRÁFICO 11
Evolución de la prevalencia (%) de consumo diario de tabaco, según regiones. Chile, 2022-2024.




GRÁFICO 12

Evolución de la prevalencia (%) de consumo de alcohol en el último mes, según regiones. Chile, 2022-2024.




GRÁFICO 13

Evolución de la prevalencia (%) de consumo de marihuana en el último año, según regiones. Chile, 2022-2024.




GRÁFICO 14

Evolución de la prevalencia (%) de consumo de cocaína total (cocaína y/o pasta base) en el último año, según regiones. Chile, 2022-2024.




GRÁFICO 15

Evolución de la prevalencia (%) de tranquilizantes sin receta médica en el último año, según regiones. Chile, 2022-2024.





GRÁFICO 16

Evolución de la prevalencia (%) de analgésicos sin receta médica en el último año, según regiones. Chile, 2022-2024.





ANEXO

Cuestionario Aplicado

CUESTIONARIO

DÉCIMO SEXTO ESTUDIO NACIONAL DE DROGAS EN POBLACIÓN GENERAL DE CHILE

Año 2024

MÓDULO SALUD Y TABACO

ST_1) Hablando de su salud, ¿cómo calificaría Ud. su estado de salud, en general, durante los últimos 12 meses?
(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Muy malo
- 2 ☐ Malo
- 3 ☐ Regular
- 4 ☐ Bueno
- 5 ☐ Muy bueno
- 6 ☐ Excelente
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

ST_2) ¿Ha fumado Ud. cigarrillos alguna vez en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. CE_1-MÓDULO CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

ST_3) ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. fumó cigarrillos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

ST_4) ¿Qué edad tenía cuando fumó cigarrillos por primera vez?

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

En años cumplidos

RANGO: 5 A EDAD_KISH

ST_5) ¿Cuándo fue la última vez que fumó cigarrillos? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 3, 88 o 99 PASE A PREG. CE_1-MÓDULO CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

ST_6) Piense solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días ha fumado cigarrillos?

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

Nº de días (de 1 a 30)

ST_7) ¿Más o menos cuántos cigarrillos diarios ha fumado Ud. en estos últimos 30 días? Si fuma irregularmente, considere un día típico.

(Encuestador: Anote 888 No sabe, 999 No contesta)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

RANGO: 0 A 999

Nº de cigarrillos al día

MÓDULO CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

CE_1) ¿Ud. conoce o ha escuchado hablar de los cigarrillos electrónicos? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: "e-cigarettes", vaporizadores o aparatos electrónicos que liberan vapor en vez de humo)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. OH_1-MÓDULO ALCOHOL

CE_2) ¿Ha usado Ud. cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. OH_1-MÓDULO ALCOHOL

CE_3) ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. usó cigarrillos electrónicos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

CE_4) ¿Cuándo fue la última vez que usó cigarrillos electrónicos? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año

Alternativas 2 o 3 PASE A CE_6

- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 88 o 99 PASE A PREG. OH_1-MÓDULO ALCOHOL

CE_5) Piense solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días ha usado cigarrillos electrónicos?

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

Nº de días (de 1 a 30)

CE_6) Respecto a la última vez que Ud. usó cigarrillos electrónicos, ¿sabía Ud. si el dispositivo contenía nicotina?
(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 99 ☐ No contesta

CE_7) ¿Tiene Ud. actualmente algún dispositivo de cigarrillo electrónico? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

CE_8) ¿Usted ha intentado consumir otras drogas o sustancias incorporándolas en el dispositivo de cigarrillo electrónico? (Respuesta espontánea)

- 1 Sí, especifique:
- 2 No
- 88 No sabe
- 99 No contesta

MÓDULO ALCOHOL

OH_1) ¿Ha tomado Ud. alcohol alguna vez en su vida? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: cerveza/malta, chicha, vino/champaña, o licores fuertes)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. MAR_1-MÓDULO MARIHUANA

OH_2) ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. consumió alcohol en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

OH_3) ¿Qué edad tenía cuando consumió por primera vez alcohol? (No considere cuando le dieron a probar de niño)

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

En años cumplidos

RANGO: 5 A EDAD_KISH

OH_4) ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió alcohol? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año

Alternativa 2 PASE A PREG. OH_8

- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 3, 88 o 99 PASE A PREG. MAR_1-MÓDULO MARIHUANA

OH_5) Pensando solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días del mes ha tomado algún tipo de alcohol?

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

Nº de días (de 1 a 30)

OH_6) Durante los últimos 30 días, ¿qué tipo de bebida alcohólica tomó con más frecuencia?

(Respuesta espontánea, única)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Cerveza
- 2 ☐ Vino, champaña u otros espumantes
- 3 ☐ Licores, destilados o combinados (Encuestador: pisco, ron, whisky, vodka, aguardiente u otro)
- 4 ☐ Otro
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

OH_7) Pensando en los últimos 30 días:

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

SI {SEXO_ENCUESTADO} = 1. Hombre: **¿Cuántas veces tomó 5 o más tragos en una sola ocasión?**

Entendiendo que 5 tragos son:

- 5 latas de cerveza (Encuestador: 1.600 ml de cerveza aprox.)
- 5 copas de vino (Encuestador: 700 ml de vino aprox.)
- 5 combinados suaves o 3 combinados fuertes (Encuestador: 200 ml de ron, pisco, vodka u otro licor aprox.)

SI {SEXO_ENCUESTADO} = 2. Mujer: **¿Cuántas veces tomó 4 o más tragos en una sola ocasión?**

Entendiendo que 4 tragos son:

- 4 latas de cerveza (Encuestador: 1.300 ml de cerveza aprox.)
- 4 copas de vino (Encuestador: 550 ml de vino aprox.)
- 4 combinados suaves o un poco menos de 3 combinados fuertes (Encuestador: 160 ml de ron, pisco, vodka u otro licor aprox.)

(Encuestador: Por "ocasión" nos referimos a un mismo momento, por ejemplo, en un período de dos horas)

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

RANGO: 0 A 99

Nº de veces: **OH_8) ¿Qué tan seguido toma usted alguna bebida alcohólica? (Respuesta espontánea)**

Nunca	1 vez al mes o menos	2 a 4 veces al mes	2 a 3 veces a la semana	4 o más veces a la semana
0	1	2	3	4

OH_9) ¿Cuántos tragos suele tomar usted en un día típico de consumo de alcohol? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Leer)

POR UN TRAGO SE ENTENDERÁ

Una botella o lata individual de cerveza (Encuestador: 333 cc)

Un vaso de vino (Encuestador: 140 cc)

Un trago de licor solo o combinado (Encuestador: 40 cc, pisco, ron vodka, whisky)

POR 6 TRAGOS SE ENTENDERÁ

Una botella de vino (Encuestador: 750 cc)

POR 18 TRAGOS SE ENTENDERÁ

Una botella de licor (Encuestador: 750 cc)

0 a 2 tragos	3 a 4 tragos	5 a 6 tragos	7 a 9 tragos	10 o más tragos
0	1	2	3	4

OH_10) ¿Qué tan seguido toma usted 6 o más tragos en una sola ocasión? (TARJETA 1)

Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	Todos o casi todos los días
0	1	2	3	4

OH_11) Y con la misma escala, ¿qué tan seguido, en el curso de los últimos 12 meses, usted no pudo parar de beber una vez que había empezado? (TARJETA 1)

Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	Todos o casi todos los días
0	1	2	3	4

OH_12) ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos 12 meses, su consumo de alcohol alteró el desempeño de sus actividades normales? (TARJETA 1)

Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	Todos o casi todos los días
0	1	2	3	4

OH_13) ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos 12 meses, usted necesitó beber en la mañana para recuperarse de haber bebido mucho el día anterior? (TARJETA 1)

Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	Todos o casi todos los días
0	1	2	3	4

OH_14) ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos 12 meses, usted tuvo remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido? (TARJETA 1)

Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	Todos o casi todos los días
0	1	2	3	4

OH_15) ¿Qué tan seguido, en el curso de los últimos 12 meses, usted no fue capaz de recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo? (TARJETA 1)

Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	Todos o casi todos los días
0	1	2	3	4

OH_16) ¿Usted o alguna otra persona ha resultado físicamente herido debido a que usted había bebido alcohol?

(Respuesta espontánea)

(Encuestador: Si responde sí, sondear)

No	Sí, pero no en el último año	Sí, en el último año
0	2	4

OH_17) ¿Algún familiar, amigo, médico u otro profesional de la salud ha mostrado preocupación por la forma en que usted consume bebidas alcohólicas o le ha sugerido que deje de beber? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Si responde sí, sondear)

No	Sí, pero no en el último año	Sí, en el último año
0	2	4

OH_18) Pensando en los últimos 30 días, ¿ha comprado alcohol en alguno de los siguientes lugares?

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

1. Bares, pubs o discotecas	
2. Restaurantes	
3. Botillerías/licorerías	
4. Supermercados	
5. Servicentros	
6. Otro lugar	
7. Ninguno de los anteriores	

OH_19) Durante los últimos 30 días, ¿ha comprado alcohol en alguno de los siguientes lugares?

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple)

1. Ferias libres o mercados	
2. Fiestas particulares	
3. Locales "clandestinos"	
4. Delivery (Encuestador: reparto o entrega)	
5. Productores artesanales	
6. Otro lugar	
7. Ninguno de los anteriores	

OH_I. PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

OH_20) ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde estudia a causa del alcohol?

(Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como descuidar a los niños, faltar al trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en el estudio, o perder el empleo)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

OH_21) ¿Le ha sucedido que a causa del alcohol se haya expuesto a algún peligro contra su integridad física? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como, por ejemplo, ha estado a punto de chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

OH_22) ¿Ha hecho algo bajo los efectos del alcohol que pudiera causarle problemas con la autoridad pública o con la ley?

(Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como conducir vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

OH_23) ¿Ha tenido algún problema o han aumentado los problemas con su familia o amigos a causa de su consumo de alcohol? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Por ejemplo, discusiones serias o violencia)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

OH_24) ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a alguien bajo los efectos del alcohol?

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MÓDULO MARIHUANA

MAR_1) ¿Ha probado Ud. marihuana alguna vez en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. PB_1-MÓDULO PASTA BASE

MAR_2) ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. consumió marihuana en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_3) ¿Qué edad tenía cuando probó marihuana por primera vez?

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

En años cumplidos

RANGO: 5 A EDAD_KISH

MAR_4) ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió marihuana? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año

Alternativa 2 PASE A PREG. MAR_7

- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 3, 88 o 99 PASE A PREG. PB_1-MÓDULO PASTA BASE

MAR_5) Pensando solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días del mes ha consumido marihuana?

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

Nº de días (de 1 a 30)

MAR_6) ¿Cuántos cigarros de marihuana consume Ud. al mes? Considere su consumo habitual

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Anote 888 No sabe, 999 No contesta)

RANGO: 0 A 999

Nº de cigarros

MAR_7) ¿Qué tipo de marihuana consumió con mayor frecuencia? (Respuesta única)

(Tarjeta 2)

- 1 ☐ Marihuana prensada o "paraguaya"
- 2 ☐ Marihuana verde o yerba
- 3 ☐ Marihuana verde o yerba de "autocultivo"
- 4 ☐ Marihuana *skunk* o de alta potencia (marihuana "cripy o creepy")
- 5 ☐ Marihuana *skunk* o de alta potencia de "autocultivo"
- 88 ☐ No sabe (No leer)
- 99 ☐ No contesta (No leer)

MAR_I. PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**MAR_8) Respecto a problemas como:**

- Ansiedad, irritabilidad (Encuestador: inquietud)
- Estrés o depresión
- Náuseas (Encuestador: vómitos)
- Problemas de concentración, fatiga o insomnio (Encuestador: somnolencia/debilidad)
- Percepción de cosas inexistentes (Encuestador: sentir, ver u oír)
- Taquicardia o temblores

¿Ha consumido marihuana para eliminar problemas como estos o para evitar que se presentaran?

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_9) ¿Ha presentado estos problemas cuando suspendía o disminuía el consumo de marihuana? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_10) ¿Ha sentido un deseo tan grande de consumir marihuana que no pudo resistir o pensar en nada más? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_11) ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con marihuana ha consumido mayor cantidad que antes?
(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_12) ¿Ha notado que la misma cantidad de marihuana tiene menos efecto en Ud. que antes? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_13) ¿Ha intentado controlar, disminuir o dejar su consumo de marihuana, pero no ha podido lograrlo?
(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_14) ¿Ha terminado consumiendo marihuana en mayores cantidades o por mayor tiempo del que tenía pensado hacerlo? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_15) ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de marihuana? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_16) ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir marihuana, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_17) ¿Ha continuado consumiendo marihuana a pesar de que le ocasione problemas de salud física, emocionales o nerviosos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_12. PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CONTINÚE PENSANDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

MAR_18) ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde estudia a causa de la marihuana? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como descuidar a los niños, faltar al trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en el estudio, o perder el empleo)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_19) ¿Le ha sucedido que a causa de la marihuana se haya expuesto a algún peligro contra su integridad física? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como, por ejemplo, ha estado a punto de chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_20) ¿Ha hecho algo bajo los efectos de la marihuana que pudiera causarle problemas con la autoridad pública o con la ley? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como conducir vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_21) ¿Ha tenido algún problema o han aumentado los problemas con su familia o amigos a causa de su consumo de marihuana? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Por ejemplo, discusiones serias o violencia)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_21 A) ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a alguien bajo los efectos de la marihuana? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_21 B) ¿Algún familiar o persona cercana a usted ha resultado dañada física o psicológicamente debido a su consumo de marihuana? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MAR_22) Piense en los últimos 12 meses, ¿ha consumido marihuana por una vía distinta a la fumada? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativa 2, 88 o 99 PASE A PREG. PB_1-MÓDULO PASTA BASE

MAR_23) Piense en los últimos 12 meses, ¿ha consumido marihuana por alguna de las siguientes vías (cigarrillos, pitos, pipas o bongs)? (TARJETA 3) (Respuesta múltiple)

- 1 ☐ Fumada en cigarrillos, pitos, pipas o bongs
- 2 ☐ Vaporizada en dispositivos electrónicos
- 3 ☐ En pomadas en base de aceite de cáñamo o en base a semillas de cannabis (uso tópico)
- 4 ☐ En pomadas de aceite en base a planta de cannabis (uso tópico)
- 5 ☐ Uso oral o sublingual de aceite de cáñamo o de semillas de cannabis
- 6 ☐ Uso oral o sublingual de aceite en base a planta de cannabis
- 7 ☐ Comestible elaborado a partir de semillas de cannabis (queques, galletas, brownies u otros)
- 8 ☐ Comestible elaborado a partir de plantas de cannabis (queques, galletas, brownies u otros)
- 9 ☐ Ingerida en infusiones en agua, té, leche o derivados lácteos
- 10 ☐ Otro, especifique
- 88 ☐ No sabe (No leer)
- 99 ☐ No contesta (No leer)

MÓDULO PASTA BASE

PB_1) ¿Ha probado Ud. pasta base alguna vez en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. COC_1-MÓDULO COCAÍNA

PB_2) ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. consumió pasta base en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_3) ¿Qué edad tenía cuando probó pasta base por primera vez?

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

En años cumplidos

RANGO: 5 A EDAD_KISH

PB_4) ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió pasta base? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año

Alternativa 2 PASE A PREG. PB_6

- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 3, 88 o 99 PASE A PREG. COC_1-MÓDULO COCAÍNA

PB_5) Pensando solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días del mes ha consumido pasta base?

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

Nº de días (de 1 a 30)

PB_I. PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**PB_6) Respecto a problemas como:**

- Ansiedad, irritabilidad (Encuestador: inquietud)
- Estrés o depresión
- Náuseas (Encuestador: vómitos)
- Problemas de concentración, fatiga o insomnio (Encuestador: somnolencia/debilidad)
- Percepción de cosas inexistentes (Encuestador: sentir, ver u oír)
- Taquicardia o temblores

¿Ha consumido pasta base para eliminar problemas como estos o para evitar que se presentaran?

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_7) ¿Ha presentado estos problemas cuando suspendía o disminuía el consumo de pasta base? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_8) ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar pasta base que no pudo resistir o pensar en nada más? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_9) ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con pasta base ha consumido mayor cantidad que antes?

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_10) ¿Ha notado que la misma cantidad de pasta base tiene menos efecto en Ud. que antes? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_11) ¿Ha intentado controlar, disminuir o dejar su consumo de pasta base, pero no ha podido lograrlo?
(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_12) ¿Ha terminado consumiendo pasta base en mayores cantidades o por mayor tiempo del que tenía pensado hacerlo? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_13) ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de pasta base? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_14) ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir pasta base, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_15) ¿Ha continuado consumiendo pasta base a pesar de que le ocasione problemas de salud física, emocionales o nerviosos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_12. PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, CONTINÚE PENSANDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

PB_16) ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde estudia a causa de la pasta base?
(Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como descuidar a los niños, faltar al trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en el estudio, o perder el empleo)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_17) ¿Le ha sucedido que a causa de la pasta base se haya expuesto a algún peligro contra su integridad física?
(Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como, por ejemplo, ha estado a punto de chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_18) ¿Ha hecho algo bajo los efectos de la pasta base que pudiera causarle problemas con la autoridad pública o con la ley? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como conducir vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_19) ¿Ha tenido algún problema o han aumentado los problemas con su familia o amigos a causa de su consumo de pasta base? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Por ejemplo, discusiones serias o violencia)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_20) ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a alguien bajo los efectos de la pasta base?

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PB_21) ¿Algún familiar o persona cercana a usted ha resultado dañada física o psicológicamente debido a su consumo de pasta base? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MÓDULO COCAÍNA

COC_1) ¿Ha probado Ud. cocaína alguna vez en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. TUS_1-MÓDULO TUSI

COC_2) ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. consumió cocaína en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_3) ¿Qué edad tenía cuando probó cocaína por primera vez?

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

En años cumplidos

RANGO: 5 A EDAD_KISH

COC_4) ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió cocaína? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año

Alternativa 2 PASE A PREG. COC_6

- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 3, 88 o 99 PASE A PREG. TRANS_1-MÓDULO TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA

COC_5) Pensando solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días del mes ha consumido cocaína?

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

Nº de días (de 1 a 30)

COC_I. PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**COC_6) Respecto a problemas como:**

- Ansiedad, irritabilidad (Encuestador: inquietud)
- Estrés o depresión
- Náuseas (Encuestador: vómitos)
- Problemas de concentración, fatiga o insomnio (Encuestador: somnolencia/debilidad)
- Percepción de cosas inexistentes (Encuestador: sentir, ver u oír)
- Taquicardia o temblores

¿Ha consumido cocaína para eliminar problemas como estos o para evitar que se presentaran?

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_7) ¿Ha presentado estos problemas cuando suspendía o disminuía el consumo de cocaína?

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_8) ¿Ha sentido un deseo tan grande de consumir cocaína que no pudo resistir o pensar en nada más? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_9) ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con cocaína ha consumido mayor cantidad que antes? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_10) ¿Ha notado que la misma cantidad de cocaína tiene menos efecto en Ud. que antes? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_11) ¿Ha intentado controlar, disminuir o dejar su consumo de cocaína, pero no ha podido lograrlo?

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_12) ¿Ha terminado consumiendo cocaína en mayores cantidades o por mayor tiempo del que tenía pensado hacerlo?

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_13) ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de cocaína?

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_14) ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir cocaína, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_15) ¿Ha continuado consumiendo cocaína a pesar de que le ocasione problemas de salud física, emocionales o nerviosos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_12. PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, CONTINÚE PENSANDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**COC_16) ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde estudia a causa de la cocaína?** (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como descuidar a los niños, faltar al trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en el estudio, o perder el empleo)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_17) ¿Le ha sucedido que a causa de la cocaína se haya expuesto a algún peligro contra su integridad física? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como, por ejemplo, ha estado a punto de chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_18) ¿Ha hecho algo bajo los efectos de la cocaína que pudiera causarle problemas con la autoridad pública o con la ley? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Como conducir vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_19) ¿Ha tenido algún problema o han aumentado los problemas con su familia o amigos a causa de su consumo de cocaína? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: Por ejemplo, discusiones serias o violencia)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_20) ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a alguien bajo los efectos de la cocaína?

(Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

COC_21) ¿Algún familiar o persona cercana a usted ha resultado dañada física o psicológicamente debido a su consumo de cocaína? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MÓDULO TUSI (COCAÍNA ROSADA)

TUS_1) ¿Ha probado Ud. Tusi o cocaína rosada alguna vez en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. TRANS_1 - MÓDULO TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA

TUS_2) ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. consumió Tusi en su vida? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

TUS_3) ¿Qué edad tenía cuando probó Tusi por primera vez?

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

En años cumplidos

RANGO: 5 A EDAD_KISH

TUS_4) ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió Tusi? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

- 1 ☐ Durante los últimos 30 días
- 2 ☐ Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 ☐ Hace más de un año
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 3, 88 o 99 PASE A PREG. TRANS_1-MÓDULO TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA

TUS_5) Pensando en la última vez que Ud. consumió Tusi. ¿cuál era su forma de presentación?

- 1 ☐ Pastillas/Tabletas/Comprimidos
- 2 ☐ Cápsulas (polvo o cristales con cubierta blanda o dura)
- 3 ☐ Polvo
- 4 ☐ Cristales
- 5 ☐ Estampillas
- 6 ☐ Cartón
- 7 ☐ Frasco (líquido)
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

TUS_6) ¿Cuál es la principal vía de administración que Ud. emplea para consumir Tusi?

- 1 ☐ Por vía oral (cápsulas, pastillas, estampillas, cartón)
- 2 ☐ Esnifada
- 3 ☐ Disuelta en una bebida (alcohólica o no alcohólica)
- 4 ☐ Por vía mucosa (ojos, encías, etc.)
- 5 ☐ Otra, especifique:
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

TUS_7) Pensando solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días del mes ha consumido Tusi?

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año nuevo

(Encuestador: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)

Nº de días (de 1 a 30)

MÓDULO TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA

TRANS_1)

¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes tranquilizantes sin receta médica alguna vez en su vida?

(Respuesta múltiple) (TARJETA 4)

1a

☐

Alprazolam (Zotrán, Ativán o Adax)

2b

☐

Diazepam (Valium)

3c

☐

Clonazepam (Ravotril, Valpax, trencito)

4d

☐

Lorazepam o (Amparax)

5e

☐

Clordiazepóxido

6f

☐

Bromazepam

7g

☐

Zopiclona, (Zolpidem, o Somno)

8h

☐

Midazolam (Dormonid)

9i

☐

Flunitrazepam (Rohypnol, lpnopen)

10j

☐

Ninguna de las anteriores

TRANS_1: Alternativa j PASE A PREG. ANALG_1-MÓDULO ANALGÉSICOS SIN RECETA MÉDICA

TRANS_2)

¿Cuándo fue la última vez que consumió sin receta médica...? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LOS MEDICAMENTOS TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1a. Alprazolam (Zotrán, Ativán o Adax)					
2b. Diazepam (Valium)					
3c. Clonazepam (Ravotril, Valpax, Trencito)					
4d. Lorazepam (Amparax)					
5e. Clordiazepóxido					
6f. Bromazepam					
7g. Zopiclona (Zolpidem, Somno)					
8h. Midazolam (Dormonid)					
9i. Flunitrazepam (Rohypnol, lpnopen)					

TRANS_2: Si declara 1 o 2 en al menos una droga, PASE A TRANS_3

Si declara 3, 88 o 99 en TODAS las drogas, PASE A ANALG_1

TRANS_3. Piense en la última vez que Ud. consumió tranquilizantes sin receta médica, ¿cómo lo consiguió? (Respuesta espontánea, única)

- 1 ☐ Lo compré en una farmacia con una receta médica de otra persona
- 2 ☐ Lo compré en una feria libre o mercado
- 3 ☐ Lo compré por internet
- 4 ☐ Me lo pasó mi conviviente/pareja, un familiar y/o amigo/a
- 5 ☐ Me lo pasaron en el consultorio
- 6 ☐ Estaba en mi casa y lo tomé
- 7 ☐ Lo conseguí de otra forma
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

TRANS_4) Piense en la última vez que Ud. consumió tranquilizantes sin receta médica, ¿por qué consumió estos fármacos? (Respuesta espontánea, única)

(Encuestador: nombre razón principal)

- 1 ☐ Para inducir el sueño, problemas de insomnio
- 2 ☐ Para relajarme, bajar la ansiedad
- 3 ☐ Porque me he sentido triste o deprimido/a
- 4 ☐ Para hacer frente a estados de tensión y/o estrés
- 5 ☐ Para enfrentar momentos difíciles o situaciones de tensión
- 6 ☐ Para disminuir efectos secundarios de otro medicamento (me lo tomé para contrarrestar sus efectos)
- 7 ☐ Para probar o experimentar
- 8 ☐ Otra razón
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MÓDULO ANALGÉSICOS SIN RECETA MÉDICA

ANALG_1) ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes analgésicos sin receta médica alguna vez en su vida?

(Encuestador: Leer alternativas) (Respuesta múltiple) (TARJETA 5)

1a

☐

Tramadol (Tramal)

2b

☐

Codeína (Codetol, Tosilab, Flemex, Tusigen, Sedopec)

3c

☐

Morfina

4d

☐

Metadona

5e

☐

Petidina

6f

☐

Fentanilo

7g

☐

Oxycodona (OxyContin)

8h

☐

Hidrocodona (Vicodin)

9i

☐

Ninguna de las anteriores

ANALG_1: Alternativa i PASE A PREG. OD_1-MÓDULO OTRAS DROGAS

ANALG_2) ¿Cuándo fue la última vez que consumió sin receta médica...? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LOS MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS SIN RECETA MÉDICA QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1a. Tramadol (Tramal)					
2b. Codeína (Codetol, Tosilab, Flemex, Tusigen, Sedopec)					
3c. Morfina					
4d. Metadona					
5e. Petidina					
6f. Fentanilo					
7g. Oxycodona (OxyContin)					
8h. Hidrocodona (Vicodin)					

ANALG_2: Si declara 1 o 2 en al menos una droga, PASE A ANALG_3.

Si declara 3, 88 o 99 en TODAS las drogas, PASE A OD_1

ANALG_3) Piense en la última vez que Ud. consumió analgésicos sin receta médica, ¿cómo lo consiguió? (Respuesta espontánea, única)

- 1 ☐ Lo compré en una farmacia con una receta médica de otra persona
- 2 ☐ Lo compré en una feria libre o mercado
- 3 ☐ Lo compré por internet
- 4 ☐ Me lo pasó mi conviviente/pareja, un familiar y/o amigo/a
- 5 ☐ Me lo pasaron en el consultorio
- 6 ☐ Estaba en mi casa y lo tomé
- 7 ☐ Lo conseguí de otra forma
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

ANALG_4) Piense en la última vez que Ud. consumió analgésicos sin receta médica, ¿por qué consumió estos fármacos?

(Respuesta espontánea, única) (Encuestador: nombre razón principal)

- 1 ☐ Para inducir el sueño, problemas de insomnio, relajarme o bajar la ansiedad
- 2 ☐ Porque me he sentido triste o deprimido/a
- 3 ☐ Para manejo de dolor agudo por una lesión muscular, articular y/o dental
- 4 ☐ Para manejo de dolor persistente por enfermedad crónica (por ejemplo, cáncer, artritis, etc.)
- 5 ☐ Para enfrentar momentos difíciles o situaciones de tensión y/o estrés
- 6 ☐ Para disminuir efectos secundarios de otro medicamento (me lo tomé para contrarrestar sus efectos)
- 7 ☐ Para probar o experimentar
- 8 ☐ Otra razón
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MÓDULO OTRAS DROGAS

OD_1

¿Ha probado Ud. alguna de las siguientes drogas alguna vez en su vida?

(Respuesta múltiple) (TARJETA 6)

1a

☐

Hachís (resina de cannabis)

2b

☐

Marihuana sintética o cannabinoides sintéticos (Spice, K2)

3c

☐

Éxtasis o MDMA

4d

☐

Mefedrona, Metilona o Sales de baño (catinonas sintéticas, MDPV o alfa-ppp)

5e

☐

Heroína

6f

☐

DMT o Foxy (triptaminas o acetilpsilocina)

7g

☐

Crack

8h

☐

Kratom o mitraginina

9i

☐

Escopolamina o burundanga

10j

☐

Ninguna de las anteriores

Alternativa j PASE A PREG. OD_3

OD_2

¿Cuándo fue la última vez que consumió...? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LAS DROGAS QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1a. Hachís (resina de cannabis)					
2b. Marihuana sintética o cannabinoides sintéticos (Spice, K2)					
3c. Éxtasis o MDMA					
4d. Mefedrona, Metilona o Sales de baño (catinonas sintéticas, MDPV o alfa-ppp)					
5e. Heroína					
6f. DMT o Foxy (Encuestador: triptaminas o acetilpsilocina)					
7g. Crack					
8h. Kratom o mitraginina					
9i. Escopolamina o burundanga					

OD_3) ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes medicamentos estimulantes sin receta médica alguna vez en su vida?

(Respuesta múltiple) (TARJETA 7)

- 1a ☐ Anfetaminas
- 2b ☐ Cidrín
- 3c ☐ Modafinilo (Mentix)
- 4d ☐ Metilfenidato (Ritalin, Aradix, Concerta o Ritrocel)
- 5e ☐ Escancil
- 6f ☐ Pemolina (Cylert)
- 7g ☐ Anfeparamona (Fenproporex, Salcal)
- 8h ☐ Ninguna de las anteriores

Alternativa h PASE A PREG. OD_5

OD_4) ¿Cuándo fue la última vez que consumió sin receta médica...? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LOS MEDICAMENTOS ESTIMULANTES QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1a. Anfetaminas					
2b. Cidrín					
3c. Modafinilo (Mentix)					
4d. Metilfenidato (Ritalin, Aradix (Concerta, Ritrocel)					
5e. Escancil					
6f. Pemolina (Cylert)					
7g. Anfeparamona (Fenproporex, Salcal)					

OD_5) ¿Ha probado Ud. alguna de las siguientes metanfetaminas alguna vez en su vida?

(Respuesta múltiple) (TARJETA 8)

- 1a ☐ Meth, Crystal o Speed (Hielo, Ice o Glass)
- 2b ☐ Cristina, Anteta o Crack Mexicano (Polvo amarillo, Batú, Cris, Tina, Ya-Ba)
- 3c ☐ Ninguna de las anteriores

Alternativa c PASE A PREG. OD_7

OD_6) ¿Cuándo fue la última vez que consumió...? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LAS METANFETAMINAS QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1a. Meth, Crystal o Speed (Hielo, Ice o Glass)					
2b. Cristina, Anteta o Crack Mexicano (Polvo amarillo, Batú, Cris, Tina, Ya-Ba)					

OD_7) ¿Ha probado Ud. alguna de las siguientes sustancias inhalables alguna vez en su vida?

(Respuesta múltiple) (Tarjeta 9)

- 1a ☐ Neoprén
- 2b ☐ Bencina o parafina
- 3c ☐ Tolueno
- 4d ☐ Desodorantes ambientales o corporales
- 5e ☐ Pinturas en spray
- 6f ☐ Acetona
- 7g ☐ Éter u otros solventes volátiles (como los usados en pinturas)
- 8h ☐ Poppers (nitritos de alquilo)
- 9i ☐ Solventes para extintores de incendios
- 10j ☐ Cloruro de etilo
- 11k ☐ Óxido nitroso (gas de la risa o hippy crack)
- 12l ☐ Ninguna de las anteriores

Alternativa 11 PASE A PREG. OD_9

OD_8) ¿Cuándo fue la última vez que consumió...? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LAS SUSTANCIAS INHALABLES QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1a. Neoprén					
2b. Bencina o parafina					
3c. Tolueno					
4d. Desodorantes ambientales o corporales					
5e. Pinturas en spray					
6f. Acetona					
7g. Éter u otros solventes volátiles (como los usados en pinturas)					
8h. Poppers (nitritos de alquilo)					
9i. Solventes para extintores de incendios					
10j. Cloruro de etilo					
11k. Óxido nitroso (gas de la risa o hippy crack)					

OD_9) ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes alucinógenos alguna vez en su vida?

(Respuesta múltiple) (Tarjeta 10)

- 1a ☐ LSD, tripi, sello u otros ácidos
- 2b ☐ Polvo de ángel (PCP o fenciclidina)
- 3c ☐ 25B-NBOMe o 25C-NBOMe (Nboom)
- 4d ☐ Feniletilamina (2-CB)
- 5e ☐ Peyote, San Pedro
- 6f ☐ Floripondio
- 7g ☐ Hongos o Cucumelo
- 8h ☐ Mescalina
- 9i ☐ Belladona
- 10j ☐ Ayahuasca
- 11k ☐ Ninguna de las anteriores

Alternativa k PASE A PREG. OD_11

OD_10) ¿Cuándo fue la última vez que consumió...? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LOS ALUCINÓGENOS QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1a. LSD, tripi, sello u otros ácidos					
2b. Polvo de ángel (PCP o fenciclidina)					
3c. 25B-NBOMe o 25C-NBOMe (Nboom)					
4d. Feniletilamina (2-CB)					
5e. Peyote, San Pedro					
6f. Floripondio					
7g. Hongos o Cucumelo					
8h. Mescalina					
9i. Belladona					
10j. Ayahuasca					

OD_11) ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes medicamentos sin receta médica alguna vez en su vida?

(Respuesta múltiple) (Tarjeta 11)

- 1a ☐ Fluoxetina (Pragmaten o Sostac)
- 2b ☐ Clormezanona (Calmosedan)
- 3c ☐ Sedantol
- 4d ☐ Dietilpropión o Fentermina (Elvenir o Sentis)
- 5e ☐ Quetiapina
- 6f ☐ Clorpromazina
- 7g ☐ Ninguna de las anteriores

Alternativa 6 PASE A PREG. OD_13

OD_12) ¿Cuándo fue la última vez que consumió sin receta médica...? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LOS MEDICAMENTOS SIN RECETA MÉDICA QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1a. Fluoxetina (Pragmaten o Sostac)					
2b. Clormezanona (Calmosedan)					
3c. Sedantol					
4d. Dietilpropión o Fentermina (Elvenir o Sentis)					
5e. Quetiapina					
6f. Clorpromazina					

OD_13) ¿Ha probado Ud. alguna de las siguientes sustancias alguna vez en su vida?

(Respuesta múltiple) (Encuestador: Leer alternativas)

- 1a ☐ Bebidas energéticas (Encuestador: Battery, Red Bull, Dark Dog, etc.)
- 2b ☐ Bebida energética combinada con alcohol
- 3c ☐ Sibutramina
- 4d ☐ Tonaril sin receta médica (Encuestador: Trihexifenidilo)
- 5e ☐ Anabólicos
- 6f ☐ Esteroides
- 7g ☐ Ketamina ("el key", vitamina K o CK)
- 8h ☐ GHB o GLB
- 9i ☐ PCP (Fenciclidina)
- 10j ☐ BZP (Benzilpiperazina)
- 11k ☐ GBL o Éxtasis líquido (Gammabutirolactona)
- 12l ☐ Ninguna de las anteriores

Alternativa l PASE A PREG. OD_15

OD_14) ¿Cuándo fue la última vez que consumió...? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LAS SUSTANCIAS QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1a. Bebidas energéticas (Encuestador: Battery, Red Bull, Dark Dog, etc.)					
2b. Bebida Energética combinada con alcohol					
3c. Sibutramina					
4d. Tonaril sin receta médica (Encuestador: Trihexifenidilo)					
5e. Anabólicos					
6f. Esteroides					
7g. Ketamina ("el key", vitamina K o CK)					
8h. GHB o GLB					
9i. PCP (Fenciclidina)					
10j. BZP (Benzilpiperazina)					
11k. GBL o Éxtasis líquido (Gammabutirolactona)					

OD_15) ¿Alguna vez en su vida se ha inyectado alguna droga o sustancia? ¿Cuál/es? (Respuesta múltiple, espontánea)

(Encuestador: Anote la droga en el espacio) (PREGUNTA ABIERTA)

1a 2b 3c 4d ☐ Ninguna

Alternativa d PASE A PREG CC_1 MÓDULO CONSUMO Y CONDUCCIÓN

OD_16) ¿Cuándo fue la última vez que se inyectó esa droga o sustancia? (Respuesta espontánea)

SI FECHA ES >= A 17/09/2024 Y <= 21/10/2024, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Fiestas Patrias

SI FECHA ES >= A 01/01/2025 Y <= 31/01/2025, MOSTRAR: No considere Celebraciones de Año Nuevo

SE RESPONDE SÓLO RESPECTO DE LAS DROGAS INYECTADAS QUE HA PROBADO.

	1. Durante los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	88. No sabe	99. No contesta
1a.					
2b.					
3c.					

MÓDULO CONSUMO Y CONDUCCIÓN

RESPONDEN SÓLO PERSONAS DE 17 AÑOS O MÁS

CC_1) ¿Tiene licencia de conducir? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

Alternativas 2, 88 o 99 PASE A PREG. SG_1-MÓDULO SALUD GENERAL

CC_2) Durante los últimos 12 meses, ¿ha manejado algún vehículo después de haber consumido alcohol (independiente de la cantidad consumida)? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

CC_3) Durante los últimos 12 meses, ¿ha manejado algún vehículo después de haber consumido marihuana? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

CC_4) Durante los últimos 12 meses, ¿ha manejado algún vehículo después de haber consumido otra droga sea lícita o ilícita (como cocaína, éxtasis, tranquilizantes, estimulantes u otra)? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí, especifique droga
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

MÓDULO SALUD GENERAL

SG_1) Nos gustaría saber si usted ha tenido algunas molestias y/o trastornos y cómo ha estado de salud en las últimas semanas. Queremos saber los problemas recientes y actuales, no los del pasado.

Para las preguntas siguientes piense en las últimas semanas:

	Más que lo habitual [0]	Igual que lo habitual [1]	Menos que lo habitual [2]	Mucho menos que lo habitual [3]
2c. ¿Ha sentido que está jugando un papel útil en la vida?				
3d. Y, utilizando la misma escala: ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones?				
4g. ¿Ha sido capaz de disfrutar sus actividades normales cada día?				
5h. ¿Ha sido capaz de hacer frente a sus problemas?				

	No, en absoluto [0]	No más que lo habitual [1]	Bastante más que lo habitual [2]	Mucho más [3]
1b. ¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho sueño? (Encuestador: Leer escala)				
6e. Y, ¿se ha sentido constantemente agobiado/a o en tensión?				
7f. Y, utilizando la misma escala: ¿Ha sentido que no puede superar sus dificultades?				
8i. ¿Se ha sentido poco feliz y deprimido/a?				
9j. ¿Ha perdido confianza en sí mismo?				
10k. ¿Ha pensado que usted es una persona que no vale para nada?				

11a. ¿Ha podido concentrarse bien en lo que hace? (Encuestador: Leer escala)	Mejor que lo habitual [0]	Igual que lo habitual [1]	Menos que lo habitual [2]	Mucho menos que lo habitual [3]
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------

12l. ¿Se siente razonablemente feliz considerando todas las circunstancias? (Encuestador: Leer escala)	Más feliz que lo habitual [0]	Aproximadamente lo mismo que lo habitual [1]	Menos feliz que lo habitual [2]	Mucho menos que lo habitual [3]
--	-------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

SG_2) [SI MAR_4=1 ó MAR_4=2]

En los últimos 12 meses, ¿un médico le ha recetado cannabis como parte de un tratamiento médico?

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No

MÓDULO TRATAMIENTO

RESPONDEN TODAS LAS PERSONAS

TRATA_1) ¿Ha recibido Ud. alguna vez en su vida algún tipo de tratamiento por el consumo de alcohol u otras drogas? No incluya tratamientos para dejar de fumar (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No

Alternativa 2 PASE A PREG. TRATA_4

TRATA_2) ¿Durante los últimos 12 meses ha recibido Ud. algún tipo de tratamiento por el consumo de alcohol u otras drogas? No incluya tratamientos para dejar de fumar (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No

Alternativa 2 PASE A PREG. TRATA_4

TRATA_3) ¿Este tratamiento que Ud. recibió durante los últimos 12 meses fue sólo por consumo de alcohol, sólo por consumo de drogas o por consumo de alcohol y otras drogas? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sólo por consumo de alcohol
- 2 ☐ Sólo por consumo de drogas
- 3 ☐ Por consumo de alcohol y otras drogas

Alternativas 1, 2 o 3 PASE A PREG. PR_1-MÓDULO PERCEPCIÓN DE RIESGO

TRATA_4) Durante los últimos 12 meses, ¿ha sentido la necesidad de recibir algún tipo de ayuda o tratamiento para disminuir o dejar de consumir alcohol y/u otras drogas? (Respuesta espontánea) (Encuestador: Si responde sí, sondear)

- 1 ☐ Sí, sólo por consumo de alcohol
- 2 ☐ Sí, sólo por consumo de drogas
- 3 ☐ Sí, por consumo de alcohol y otras drogas
- 4 ☐ No

Alternativa 4 PASE A PREG. PR_1-MÓDULO PERCEPCIÓN DE RIESGO

TRATA_5) Durante los últimos 12 meses, ¿ha intentado obtener algún tipo de ayuda o tratamiento para disminuir o dejar de consumir alcohol y/u otras drogas? (Encuestador: Si responde sí, sondear)

- 1 ☐ Sí, sólo por consumo de alcohol
- 2 ☐ Sí, sólo por consumo de drogas
- 3 ☐ Sí, por consumo de alcohol y otras drogas
- 4 ☐ No

Alternativas 1, 2, 3 o 4 pase PR_1-MÓDULO PERCEPCIÓN DE RIESGO

MÓDULO PERCEPCIÓN DE RIESGO

PR_1) ¿Cuál cree Ud. que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas?

(Encuestador: leer escala sólo para la primera afirmación)

	1. Ningún riesgo	2. Riesgo leve	3. Riesgo moderado	4. Riesgo grande	88. No sabe (No leer)
1a. Fuma una o más de una cajetilla de cigarrillos al día					
2b. Toma tres o más tragos por ocasión					
3c. Toma cinco o más tragos diariamente					
4d. Prueba marihuana una o dos veces (uso experimental)					
5e. Fuma marihuana frecuentemente					
6f. Prueba cocaína una o dos veces (uso experimental)					
7g. Usa cocaína frecuentemente					
8h. Prueba pasta base una o dos veces (uso experimental)					
9i. Usa pasta base frecuentemente					
10j. Prueba éxtasis una o dos veces (uso experimental)					
11k. Usa éxtasis frecuentemente					
12l. Prueba Tusi una o dos veces (uso experimental)					
13m. Usa Tusi frecuentemente					

MÓDULO ENTORNO Y BARRIO

EB_1) Hasta donde Ud. sabe, ¿alguien en su casa, distinto de usted, ha tenido problemas con el consumo de alcohol y/u otras drogas durante los últimos 12 meses? (Respuesta espontánea) (Encuestador: Si responde sí, sondear)

(Encuestador: Por ejemplo, si ha dejado de cumplir deberes en la casa, en el trabajo o donde estudia, si ha puesto en peligro su integridad física a causa del consumo recurrente, si ha hecho algo bajo los efectos de la sustancia que pudiera causarle problemas con la autoridad pública, si ha tenido algún problema o han aumentado los problemas con su familia o amigos a causa de su consumo)

- 1 ☐ Sí, sólo por consumo de alcohol
- 2 ☐ Sí, sólo por consumo de drogas
- 3 ☐ Sí, por consumo de alcohol y drogas
- 4 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

EB_2) En su casa, y hasta donde Ud. conoce, ¿alguien usa o consume alguna de estas drogas? Si Ud. lo hace, no se considere. (Respuesta espontánea)

	1. Sí	2. No	88. No sabe	99. No contesta
1a. Marihuana				
2b. Pasta base				
3c. Cocaína				

EB_3) Hasta donde Ud. conoce, ¿cuánto hay de las siguientes situaciones en su barrio?

(Encuestador: Leer escala sólo para la primera afirmación)

	1. Mucho	2. Bastante	3. Algo	4. Poco	5. Nada	88. No sabe (No leer)	99. No contesta (No leer)
1a. Tráfico de drogas							
2b. Robos en las casas							
3c. Rayado en las paredes, daños al alumbrado o cosas parecidas							
4d. Consumo de drogas ilícitas en lugares públicos como en la calle o plazas							
5e. Asaltos o robos en las calles							
6f. Jóvenes parados no haciendo nada en las esquinas							
7g. Balaceras y acciones violentas con armas de fuego							
8h. Venta clandestina de alcohol							

EB_4) ¿Cuán difícil le sería a Ud. conseguir alguna de las siguientes drogas?

(Encuestador: Leer escala sólo para la primera afirmación)

	1. Le sería muy fácil	2. Le sería fácil	3. Le sería difícil	4. Le sería muy difícil	5. No podría conseguir	88. No sabe (No leer)	99. No contesta (No leer)
1a. Marihuana							
2b. Cocaína							
3c. Pasta base							
4d. Éxtasis							
5e. Tusi o cocaína rosada							

EB_5) ¿Y cuándo fue la última vez que una persona, conocida o desconocida, le ofreció alguna de las siguientes drogas?

(Respuesta espontánea)

	1. En los últimos 30 días	2. Hace más de un mes, pero menos de un año	3. Hace más de un año	0. Nunca me han ofrecido Pregunte por cada droga.
1a. Marihuana				
2b. Cocaína				
3c. Pasta base				
4d. Éxtasis				
5e. Tusi o cocaína rosada				

CUANDO EL ENTREVISTADO DECLARE 0, PASE A LA SIGUIENTE DROGA. SI DECLARA NUNCA PARA TODAS, PASE A PREG.
OP_1-MÓDULO OPINIÓN PÚBLICA

EB_6) La última vez que le ofrecieron, ¿en qué lugar se la ofrecieron? (Respuesta espontánea, única)

(Encuestador: Sondear, leer drogas)

	1. En la casa	2. En los alrededores de la casa, barrio o comuna	3. En lugar de estudios o trabajo	4. En alrededores lugar de estudios o trabajo	5. En una fiesta, junta, discoteca, recitales	6. Por internet, mail o chat	7. En otro lugar
1a. Marihuana							
2b. Cocaína							
3c. Pasta base							
4d. Éxtasis							
5e. Tusi o cocaína rosada							

MÓDULO OPINIÓN PÚBLICA

OP_1) Respecto al tema drogas, ¿cuán de acuerdo estás con las siguientes frases? (Encuestador: Leer escala sólo para la primera afirmación)

	1. Muy de acuerdo	2. De acuerdo	3. En desacuerdo	4. Muy en desacuerdo	88. No sabe (No leer)	99. No contesta (No leer)
1a. La mayoría de los jóvenes fuma marihuana						
2b. La marihuana produce menos daño que el alcohol						
3c. El consumo y el tráfico de drogas es el principal responsable de la delincuencia en este país						
4d. La marihuana debería ser legal para los mayores de 18 años						
5e. Las drogas han hecho más violentos a los delincuentes						
6f. Se debería dejar tranquilos a los que consumen drogas: después de todo es asunto de cada cual hacerlo o no						

OP_2) Pensando ahora en drogas como marihuana, cocaína o pasta base, ¿cuán de acuerdo está Ud. con las siguientes medidas?

(Encuestador: Leer escala sólo para la primera afirmación)

	1. Muy de acuerdo	2. De acuerdo	3. En desacuerdo	4. Muy en desacuerdo	88. No sabe (No leer)	99. No contesta (No leer)
1a. Suspender el juicio de quienes han delinquido por primera vez a cambio de que ingresen a un programa de tratamiento						
2b. Dar la misma pena a quienes trafican con marihuana que los que trafican con cocaína o pasta base						
3c. Autorizar que se registre a los alumnos/as a la entrada de sus colegios para averiguar si portan alguna droga						
4d. Penalizar el porte y consumo de marihuana aunque sea en pequeñas cantidades y para uso personal						

MÓDULO TRABAJO

CO_1) La semana pasada, ¿trabajó al menos una hora, sin considerar los quehaceres del hogar? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No

Alternativa 1 PASE A PREG. CO_6

CO_2) Aunque no trabajó la semana pasada, ¿realizó alguna actividad por lo menos durante una hora?

(Respuesta espontánea)

(Encuestador:

... por un salario o remuneración?

... en su empresa o negocio?

... para la empresa o negocio de un familiar (con o sin remuneración)?

... por pago en especies?

... como aprendiz o realizando una práctica?

... de venta, sin incluir bienes del hogar?

... agrícola, minera o artesanal para la venta?)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No

Alternativa 1 PASE A PREG. CO_6

CO_3) Aunque no trabajó la semana pasada, ¿tenía empleo del cual estuvo ausente temporalmente por licencia, huelga, enfermedad, vacaciones, suspensión temporal u otra razón? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No

Alternativa 1 PASE A PREG. CO_6

CO_4) ¿Buscó trabajo remunerado o realizó alguna gestión para iniciar una actividad por cuenta propia (negocio o empresa) en las últimas cuatro semanas? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No

Alternativa 1 PASE A PREG. CO_6

CO_5) ¿Cuál es la razón por la que no buscó trabajo o realizó alguna gestión para iniciar una actividad por cuenta propia en las últimas cuatro semanas? (Respuesta espontánea)

(Encuestador: No lea las alternativas, registre la razón que el entrevistado considera más importante. Anote SÓLO 1 de las razones)

Posibilidad de empezar a trabajar pronto

- 1 ☐ Consiguió trabajo que empezará pronto o iniciará una actividad por cuenta propia
- 2 ☐ Está esperando resultado de gestiones ya emprendidas

Limitaciones de condiciones familiares o personales

- 3 ☐ No tiene con quien dejar a los niños
- 4 ☐ No tiene con quien dejar a adultos mayores
- 5 ☐ No tiene con quien dejar a otro familiar
- 6 ☐ Está enfermo o tiene una discapacidad
- 7 ☐ Percepción de limitaciones personales
- 8 ☐ Piensa que nadie le dará trabajo (porque no cuenta con la capacitación requerida, por su edad, etc.)

Condiciones laborales no se adecuan a expectativas

- 9 ☐ Las reglas, horarios y distancias de los trabajos no le acomodan
- 10 ☐ Ofrecen sueldos muy bajos

Tiene otra actividad o renta

- 11 ☐ Quehaceres del hogar
- 12 ☐ Estudiante
- 13 ☐ Jubilado(a), pensionado(a) o montepiada
- 14 ☐ Tiene otra fuente de ingreso (seguro de cesantía, mesadas, rentas transferencias del Estado, etc.)

Otros

- 15 ☐ Se cansó de buscar o cree que no hay trabajo disponible
- 16 ☐ Busca cuando realmente lo necesita o tiene trabajo esporádico
- 17 ☐ No tiene interés en trabajar
- 18 ☐ Otra razón

PASE A PREG. DP_1 –MÓDULO DATOS PERSONALES DEL ENCUESTADO

CO_6) En su trabajo o negocio principal, ¿usted trabaja como? (Respuesta única)

(Encuestador: Leer alternativas)

- 1 ☐ Patrón o empleador/a
- 2 ☐ Trabajador/a por cuenta propia
- 3 ☐ Empleado/a u obrero/a del sector público (gobierno central o municipal)
- 4 ☐ Empleado/a u obrero/a de empresas públicas
- 5 ☐ Empleado/a u obrero/a del sector privado
- 6 ☐ Servicio doméstico puertas adentro
- 7 ☐ Servicio doméstico puertas afuera
- 8 ☐ FF. AA. y del Orden
- 9 ☐ Familiar no remunerado

MÓDULO DATOS PERSONALES DEL ENCUESTADO

DP_1) ¿Cuántas personas viven en este hogar? Un hogar está compuesto por una o más personas que unidas o no por un vínculo de parentesco, residen en una misma vivienda o parte de ella y se benefician de un mismo presupuesto, principalmente para alimentación.

(Encuestador: Anote 99 No contesta)

RANGO: 1 A 99

personas

DP_2) ¿Cuál es su estado civil actual (legal)? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Soltero/a
- 2 ☐ Casado/a
- 3 ☐ Divorciado/a
- 4 ☐ Viudo/a
- 5 ☐ Anulado/a
- 6 ☐ Conviviente civil

DP_3) Actualmente, ¿cuál es su estado de hecho? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Casado/a vive con su esposo/a
- 2 ☐ Conviviente o pareja de distinto sexo
- 3 ☐ Conviviente o pareja del mismo sexo
- 4 ☐ No convive con pareja

DP_4) En Chile, la ley reconoce nueve pueblos indígenas (originarios), ¿pertenece usted o es descendiente de alguno de ellos? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Aymara
- 2 ☐ Rapa Nui
- 3 ☐ Quechua
- 4 ☐ Mapuche
- 5 ☐ Atacameño (Likán Antai)
- 6 ☐ Colla
- 7 ☐ Kawésqar (Alacalufes)
- 8 ☐ Yagán (Yámana)
- 9 ☐ Diaguita
- 10 ☐ Chango
- 11 ☐ Selk'nam
- 12 ☐ Otro
- 13 ☐ No pertenece a ningún pueblo indígena

DP_5) ¿Cuál es su religión o credo? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Católica
- 2 ☐ Evangélica o protestante
- 3 ☐ Judía
- 4 ☐ Musulmana
- 5 ☐ Mormón
- 6 ☐ Ortodoxa
- 7 ☐ Budista
- 8 ☐ Fe Bahá'í
- 9 ☐ Testigo de Jehová
- 10 ☐ Espiritualidad indígena
- 11 ☐ Otra
- 12 ☐ Ninguna

DP_6) ¿Cuál es su nacionalidad? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Chilena (exclusivamente)
- 2 ☐ Chilena y otra (doble nacionalidad)
- 3 ☐ Otra nacionalidad (extranjeros), especifique:

DP_6A) Cuando usted nació, ¿en qué comuna o país vivía su madre?

- 1 ☐ En esta comuna
- 2 ☐ En otra comuna de Chile
- 3 ☐ En otro país, especifique:
- 88 ☐ No sabe

DP_6B) ¿En qué comuna o país vivía usted hace 5 años (2019)?

SI LA FECHA ES $\geq$ A 01/01/2025 Y $\leq$ 31/07/2025, CAMBIAR FRASE PREGUNTA: (2020)

- 1 ☐ En esta comuna
- 2 ☐ En otra comuna de Chile
- 3 ☐ En otro país, especifique:
- 88 ☐ No sabe

DP_I. A CONTINUACIÓN, LE VOY A HACER UNAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON SU IDENTIDAD DE GÉNERO**DP_8) En cuanto a su género, ¿usted se identifica como?**

(Encuestador: Leer alternativas)

Encuestador: La Identidad de Género hace referencia a cómo la persona se siente o se identifica respecto de su género (masculino o femenino), y esto puede concordar o no con su sexo biológico.

- 1 ☐ Masculino
- 2 ☐ Femenino
- 3 ☐ Transmasculino
- 4 ☐ Transfemenino
- 5 ☐ No binario
- 6 ☐ Otro, especifique:
- 99 ☐ No contesta (No leer)

PERSONAS CON SEXO KISH=1 (HOMBRE) & DP_ 8=2 ó PERSONAS CON SEXO KISH=2 (MUJER) & DP_ 8=1 ó PERSONAS CON DP_ 8=5

DP_8A) ¿Ud. se identifica como trans?

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta (No leer)

RESPONDEN SÓLO PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS**DP_8B) ¿Cuál de estas alternativas define mejor su orientación sexual?**

(Encuestador: Leer alternativas)

Encuestador: Se entiende por Orientación Sexual la atracción que una persona puede tener hacia el sexo opuesto (heterosexual), el mismo sexo (homosexual) o hacia ambos (bisexual).

- 1 ☐ Gay/Lesbiana (atracción hacia el mismo sexo)
- 2 ☐ Bisexual (atracción hacia más de un sexo o género)
- 3 ☐ Heterosexual (atracción hacia el sexo opuesto)
- 4 ☐ Otro, especifique:
- 88 ☐ No sabe (No leer)
- 99 ☐ No contesta (No leer)

DP_9) ¿A qué sistema previsional de salud pertenece usted? (Respuesta espontánea, sondear)

- 1 ☐ Sistema público grupo A
- 2 ☐ Sistema público grupo B
- 3 ☐ Sistema público grupo C
- 4 ☐ Sistema público grupo D
- 5 ☐ Sistema público no sabe grupo
- 6 ☐ FF. AA. y del Orden
- 7 ☐ ISAPRE
- 8 ☐ Ninguno (particular)
- 9 ☐ Otro sistema
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

DP_10) ¿Qué relación de parentesco tiene con el/la jefe/a de hogar? Jefe de hogar se define como la persona, hombre o mujer, reconocida como tal por los integrantes del hogar (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Jefe/a de hogar
- 2 ☐ Esposo/a o pareja
- 3 ☐ Hijo/a de ambos
- 4 ☐ Hijo/a sólo del jefe
- 5 ☐ Hijo/a sólo del esposo/a o pareja
- 6 ☐ Padre o madre
- 7 ☐ Suegro/a
- 8 ☐ Yerno o nuera
- 9 ☐ Nieto/a
- 10 ☐ Hermano/a
- 11 ☐ Cuñado/a
- 12 ☐ Otro familiar
- 13 ☐ No familiar

DP_11) Actualmente, ¿asiste a algún establecimiento educacional? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

DP_12) ¿Cuál es el nivel educacional más alto alcanzado o el nivel educacional actual de usted? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Nunca asistió
- 2 ☐ Educación Especial (Diferencial)
- 3 ☐ Primaria o preparatoria (Sistema antiguo)
- 4 ☐ Educación Básica
- 5 ☐ Humanidades (Sistema antiguo)
- 6 ☐ Educación Media Científico Humanista
- 7 ☐ Técnica Comercial, Industrial o Normalista (Sistema antiguo)
- 8 ☐ Educación Media Técnico Profesional
- 9 ☐ Técnico de Nivel Superior
- 10 ☐ Profesional
- 11 ☐ Postítulo
- 12 ☐ Magíster
- 13 ☐ Doctorado
- 88 ☐ No sabe

DP_13) ¿Completó el nivel educacional anteriormente declarado? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sí
- 2 ☐ No
- 77 ☐ No aplica

DP_14) En este nivel educacional, ¿cuál fue el último curso que aprobó? (Respuesta espontánea)

- 1 ☐ Sin estudios
- 2 ☐ Primer año
- 3 ☐ Segundo año
- 4 ☐ Tercer año
- 5 ☐ Cuarto año
- 6 ☐ Quinto año
- 7 ☐ Sexto año
- 8 ☐ Séptimo año
- 9 ☐ Octavo año
- 77 ☐ No aplica
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

DP_15) ¿Cuál de estas situaciones se aplica mejor a su caso?

(Encuestador: Leer alternativas)

- 1 ☐ Ud. aporta ingreso único
- 2 ☐ Ud. aporta el ingreso principal, pero existen otros ingresos
- 3 ☐ Ud. aporta la mitad del ingreso del hogar
- 4 ☐ Ud. aporta ingreso, pero no es el principal del hogar
- 5 ☐ Ud. no aporta ingresos al hogar
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

DP_16) Aproximadamente y considerando un mes normal, ¿a cuánto asciende el ingreso total del hogar al mes?

(Respuesta espontánea)

(Encuestador: Si hay más de un hogar en la vivienda, preguntar por el hogar del entrevistado. Si es menor de edad, intente conseguir esta información con algún adulto)

- 1 ☐ Menos de \$100.000
- 2 ☐ Entre \$100.001 y 200.000
- 3 ☐ Entre \$200.001 y 300.000
- 4 ☐ Entre \$300.001 y 400.000
- 5 ☐ Entre \$400.001 y 500.000
- 6 ☐ Entre \$500.001 y 750.000
- 7 ☐ Entre \$750.001 y 1.000.000
- 8 ☐ Entre \$1.000.001 y 1.500.000
- 9 ☐ Entre \$1.500.001 y 2.000.000
- 10 ☐ Más de \$2.000.000
- 88 ☐ No sabe
- 99 ☐ No contesta

PARA LAS PREGUNTAS DP_17 Y DP_18 UD. SÓLO DEBE OBSERVAR Y NO PREGUNTARLE AL ENTREVISTADO**DP_17) Calidad de la vivienda**

- 1 ☐ Tipo 1. Casas o departamentos de gran lujo y muy espaciosos.
- 2 ☐ Tipo 2. Casas o departamentos espaciosos y confortables.
- 3 ☐ Tipo 3. Casas o departamentos de construcción sólida, pero de apariencia modesta y en buen estado de conservación.
- 4 ☐ Tipo 4. Tres casos típicos:
 - i) Construcción sólida, pero en mal estado de conservación.
 - ii) Construcción sólida, buen estado de conservación, buena iluminación, pero existe hacinamiento.
 - iii) Casa prefabricada, aunque tenga cocina y baño independiente.
- 5 ☐ Tipo 5. Se presentan tres casos:
 - i) Mejoras: casas de madera con pozos negros y sin suministro de agua potable dentro del hogar.
 - ii) Pocilga: habitación sucia y sin ventilación ni baño. La cocina, el comedor y dormitorio están dentro de la misma habitación.
 - iii) Subterráneos insalubres con hacinamiento y/o promiscuidad.

DP_18) Calidad del barrio

- 1 ☐ Tipo 1. Barrio residencial elegante, donde el valor del terreno y el monto de los arriendos es alto.
- 2 ☐ Tipo 2. Barrio residencial, todavía acomodado, de calles amplias, pero sin tanta área verde; casas confortables y bien mantenidas.
- 3 ☐ Tipo 3. Barrios de comercio o calles estrechas, antiguas, sin áreas verdes, de menos agrado para vivir y de valores medios de arrendamiento.
- 4 ☐ Tipo 4. Barrio obrero o barrio populoso o mal ventilado. El valor de las viviendas está disminuido por la proximidad a talleres, fábricas, estaciones de ferrocarriles, basurales, etc.
- 5 ☐ Tipo 5. Barrio de mejoras y pocilgas desaseadas, sin pavimentación, de mal aspecto y sin condiciones sanitarias.

OBS_FINAL. ENCUESTADOR: ANOTE CUALQUIER OBSERVACION ACERCA DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.

[O] PREGUNTA ABIERTA.

ENCUESTADOR: ANUNCIE POSIBLE INSTANCIA DE SUPERVISIÓN, PARA EVITAR NEGACIÓN A LA ENTREVISTA DE CONTROL Y AGRADEZCA LA COLABORACIÓN

FONO_SUPERVISION

Para fines de supervisión de mi trabajo, le solicito si me puede dar su número de teléfono

Número de teléfono +56: [O] LIMITAR ENTRE 8 Y 10 DÍGITOS

