Schlüssel zur Bestimmung der wichtigsten Wiesengräser im vegetativen Zustand

Nur junge, gut entwickelte Exemplare mit 2 bis 4 Blättern lassen sich sicher bestimmen. Sobald als möglich den Blütenstand frei machen und mit Bestimmungsschlüssel ab Beginn Rispenschieben arbeiten.
Beim Bestimmen immer von links nach rechts vorgehen!

①a Blätter borstenförmig

< 2 mm breit



Blätter gelbgrün, schlaff, dünn, Unterseite glänzend

Gemeines Rispengras

Blätter leicht konisch, schlaff, gelbgrün. Doppelrille mit Lupe erkennbar.
Im ersten Schnitt obere Blätter breiter.



Rotschwingel

Blätter zäh, deutlich gerillt. Pflänzchen lassen sich einzeln ausreissen.
Verwandte Arten: z.B. Schafschwingel mit blaugrünen Blättern.



Blätter borstenförmig, zäh, drahtig, dunkelgrün

Borstgras

Blätter steif, sehr zäh, graugrün.
Pflänzchen lassen sich nicht einzeln ausreissen. Ganze Horste sind stark im Boden verankert.
Meist liegen dürre Horstteile vom Vorjahr umher.

①b Blätter mit Doppelrille

«Skispur»



Blätter unbehaart

Einjähriges Rispengras

Pflanze blüht schon bei 5 bis 10 cm Höhe, d.h. fast immer.
Blätter kurz, häufig querrunzelig.
Blattunterseite nicht glänzend.

Wiesen-rispengras

Blattränder parallel, Blatt lang, steif, dunkelgrün, mit Kahnspitze. Blatthäutchen kurz, gestutzt.



Gemeines Rispengras

Blätter leicht konisch, schlaff. Blatthäutchen zugespitzt.
Im ersten Schnitt sehr formenreich.



Blätter behaart

Flaumhafer

Blattränder parallel, Blatt mit Kahnspitze. Blatt sehr lang (nur im vegetativen Zustand!).



② Blätter und/oder Blattscheiden oder Halmknoten behaart



mit Öhrchen

Quecke

Blattöhrchen schmal, Blätter zäh, steif, gedreht, breit und konisch. Mit Ausläufern.



Haare 0,5 mm

Wolliges Honiggras

Pflanze dicht, samtig behaart.
Unterste Blattscheide mit violetten Nerven.
Blatt hellgraugrün. Ohne Ausläufer.



überall

ohne Blattöhrchen

längere Haare > 1 mm vorhanden

unregelmässig behaart

Weiches Honiggras

Knoten lang schräg abwärts behaart.
Mit unterirdischen Ausläufern.



Ruchgras

Blattgrund mit auffälligen Haarbüscheln. Rest unbehaart.



Fromental

Blätter schwertförmig aufrecht, kaum gedreht, im Licht mit gelbgrünen Linien. Blatthäutchen kurz, weiss, gezähnt, oft zerschlitzt. Überragt Bestand.

regelmässig behaart

Fiederzwenke

Hellgelbgrüne Blätter, in den Ansatz verschmälert. Pflanze bildet durch Ausläufer auffällig hellgelbe Flecken auf unternutzten Flächen.



Blatt

hellgelb

Aufrechte Trespe

Blattrand regelmässig bewimpert, Blätter lang, parallelrandig (nur im vegetativen Zustand).



Blatt

Weiche Trespe

Blattscheide dicht behaart, Triebe dick.
Violettbraune Flecken auf unterster Blattscheide.
Stirbt nach dem ersten Schnitt.

Goldhafer

Triebe fein. Haare auf Blattscheide schräg abwärts gerichtet. Blatthäutchen kurz, weiss, gezähnt. Blatt links gedreht (von der Spitze aus gesehen).



Blattscheide

③ Blattunterseite deutlich von Blattoberseite verschieden

Blätter normalgrün (nicht graugrün)



Blattoberseite stark gerillt

Blattunterseite meist glänzend

Blätter 3 bis 4 mm breit (vor Rispenschieben breiter)

Blattränder parallel

Englisches Raigras

Blattunterseite stark glänzend.
Mittlere Riefen vertieft. Blattquerschnitt = «Krähe» (3 Linien!). Trieb zuunterst rot (totes Material abstreifen!). Blattkiel bis zur Spitze sichtbar.
Blatt gefaltet → ovaler Trieb.



1 2 3

Rasenschmiele

Blätter mit weissen, durchsichtigen Linien und sehr scharfen Rillen.
Grosse Horste.



Kammgras

Blattunterseite leicht glänzend.
Trieb zuunterst gelbbraun. Blattränder an einer Stelle eingedrückt. Kleine, dichte Horste.

Blätter 5 bis 10 mm breit

Blattränder konisch

Italienisches Raigras

Blatthäutchen durchsichtig, etwa 2 mm lang, von der Seite sichtbar. Blattspitzen meist überhängend, überragt übrige Gräser. Blattunterseite stark glänzend.

Wiesenschwingel

Blatthäutchen kurz, max. 1 mm, grünlich, derb, von der Seite nicht sichtbar, Blätter schmutziggrün.
Zweitoberstes Blatt stramm abstehend.
Blattunterseite wenig glänzend.



Rohrschwingel

Wie Wiesenschwingel, aber:
grobe, harte und raue Pflanze.
Blattgrund fein bewimpert (Lupe).
Grosse, grobe Horste, Sorten feiner.




Wiesenfuchsschwanz

Blattoberseite mit unregelmässigen, aber deutlichen Rillen. Sehr langes, konisches Blatt.
Blatthäutchen 1 bis 3 mm, robust, grünlich.
Blattunterseite nicht glänzend.

④ Blattunterseite gleich oder ähnlich wie Blattoberseite

Blätter mattgrün bis graugrün



Blattoberseite glatt bis fein gerillt

Blattunterseite nicht gerillt, nicht glänzend

Triebe

Knaulgras

Blätter ausgeprägt graugrün (sehr junge hellgelbgrün). Triebe flachgedrückt. Blattunterseite mit Kiel.



Kiel

Triebe

ohne Blattöhrchen

Blattoberseite deutlich gerillt

Blatthäutchen nicht robust, Blätter relativ kurz, nicht oder nur wenig rau.

mit Öhrchen

Quecke

Blattöhrchen schmal, spitz.
Blätter zäh, steif, gedreht, breit und ziemlich konisch. Mit Ausläufern.



Blatt nicht oder kaum gerillt

Timothe

Blatt mit gewelltem Rand, bläulich graugrün, wachsig anzufühlen, Halmbasis verdickt.
Überragt übrige Gräser nicht.

oft mit seitlichen Zähnen



Blatthäutchen weiss

Fromental

Blätter schwertförmig aufrecht, kaum gedreht, im Licht mit gelbgrünen Linien.
Blatthäutchen kurz, weiss, gezähnt, oft zerschlitzt.
Überragt übrigen Bestand.

Wiesenfuchsschwanz

Sehr langes, konisches Blatt.
Blatthäutchen 1 bis 3 mm, robust, grünlich.
Blattunterseite nicht glänzend.

Oberstes Blatthäutchen spitz und lang (1 bis 4 mm)

Ausläufer-Straussgras

Mit niederliegenden Trieben und oberirdischen Ausläufern.

Fioringras

Ohne niederliegende Triebe und oberirdische Ausläufer.

Blatthäutchen gestutzt (0,5 bis 1,5 mm).
Blatt mattgrün.



Rotes Straussgras

Blätter etwas rau, meist < 12 cm.



= Jüngstes Blatt gefaltet

= Jüngstes Blatt gerollt