Schlüssel zur Bestimmung der wichtigsten Wiesengräser ab Beginn Rispenschieben

Achtung: Zum Bestimmen immer mehrere gut entwickelte Exemplare nehmen!

Ähren

① Ährchen mit Grannen[1]

mit 1 Granne pro Ährchen

Wiesenfuchsschwanz
Frühes Gras, das bereits anfangs Mai blüht. Nicht mit Timothe verwechseln, das im Juni schiebt.
Eher feuchte Wiesen.



mit > 5 Grannen pro Ährchen

Italienisches Raigras
Bildet auch im Sommer Ähren.
Gras der tiefen, feucht-warmen Lagen.



Spezialfälle

Sehr raues Gras, mit weissen, durchsichtigen Linien.



Rasenschmiele
Unkraut der eher feuchten, extensiven Wiesen und Weiden.



Borstgras
Ähre = halbe Feder.
Mit trockenen Scheiden vom Vorjahr. Sehr zähe Pflanze der sauren und mageren Weiden.



Zittergras
Zähes Gras der mageren und trockenen Wiesen.



Knaulgras
Vor allem in mittel-intensiven Wiesen.

② Ährchen ohne Grannen[2]

Ährchen 4 bis 7 mm

Timothe
Spätes Gras (blüht im Juni). Nicht mit dem Wiesenfuchsschwanz verwechseln.



Kammgras
Gleicht einem Kamm.
Gras der Bergweiden.



Ruchgras
Sehr frühes Gras. Zeigt mageren Boden an, falls stark verbreitet. Bei genauer Betrachtung ist das Ährchen eine Ährenspitze mit kurzen Ästen.



Ährchen 10 bis 18 mm

Quecke
Breitseite des Ährchens gegen Ährenachse. Nicht mit dem Englischen Raigras verwechseln! Spätreif: blüht erst im Juni. Mit unterirdischen Ausläufern.



Englisches Raigras
Auf flache Oberfläche gelegt sieht man alle Breitseiten der Ährchen. Nicht mit Quecke verwechseln! Hauptgras der intensiven Wiesen und Weiden.



Ährchen > 18 mm

Fiederzwenke
Helle, gelbgrüne Blätter, die an Ansatz und Spitze am schmälsten sind. Extensive, unternutzte oder nicht mehr genutzte Flächen.



Rispen

③ Ährchen mit Grannen[1]

mit 1 Granne pro Ährchen

Weiches Honiggras
Knoten auffällig behaart, Rest unregelmässig behaart.
Waldränder usw.



Fromental
Auffällig hohes Gras.
Im fortgeschrittenen Stadium häufig mit 2 Grannen. Gras der wenig intensiven Wiesen.



mit 2 bis 3 Grannen pro Ährchen

Flaumhafer
Behaart, Blütenstand teilweise violett. Blätter sehr kurz, mit Skispur. Wenig intensive, eher trockene Wiesen.



Goldhafer
Mit feinen Trieben, Blütenstand golden überlaufen. Blattscheiden stark behaart, Haare nach unten gerichtet.



mit > 5 Grannen pro Ährchen

Aufrechte Trespe
Blattrand bewimpert.
Hartes Gras der wenig intensiven, trockenen Wiesen.



Weiche Trespe
Einjährige, stark behaarte Pflanze.
Verschwindet nach dem ersten Schnitt.



Rotschwingel
Kurze Grannen (1–2 mm), Grundblätter borstenförmig, zäh.



④ Ährchen ohne Grannen[2]

Samtig behaart

Wolliges Honiggras
Regelmässig behaart, sehr kurze, samtige Behaarung, Berührung sehr weich.
In eher extensiven Wiesen.



Ährchen 10 mm

Wiesenschwingel
Keine Grannen. Kürzerer der untersten Rispenäste mit 1 (–2) Ährchen.



Rohrschwingel
Ährchen mit Spitzchen = sehr kurze Grannen.
Kürzerer der untersten Rispenäste mit ≥ 3 Ährchen.



Ährchen 8 mm

Blaues Pfeifengras/Besenried
Hohes Gras ohne sichtbare Knoten.
Pflanzen der feuchten Orte.

Ährchen 4 mm

Wiesenrispengras
Mit kurzem, gestutztem Blatthäutchen. Blätter dunkelgrün.



Gemeines Rispengras
Mit langem, zugespitztem Blatthäutchen. Blätter hellgrün.



Einjähriges Rispengras
Blühend 5–10 cm hoch.
Kurze, oft etwas gedrehte Blätter.



Ährchen ca. 2,5 mm

Rotes Straussgras
Oberstes Blatthäutchen kurz und gestutzt.
Wenig intensive Wiesen.



Oberstes Blatthäutchen lang und zugespitzt

Ausläufer-Straussgras
Mit nieder liegenden Trieben und oberirdischen Ausläufern. Feuchte Orte.



Fioringras
Ohne nieder liegende Triebe oder oberirdische Ausläufer.





[1] Mittlere Länge der Ährchen ohne Grannen
[2] oder mit Spitzchen von max. 1 mm