

Bài 2: Tổng đoạn con (20 điểm)

Một dãy con gồm các phần tử liên tiếp nhau trong một dãy cho trước được gọi là đoạn. Cho dãy gồm n số nguyên không âm. Tìm đoạn con ngắn nhất có tổng các phần tử bằng giá trị k cho trước.

Dữ liệu vào: Từ bàn phím:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n ($1 < n \leq 2 \cdot 10^3$) và số nguyên dương k ($1 < k \leq 2 \cdot 10^9$).
- Dòng tiếp theo ghi n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 2 \cdot 10^9$), mỗi số cách nhau tối thiểu một dấu cách.

Kết quả ra: Ghi ra màn hình:

Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương d và L cách nhau tối thiểu một dấu cách, trong đó: d là chỉ số của phần tử đầu tiên trong đoạn, L là số phần tử trong đoạn (chiều dài đoạn). Nếu không có kết quả thì ghi ra số 0.

Ví dụ:

Bàn phím	Màn hình
21 17 0 2 3 2 10 1 5 5 6 12 20 30 14 80 11 0 6 0 0 5	16 3