

Løsningsforslag – Eksamen R2, høsten 2018

Laget av Markus

Sist oppdatert: 24. november 2018

Antall sider: 7

Finner du matematiske feil, skrivefeil, eller andre typer feil? Dette dokumentet er open-source, alle kan bidra på https://github.com/matematikk/vgs_eksamener.

1 Del 1

1.1 Oppgave 1

a)

$$f'(x) = 6(-\sin(2x - 1)) \cdot \frac{d}{dx}[2x - 1] = -12 \sin(2x - 1)$$

b)

$$g'(x) = \frac{d}{dx} [\cos^2(x) + \sin^2(x)] = \frac{d}{dx}[1] = 0$$

1.2 Oppgave 2

a)

$$\int (2x^2 - 3x) \, dx = \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + C$$

b) La $u = x^2 + 2 \implies dx = \frac{1}{2x} du$. Da fås

$$\int 4x \cdot \cos(x^2 + 2) \, dx = 2 \int \cos(u) = 2 \sin(u) + C = 2 \sin(x^2 + 2) + C$$

c) Observer at $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$ og bruk delbrøksoppspalting. Det gir

$$\int \frac{4}{x^2 - 4} = \int \left(\frac{1}{x - 2} - \frac{1}{x + 2} \right) dx = \ln|x - 2| - \ln|x + 2| + C = \ln \left| \frac{x - 2}{x + 2} \right| + C$$

1.3 Oppgave 3

a) For at rekka skal konvergere må $|e^{-x}| < 1$. Siden $e^x > 0$ for alle $x \in \mathbb{R}$, holder det med å sjekke når $e^{-x} < 1 \iff e^x > 1 \iff x > 0$

b) Vi ønsker å løse $S(x) = 3$. Siden $S(x)$ er en geometrisk rekke er den for alle $x > 0$ slik at

$$S(x) = \frac{1}{1 - e^{-x}} = \frac{e^x}{e^x - 1}$$

Sett nå dette lik 3 så får vi likningen

$$2e^x = 3 \iff x = \ln \left(\frac{3}{2} \right)$$

1.4 Oppgave 4

b) Vi skal finne skjæringspunktene til $\sin(x)$ og $\cos(x)$, altså løse $\sin(x) - \cos(x) = 0 \iff \frac{\sin(x)}{\cos(x)} - 1 = 0$, når $\cos(x) \neq 0$. Dette forenkles igjen til $\tan(x) = 1$, som skjer når $x = \frac{\pi}{4} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. Så skjæringspunktene er $(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ og $(\frac{5\pi}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$.

c)

$$\int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\sin(x) - \cos(x)) \, dx = -\cos(x) - \sin(x) \Big|_{\pi/4}^{5\pi/4} = 2\sqrt{2}$$

1.5 Oppgave 5

a) Vi observerer at amplituden er 1.2 og at perioden er 8 sekunder. Jeg tolker likevektslinja til å være 1.2 m utifra oppgavebeskrivelsen. Siden $f(t)$ er på sitt høyeste når $t = 0$, kan vi konkludere med at den er faseforskjøvet med $\frac{\pi}{2}$. Konklusjonen er

$$f(t) = 1.2 \sin\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{2}\right) + 1.2$$

b) Her skal vi løse $f(t) = 1.2 + 0.6 = 1.8 \iff \sin\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$. Dette er ekvivalent med å løse

$$\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \quad \text{og} \quad \frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$$

der $n \in \mathbb{Z}$ og $t \in [0, 8]$. Dette er igjen ekvivalent med å løse

$$t = -\frac{4}{3} + 8n \quad \text{og} \quad t = \frac{4}{3} + 8n$$

Herifra ser vi at løsningene på det ønskede intervallet er $t \in \{\frac{4}{3}, \frac{20}{3}\}$. Så bøyen er 0.6 m over likevektslinja etter 1.33 sekunder og etter 6.66 sekunder.

1.6 Oppgave 6

a) Observer at tangenten i $(1, -1)$ peker nedover, så alternativ 1 ($y' = x + y$) kan ikke være rett, fordi da hadde $y' = 1 - 1 = 0$ i $(1, -1)$, altså skulle tangenten vært flat. Hvis alternativ 2 hadde vært korrekt skulle tangenten gått mot å stige mer og mer når y nærmet seg 0 og x er liten (og positiv i dette eksempelet), for når $y' = \frac{x}{y}$, og $y \rightarrow 0$, vokser helt klart y' . Men her går y' mot å være mer og mer flat". Eneste gjenstående alternativ er alternativ 3, så $y' = x \cdot y$ må være korrekt.

b) $y' = x \cdot y \iff \frac{y'}{y} = x$ Dette er en separabel diff.likning., vi får

$$\int \frac{1}{y} \, dy = \int x \, dx \iff \ln|y| = \frac{1}{2}x^2 + C \iff y = Ce^{\frac{1}{2}x^2}$$

1.7 Oppgave 7

a) $\overrightarrow{AB} = (2, -2, -1)$, $\overrightarrow{AC} = (0, -1, 1)$

b) $A(-1, 1, 1)$ inn i planlikningen gir $3(-1) + 2(1) + 2(1) - 1 = -3 + 2 + 2 - 1 = 0$ så A ligger i planet. Akkurat den samme prosessen kan brukes for å vise at B og C ligger i planet.

c) Vi er gitt $D(s^2 - 1, 3s + 1, 10)$, $s \in \mathbb{R}$. Vektorene \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AC} og \overrightarrow{AD} utspenner et tetraeder $ABCD$ med volum

$$V = \frac{1}{6} \left| (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} \right|$$

Vi regner ut at $\overrightarrow{AD} = (s^2, 3s, 9)$, og at $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-3, -2, -2)$, så vi får at

$$V = \frac{1}{6} |(-3, -2, -2) \cdot (s^2, 3s, 9)| = \frac{1}{6} |-3s^2 - 6s - 18| = \frac{1}{6} |-3| |s^2 + 2s + 6| = \frac{1}{2} |s^2 + 2s + 6|$$

Observer at $s^2 + 2s + 6 = (s + 1)^2 + 5$, så $s^2 + 2s + 6$ er aldri negativ, og vi kan se bort ifra absoluttverditegnet, så funksjonen for volumet av s er gitt ved

$$V(s) = \frac{1}{2} s^2 + s + 3$$

d) Deriverer vi $V(s)$, får vi at $V'(s) = s + 1$ så $V'(s) = 0$ når $s = -1$. Observer at $V'(-2) = -1$ og $V'(0) = 1$, så $(-1, V(-1))$ er et bunnpunkt. Det minste volumet tetraederet kan ha er altså $V(-1) = \frac{1}{2} - 1 + 3 = \frac{5}{2}$.

1.8 Oppgave 8

Vi skal vise at $P(n) : 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ ved induksjon.

Basistilfellet, $n = 1$ gir venstre side lik $1^3 = 1$ og høyre side $\frac{1^2(1+1)^2}{4} = 1$, så høyre side er lik venstre side og basistilfellet stemmer.

Induksjonshypotesen, $n = k$. Vi antar at formelen stemmer for $n = k$, altså at

$$1^3 + 2^3 + \dots + k^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}$$

Induksjonssteget, vi ønsker nå å vise at $P(k) \implies P(k+1)$.

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^3 &\stackrel{\text{i.h.}}{=} \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 \\ &= (k+1)^2 \left(\frac{k^2}{4} + (k+1) \right) \\ &= (k+1)^2 \left(\frac{k^2 + 4k + 4}{4} \right) \\ &= (k+1)^2 \left(\frac{(k+2)^2}{4} \right) \\ &= \frac{(k+1)^2((k+1)+1)^2}{4} \end{aligned}$$

2 Del 2

2.1 Oppgave 1

b) Fra oppgave a) vet man allerede hvordan dette området ser ut. Skjæringspunktene fås ved å løse $f(x) = g(x)$. Vi får at skjæringspunktene er $\{0, 2\}$. Da er

$$M = \int_0^2 (g(x) - f(x)) \, dx = \int_0^2 (-x^4 + 4x^3 - 6x^2 + 4x) \, dx = \frac{8}{5}$$

c)

1	$F(x) := x^4 - 4r^3x - 1$ $\rightarrow \mathbf{F(x) := -4r^3x + x^4 - 1}$
2	$G(x) := 4r^3x^3 - 6r^2x^2 - r^4$ $\rightarrow \mathbf{G(x) := 4r^3x^3 - 6r^2x^2 - r^4}$
3	Løs($F=G$) $\rightarrow \mathbf{\{x = r - 1, x = r + 1\}}$
4	IntegralMellom($G, F, r-1, r+1$) $\rightarrow \mathbf{\frac{8}{5}}$

Vi ser at arealet mellom grafen er uavhengig av r .

2.2 Oppgave 2

a) Sentrumet i kuleflaten K_1 er gitt ved $(2t, 1, 3)$ og kulen har radius 2. Formelen for en kuleflate med radius r og sentrum i (x_0, y_0, z_0) er gitt ved $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$. Så for vår del blir likningen

$$(x - 2t)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 2^2$$

b) K_1 vil tangere yz -planet når avstanden fra sentrum i K_1 til yz -planet er 2. yz -planet har likningen $x = 0$. Bruker vi nå avstandsformelen får vi at avstanden er

$$D = \frac{|ax_1 + d|}{\sqrt{a^2}} = \frac{1 \cdot 2t}{\sqrt{1^2}} = 2t$$

Så vi må løse $2t = 2$, altså tangerer K_1 yz -planet når $t = 1$.

c) Vi har en ny kuleflate gitt ved $K_2 : x^2 + y^2 + z^2 = r^2$. Herifra er det lett å se at sentrum for K_2 er $(0, 0, 0)$. Dersom $r = 2$, vil kulene tangere hverandre når avstanden mellom sentrumene til K_1 og K_2 er 4 (radius K_1 + radius K_2). Altså må vi finne når avstanden mellom $(0, 0, 0)$ og $(2t, 1, 3)$ er 4. Avstanden mellom disse punktene er $S = \sqrt{(2t)^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{4t^2 + 10}$. Løser vi $\sqrt{4t^2 + 10} = 4$, får vi $t^2 = \frac{3}{2}$, så $t = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$. Altså vil kulene tangere hverandre når $t = \left\{ -\sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}} \right\}$.

d) Fra c) vet vi at avstanden mellom sentrumene, hvis K_2 har radius r , er $A(t) = \sqrt{4t^2 + 10}$, og at kulene tangerer hverandre når $A(t) = 2 + r$. Setter vi $A(t) = 2 + r$, får vi likningen $4t^2 + 10 = 4 + 4r + r^2 \iff t^2 = \frac{1}{4}r^2 + r - \frac{3}{2}$. Siden $t^2 \geq 0$ for alle $t \in \mathbb{R}$, må vi ha at $\frac{1}{4}r^2 + r - \frac{3}{2} \geq 0$. Denne likningen har to løsninger, der henholdsvis en er positiv, nemlig $r = \sqrt{10} - 2$. Altså er $r = \sqrt{10} - 2$ den minste verdien som sørger for at de to kulene tangerer.

2.3 Oppgave 3

a) Hvis bedriften klarer å nå målet blir utslippet i 2018 lik 20 000 tonn, i 2019 lik $20000 \cdot (0.85)$, i 2020 vil den være $(20000 \cdot 0.85) \cdot 0.85 = 20000 \cdot 0.85^2$. Vi ser at mønsteret danner en geometrisk rekke, så fra 2018 til 2027 blir summen av utslippene lik

$$\sum_{n=0}^9 20000 \cdot 0.85^n \approx 107083.4 \text{ (tonn)}$$

b) Om en annen bedrift vet vi at utslippene deres over 2018 – 2027 er

$$S(r) = \sum_{n=0}^9 30000 \cdot r^n$$

Vi er bedt å finne r slik at bedriften i a) og denne bedriften slipper ut like mye. Formelen for summen av en geometrisk rekke lar oss omskrive $S(r)$ til

$$S(r) = 30000 \left(\frac{1 - r^{10}}{1 - r} \right)$$

Settes $S(r)$ lik svaret i a) (dette kan man for eksempel gjøre i CAS), fås $r \approx 0.74$, så bedriften må redusere utslippene hvert år med omtrent 74% for at bedriftene skal slippe ut det samme over samme periode.

2.4 Oppgave 4

a) 3.2 sier oss at det renner inn 3.2 liter vann i tanken per min, 0.14 sier oss at det renner ut 14% av innholdet i tanken per minutt og $y(0) = 200$ sier oss at det var 200 liter vann i tanken til å starte med.

b) Dette er en lineær første ordens diff.likning

$$y' + 0.14y = 3.2$$

Integrerende faktor er $e^{\int 0.14 dx} = e^{0.14x}$ Vi får

$$\begin{aligned} e^{0.14x} (y' + 0.14y) &= 3.2e^{0.14x} \\ (ye^{0.14x})' &= 3.2e^{0.14x} \\ \int (ye^{0.14x})' dx &= \int 3.2e^{0.14x} dx \\ ye^{0.14x} &= \frac{160}{7}e^{0.14x} + C \\ y &= \frac{160}{7} + Ce^{-0.14x} \end{aligned}$$

Med initialverdibetingelsen $y(0) = 200$ fås $C = 200 - \frac{160}{7} = \frac{1240}{7}$, så

$$y = \frac{160}{7} + \frac{1240}{7}e^{-0.14x}$$

c) $y(20) \approx 33.63$ (liter)

d) Utifra opplysningene danner vi oss diff.likningen $y' = 1.5 - ky$ for en $k \in \mathbb{R}$, der $y(0) = 0$. Denne diff.likningen kan løses likt som i b) og vi får den generelle løsningen

$$y = \frac{1.5}{k} + Ce^{-kx}$$

Med initialverdibetingelsen $y(0) = 0$ fås

$$y = \frac{1.5}{k} - \frac{1.5}{k}e^{-kx}$$

Videre vet vi at mengden vann i tanken vil stabilisere seg på 10L etterhvert, med andre ord er

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{1.5}{k} - \frac{1.5}{k}e^{-kx} \right] = 10$$

Vi kan herifra konkludere at $k = \frac{1.5}{10}$ Så funksjonen vår er gitt ved

$$y = 10 - 10e^{-0.15x}$$

Og etter 20 minutter vil da derfor være

$$y(20) \approx 9.50 \text{ (liter i tanken)}$$