



تعليمات استخدام تدرريبات أعضاء النطق:

- لا ينصح باستخدام هذه التدريبات من قبل الوالدين إلا تحت إشراف الأخصائي الخاص بالطفل حيث يكون الأخصائي أعلم بإحتياجات الطفل.
- كل تدريب يجب أن يكون مدته تعتمد على قدرة كل طفل وتزدات بالتدريب حتى نصل لدرجة الإتقان.

المؤشرات التي توضح وجود ضعف في عضلات الفك والفم لدي الطفل

У	نعم	١- هل يحرك الطفل فمه من اليمين إلي اليسار أثناء الأكل؟
		وذلك للأن الفك الغير ثابت يكون الطفل في هذه الحالة عند الأكل
		يحرك فمه من اليمين لليسار وليس من أعلي إلي أسفل.
У	نعم	٢ - في الأوقات التي لا يكون فيها الطفِل يأكل أو يتكلم هل نجد فمه
		مفتوحاً ؟
У	نعم	٣- هل وقت الكلام تشعر بأن فمه لا يتحرك؟
У	نعم	٤ - هل يقوم الطفل بعض نفسه او الأخرين / يجز علي أسنانه /يأكل
		أنامله هل يسيل لعابه بصورة ثابته drooling؟
У	نعم	 هل يجمع الطفل الأكل في فمه محاولة منه لإذابته بلعابه؟
У	نعم	7 - هل طفلك لا يستطيع الشرب بشيليمو شفاطة /ينفخ في شمعة أو
		بابلز؟
У	نعم	٧- هل طفلك لا يستطيع تحريك لسانه من الأعلي إلي أسفل وفي
		حركات مختلفة؟

في حالة كانت الإجابة (بنعم أكثر من لا) فإن هذا الطفل يعاني من الضعف في العضلات المسؤولة عن النطق والذي ينتج عنها:

- تأثيرات سلبية علي نطق الحرف.
- ضعف في درجة مفهومية اللغة .
- ولكن لا يؤثر على إكتساب اللغة كما يدعى البعض.

ومن هذا يجب أن نحيل الطفل لطبيب أمراض تخاطب لكي يحدد لنا الإجراءات المناسبة للسيطرة علي هذا الضعف. عند وجود ضعف عند الطفل في إخراج صوت الحرف بسبب ضعف في عضلات العضو المسؤول عن إخراجه يجب البدأ في عمل تدريبات لهذا العضو بالإضافة إلي أنه يجب إختيار التدريبات التي تخدم الصوت وتساعد علي إخراجه ولكل طفل برنامج تدريبات مختلف عن الأخر.