

6. Raytracing

M. Ravasi


ERSE 210 Seismology

Eikonal Equation

$$|\nabla T|^2 = \frac{1}{\alpha^2}$$

↑
Traveltime


Raytracing in layered medium



$$X(p_x) = 2p_x \int_0^{z_p} \frac{dz}{\sqrt{u^2(p_x) - p_x^2}}$$

$$T(p_x) = 2 \int_0^{z_p} \frac{u^2(p_x) dz}{\sqrt{u^2(p_x) - p_x^2}}$$


Raytracing in spherical medium



$$\Delta(p_{sph}) = 2p_{sph} \int_{r_{tp}}^{r_e} \frac{1}{\sqrt{(ur)^2 - p_{sph}^2}} \frac{dr}{r}$$


$$T(p_{sph}) = 2 \int_{r_{tp}}^{r_e} \frac{(ur)^2}{\sqrt{(ur)^2 - p_{sph}^2}} \frac{dr}{r}$$

Earth-flattening transformation




Raytracing in heterogenous medium

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\mathbf{x}}{ds} = \frac{\mathbf{s}}{u} \\ \frac{d\mathbf{s}}{ds} = \nabla u \\ \mathbf{s}(s = 0) = \mathbf{s}_0 \\ \mathbf{x}(s = 0) = \mathbf{x}_0 \end{array} \right.$$





Ray amplitude (geometrical spreading)

$$\frac{A_2}{A_1} = \sqrt{\frac{dS_1}{dS_2}}$$




Ray amplitude (attenuation)



$$t^* = \int_{path} \frac{dt}{Q(\mathbf{r})}$$

Absorption model



$$Q^{-1}(\omega) = 2Q_m^{-1}D_Q(\omega)$$

$$c(\omega) = c_{\infty} \left(1 - \frac{D_c(\omega)}{Q_m} \right)$$