

Machine Learning

Regularization

Regularized linear regression

Regularized linear regression

termo para regularizar

$$J(\theta) = \frac{1}{2m}\left[\sum_{i=1}^{m}(h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 + \lambda \sum_{j=1}^{n}\theta_j^2\right]$$

$$\min_{\theta} J(\theta)$$

Gradient descent

Repeat {

$$\theta_0 := \theta_0 - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)}) x_0^{(i)}$$

$$\theta_j := \theta_j - \alpha \left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)}) x_j^{(i)} - \frac{\lambda}{m} \theta_j \right]$$

$(j = 1, 2, 3, \ldots, n)$

derivada parcial?

}

$$\theta_j := \theta_j (1 - \alpha \frac{\lambda}{m}) - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)}) x_j^{(i)}$$

esta parte proxima zero

Normal equation

$$X = \begin{bmatrix} (x^{(1)})^T \\ \vdots \\ (x^{(m)})^T \end{bmatrix}$$

$m \times (n+1)$

$$y = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ \vdots \\ y^{(m)} \end{bmatrix} \quad \mathbb{R}^m$$

$\Rightarrow \min_\theta J(\theta)$

$\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta) \overset{\text{set}}{=} 0$ for all j

$$\Rightarrow \theta = \left(X^T X + \lambda \begin{bmatrix} 0 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \right)^{-1} X^T y$$

$(n+1) \times (n+1)$

E.g. $n = 2$ (3*3)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Non-invertibility (optional/advanced).

Suppose $m \leq n$,

(#examples) (#features)

se tivermos poucos exemplos e variaveis é impossivelinverter matriz

$$\theta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

non-invertible / singular

pinv

inv

If $\lambda > 0$,

$$\theta = \left(X^T X + \lambda \begin{bmatrix} 0 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \right)^{-1} X^T y$$

invertible.