

## 2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

### 一、 判断题 (16 分, 每题 2 分, 共 8 题)

#### 1、【正解】对

【解析】若矩阵A的所有r阶子式都为0, 那么 $r(A) < r$ , 因此A的所有r+1阶子式, 如果存在都要为0, 否则 $r(A) \geq r+1$ 就会出现矛盾.

#### 2、【正解】错

【解析】“两个n维向量组等价的充分必要条件是它们有相同的秩”这个命题是错的,

我们用反例:  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{n \times 1} \right\}, \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{n \times 1} \right\}$  是n维向量组, 且它们的秩都是1,

显然它们不等价. (不能相互线性表示)

#### 3、【正解】错

【解析】 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  是两个初等矩阵, 但是  $AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$  不是初等矩阵

#### 4、【正解】对

【解析】若n阶方阵A的行列式 $|A| = 0$ , 则说明 $r(A) < n$ , 因此A的列向量线性相关, 所以一定有一列可由其余列线性表示.

#### 5、【正解】对

【解析】依题意 $f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I = 0$ , 且 $a_m \neq 0, a_0 \neq 0$ ,

那么 $A(a_m A^{m-1} + a_{m-1} A^{m-2} + \cdots + a_1 I) = -a_0 I$ ,

反证法: 假设A不可逆, 那么 $|A| = 0$ ,

所以 $|A|(a_m A^{m-1} + a_{m-1} A^{m-2} + \cdots + a_1 I) = |-a_0 I|$ , 等式左边为0, 右边为 $(-a_0)^n$ , 由于 $a_0 \neq 0$ , 那么左右两边矛盾, 所以A可逆

#### 6、【正解】错

【解析】举个反例: 假设 $A = [1, 1], \beta = 1, r = r(A) = 1, n = 2$ ,

那么 $AX = \beta$ 的展开形式为 $x_1 + x_2 = 1$ , 其通解为:

$$x = a \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + (1-a) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad a \text{ 是任意常数}$$

所以非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的线性无关的解的个数为大于 $n - r = 1$ .

#### 7、【正解】错

【解析】令  $r=2, n=2, \alpha_1=\alpha_2=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ , 显然生成的向量空间  $L(\alpha_1, \alpha_2)$  的维数为 1,

而不是  $\min(r, n) = 2$ . (思考: 题目改为  $r$  个线性无关的  $n$  维向量才正确)

8、【正解】对

【解析】设  $n$  阶方阵  $A, B$  均为正交矩阵, 根据正交矩阵的定义, 那么  $AA^T = BB^T = I$ ,

则  $AB(AB)^T = ABB^T A^T = AIA^T = I$ , 所以  $AB$  也为正交矩阵.

## 二、填空题(18分, 每题3分, 共6题)

1、【正解】-3

【解析】根据行列式的性质:  $(-4, 0, 1, 3)$  和  $(-2, 5, 1, x)$  是正交的, 因此  $8 + 1 + 3x = 0$ ,

所以  $x = -3$ .

2、【正解】 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

【解析】由初等矩阵的性质:  $A \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = B, B \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = C$ , 那么:

$$A \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = C \Rightarrow Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3、【正解】1

【解析】先求  $A$  的特征值, 由  $\det(A - \lambda I) = 0$ , 那么可以化简得到: (注: 这里的符号  $\det(A - \lambda I)$  表示方阵  $A - \lambda I$  的行列式, 下同)  $[(4 + \lambda)(3 - \lambda) - 8](\lambda - a) = 0$ , 由于  $\lambda = 1$  是该式的一个解, 而  $\lambda = 1$  时前面[中括号]的一项不为 0, 因此  $(\lambda - a) = 0$ , 那么  $a = 1$ .

4、【正解】 $k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}, k$  为任意常数

【解析】根据各行元素和为 0, 那么  $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{0}_{5 \times 1}$ , 由于  $r(A) = 3, n = 4$ , 那么解集中, 线性无

关的解的个数不超过  $n - r = 1$  个, 因此我们找到了方程的齐次解.  $\beta = \alpha_1 - 2\alpha_2 - 3\alpha_3$  这个条件告诉

我们  $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} = \beta$ , 所以我们找到了特解. 所以通解为:  $k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $k$  为任意常数

### 5、【正解】0

【解析】对  $A_{n \times n}$  是一个实对称矩阵, 那么  $A$  一定可相似对角化, 所以我们可知:

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} P^{-1}, \text{ 那么 } A^m = P \begin{bmatrix} \lambda_1^m & & & \\ & \lambda_2^m & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^m \end{bmatrix} P^{-1},$$

由于  $A^m = \mathbf{0}$ , 那么  $r(A^m) = 0$ ,

根据性质: 与可逆矩阵相乘不改变矩阵的秩, 那么:

$$r \left( \begin{bmatrix} \lambda_1^m & & & \\ & \lambda_2^m & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^m \end{bmatrix} \right) = r(A^m) = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0 (i=1, 2, \dots, n)$$

$$\text{又 } A = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} P^{-1}, \text{ 所以 } r(A) = r \left( \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \right) = 0$$

也就是说  $A = \mathbf{0}_{n \times n}$

### 三、 (8分)

【正解】  $D_n = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a_3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & a_3 & \cdots & 1 \\ 0 & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \quad (\text{利用加边法})$

从第二行开始, 每一行都减去第一行, 那么:

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & a_1 - 1 & & & & \\ -1 & & a_2 - 1 & & & \\ -1 & & & a_3 - 1 & & \\ \vdots & & & & \ddots & \\ -1 & & & & & a_n - 1 \end{vmatrix} = \left( 1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i - 1} \right) \prod_{i=1}^n (a_i - 1)$$

$a_i \neq 1, i=1, 2, \dots, n$

#### 四、 (12分)

【正解】  $A = \begin{bmatrix} a+3 & 1 & 2 \\ a & a-1 & 1 \\ 3(a+1) & a & a+3 \end{bmatrix}, [A|B] = \left[ \begin{array}{ccc|c} a+3 & 1 & 2 & a \\ a & a-1 & 1 & a \\ 3(a+1) & a & a+3 & 3 \end{array} \right]$

(1)  $\beta$  能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  唯一的线性表示意味着  $AX=B$  仅有唯一解.

所以  $r(A) = r(A|B) = 3$ , 那么  $A$  可逆

则  $\det(A) \neq 0$ . 由于  $\det(A) = a^2(a-1)$

所以, 当  $a \neq 0$  且  $a \neq 1$  时,  $\beta$  能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  唯一的线性表示.

(2) 当  $a=1$  时,

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 6 & 1 & 4 \end{bmatrix}, [A|B] = \left[ \begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 4 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

此时,  $r(A) = r(A|B) < 3$ ,  $\beta$  能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 但表示不唯一.

主元列在第一列和第二列, 因此我们将  $x_3$  看作自由变量

那么  $\begin{cases} x_1 = -x_3 + 1 \\ x_2 = 2x_3 - 3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$ , 即通解为:  $X = k \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}$

此时  $\beta = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]X$

(3) 当  $a=0$  时

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \end{bmatrix}, [A|B] = \left[ \begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

由于  $r(A) \neq r(A|B)$ , 因此  $\beta$  不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示

#### 五、 (10分)

【正解】 由于  $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & b \end{bmatrix}$  和矩阵  $B = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & c \end{bmatrix}$  相似,

那么  $A, B$  有相同的特征值, 则  $tr(A) = tr(B), \det(A) = \det(B)$

由于  $B$  的特征值为对角线上元素  $-1, 2, c$ , 那么  $A$  也有这三个特征值.

由于  $A = \left[ \begin{array}{c|cc} -2 & 0 & 0 \\ \hline 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & b \end{array} \right]$  是下三角的分块矩阵,

所以其特征值为:  $-2$ , 以及  $\begin{bmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{bmatrix}$  的两个特征值.

那么  $c = -2$ .

由于  $\det(B) = -1 \times 2 \times (-2) = 4, tr(B) = -1 + 2 + (-2) = -1$

因此:  $\det(A) = -2 \times (ab - 2) = 4, tr(A) = a + b - 2 = -1$

解得:  $a = 0, b = 1$  (或者  $a = 1, b = 0$ )

## 六、 (12分)

【正解】  $f(x, y, z) = x^2 + 4xy + 4xz + y^2 + 4yz + z^2$

对应的矩阵形式表示为  $f(x, y, z) = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

我们令  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ , 那么由于  $A$  是对称矩阵,

所以  $A$  一定可以相似对角化.

令  $\det(A - \lambda I) = 0$ , 所以  $(\lambda - 5)(\lambda + 1)^2 = 0$

解得  $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 5$

当  $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$  时, 根据  $(A - \lambda I)x = 0$  可以解得对应的特征向量为  $p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, p_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

将其进行施密特正交化, 那么  $q_1 = p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, q_2 = p_2 - \frac{q_1 \cdot p_2}{q_1 \cdot q_1} q_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1 \end{bmatrix}$

单位化后为:  $\varepsilon_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \end{bmatrix}$

同理:  $\lambda_3 = 5$  对应的标准化后的特征向量为  $\varepsilon_3 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$

那么所使用的正交变换矩阵  $P = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$  ( $P$  正交)

因此  $A = P \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 5 \end{bmatrix} P^{-1} \Rightarrow P^T A P = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 5 \end{bmatrix}$  (利用  $P^{-1} = P^T$ )

我们令:  $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}, X = PV$

所以  $f(x, y, z) = X^T \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} X = V^T P^T \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} P V = V^T \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 5 \end{bmatrix} V$

因此, 标准型为  $f = -v_1^2 - v_2^2 + 5v_3^2$

## 七、 (10分)

【证明】根据  $A, B, A + B$  都是  $n$  阶可逆矩阵,

因此  $A^{-1}(A + B)B^{-1} = A^{-1}AB^{-1} + A^{-1}BB^{-1} = B^{-1} + A^{-1}$



$$\text{因此}(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=\{A^{-1}(A+B)B^{-1}\}^{-1}=B(A+B)^{-1}A$$

#### 八、 (10 分)

【证明】由于矩阵  $A$  的列向量组  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$  线性无关，因此  $m \geq n$ 。

否则当  $m < n$  时， $r(A) \leq \min(m, n) \Rightarrow r(A) < n$ ，那么  $A$  的列向量组  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$  线性相关，故矛盾。

由于  $m \geq n$ ，且  $A$  的列向量组  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$  线性无关，因此  $r(A) = n$

充分性：

(1)  $K$  是可逆矩阵时，那么由于  $B = AK$ ，因此  $r(B) = r(A) = n$ ，

因此矩阵  $B$  的列向量组  $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$  也线性无关

(注：与可逆矩阵相乘不改变矩阵的秩)

必要性：

(2) 当矩阵  $B$  的列向量组  $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$  线性无关时，那么  $r(B) = n$

因此，我们可以得到  $r(B) = r(A) = n$

由题意存在  $B = AK$ ，注意到  $K$  是  $n$  阶方阵。

我们用反证法：假设  $K$  不可逆，那么一定有  $r(K) < n$ ，因此  $r(AK) \leq \min(r(A), r(K)) = r(K) < n$

(注：秩的不等式  $r(AB) = \min(r(A), r(B))$ )

又因为  $r(B) = n$ ， $B = AK$ ，所以  $r(AK) = n$

因此产生了矛盾

也就是说  $K$  一定是可逆矩阵。