

《线性代数 2020 春 B》参考答案

一、判断题

1. 错, 2. 对, 3. 对, 4. 错, 5. 对, 6. 对, 7. 对, 8. 对

二、填空题:

1. 2^{3n-1} , 2. $\alpha_5 = -\frac{9}{2}\alpha_1 - \frac{3}{2}\alpha_2 + \frac{5}{2}\alpha_4$, 3. 48, 4. $\lambda \neq 1$, 5. $(1, \infty)$

三、解答题

解: 按第一列展开

$$D_n = xD_{n-1} + (-1)^{n+1}a_n \begin{vmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & -1 \end{vmatrix} = xD_{n-1} + a_n. \text{ 所以递推得到}$$

$$D_n = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n.$$

四、解答题

方程有唯一解, 当且仅当系数行列式非零, 即

$$\begin{vmatrix} 1 & -a & -2 \\ 1 & -1 & a \\ 5 & -5 & -4 \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 解之得 } a \neq -\frac{4}{5} \text{ 或 } a \neq 1.$$

当 $a = -\frac{4}{5}$ 时, 系数矩阵与增广矩阵的秩不一致, 所以无解;

当 $a = 1$ 时, 无穷多解, 其通解为 $c_1(1, 1, 0)^T + c_2(1, 0, 1)^T$.

五、解答题

解: f 所对应的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & a \end{pmatrix}$. 由题意知 A 的特征值为 $-1, -1, 5$. 于是根据迹的性质得到:

$1+1+a = -1-1+5$, 所以 $a = 1$.

求特征值 $\lambda = -1$ 所对应的特征向量, 即求解方程组 $(-I - A)X = 0$, 解之得基础解系为

$$(-1, 1, 0)^T, (-1, 0, 1)^T$$

利用 Gram-Schmidt 正交化办法对其正交化和单位化得到:

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^T \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)^T$$

求特征值 $\lambda = 5$ 所对应的特征向量, 即求解方程组 $(5I - A)X = 0$, 解之得基础解系为

$$(1, 1, 1)^T. \text{ 对其单位化得到: } \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T.$$

所以将此二次型对应的标准型所采用的正交变换矩阵为

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

六、

解: A 的特征值为 3, 0, 0, 其中 3 为 1 重特征值, 0 为 2 重特征值. 由于 A 可相似对角化, 所以 0 有两个线性无关的解, 即 $(0I - A)X = 0$ 的解空间的维数为 2, 从而 $r(A) = 1$, 所以 $a = 0$.

七、解: 根据 f 的定义, 得到:

$$\begin{aligned} I + f(A) &= I + (I + A)^{-1}(I - A) = (I + A)^{-1}(I + A) + (I + A)^{-1}(I - A) \\ &= (I + A)^{-1}(I - A + I + A) = 2(I + A)^{-1}. \end{aligned}$$

于是

$$(I + f(A)) \cdot \frac{(I + A)}{2} = I, \text{ 所以 } I + f(A) \text{ 可逆, 且其逆为 } \frac{(I + A)}{2}.$$

八、证明: 考虑 A 的行标准型. 由于 A 的秩为 n , 所以 A 的行标准型中有 n 列, 分别是 m

维的基本单位向量. 同时, 又由于 A 只有 n 个列, 所以 A 的行标准型为 $\begin{pmatrix} I \\ O \end{pmatrix}$, 其中 I 是 n

阶的单位矩阵, O 是 $(m - n) \times n$ 零矩阵. 所以存在 m 阶可逆矩阵 G 使得 $GA = \begin{pmatrix} I \\ O \end{pmatrix}$. 最后,

令 $B = (I, O)G$, 则

$$BA = (I, O)GA = (I, O) \begin{pmatrix} I \\ O \end{pmatrix} = I.$$