

微分中值等式问题证明中的辅助函数

用罗尔定理证题，关键是构造辅助函数.

问题一 设函数 $f(x), g(x)$ 可微，且 $f(a) = f(b) = 0$ ，证明 $\exists \xi \in (a, b)$ ，使

$$f'(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0.$$

分析 结论等价于在中值点 ξ 处成立等式

$$\boxed{f'(x) + f(x)g'(x) = 0}, \quad (*)$$

或 $f'(x)e^{g(x)} + f(x)e^{g(x)}g'(x) = 0$ ，

即 $\left\{f(x)e^{g(x)}\right\}' \Big|_{x=\xi} = 0$.

故构造辅助函数

$$\boxed{F(x) = f(x)e^{g(x)}}, \quad (**)$$

用罗尔定理即可证明结论.

以下皆为问题一的特例.

例 1 设函数 $f(x)$ 可微，且 $f(a) = f(b) = 0$ ，证明 $\exists \xi \in (a, b)$ ，使

$$f'(\xi) = \lambda f(\xi).$$

分析 让 $g'(x) = -\lambda$ ，取 $g(x) = -\lambda x$ ，辅助函数为 $F(x) = f(x)e^{-\lambda x}$.

例 2 设函数 $f(x)$ 可微，证明 $\exists \xi \in (0, \pi)$ ，使

$$f'(\xi) = -f(\xi)\cot \xi.$$

分析 让 $g'(x) = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ ，取 $g(x) = \ln \sin x, x \in (0, \pi)$ ，辅助函数为

$$F(x) = f(x)e^{\ln \sin x} = f(x)\sin x.$$

依循以下方式也可找到辅助函数：

$$f'(\xi) = -f(\xi)\cot \xi \Leftrightarrow f'(\xi)\sin \xi + f(\xi)\cos \xi = 0 \Leftrightarrow \left\{f(x)\sin x\right\}' \Big|_{\xi} = 0.$$

例 3 设函数 $f(x)$ 可微，且 $f(1) = 0$ ，证明对正整数 m, n ， $\exists \xi \in (0, 1)$ ，使

$$nf'(\xi) = -mf(\xi)/\xi.$$

分析 让 $g'(x) = \frac{m}{nx}$, 取 $g(x) = \frac{m}{n} \ln x, x \in (0,1)$, 辅助函数为

$$F(x) = f(x)e^{\frac{m}{n} \ln x} = f(x) \cdot \sqrt[n]{x^m}.$$

也可循以下方式找到辅助函数:

$$nf'(\xi) = -mf(\xi)/\xi \Leftrightarrow f'(\xi)\xi^{\frac{m}{n}} + \frac{m}{n}\xi^{\frac{m}{n}-1}f(\xi) = 0$$

$$\Leftrightarrow \left\{ f(x) \cdot x^{\frac{m}{n}} \right\}' \Big|_{\xi} = 0.$$

例 4 设函数 $f(x)$ 可微, 且 $f(1) = 0$, 证明 $\exists \xi \in (0,1)$, 使

$$f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi).$$

分析 让 $g'(x) = -1 + \frac{1}{x}$, 取 $g(x) = -x + \ln x, x \in (0,1)$, 辅助函数为

$$F(x) = f(x)e^{-x+\ln x} = f(x) \cdot xe^{-x}.$$

你能熟练给出下面的辅助函数吗?

中值点 ξ 处 $f'(x) + f(x)g'(x) = 0$	辅助函数 $F(x) = f(x)e^{g(x)}$	
$xf'(x) + f(x) = 0$	$F(x) = xf(x)$	
$xf'(x) - f(x) = 0$	$F(x) = f(x)/x$	$g'(x) = -\frac{1}{x}, g(x) = -\ln x$
$xf'(x) + kf(x) = 0,$	$F(x) = x^k f(x)$	$g'(x) = \frac{k}{x}, g(x) = k \ln x$
$f'(x)h(x) + f(x)h'(x) = 0$	$F(x) = f(x)h(x)$	
$f'(x)h(x) - f(x)h'(x) = 0$	$F(x) = f(x)/h(x)$	$g'(x) = -\frac{h'(x)}{h(x)}, g(x) = -\ln h(x)$
$f'(x) + kf(x) = 0$	$F(x) = e^{kx} f(x)$	
$(1+x^2)f'(x) + 2xf(x) = 0$	$F(x) = (1+x^2)f(x)$	

练习

1. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数, 且 $f'(0)=0$, 试证存在 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1-\xi}.$$

分析 记 $h(x) = f'(x)$, 结论为

$$(1-\xi)h'(\xi) - 2h(\xi) = 0,$$

$$\text{或} \quad (1-\xi)^2 h'(\xi) + 2(1-\xi)(-1)h(\xi) = 0.$$

辅助函数为 $F(x) = (1-x)^2 f'(x)$.

2. 设 $f(x) \in C[0,1]$, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=f(1)=0, f(\frac{1}{2})=1$, 证明:

(1) 存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f(\eta) = \eta$;

(2) 对实数 λ , 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda(f(\xi) - \xi) = 1$.

分析 记 $h(x) = f(x) - x$, 用零点定理可证明 (1). 而 (2) 的结论能写为

$h'(\xi) - \lambda h(\xi) = 0$, 辅助函数为 $F(x) = e^{-\lambda x} h(x)$.